


[図1]




[図2]

ID: 123456 テスト開始2次元コード: 					
A1	B1	C1	D1	E1	F1
A2	B2	C2	D2	E2	F2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
A9	B9	C9	D9	E9	F9


[図3]

テストミールキットID	錠剤A1	錠剤A2	錠剤A3	...	錠剤F9
001000	甘味レベル7	塩味レベル3	酸味レベル5	...	塩味レベル1
001001	旨味レベル2	苦味レベル9	無味	...	旨味レベル3
:	:	:	:	:	:


[図4]




[図5]




[図6]




[図7]




[図8]




[図9]




[図10]




[図11]



[図12]



[図13]



[図14]

味覚テスト(味覚認知閾値テスト)

次の錠剤を1つずつ味わって、
同じ味か、もしくはどの味が異なるかを
お答えください。

B2 と E8


同じ味	旨味が異なる
甘味が異なる	塩味が異なる
酸味が異なる	苦味が異なる

テスト進捗度

14



[図15]



[図16]

味覚テスト(味覚濃度テスト)

次の錠剤を1つずつ味わって、
苦味が濃い順に並べてください。

A3

A6

C3

D4

濃い ←
→ 薄い

テスト進捗度

[図17]

	錠剤A3	錠剤A6	錠剤C3	錠剤D4	正解との 相違量
正解の順番	1	4	3	2	—
回答の順番	1	2	3	4	8

[図18]

味覚テスト(混在テスト)


E3の錠剤を味わって、
それぞれの味覚の有無をお答えください。

	ない	ある
甘味	☒	☐
塩味	☐	☒
酸味	☐	☒
苦味	☒	☐
旨味	☐	☒

決定

テスト進捗度

14




[図19]

	甘味レベル	塩味レベル	酸味レベル	苦味レベル	旨味レベル
錠剤E3	2	3	1	0(含有せず)	0(含有せず)
ユーザ回答	ない	ある	ある	ない	ある
スコア	-2	2	4	0	-2


[図20]

味覚レベル	0(含有せず)	1	2	3	4
正解時の 加点	0	4	3	2	1
不正解時の 加点	-2	-1	-2	-3	-4

[図21]



[図22]




[図23]

評価データベース		
レストラン店舗名	ユーザID	評価
レストラン店舗S	1010	4
レストラン店舗Sの料理T	1010	5
レストラン店舗S	7367	4
:	:	:

[図24]

ユーザ情報	
ユーザID	1010
味覚スコア	684
味覚特性	76,43,41,62,60
居住する国/地域	日本
居住する都道府県	大阪府
:	:


[図25]




[図26]




[図27]




[図28]




[図29]




[図30]




[図31]




[図32]




[図33]




[図34]




[図35]




[図36]




[図37]




[図38]



[図39]



[図40]



[図41]

