

100
112
106
120
116
102
130
132
108
3
3
104
114
110

FIG. 1A



106
108
102
122
124
114
112
104
110

FIG. 1B




FIG. 2A




FIG. 2B




FIG. 3B




FIG. 3A




FIG. 3C




FIG. 4A




FIG. 4B




FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 6



GEMCITABINE CONC. IN PROSTATE POST BLADDER PERFUSION
IN-VITRO PROSTATE POTENCY RANGE
HIGH RANGE IN-VITRO IC50 (200 ng/ml)
LOW RANGE IN-VITRO IC50 (10 ng/ml)
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
24HR IV SINGLE DOSE
6HR BLADDER PERF
24HR BLADDER PERF
14C GEMCITABINE CONC (ng/g)

FIG. 7



GEMCITABINE PLASMA LEVEL
GEMCITABINE PLASMA LEVEL (ug-eq/ml)
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
COLLECTION TIME (HR)
A1-6HR
A2-6HR
A3-6HR
A4-24H
A5-24HR
A6-24HR
A7-IV
A8-IV
A9-IV

FIG. 8



14C GEMCITABINE BLADDER CONCENTRATION
HIGH RANGE IN-VITRO IC50 (3 ug/ml)
LOW RANGE IN-VITRO IC50 (1 ug/ml)
14C GEMCITABINE CONC (ug/g)
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2HR
24H
2HR
6HR
24HR
IV SINGLE DOSE*
BLADDER PERFUSION

FIG. 9



OXALIPLATIN TERMINAL CONCENTRATIONS
250000
200000
150000
100000
50000
0
OXALIPLATIN (ng/g MATRIX)
72 H PERFUSION @72 H
BLADDER
KIDNEY
PROSTATE
URINE
WHOLE BLOOD

FIG. 10



CISPLATIN TERMINAL CONCENTRATIONS
250000
200000
150000
100000
50000
0
CISPLATIN (ng/g MATRIX)
72 H PERFUSION @72 H
24H PERFUSION @24 H
IV BOLUS @72 H
BLADDER
KIDNEY
PROSTATE
URINE
WHOLE BLOOD

FIG. 11