
Baseline
Post-dosing
Control
D = 0.04 mg/kg
D = 0.08 mg/kg
D = 0.16 mg/kg
D = 0.32 mg/kg

FIG. 1


Proportion with absence of cognitive impairment
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
60
70
80
90
100
Age
L,L
L,VL
S,L
S,S
S,VL
VL,VL

FIG. 2


Low risk
High risk
Proportion with absence of cognitive impairment
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
60
65
70
75
80
85
Age

FIG. 3


All high risk
Proportion with absence of cognitive impairment
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
60
65
70
75
80
85
Age

FIG. 4


All high risk
Proportion with absence of cognitive impairment
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
60
65
70
75
80
85
Age

FIG. 5


Low risk
High risk
Proportion with absence of cognitive impairment
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
60
65
70
75
80
85
Age

FIG. 6


Low risk
High risk
Proportion with absence of cognitive impairment
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
60
65
70
75
80
85
Age

FIG. 7


Low risk
High risk
Proportion with absence of cognitive impairment
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
60
65
70
75
80
85
Age

FIG. 8


All low risk
Proportion with absence of cognitive impairment
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
60
65
70
75
80
Age

FIG. 9