


G1 对照
G2 CR194L4 100mg/kg iv q3d*6
G3 CR194A6 100mg/kg iv q3d*3
G4 CR194N5 100mg/kg iv q3d*3
平均体重(g)
28
26
24
22
20
18
16
14
12
d1
d4
d7
d11
d14
d18
d21
d25
d28
分组后天数


A


G1 对照
G2 CR194L4 100mg/kg iv q3d*6
G3 CR194A6 100mg/kg iv q3d*3
平均瘤体积(mm³)
2500
2000
1500
1000
500
0
d1
d4
d7
d11
d14
d18
d21
d25
d28
分组后天数

B


图 1

小鼠的体重随给药时间的变化情况(平均值±标准误)




A

小鼠相较初始体重随给药时间的变化情况(平均值±标准误)




B

图 2


体重变化（%）
治疗后天数
G1: 对照
G2:CR194AX 50mg/kg 单剂量
G3:CR194AX 100mg/kg 单剂量
G4:CR194X3 150mg/kg 单剂量
G5:CR194X3 200mg/kg 单剂量

A


食物重量（g）
治疗后天数
G1: 对照
G2:CR194AX 50mg/kg 单剂量
G3:CR194AX 100mg/kg 单剂量
G4:CR194X3 150mg/kg 单剂量
G5:CR194X3 200mg/kg 单剂量

B

图 3