


[Fig. 1]


50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Cell death (%)
H. pylori (48h) - + + +
Rebamipide (50 μM) - - + -
Revaprazan (50μM) - - - +


[Fig. 2]


30
25
20
15
10
5
0
Cell death (%)
EtOH (200mM) - + + +
Rebamipide (μM) - - 50 -
Revaprazan (μM) - - - 50


[Fig. 3]


40mg/kg
Indomethacin
10mg/kg
Revaprazan
+
40mg/kg
Indomethacin
EtOH
10mg/kg
Revaprazan
+
EtOH


[Fig. 4]




[Fig. 5]




[Fig. 6]



[Fig. 7]




[Fig. 8]



Control
(40 mg/kg Indomethacine, 12hrs)

5mg/kg Omeprazole+
40mg/kg Indomethacine


30mg/kg Rebamipide+
40mg/kg Indomethacine



5mg/kg Revaprazan+
40mg/kg Indomethacine

10mg/kg Revaprazan+
40mg/kg Indomethacine

[Fig. 9]


40mg/kg Indomethacine +
5mg/kg Revaprazan
Control
(40mg/kg Indomethacine, 8hrs)
40mg/kg Indomethacine +
10mg/kg Revaprazan