請求の範囲

[請求項1] アスコルビン酸の量が、６ｍｇ／１００ｍｌ以上であり、

アスコルビン酸の質量の中鎖脂肪酸トリグリセリドの質量に対する割合（アスコルビン酸／中鎖脂肪酸トリグリセリド）が、０．０００３以上０．１３４０以下であり、

さらに、カテキン、カテキンガレート、エピカテキン、エピカテキンガレート、ガロカテキン、ガロカテキンガレート、エピガロカテキン、またはエピガロカテキンガレートから選択される１以上のカテキン類を、上記カテキン類の合計量として１ｍｇ／１００ｍｌ以上含む、

加熱殺菌済み容器詰め飲料。

[請求項2] 中鎖脂肪酸トリグリセリドの量が５００ｍｇ／１００ｍｌ以上である、請求項１に記載の加熱殺菌済み容器詰め飲料。

[請求項3] 中鎖脂肪酸トリグリセリドにおける中鎖脂肪酸が、炭素数８の飽和脂肪酸及び／又は炭素数１０の飽和脂肪酸である、請求項１又は２に記載の加熱殺菌済み容器詰め飲料。

[請求項4] 加熱殺菌が、８５℃で３０分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で行われたものである、請求項１～３のいずれか１項に記載の加熱殺菌済み容器詰め飲料。

[請求項5] アスコルビン酸の量が６ｍｇ／１００ｍｌ以上であり、かつ、中鎖脂肪酸トリグリセリドの量に対するアスコルビン酸の量の割合（アスコルビン酸／中鎖脂肪酸トリグリセリド）が０．０００３以上０．１３４０以下である飲料を加熱殺菌及び容器詰めして保管した際に生じる不快臭を抑制する方法であって、

前記飲料に、カテキン、カテキンガレート、エピカテキン、エピカテキンガレート、ガロカテキン、ガロカテキンガレート、エピガロカテキン、またはエピガロカテキンガレートから選択される１以上のカテキン類を、上記カテキン類の合計量として１ｍｇ／１００ｍｌ以上

含有させることを含む、上記方法。