

明 細 書

発明の名称：抗PD-L1抗体

技術分野

[0001] 本発明は、抗PD-L1抗体に関し、より詳細には、ラット抗ウシPD-L1抗体の相補鎖決定領域（CDR）を含む可変領域とラット以外の動物の抗体の定常領域とを有する抗PD-L1抗体に関する。

背景技術

[0002] 免疫抑制受容体Programmed death 1（PD-1）とそのリガンドであるProgrammed death ligand 1（PD-L1）は過剰な免疫応答を抑制し、免疫寛容に深く関連している因子として京都大学、本庶 佑氏らによって同定された分子である（非特許文献1：Ishida Y, Agata Y, Shibahara K, Honjo T The EMBO Journal. 1992 Nov;11(11):3887-3895.）。腫瘍における免疫抑制に関与していることも近年明らかにされ、ヒト医療では、PD-1の働きを阻害する抗体医薬が開発され、実用化されている（小野薬品工業株式会社「オプジーボ（登録商標）」）。

[0003] これまで、本発明者らは、動物難治性疾病に対するPD-1又はPD-L1を標的とする免疫療法の開発を行い、この新規免疫療法が疾病横断的かつ動物横断的に応用が可能であることを明らかにしてきた（非特許文献2：Ikebuchi R, Konnai S, Okagawa T, Yokoyama K, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. Immunology. 2014 Aug;142(4):551-61.、非特許文献3：Maekawa N, Konnai S, Ikebuchi R, Okagawa T, Adachi M, Takagi S, Kagawa Y, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. PLoS One. 2014 Jun 10;9(6):e98415.、非特許文献4：Mingala CN, Konnai S, Ikebuchi R, Ohashi K. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis. 2011 Jan;34(1):55-63.）。

[0004] しかし、本発明者らがこれまでに作製した抗体は、ラット抗体であるため、ラット以外の動物には頻回投与できない。

先行技術文献

非特許文献

[0005] 非特許文献1: Ishida Y, Agata Y, Shibahara K, Honjo T The EMBO Journal . 1992 Nov;11(11):3887-3895.

非特許文献2: Ikebuchi R, Konnai S, Okagawa T, Yokoyama K, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. Immunology. 2014 Aug;142(4):551-61.

非特許文献3: Maekawa N, Konnai S, Ikebuchi R, Okagawa T, Adachi M, Takagi S, Kagawa Y, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. PLoS One. 2014 Jun 10;9(6):e98415.

非特許文献4: Mingala CN, Konnai S, Ikebuchi R, Ohashi K. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis. 2011 Jan;34(1):55-63.

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] 本発明は、ラット以外の動物にも頻回投与が可能な抗PD-L1抗体を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0007] 本発明者らは、イヌPD-1およびPD-L1の結合を阻害可能なラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体(4G12)の可変領域を決定し、この可変領域遺伝子と、イヌ免疫グロブリン(ヒトIgG4に相当するIgG-D)の定常領域遺伝子を組み合わせたキメラ抗体遺伝子を導入したチャイニーズハムスター卵巣細胞(Chinese hamster ovary cell:CHO細胞)を培養増殖させることにより、ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体を作製することに成功した。さらに、ラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体(4G12)の可変領域のCDRを決定した。

また、本発明者らは、ウシPD-1およびPD-L1の結合を阻害可能なラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体(4G12)の可変領域を決定し、この可変領域遺伝子と、ウシ免疫グロブリン(ウシIgG1、ただし、ADCC活性を抑制するために、C H2ドメインのFc γ 受容体予想結合部位に変異を加えた(図19参照。アミノ酸番号及び変異: 250 E→P, 251 L→V, 252 P→A, 253 G→deletion, 347 A

→S, 348 P→S; Ikebuchi R, Konnai S, Okagawa T, Yokoyama K, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. Immunology 2014 Aug; 142(4):551-561.)。)の定常領域遺伝子を組み合わせたキメラ抗体遺伝子を導入したチャイニーズハムスター卵巣細胞(Chinese hamster ovary cell:CHO細胞)を培養増殖させることにより、ラットーウシキメラ抗PD-L1抗体を作製することに成功した。本発明は、これらの知見により完成されたものである。

[0008] 本発明の要旨は以下の通りである。

(1) (a)QSLLYSENQKDY (配列番号37) のアミノ酸配列を有するCDR1、WATのアミノ酸配列を有するCDR2及びGQYLVYPFT (配列番号38) のアミノ酸配列を有するCDR3を含むL鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域とを有するL鎖と、(b)GYTFTSNF (配列番号39) のアミノ酸配列を有するCDR1、IYPEYGNT (配列番号40) のアミノ酸配列を有するCDR2及びASEEAVISLVY (配列番号41) のアミノ酸配列を有するCDR3を含むH鎖可変領域とラット以外の動物抗体のH鎖定常領域とを有するH鎖とを含む、抗PD-L1抗体。

(2) L鎖可変領域とH鎖可変領域がラットに由来する(1)記載の抗体。

(3) L鎖可変領域がラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域であり、H鎖可変領域がラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域である(2)記載の抗体。

(4) L鎖可変領域が配列番号1のアミノ酸配列を有し、H鎖可変領域が配列番号2のアミノ酸配列を有する、(3)記載の抗体。

(5) ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域が、Lambda鎖又はKappa鎖の定常領域のアミノ酸配列を有する(1)～(4)のいずれかに記載の抗体。

(6) ラット以外の動物抗体のH鎖定常領域が、ヒトのIgG4に相当する免疫グロブリンの定常領域のアミノ酸配列を有する(1)～(5)のいずれかに記載の抗体。

(7) ラット以外の動物がウシであり、ウシ抗体のH鎖定常領域が、ADCC活性及び/又はCDC活性を低下させる変異が導入されたものである(1)～(5)のいずれかに記載の抗体。

(8) ラット以外の動物がイヌであり、イヌ抗体のL鎖定常領域が、Lambda鎖

の定常領域のアミノ酸配列を有し、かつ、イヌ抗体のH鎖定常領域が、ヒトのIgG4に相当する免疫グロブリンの定常領域のアミノ酸配列を有する（６）記載の抗体。

（９）ウシ抗体のL鎖定常領域が、Lambda鎖の定常領域のアミノ酸配列を有し、かつ、ウシ抗体のH鎖定常領域が、ADCC活性及び/又はCDC活性を低下させる変異が導入されたものである（７）記載の抗体。

（１０）イヌ抗体のL鎖定常領域が配列番号３のアミノ酸配列を有し、イヌ抗体のH鎖定常領域が配列番号４のアミノ酸配列を有する（８）記載の抗体。

（１１）ウシ抗体のL鎖定常領域が配列番号１００のアミノ酸配列を有し、ウシ抗体のH鎖定常領域が配列番号１０２のアミノ酸配列を有する（９）記載の抗体。

（１２）L鎖２本とH鎖２本の４本鎖構造を持つ（１）～（１１）のいずれかに記載の抗体。

（１３）（１）～（１２）のいずれかに記載の抗体を有効成分として含む、医薬組成物。

（１４）がん及び/又は感染症の予防及び/又は治療のための（１３）記載の医薬組成物。

（１５）がん及び/又は感染症が、腫瘍性疾患、白血病、ヨーネ病、アナプラズマ病、細菌性乳房炎、真菌性乳房炎、マイコプラズマ感染症（例えば、マイコプラズマ性乳房炎、マイコプラズマ性肺炎など）、結核、小型ピロプラズマ病、クリプトスポリジウム症、コクシジウム症、トリパノソーマ病及びリーシュマニア症からなる群より選択される（１４）記載の医薬組成物。

（１６）（a'）QSLLYSENQKDY（配列番号３７）のアミノ酸配列を有するCDR1、WATのアミノ酸配列を有するCDR2及びGQYLVYPFT（配列番号３８）のアミノ酸配列を有するCDR3を含むL鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域とを有するL鎖をコードするDNAと、（b'）GYTFTSNF（配列番号３９）のアミノ酸配列を有するCDR1、IYPEYGNT（配列番号４０）のアミノ酸配列を有するCDR2及びASEEAVISLVY（配列番号４１）のアミノ酸配列を有するCDR3を含

むH鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のH鎖定常領域とを有するH鎖をコードするDNAとを含む、人工遺伝子DNA。

(17) (16) 記載の人工遺伝子DNAを含むベクター。

(18) (17) 記載のベクターにより形質転換された宿主細胞。

(19) (18) 記載の宿主細胞を培養し、培養物から抗PD-L1抗体を採取することを含む、抗体の製造方法。

(20) QSLLYSENQKDY (配列番号37) のアミノ酸配列を有するCDR1、WATのアミノ酸配列を有するCDR2及びGQYLVYPFT (配列番号38) のアミノ酸配列を有するCDR3を含むL鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域とを有するL鎖をコードするDNA。

(21) GYTFTSNF (配列番号39) のアミノ酸配列を有するCDR1、IYPEYGNT (配列番号40) のアミノ酸配列を有するCDR2及びASEEAVISLVY (配列番号41) のアミノ酸配列を有するCDR3を含むH鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のH鎖定常領域とを有するH鎖をコードするDNA。

本明細書は、本願の優先権の基礎である日本国特許出願、特願2016-159088、特願2016-159089、特願2017-110723及び特願2017-61454の明細書および／または図面に記載される内容を包含する。

発明の効果

[0009] 本発明により、新規な抗PD-L1抗体が得られた。この抗体は、ラット以外の動物にも利用可能である。

図面の簡単な説明

[0010] [図1] 組み換えイヌPD-1に対する組み換えイヌPD-L1結合の阻害。イヌPD-1-IgへのイヌPD-L1-Igの結合をELISAプレート上で検出した。抗体非添加時の吸光度 (O.D.) を100%とし、各抗体濃度におけるO.D. を相対値として表した。イヌPD-L1に交差反応を示したラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体4G12; Rat IgG2a (κ)、5A2; Rat IgG1 (κ)、および6G7; Rat IgM (κ)のうち、4G12, 6G7両クローンは結合阻害能が高かった。

[図2] pDC6ベクターとラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体の模式図。

[図3]ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12およびc6G7の発現と精製。非還元条件にてSDS-PAGEを行い、CBB染色によりバンドを可視化した。a：プロテインA精製のみ、b：+ゲル濾過クロマトグラフィー精製。

[図4]ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12およびc6G7のPD-1/PD-L1結合阻害活性。

[図5]ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12高発現細胞の樹立。

[図6]ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12のSDS-PAGE像。ラット抗ウシPD-L1抗体4G12およびラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12を還元条件および非還元条件にて電気泳動し、CBB染色により可視化した。還元条件では50 kDa付近に抗体重鎖、25 kDa付近に抗体軽鎖のバンドが見られた。目的以外のバンドは検出されなかった。

[図7]ラット抗ウシPD-L1抗体4G12およびラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12のイヌPD-1/PD-L1結合およびCD80/PD-L1結合阻害活性。ラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体4G12およびラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12はイヌPD-1-IgおよびCD80-IgへのPD-L1-Ig結合量を低下させ、キメラ抗体化による結合阻害活性の変化は認められなかった。

[図8]ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12によるイヌ免疫担当細胞活性化効果。イヌPBMCを3日間刺激培養し、上清中のIL-2およびIFN- γ 濃度をELISA法により定量した。また、刺激培養2日目に培養液中に核酸アナログEdUを添加し、その取り込み量をフローサイトメトリーにより定量した。ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12はイヌPBMCからのIL-2およびIFN- γ 産生を増大させ、CD4+およびCD8+リンパ球の増殖を亢進した。

[図9]口腔内メラノーマ (A) および未分化肉腫 (B) におけるPD-L1の発現。

[図10]口腔内メラノーマ罹患犬を対象に行ったラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12投与治療試験における腫瘍のCT画像および外観。(a, d) 治療開始前、(b, e) 治療10週時点、(c, f) 治療34週時点。5回の抗体投与（治療開始後10週）で顕著な抗腫瘍効果が認められ、34週時点ではさらなる腫瘍の縮小が確認された。

[図11]図10で示した口腔内メラノーマ罹患犬における腫瘍長径の推移。ベースライン長径に比して、30%以上の縮小を部分奏功（PR）とした。

[図12]未分化肉腫罹患犬を対象に行ったラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12投与治療試験におけるCT画像。(a, c) 治療開始前、(b, d) 治療3週時点。2回の抗体投与で顕著な腫瘍の縮小が認められた。

[図13]口腔内メラノーマ罹患犬（肺転移症例）を対象に行ったラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12投与治療試験におけるCT画像。(a, d, g) 治療開始前、(b, e, h) 治療6週時点、(c, f, i) 治療18週時点。9回の抗体投与により複数の肺転移巣が消失した。

[図14]口腔内メラノーマ罹患犬の肺転移発生後の生存率の推移。抗体投与群では、対照群と比べて生存期間が延長された可能性がある。

[図15]ラット抗ウシPD-L1抗体4G12のL鎖可変領域及びH鎖可変領域における、CDR1、CDR2及びCDR3領域を図示する。

[図16]ラット抗ウシPD-L1抗体4G12の交差反応性。ラット抗ウシPD-L1抗体4G12は、ヒツジ、ブタのPD-L1に結合することが確認された。

[図17]スイギュウの白血球に対するラット抗ウシPD-L1抗体4G12の反応性。ラット抗ウシPD-L1抗体4G12は、スイギュウの血中マクロファージ（CD14+CD11b+細胞）に強く結合した。また、スイギュウのリンパ球（CD14-CD11b-細胞）に対して、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12は弱く結合した。この結合性の違いは、マクロファージとリンパ球におけるPD-L1の発現量を反映していると思われる。

[図18]ラット抗ウシPD-L1抗体4G12によるヒツジまたはブタPD-1/PD-L1の結合阻害試験。ラット抗ウシPD-L1抗体4G12は、ヒツジおよびブタPD-1/PD-L1の結合を濃度依存的に阻害できることが示された。

[図19]ラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12の アミノ酸配列。ラット抗ウシPD-L1抗体4G12のL鎖可変領域及びH鎖可変領域における、CDR1、CDR2及びCDR3領域を示し、さらに、ウシIgG1（CH2ドメイン）に変異を加えたアミノ酸（アミノ酸番号および変異：250 E→P, 251 L→V, 252 P→A, 253 G→dele

tion, 347 A→S, 348 P→S) も示す。

[図20]pDC6ベクターとラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12の模式図。

[図21]ラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12の精製純度の確認。

[図22]ラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12の結合特異性。

[図23]ラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12のウシPD-1/PD-L1結合阻害活性（ウシPD-L1発現細胞と可溶性ウシPD-1の結合阻害試験の結果）。

[図24]ラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12のウシPD-1/PD-L1結合阻害活性（ウシPD-1発現細胞と可溶性ウシPD-L1の結合阻害試験の結果）。

[図25]ラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12のウシリンパ球応答に対する活性化効果（細胞増殖）。

[図26]ラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12のBLV抗原に対するウシリンパ球応答の活性化効果（IFN- γ 産生量）。

[図27]ラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12を投与したBLV実験感染牛におけるBLV抗原に対するT細胞の細胞増殖応答。

[図28]ラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12を投与したBLV実験感染牛におけるBLVプロウイルス量の変化。

発明を実施するための形態

[0011] 以下、本発明を詳細に説明する。

[0012] 本発明は、(a)QSLLYSENQKDY（配列番号37）のアミノ酸配列を有するCDR1、WATのアミノ酸配列を有するCDR2及びGQYLVYPFT（配列番号38）のアミノ酸配列を有するCDR3を含むL鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域とを有するL鎖と、(b)GYTFTSNF（配列番号39）のアミノ酸配列を有するCDR1、IYPEYGNT（配列番号40）のアミノ酸配列を有するCDR2及びASEEAVISLVY（配列番号41）のアミノ酸配列を有するCDR3を含むH鎖可変領域とラット以外の動物抗体のH鎖定常領域とを有するH鎖とを含む、抗PD-L1抗体を提供する。

[0013] ラット抗ウシPD-L1抗体4G12のL鎖可変領域におけるCDR1～3は、それぞれ、QSLLYSENQKDY（配列番号37）のアミノ酸配列からなる領域、WATのアミノ酸

配列からなる領域、GQYLVYPFT（配列番号 38）のアミノ酸配列からなる領域である（図 15 参照）。

[0014] また、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12のH鎖可変領域におけるCDR1～3は、それぞれ、GYTFTSNF（配列番号 39）のアミノ酸配列からなる領域、IYPEYGNT（配列番号 40）のアミノ酸配列からなる領域及びASEEAVISLVY（配列番号 41）のアミノ酸配列からなる領域である（図 15 参照）。

[0015] QSLLYSENQKDY（配列番号 37）のアミノ酸配列、WATのアミノ酸配列及びGQYLVYPFT（配列番号 38）のアミノ酸配列、並びに、GYTFTSNF（配列番号 39）のアミノ酸配列、IYPEYGNT（配列番号 40）のアミノ酸配列及びASEEAVISLVY（配列番号 41）のアミノ酸配列においては、1個、2個、3個、4個又は5個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されてもよい。

[0016] 本明細書において、抗体とは、全長抗体の他、Fab、F(ab)'₂、ScFv、Diabody、V_H、V_L、Sc(Fv)₂、Bispecific sc(Fv)₂、Minibody、ScFv-Fc monomer、ScFv-Fc dimerなどの低分子化されたものも含む概念である。

[0017] 本発明の抗PD-L1抗体において、L鎖可変領域とH鎖可変領域がラットに由来するとよい。例えば、L鎖可変領域がラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域であり、H鎖可変領域がラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域であるとよい。

[0018] ラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域のアミノ酸配列及びH鎖可変領域のアミノ酸配列を、それぞれ、配列番号 1 及び 2 に示すが、配列番号 1 及び 2 のアミノ酸配列においては、1若しくは複数個（例えば、5個以下、多くても10個程度）のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されてもよく、これらの変異が導入されても、PD-L1抗体のL鎖可変領域又はH鎖可変領域としての機能を有する。

[0019] ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域及びH鎖定常領域は、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12と交差反応するPD-L1を産生する動物由来のものであるとよい。

[0020] 抗体のL鎖には、Kappa鎖（カッパ鎖）とLambda鎖（ラムダ鎖）があり、本発明の抗PD-L1抗体において、ラット以外の動物の抗体のL鎖定常領域は、Kappa鎖又はLambda鎖のどちらの鎖の定常領域のアミノ酸配列を有するものであ

ってもよいが、存在比率は、ヒツジ、ネコ、イヌ、ウマ、ウシではLambda鎖の方が高く、マウス、ラット、ヒト、ブタではKappa鎖の方が高い。存在比率の高い鎖の方が好ましいと考えられるので、ヒツジ、ネコ、イヌ、ウマ、ウシではLambda鎖の定常領域のアミノ酸配列を有することが好ましく、マウス、ラット、ヒト、ブタではKappa鎖の定常領域のアミノ酸配列を有することが好ましい。

[0021] ラット以外の動物の抗体のH鎖定常領域は、ヒトのIgG4に相当する免疫グロブリンの定常領域のアミノ酸配列を有するとよい。H鎖は、定常領域の違いにより、 γ 鎖、 μ 鎖、 α 鎖、 δ 鎖、 ϵ 鎖に分けられ、この違いによりそれぞれIgG、IgM、IgA、IgD、IgEの5種類のクラス（アイソタイプ）の免疫グロブリンが形成される。

[0022] 免疫グロブリンG（IgG）はヒト免疫グロブリンの70-75%を占め、血漿中に最も多い単量体の抗体である。軽鎖2本と重鎖2本の4本鎖構造をもつ。ヒトIgG1、IgG2、IgG4は分子量は約146,000であるが、ヒトIgG3はFab領域とFc領域をつなぐヒンジ部が長く、分子量も170,000と大きい。ヒトIgG1はヒトIgGの65%程度、ヒトIgG2は25%程度、ヒトIgG3は7%程度、ヒトIgG4は3%程度を占める。血管内外に平均して分布する。ヒトIgG1は、エフェクター細胞表面のFcレセプターや補体因子に強い親和性を有するので、抗体依存性細胞傷害活性（ADCC）を誘導し、また、補体を活性化して補体依存性細胞傷害活性（CDC）を誘導する。ヒトIgG2とヒトIgG4は、Fcレセプターや補体因子への親和性が低いことから、ADCC活性及びCDC活性が低い。

[0023] 免疫グロブリンM（IgM）はヒト免疫グロブリンの約10%を占める、基本の4本鎖構造が5つ結合した五量体の抗体である。分子量は970,000。通常血中のみに存在し、感染微生物に対して最初に産生され、初期免疫を司る免疫グロブリンである。

[0024] 免疫グロブリンA（IgA）はヒト免疫グロブリンの10-15%を占める。分子量は160,000。分泌型IgAは2つのIgAが結合した二量体の抗体になっている。IgA1は血清、鼻汁、唾液、母乳中に存在し、腸液にはIgA2が多く存在する。

- [0025] 免疫グロブリンD (IgD) はヒト免疫グロブリンの1%以下の単量体の抗体である。B細胞表面に存在し、抗体産生の誘導に関与する。
- [0026] 免疫グロブリンE (IgE) はヒト免疫グロブリンの0.001%以下と極微量しか存在しない単量体の抗体である。寄生虫に対する免疫反応に関与していると考えられるが、寄生虫の稀な先進国においては、特に気管支喘息やアレルギーに大きく関与している。
- [0027] イヌでは、IgGのH鎖として、IgG-A (ヒトIgG2に相当)、IgG-B (ヒトIgG1に相当)、IgG-C (ヒトIgG3に相当)、IgG-D (ヒトIgG4に相当) の配列が同定されている。本発明の抗体では、ADCC活性、CDC活性をともに持たないIgG H鎖定常領域が好ましい (ヒトではIgG4)。ヒトIgG4に相当する免疫グロブリンの定常領域が同定されていない場合には、ヒトIgG1に相当する免疫グロブリンの当該領域に変異を加えることにより、ADCC活性、CDC活性をともに持たなくなったものを使用するとよい。
- ウシでは、IgGのH鎖として、IgG1、IgG2、IgG3の配列が同定されている。本発明の抗体では、ADCC活性、CDC活性をともに持たないIgG H鎖定常領域が好ましい (ヒトではIgG4)。ヒトIgG1の定常領域は野生型ではADCC活性およびCDC活性を持つが、特定の部分にアミノ酸置換や欠損を加えることにより、それらの活性を低下させられることが知られている。ウシにおいて、ヒトIgG4に相当する免疫グロブリンの定常領域が同定されていないので、ヒトIgG1に相当する免疫グロブリンの当該領域に変異を加え、これを使用することができ。その一例として、ウシ抗体のH鎖定常領域 (IgG1鎖, GenBank: X62916) のCH2ドメインに変異を加えたアミノ酸配列とヌクレオチド配列 (コドンを最適化したもの) を、それぞれ、配列番号102及び103に示す。
- [0028] ラット以外の動物がイヌである場合、イヌの抗体のL鎖定常領域が、Lambda鎖の定常領域のアミノ酸配列を有し、かつ、イヌ抗体のH鎖定常領域が、ヒトのIgG4に相当する免疫グロブリンの定常領域のアミノ酸配列を有する抗PD-L1抗体がより好ましい。

ラット以外の動物がウシである場合、ウシ抗体のL鎖定常領域が、Lambda鎖

の定常領域のアミノ酸配列を有し、かつ、ウシ抗体のH鎖定常領域が、ADCC活性及び/又はCDC活性を低下させる変異が導入されたものである抗PD-L1抗体がより好ましい。

[0029] 本発明の抗PD-L1抗体は、ラット-イヌキメラ抗体、イヌ化抗体、完全イヌ型抗体、ラット-ウシキメラ抗体、ウシ化抗体、完全ウシ型抗体を包含するが、動物は、イヌとウシに限定されるわけではなく、ヒト、ブタ、サル、マウス、ネコ、ウマ、ヤギ、ヒツジ、水牛、ウサギ、ハムスター、モルモットなどを例示することができる。

[0030] 例えば、本発明の抗PD-L1抗体は、イヌ抗体のL鎖定常領域が配列番号3のアミノ酸配列を有し、イヌ抗体のH鎖定常領域が配列番号4のアミノ酸配列を有する抗PD-L1抗体であるとよい。

また、例えば、本発明の抗PD-L1抗体は、ウシ抗体のL鎖定常領域が配列番号100のアミノ酸配列を有し、ウシ抗体のH鎖定常領域が配列番号102のアミノ酸配列を有する抗PD-L1抗体であるとよい。

[0031] 配列番号3及び4並びに配列番号100及び102のアミノ酸配列においては、1若しくは複数個（例えば、5個以下、多くても10個程度）のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されてもよく、これらの変異が導入されても、抗体のL鎖定常領域又はH鎖定常領域としての機能を有しうる。

[0032] 本発明の抗PD-L1抗体は、L鎖2本とH鎖2本の4本鎖構造を持つとよい。

[0033] 本発明の抗PD-L1抗体は、以下のようにして製造することができる。同定したラット抗ウシPD-L1抗体の可変領域配列とラット以外の動物（例えば、イヌ、ウシなど）の抗体（好ましくは、ヒトIgG4抗体、ヒトIgG4抗体に相当する抗体又はヒトIgG1に相当する免疫グロブリンの当該領域に変異を加え、ADCC活性および/又はCDC活性を低下させたもの）の定常領域配列を含む人工遺伝子を合成し、その人工遺伝子をベクター（例えば、プラスミド）に挿入後、宿主細胞（例えば、CHO細胞などの哺乳類細胞）に導入し、該宿主細胞を培養することにより、培養物から抗体を採取する。

[0034] 本発明者らが同定したラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域のアミノ酸配

列とヌクレオチド配列を、それぞれ、配列番号 1 及び 5 に示す。さらに、コドン最適化後のヌクレオチド配列を配列番号 1 5 に示す。

[0035] 本発明者らが同定したラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域のアミノ酸配列とヌクレオチド配列を、それぞれ、配列番号 2 及び 6 に示す。さらに、コドン最適化後のヌクレオチド配列を配列番号 1 6 に示す。

[0036] イヌ抗体のL鎖定常領域（Lambda鎖，GenBank：E02824.1）のアミノ酸配列とヌクレオチド配列を、それぞれ、配列番号 3 及び 7 に示す。さらに、コドン最適化後のヌクレオチド配列を配列番号 1 7 に示す。

ウシ抗体のL鎖定常領域（Lambda鎖，GenBank：X62917）のアミノ酸配列とヌクレオチド配列を、それぞれ、配列番号 1 0 0 及び 1 0 1 に示す。さらに、コドン最適化後のヌクレオチド配列を配列番号 1 0 4 に示す。

[0037] イヌ抗体のH鎖定常領域（IgG-D鎖，GenBank：AF354267.1）のアミノ酸配列とヌクレオチド配列を、それぞれ、配列番号 4 及び 8 に示す。さらに、コドン最適化後のヌクレオチド配列を配列番号 1 8 に示す。

ウシ抗体のH鎖定常領域（IgG1鎖，GenBank：X62916を改変）のアミノ酸配列とヌクレオチド配列（コドン最適化後）を、それぞれ、配列番号 1 0 2 及び 1 0 3 に示す。

[0038] また、配列番号 9 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域とイヌ抗体のL鎖定常領域（Lambda鎖，GenBank：E02824.1）とからなるキメラL鎖のアミノ酸配列を示す。ラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域とイヌ抗体のL鎖定常領域（Lambda鎖，GenBank：E02824.1）とからなるキメラL鎖のヌクレオチド配列（コドン最適化後）を配列番号 1 9 に示す。

また、配列番号 1 0 5 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域とウシ抗体のL鎖定常領域（Lambda鎖，GenBank：X62917）とからなるキメラL鎖のアミノ酸配列を示す。ラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域とウシ抗体のL鎖定常領域（Lambda鎖，GenBank：X62917）とからなるキメラL鎖のヌクレオチド配列（コドン最適化後）を配列番号 1 0 7 に示す。

[0039] 配列番号 1 0 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域とイヌ抗体のH鎖定

常領域 (IgG-D鎖, GenBank: AF354267.1) とからなるキメラH鎖のアミノ酸配列を示す。ラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域とイヌ抗体のH鎖定常領域 (IgG-D鎖, GenBank: AF354267.1) とからなるキメラH鎖のヌクレオチド配列 (コドン最適化後) を配列番号20に示す。

配列番号106は、ラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域とウシ抗体のH鎖定常領域 (IgG1鎖, GenBank: X62916を改変) とからなるキメラH鎖のアミノ酸配列を示す。ラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域とウシ抗体のH鎖定常領域 (IgG1鎖, GenBank: X62916を改変) とからなるキメラH鎖のヌクレオチド配列 (コドン最適化後) を配列番号108に示す。

[0040] この他、各種動物のL鎖定常領域及びH鎖定常領域のアミノ酸配列とヌクレオチド配列は、公知のデータベースから入手することができ、これらの配列を利用することができる。

[0041] イヌ、ヒツジ、ブタ、スイギュウ、ヒト、ウシのL鎖定常領域及びH鎖定常領域のアミノ酸配列とヌクレオチド配列を下記の表にまとめた。

(表)

種名	鎖領域	塩基配列	アミノ酸配列	GenBank Accession No.	IMGT Database	Reference
イヌ(学名: <i>Canis lupus familiaris</i>)	イヌH鎖定常領域 (CH1 ⁺ CH3)	GCCTCCACCAAGGCGCCCTGGGTTTTCACAGTGGCG CCAGGCTGGGGTCCAGCTTCCGCTCCAGGCTGGCG CTGGGCTGGCTGGTCCAGGCTTCTGGGGAAGGCT GTAACTGTGCTTGGAAATCCGGCTCCTTGACGACG GGTGTGGACAGCTTCCGCTGGTGGTGGTGGTGGT GGGCTTACTGCTCCAGGACGAGGCTGGAGTGGCG TCCAGGAGGCTGGCCGAGGAGGCTTCACTGGACAG GTGGTCCACCGCGGACGAAAGTAAAGTAGACAGAG CCAGTGGCCAAAGGTCAGCTGCAAGTGTATATCC CCATGGCCAGTGGTGAATCACTGGGAGGGGCTTGG GTCTTCATCTTCCCGGAAAGGAGGAGGACATCCTC AGGATTAGCGGAAAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG TTAGATCTGGGCGCTGAGGAGGCTGAGGTTGAGAGT AGCTGGTTCGTGGATGGTAAAGGAGGTTGACAGAGCG AAGAGGAGGCTGCTGAGGAGGAGGTTCAACAGAGCG TACCGTGTGGTCAAGGCTCCTCCCAATGGAGGAGG GAGTGGCTCAGCGGAAAGGAGTTCAGGTCAGAGT AAGCAGATAGGCGCTGGGCTCCGCTCAGAGGAGCT ATCTCCAAAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG GTGTATGTCTGCGAGCATGCGGAAAGGAGTGTCA TGGATGTGAGAGGCTGAGGCTGAGGCTGAGGAGG GAGTCTTCCGAGCTGAGATTTGATGTGAGGAGGAG AGCAATGAGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAG AGCAATGCGGCGAGCTGAGGAGGAGGAGGAGGAGG TTCTGTGACAGGAGGCTGCTGTGGAGGAGGAGGAG TGGCAGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAG CATGAAGCTGTAGAGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAG TCTCCGATTTCTGGGTAATGA (配列番号8)	ASTTAPSVPLAPSGGSGTSGSIVALAC LVSGYFPEPVYVSWHSGSLTSGVHTFP SVI GSSGLYSSTVTVPSSEWSEFTT TCNVVHPASNTKVDPKVPKESITOKIS PCPVFESLGGPSVFPFPPKPDILRTIT PRETVPLDI GREFPEVSGSNFVDDKRV HTAKTQPREQDNSTVRYVSVLPHEHQ DWLTGKEFKRVNHQLPSPIERTSKA RQJAHQPSVYVLPSPKELSSDTVTLL TCLNGFPPEEVEVDSHQDPEPSKY HTTAPQLDEGGSFYLSKLSVSKSRWQ GGDTFTTCAVMHEALNNHYTOLSLSHS PSK* (配列番号4)	AF354267	https://www.imgt.org/IMGT/sequence/sequences	Tang L. et al. Vet. Immunol. Immunopathol. 80 (3-4): 259-270 (2001). PMID: 11457479
	イヌH鎖定常領域 (λ lambda (CL))	CAGCCCAAGGCTCCGCTCGGTACAGCTCTTCCCG CCCTCTCTTGAAGAGCTGGCGGCAAGGAGGAGGAG GTGAGGCTGGGCTGAGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAG CAGCAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAG GAGCAGCAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAG CCTGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAG CAGCTGCTGTGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAG AGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAG (配列番号7)	GPKASPSVTLFPPSSSEELGANKATLVG LISQYPSVTVVWKAAGSPVTVGVET TKFSKGSNNKYAASSVLSLTPDKWKS SBSCLVTHEGSTVEKVKVAPAECS* (配列番号3)	E02824	登録なし	なし

種名	系統群	塩基配列	アミノ酸配列	GenBank Accession No.	IMGT Database	Reference
ヒツジ(学名: <i>Ovis aries</i>)	ヒツジ属羊類 (CH1 DHS)	IgG1 GCCTCAACACACCCCGGAAGTCTACGCTCTCTAGCT TCTTCTCGCGGCAAGATGGTGGAGCTCCATCTCTGACG CTGGCGTGGCTGGTCTCCAGACTATATGGGCGAGCGG GTGAGCGATGACCTGGAACTCTGTGGCTCGTCAAGCAG GGGCTGGACAGCTTCTGGCGGCGATCTGGAGCTCTGGC GGGCTCTACTCTCTCAGCAGAGGCTGGTGAACCTCGCG GCAGCAGCTCAGGAGGCCAGCAGCT1CA1CT1GCAAC GTAGCGACACCGGCGCAGAGCAGACAGAGTGGAGCAG GGCTTGAAGCGCGATCGCGGACCATGCAAAAT TCCGCGATCGCGACCGCTTGAGCTCCGCGAGGAGCAG GTCTGTCTTGATCTTCCGACCGAAAGGAGAGCAGAC CTCTACAACTCTCTGAAACCGCGAGCTGACGCTGTGT GTGTGCTGGAGTGGAGAGAGTGGGCGGAGTGGT AGT1CTCTGGT1CTGGTGGACAGCTGGAGG1GGCGA CGCGCAGGACGAAGACCGAGAGAGAGCAGT1TCAACA GAGCTTGGGCGTCTGAGCGGCTGGCCTTCGAC ACCAAGATGGCATGGAGGAGAGAGCTTCAAGTGGCA AGGTGGACAAAGCGAGCTCTCGCGGCGGCGTCTGCA GGACATCTTCCAGACCAAGGGCAGGCGCGGAGAG CGCGAGCTGTACGCTCTGGCGCGCGCGAGCAGAG CTCAGCAAAAGCAGCTCAGGCTCAGCTGGCTGGTCT ACCGGCTTGTACGAGCACTACATGGCGTGGAGTGA GCAAAATGGGAGAGCTGATCGTGGAGAGAGTGAAG GGGACAGCAGCATCCGAGCTGGACCGGACCGGCTCG TACTTCTCTACAGCAGCTCAGGCTGGGAGAGAAAG AGCTTGGGAAAGAGAGACACTACCGCTGTGTGGTGG ATCGAGCGGCTTGGACACAGCTACAGCAGAGAG TCACTCTTAAAGCTCTCGGCTAAATGA (配列番号43)	ASTTPPKYPLTSCDGGTSSSVTLGG LVSSVMPFVTVVNSGALSGTHTF FALQSSLSYS.SSVTVPASTSGAOT FIONVAHPASTKVDKRVPEQDPDPC HKRCFPELPDQSFVFFPKPKDILT SOTPEVTVVVDVGGDQDFVQSWY DNYELVRIAR1KPELQNSIFRVSVAL PIQHIDWTVGGAKPKCVINLALPAPV ATRSRTGGAEFQVYVLPPELESL STLSTVLTGYTFPDYJAVEWKNQDQ SEEDYGTTLTSQLDAGDSFYLSRLRV DKNWQEGDGYAVVWHEALNNHYTG KSNPPKPF (配列番号42)	X5979	http://www.ebi.ac.uk/IMGT/repertoire/index.html J Immunol. 158, 218-219 (1995). PMID: 8890305	Dufour V. et al. J Immunol. 158, 218-219 (1995). PMID: 8890305
		IgG2 GCCTCCACACAGCCCGAAGTCTACGCTCTGATCT TCTTGTGGGCGGAGCTCCAGCTCCAGCTCCATCT GTGAGCGCTGGCTGGCTCTCTCCAGCTATATCGCC GAGCGGCTGACGCTGGCTCTCTGGCTGTGGCTCGGCT ACACCGCGCTGGCTGACCTCTCGCGCGATCTCCAG TCTCTCGCGGCTCTACTCTCTCAGCAGAGCTGGTGGC GTGCGCGCGAGCTCAGGAGCGAGAGCTGATCAGT TCAACCTTAGCCGCGAGCGAGCGAGCGCGAGGTC GAGAGCGCTGTGGCGATTCGAGCTGACTCTCGCAAG TCTTCTAAAGCGGCTGGTGGAGCGGCGAGCGCTGTGT TTCATCTTCCGCGGCAAGCGAGAGCGAGCTGATCT TTCAGCAGCGCGCGAGCTGACCTCTCTCTCTCTCT GAGCTGGGCGAGGCTGACCGCGAGTTCAGATTCTCT TGTGTGTGGACCAAGTGGAGGTGGCAGAGCGGACAG ACAAGCGCGAGAGAGAGGAGCTTCAAGAGAGCCTCT GGGCTGTGTGACCGCGCTGGCATGCAAGAGCGGACAG TGGATGTGGAGAAAGAGAGCTTCAAGTGGAGGTCCAC AGCAAAAGCGCTCCGCGCGCATGTGTGAGAGAGGAT TCCAGGCGCAAGAGGCTGAGCGCGGCGCGCGAGCT GTACCTCTCTGCCCGCACCGCGAAGAGCTGACGCAA AAGCAGACTTACGATGAGCTGGCTGGTGGCAGCGCT TACCCAGACTATGCGCGCTGGAGTGGCAGAGAG GGCGCGCGGTGATGGCAGAGAGAGTGGCGCGAGCAG GAGCTCGCGATGGCGCGCGAGAGGCTGGATTTCTGT TCTAGCAGCGCTACAGGTGGAGAGAGAGCAGTGGCA ACAGAGAGCAGAGCTAGCGCTGTGTGTGTGATTCAGGA GGCTTGGACACAGAGCTACACAGCAGAGTGGCTGCA TAAAGCTTCGGGTAATGA (配列番号45)	ASTTAPKYPPLTSCDGGTSSSSSVTL GGLVSSVMPFVTVVNSGALSGTH TFPMLQSSLSYS.SSVTVPASTSGA OTPDHVAHPASAKVDKRVGSSDYS KCSKPPVDSVFFPKPKDILT TPEVTVVVDVGGDQDFVQSWV VEVNTAHTPKPEQFNSIFRVSVAL QHNHVTGGKFKCVNKLGLPPEV ISPAKCGAEHPVYVLPPEELSKST LSVLTGYTFPDYJAVEWKNQDQ EDYGTTLTSQLDAGDSFYLSRLRV SSNWQEGDGYAVVWHEALNNHYTGK ISKPPKPF (配列番号44)	X70983	Clarkson C.A. et al. Mol. Immunol. 30, 1195-1204 (1993). PMID: 8413324	
ヒツジ属羊類 東条種	Ig kappa (CK)	CCATCGGCTTCTCTCTCAAAACATCTAGGAGAAAG CTACCGAGCCGAAGTGTGTCTGTGGTGGTGGTGGT AATGATTATTCAGCGCAAGATTA1CAAT1TCAAGGCT AAGTGAATGGGTTGAGAGAGAGAGTGGTCTCCAGA ACAGCTTTCACAGCAGCAGGAGCAAGCAAGACACCT ACAGGCTTCAGGAGACACCTTGACACTGTCCAGCTCAG AGTACAGAGGCTTCAAGAGAGCAGGCTTGTGTGTGA GCGACAGCAAGCAAGCTGGCGACCGCGCTGTGTAAG TCAATAAGATGAATGTTAG (配列番号47)	SVFLFKPSEELRTGTYSVVLVNF YPKDNVKKVGVDTGNSFNQSTFDG DKSKTYS.SSLTSSSESHYAHYA VEVSHSKVTLTKVSHNECA (配列番号46)	X54110	登録なし	Jenks C.N. et al. Dev. Comp. Immunol. 30 (1-2), 155-174 (2006). PMID: 16033988
	Ig lambda (DL)	GGTACGCGCAAGTGGCGGCTCGGTGAGCCTGTCT CGGCGTTCACGAGGAGAGCTCAGTACCAACAGAGCG ACCGTGGTGTGTCTCTCAACAGAGCTTCTACCGGCT AGGCTGAGGCTGGTGTGGAAGCGAGATGGGAGCAG ATCATGAGAGCTTCAAGAGAGCAGGCTTGTGTGAA CAGAGCAAGCAAGCAAGCTGCGCGCGACGACCT ACGCTTGAAGGCGAGCAGTGGAGAGTCTAAGAGAGCT TACAGCTGGGAGCTGAGCGGCTTGTGTGTGTGATTCAGGA ACGAGAGCAGAGCTTCAAGAGCTTCAAGAGCTTCAAGAGCAGGCTG (配列番号49)	GQPKAPS.VLTPPEELTSLNKATVY CLINDYVQSWVYVWKKGSGTINQW TQASKGNSKYAASSYLTGSEWKS KSSYTCVTEHGSTVTKTVPSCEDS (配列番号48)	A734681		

(ブタ続き)

[illegible]

種名	系統	塩基配列	アミノ酸配列	GenBank Accession No.	IMG/ Database	Reference
スイギョウ 学名: <i>Amudusa</i> (Cili) (Cili)	lg17	<p>GACGGGGGTTGCACACGTTCCGGGGCGGTGTTTCACTCG TCGGGGGTTTACTGCTTGTCCAGGACGGTGTACCGGGCG CCGGCGAGCGCCACAAAAGCCAGAGCTTTCACCTCGAA CGTAGGCGCACCGCGCGCAGCAGCAGCAGGTGTGCACAG GGTCTTGTTCGGCGATGACGAGCGAAACCGTGTGTATG TTCGGCACCCGCTGAGCTCCGGCGAGGACCGCTTGTCGT TTCATCTTCGACGAAAGCCAGGAGCAGCTTTCACATAT CTGTGAGGCTGTGTGCTGTGAGGCTGTGTGTGTGAGC TGTGGGCGCATGATCGCCCGAGCTGAAGCTTGTTCGTGT TGTGTGAGAGTGTGAGGAGTAAACAGCGCAGAGAGGAA CGDACAAGCAGGAGCTGTTCACAGCAGGCTACCGGGT GTGAGGCGCTCGGCGCTCGACGACCAACGATGTGAGCT GAGGAAGAGGATTAAGTCCAGGCTTACATTAAGAGG TCTGGACCGCGGCTGTGTGAGGAGCTTTCGAGAGGAC AAGCGACCGCGCGCGAGGAGCTGTGATGCTGTGAGG CGCACCGCGAGACAGGCTGAGCAAAAGCAGGCTCAAG ATACCTTGTGATGGTCACTGGCTTACCGCAGCATATAT CTGGCTTATAGTGTGAGGAAATATGGGAGGCTGTGATGA GAGGAGCAATATGGCAGACCGCGCGCAGCTGAGCAGCA GGGATGGCTCTCATTTCTGTATCAGAGCAGCATCAGGAT GATGAGCAAGGAGGCTGGCAGAGAGGAGCGGCTGTACAG TGTGTGATGTGATGAGGCG</p> <p>(配列番号73)</p>	<p>SGVHTEPAWQSSQYVLSVSSVTFAPAS ATKSDTTCNVHAPASSTKVQKAAVP PCKRPKCDGCPPLLPGGQSVIIFPK PKDITLTSGTFVTVVVDGHDHDEW KFSWYVDVVTATKPHREGTNSTY RVSLAPKIDHNVITGGKTKCKVYVNP LPAHVRIISRIKIGAREPQVYVYAP QDELKSTNSTGTGHTQTVYVYVH QKGGCESEDEYGTTPPDSDSGSYF LYSLRVKHNWQEGAGGATGVYHME (配列番号72)</p>	NW_00563050	登録なし	なし
	lg22	<p>GCCTCCATCATCAGCGCGGAAAGTTCTACCTCTGACTCT TTGGCGCGGGGAACTGCGAGCTCCACCTGTGACGGCTG CTGCTTCTGCTGTCTCAAGCTACATGCGDAGCGGCGTGA CTGCTACGCTTCGATGCTGCTGCTGTGACGAGCGCGCTG GCACACCTTCGGCGGCGCTTCTTGAGCTCTTGGGGTGT TACTGCTTTCAGGAGCAGCGTGTGAGCGCGCGCGCGCGG CGCAAAAGCGAGGAGCTTCAAGCTGACGAGCTAGCGCG CGGGCGAGCAGCACCAAGGTGAGCAGCGGCTGTGGGT TCTTCAGTGGTGGTGGGAGTCTTCAAGGCTGTGTGTGTG AGGGAAGCACTGTGTCTCACTTCTCGCGCGACACCGCA AGACACCGCTGATGATCAACGGAATCCCGAGGCTGACAT GTGTGGTGTGAGGCTGGCGCGGATACCCCGAAGT CGAGTGTTCCTGCTTCGATGGTGTGTGAGGCTGCAC ACCGCTGCTGACCGCAGCAGAGGACGCTGTGACGA CGAAGTACCGCGCTGCTCAAGACGCTCCGATGACGACCA CAATGATGAGCTGTGAGCAAGAGGATTCAGTTCGAG CTTCAACAGCAAGGCTTCCGACCGCGATGTGAGGAG CCATCTCCAGACCAAAAGCGCGCGCGGAGCGCGCA GGTGTACGCTCTGGCCCGACCGACGAGCGAGCTCAGC AAAGCACCGCTGAGTCTGCTCCGACCGCGATGTGAGGCT TTCACCGACATACATCGCGCGTAGAGTGGCATAGAGAC GGCAGGCTGAGTTCGAGGAGAGCAATGAGCAGCAGCCCG GGCGCAGCTGAGACAGGATGGCTGCTGATGTGTGATC AGCAGGCTCTACGATGAGCAAGAGAGGCTGGCAAGAG GAGCGCGCTACAGCTGTGTAGTGAATGATGAGGCG</p> <p>(配列番号75)</p>	<p>ASITAPKVPYPLTSCRGTTSSSVTVLGG LVSSYMEPEVTVWNQALKSDVHTE PAWLGSGLYLSNISTVYAPASATKST CTFNVHAPASSTKDVAQZSESGGCG FKPKCPGVSPVFPFKPDKTLMGTGNE EVTCVTVVDGDRNEGVSWFQVDE VHTSPKPKGTGTNSTYVSTPKH NDWTKGFEKCKVHNKGLPAPYRIS TKGAREPQVYVYAPLLEKSTSLTS VTCMTGTGTPYATDWHRRRLASLSD KYRTTTPPOLDSQSYFYSLRVKHNNS WQEGGATTCVYHME (配列番号74)</p>	NW_00576614	3	
	lg37	<p>GGCTGCACACAGCGCGGAAAGTTGACGCTGTGTGAGAT TGGCTTCCGCGAGCGTGTGACGCTTCCGAGGCTGACGCT GGGCTGTGCTGTTCTCCAGCTACATTCGGCGAGCGGGCTGT ACGCTGAGCTTGAAGCTGGGCTGGCTGTGAGAGAACCGG TGACAGGCTTCCGCGCGGCTCGCGGAGCTTCCGCGGCT GTATGCTTCCAGGACAATGTGATGATGCTGGCGACGCA CGCGAGGAAACCGACGCTTTCACCTCGAACGCTACCGGCA CCGCGCGCAGCAGCGACAGGTTGAGCAGGCTGTGACT CGAAGGATCCGGTGTGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGAT TGATCTGCTGTAAACCGCGACCGAGGAGCGGCGAGAT GAAAGAGGCTGCGCAGCTTCTCCCAATGCCACGAAACG TGTGGAGGCTGTGTGCTGCTGCTGCTTCCGACCGAAG CAAAAGACACCGCTCCAGATCTGCTGACCGCGCGAGG CAGATGTGTGTGTTGATGAGCTGGGCGAGCTGTGACGCG GAGTTCGAGTGTGCTGCTGCTGCTGCTGAGCTGAGG TCCAGGAGCGCAGCTGAGCGAGGAGGAGGAGGAGT GAGAGAGCACTAGCGGCTGTGACGCGCGCTGGGCGAT GACGACAGGAGTGGCTGGGAGGAAGAGGATTTGAAT GGAGGTTCAACAGAAAGGGGTTCCGCGCGCGCATCT GAGGAGCATCTCCAGGACCAAGGAGGCGCGCGGAGG CCAGCAGATGTATGTCTGGCGCCACCGCGGAGGAGAGC TCAGCAAGAGCGATGAGGCTGAGCTGGCTGAGTGTGAT GGCTTCTTACCAGCGAGGATGAGGCTGGAGTGGCGAGA GAATGTGGGAGCGCTGAGTGAAGGAGGAGATACACAC GAGCGCGCGCAGGATGAGGCTGAGGCTGAGTGTGATG CTGTACAGGAGGCTGAGGCTGAGCAGGAGGAGGCTGCG AGGAAGGAGCAGATAGAGGCTGTGAGTGTGATGATGAA GGTTTACGAGTACATGAGAGGAGAGGCGGCTGTGGG CTTCCGCGCTTAATGA (配列番号77)</p>	<p>ASITAPKVPYPLASSCGTSSSVTVYTG LVSSYMEPEVTVWNQALKSDVHTE PAWLGSGLYLSNISTVYAPASATKST CTFNVHAPASSTKDVAQZSESGGCG FKPKCPGVSPVFPFKPDKTLMGTGNE EVTCVTVVDGDRNEGVSWFQVDE VHTSPKPKGTGTNSTYVSTPKH TKGAREPQVYVYAPLLEKSTSLTS TOLTGTTCVYVHVEWHPGQREPSK VHTTTPOLDADGSGTYFYSLRVKHNNS QEDHYTCFEMHEALRYHKEPKRSK PCK+</p> <p>(配列番号76)</p>	NW_00578400	8	
スイギョウの姉 系近縁種 (CL)	lg lambda?	<p>GACGCCATCGCGGACGCTGAGCTGACGCTGTTCGCGAC CTCCGACGGAGGAGCTGCGCGCAGCAACGCGACCGCT CTGCTGTGCTATCAGCAGCTTTTACCGCTAGTATGAT CGCTGCGCGGAGAGCGAGCGAGCGAGCACCATCACCGG GAGCTGTGAGGACGCGCGCGCTTCGAAACAGCAGCAAG ACGAGATACCGCGCGAGGAGGCTACCGCTGAGCTGAGG CGAGCGCATGTGGAATCGGAAGCGAGTACAGCTCGGA GGTTCACGACGAGGAGGAGGACCGCTGACCAAAACAGCT TAAAGCGTGTGAGGATGTCTTAAAG</p> <p>(配列番号79)</p>	<p>OKSPASVYPLFPSTELSNANKLTVL LSDFYQSGMVFARKADGSTITRNVLT RASKRNRKRYAKSSVLTAGTATGTA SYSGVTFVDFGTYVTKTVKPSCEB+</p> <p>(配列番号78)</p>	NW_00560075	登録なし	なし

[illegible]

g2 variant 2	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号97)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKELSKSTV SLTCMGCFPEVDVVEWDRHQRTISE DKVITTPGLDAGSTVLSYSLRDRN SWRGDRTVTCVMHREALHHYMKNST SKGAGK4 (配列番号99)	X16702 (X16727)
g2 variant 1	GGCTCCAGGAGAGCCGGGAAAGTCTAAGCTGTGAGAT TTCTCGTCCGAGAGAGCTGCTGACGCTTCCAGCTGCTGT GGCTGGCTGGCTTGCAGCTACATGCGCGGAGCGGGTGGA CGGTTGAAGCTGGAGCTGGGCTGGGCTGAAGAGCGGGGTA GGAGAGCTTGTGCGGTGCTTCTAGCTGTGGAGGCTG TACTCTCTCAGCAGACATGGTACAGCTGCCCGGACAGCA CTCTCAGGAGACAGCTTCAAGCTGGACAGCTAAGCCAGCC GGCCAGCAGCAGGAGAGCTGGACAGAGCTTGTGGGTG TCCAGTGACGCTGCCAGAGCTAATAACAGAGATTCGCT GAGGAGAGAGCTTGGCTTTCATCTTTCGAGCAAGAAAGCT AAGACAGCTCGTGTATGAGAGAGAGAGCCGAGAGTGAAG GTGTGTGTGTGGTGAAGCTGGGAGCAGGATACAGCCDAG TGTGAGCTTTGTGCTGGTGGTGGAGAGAGCTGGAGTGGT AGAGTGGCAGAGAGCTACAGCTGTGTGTGTGGAGAGAG CGCTCGCAATACATGATGTGAGAGAGTGGCAGCTCTAG TCTGGGTAAATGA (配列番号98)	ASTTAPKVPYLSGCCGDKSSBTVLTCG LVSSYMPRPVTVWNSGALSGVHTG PAVLQSSGLVLSMYPVPSSTG GTTCNAHAPASTVDMKAVVSGDG SKPMWCVWEPVPRPKPDTLTGDT GTPEVTVVNVGHPNPEVQFWFVDD VEVHTAPKPREPQNSTVRYVAUPL OHGDMTQCEFTQVNVKLSGASVIR SRSGCPAREPQVYVLPYKEL	

配列番号4、3、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70、72、74、76、78、12、80、82、84～91、100、102及び11のアミノ酸配列においては、1若しくは複数個（例えば、5個以下、多くても10個程度）のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されてもよく、これらの変異が導入されても、Ig重鎖又は軽鎖の定常領域としての機能を有しうる。

[0042] ヒトIgG1の定常領域は野生型ではADCC活性およびCDC活性を持つが、特定の部分にアミノ酸置換や欠損を加えることにより、それらの活性を低下させられることが知られている。ヒト以外の動物において、ヒトIgG4に相当する免疫グロブリンの定常領域が同定されていない場合、ヒトIgG1に相当する免疫グロブリンの当該領域に変異を加え、ADCC活性およびCDC活性を低下させたものを使用することができる。

[0043] 本発明は、(a') QSLLYSENQKDY（配列番号37）のアミノ酸配列を有するCDR1、WATのアミノ酸配列を有するCDR2及びGQYLVYPFT（配列番号38）のアミノ酸配列を有するCDR3を含むL鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域とを有するL鎖をコードするDNAと、(b') GYTFTSNF（配列番号39）のアミノ酸配列を有するCDR1、IYPEYGNT（配列番号40）のアミノ酸配列を有するCDR2及びASEEAVISLVY（配列番号41）のアミノ酸配列を有するCDR3を含むH鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のH鎖定常領域とを有するH鎖をコードするDNAとを含む、人工遺伝子DNAを提供する。また、本発明は、QSLLYSENQKDY（配列番号37）のアミノ酸配列を有するCDR1、WATのアミノ酸配列を有するCDR2及びGQYLVYPFT（配列番号38）のアミノ酸配列を有するCDR3を含むL鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域とを有するL鎖をコードするDNA（(a')のDNA）も提供する。さらに、本発明は、GYTFTSNF（配列番号39）のアミノ酸配列を有するCDR1、IYPEYGNT（配列番号40）のアミノ酸配列を有するCDR2及びASEEAVISLVY（配列番号41）のアミノ酸配列を有するCDR3を含むH鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のH鎖定常領域とを有するH鎖をコードするDNA（(b')のDNA）も提供する。

- [0044] (a) QSLLYSENQKDY (配列番号 37) のアミノ酸配列を有するCDR1、WATのアミノ酸配列を有するCDR2及びGQYLVYPFT (配列番号 38) のアミノ酸配列を有するCDR3を含むL鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域とを有するL鎖、(b) GYTFTSNF (配列番号 39) のアミノ酸配列を有するCDR1、IYPEYGNT (配列番号 40) のアミノ酸配列を有するCDR2及びASEEAVISLVY (配列番号 41) のアミノ酸配列を有するCDR3を含むH鎖可変領域とラット以外の動物抗体のH鎖定常領域とを有するH鎖については、上述した。(a') のDNAは(a)のL鎖をコードするDNA (遺伝子) であり、(b') のDNAは(b)のH鎖をコードするDNA (遺伝子) であり、(a') のDNAと(b') のDNAとを含む人工遺伝子DNAは、市販の合成機を用いて合成することができる。人工遺伝子DNAには、制限酵素認識部位、Kozak配列、ポリA付加シグナル配列、プロモーター配列、イントロン配列などを付加してもよい。
- [0045] また、本発明は、前記人工遺伝子DNAを含むベクターも提供する。
- [0046] ベクターとしては、大腸菌由来のプラスミド (例、pBR322, pBR325, pUC12, pUC13)、枯草菌由来のプラスミド (例、pUB110, pTP5, pC194)、酵母由来プラスミド (例、pSH19, pSH15)、λファージなどのバクテリオファージ、レトロウイルス、ワクシニアウイルスなどの動物ウイルス、バキュロウイルスなどの昆虫病原ウイルスなどを用いることができる。後述の実施例では、pDC6 (日本国特許第5704753号、US Patent 9096878、EU Patent 2385115、Hong Kong (China) patent HK1163739、Australia Patent 2009331326) を用いた。
- [0047] ベクターには、プロモーター、エンハンサー、スプライシングシグナル、ポリA付加シグナル、イントロン配列、選択マーカー、SV40複製オリジンなどを付加してもよい。
- [0048] さらに、本発明は、前記ベクターにより形質転換された宿主細胞も提供する。この宿主細胞を培養し、培養物から抗体を採取することにより、抗PD-L1抗体を製造することができる。よって、本発明は、前記宿主細胞を培養し、培養物から抗PD-L1抗体を採取することを含む、抗体の製造方法も提供する。

本発明の抗体の製造方法において、L鎖をコードするDNAとH鎖をコードするDNAを含む人工遺伝子DNAを組み込んだベクターを宿主細胞にトランスフェクションしてもよいし、L鎖をコードするDNAを組み込んだベクターとH鎖をコードするDNAを組み込んだベクターを宿主細胞にコトランスフェクションしてもよい。

- [0049] 宿主細胞としては、細菌細胞（例えば、エシェリヒア属菌、バチルス属菌、枯草菌など）、真菌細胞（例えば、酵母、アスペルギルスなど）、昆虫細胞（例えば、S2細胞、Sf細胞など）、動物細胞（例えば、CHO細胞、COS細胞、HeLa細胞、C127細胞、3T3細胞、BHK細胞、HEK293細胞など）、植物細胞などを例示することができる。このうち、ジヒドロ葉酸還元酵素欠損細胞であるCHO-DG44細胞(CHO-DG44(dhfr^{-/-}))が好ましい。
- [0050] 組換えベクターを宿主に導入するには、Molecular Cloning 2nd Edition, J. Sambrook et al., Cold Spring Harbor Lab. Press, 1989に記載の方法（例えば、リン酸カルシウム法、DEAE-デキストラン法、トランスフェクション法、マイクロインジェクション法、リポフェクション法、エレクトロポレーション法、形質導入法、スクレープローディング法、ショットガン法など）または感染により行うことができる。
- [0051] 形質転換体を培地で培養し、培養物から本発明の抗PD-L1抗体を採取することができる。抗体が培地に分泌される場合には、培地を回収し、その培地から抗体を分離し、精製すればよい。抗体が形質転換された細胞内に産生される場合には、その細胞を溶解し、その溶解物から抗体を分離し、精製すればよい。
- [0052] 培地としては、OptiCHO培地、Dynamis培地、CD CHO培地、ActiCHO培地、FortiCHO培地、Ex-Cell CD CHO培地、BalanCD CHO培地、ProCHO 5培地、Cellvento CHO-100培地などを例示することができるが、これらに限定されるわけではない。
- [0053] 培地のpHは培養する細胞により異なるが、一般的にはpH 6.8～7.6、多くの場合pH 7.0～7.4が適当である。

- [0054] 培養する細胞がCHO細胞である場合、CHO細胞の培養は当業者に公知の方法を用いて行うことができる。例えば、通常、気相のCO₂濃度が0-40%、好ましくは、2-10%の雰囲気下、30-39℃、好ましくは37℃程度で、培養することが可能である。
- [0055] 適当な培養期間は、通常1日～3か月であり、好ましくは1日～3週間である。
- [0056] 抗体の分離及び精製は、公知の方法により行うことができる。公知の分離、精製法としては、塩析や溶媒沈澱法などの溶解度の差を利用する方法、透析法、限外ろ過法、ゲルろ過法、およびSDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動法などの分子量の差を利用する方法、イオン交換クロマトグラフィーなどの荷電の差を利用する方法、アフィニティークロマトグラフィーなどの特異的親和性を利用する方法、逆相高速液体クロマトグラフィーなどの疎水性の差を利用する方法、等電点電気泳動法などの等電点の差を利用する方法などが用いられる。
- [0057] 本発明の抗PD-L1抗体は、動物用又はヒト用の抗体医薬として利用することができる。よって、本発明は、上記の抗PD-L1抗体を有効成分として含む、医薬組成物を提供する。
- [0058] 本発明の医薬組成物は、がん及び／又は感染症の予防及び／又は治療に用いることができる。がん及び／又は感染症としては、腫瘍性疾患（例えば、悪性黒色腫、肺がん、胃がん、腎臓がん、乳がん、膀胱がん、食道がん、卵巣がん等）、白血病、ヨーネ病、アナプラズマ病、細菌性乳房炎、真菌性乳房炎、マイコプラズマ感染症（例えば、マイコプラズマ性乳房炎、マイコプラズマ性肺炎など）、結核、小型ピロプラズマ病、クリプトスポリジウム症、コクシジウム症、トリパノソーマ病及びリーシュマニア症などを例示することができるが、これらに限定されるわけではない。
- [0059] 本発明の抗PD-L1抗体をPBSなどの緩衝液、生理食塩水、滅菌水などに溶解し、必要に応じてフィルターなどで濾過滅菌した後、注射により被験動物（ヒトも含む）に投与するとよい。また、この溶液には、添加剤（例えば、着

色剤、乳化剤、懸濁剤、界面活性剤、溶解補助剤、安定化剤、保存剤、酸化防止剤、緩衝剤、等張化剤、pH調節剤など）などを添加してもよい。投与経路としては、静脈、筋肉、腹腔、皮下、皮内投与などが可能であり、また、経鼻、経口投与してもよい。

[0060] 本発明の抗PD-L1抗体の投与量、投与の回数及び頻度は、被験動物の症状、年齢、体重、投与方法、投与形態などにより異なるが、例えば、通常、成獣一匹当たり0.1～100mg/kg体重、好ましくは、1～10mg/kg体重を、少なくとも1回、所望の効果が得られる頻度で投与するとよい。

[0061] 本発明の医薬組成物は、単独で用いてもよいが、外科手術、放射線療法、がんワクチンなど他の免疫療法や分子標的治療薬と組み合わせて用いてもよい。これにより、相乗効果が期待できる。

実施例

[0062] 以下、実施例に基づいて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

〔実施例1〕ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体

1. 序論

免疫抑制受容体Programmed death 1 (PD-1) とそのリガンドであるProgrammed death ligand 1 (PD-L1)は過剰な免疫応答を抑制し、免疫寛容に深く関連している因子として京都大学、本庶 佑氏らによって同定された分子である。腫瘍における免疫抑制に関与していることも近年明らかにされている。本実施例では、イヌ腫瘍疾患に対する新規治療法の樹立を目的にイヌPD-1およびPD-L1の結合を阻害可能なラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体(4G12)の可変領域遺伝子と、イヌ免疫グロブリン(IgG4)の定常領域遺伝子を組み合わせたキメラ抗体遺伝子を導入したチャイニーズハムスター卵巣細胞(Chinese hamster ovary cell:CHO細胞)を培養増殖させて得たラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12を作製し、in vitro及びin vivoの効果を確認した。

[0063] 2. 材料および方法

2.1ウシPD-L1モノクローナル抗体産生細胞

ウシPD-L1遺伝子配列を同定し(Ikebuchi R, Konnai S, Shirai T, Sundén Y, Murata S, Onuma M, Ohashi K. Vet Res. 2011 Sep 26;42:103.)、その遺伝子情報より組換えウシPD-L1を作製した。同組換えタンパク質をラットに免疫しラット抗ウシPD-L1抗体を得た(Ikebuchi R, Konnai S, Okagawa T, Yokoyama K, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. Immunology. 2014 Aug ;142(4):551-61. この論文に後にイヌキメラ抗体の可変領域となるクローン4G12が掲載されている)。

[0064] 2.2完全長イヌPD-1およびPD-L1遺伝子の同定

イヌPD-1およびPD-L1 cDNA全長を決定するために、まずThe National Center for Biotechnology Information (NCBI) に既に登録されているイヌのPD-1およびPD-L1の予想塩基配列 (GenBank accession number; XM_543338およびXM_541302) から遺伝子のオープンリーディングフレーム (ORF) 内部を増幅するようにプライマー (cPD-1 inner FおよびR、cPD-L1 inner FおよびR) を設計しPCR法を行った。得られた増幅産物について、常法に従いキャピラリーシーケンサーにより塩基配列を決定した。さらに完全長PD-1およびPD-L1 cDNAの塩基配列を決定するために、上記で決定したイヌPD-1およびPD-L1 cDNA配列を基にプライマー (cPD-1 5' GSPおよび3' GSP、cPD-L1 5' GSPおよび3' GSP) を設計し、それぞれ5' RACE System for Rapid Amplification of cDNA Ends および3' RACE System for Rapid Amplification of cDNA Ends (Invitrogen社) を用いて5' および3' RACE法を行った。5' および3' RACE法により得られた目的とする遺伝子断片は上記の方法にしたがって塩基配列を決定した (Maekawa N, Konnai S, Ikebuchi R, Okagawa T, Adachi M, Takagi S, Kagawa Y, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. PLoS One. 2014 Jun 10;9(6):e98415.) 。

プライマー (cPD-1 inner F) : AGGATGGCTCCTAGACTCCC (配列番号21)

プライマー (cPD-1 inner R) : AGACGATGGTGGCATACTCG (配列番号22)

プライマー (cPD-L1 inner F) : ATGAGAATGTTTAGTGTCTT (配列番号23)

プライマー (cPD-L1 inner R) : TTATGTCTCTTCAAATTGTATATC (配列番号24)

)

プライマー (cPD-1 5' GSP) : GTTGATCTGTGTGTTG (配列番号 25)

プライマー (cPD-1 3' GSP) : CGGGACTTCCACATGAGCAT (配列番号 26)

プライマー (cPD-L1 5' GSP) : TTTTAGACAGAAAGTGA (配列番号 27)

プライマー (cPD-L1 3' GSP) : GACCAGCTCTTCTTGGGGAA (配列番号 28)

[0065] 2.3 イヌPD-1およびPD-L1発現COS-7細胞の構築

イヌPD-1-EGFPおよびPD-L1-EGFP発現プラスミドを作製するため、合成したビーグルPBMC由来cDNAを鋳型に、5'末端側に制限酵素XhoIおよびBamHI (PD-1)、BglIIIおよびEcoRI (PD-L1) 認識部位を付加して設計したプライマー (cPD-1-EGFP FおよびR、cPD-L1-EGFP FおよびR) を用いてPCRを行った。得られたPCR産物をXhoI (Takara社) およびBamHI (Takara社) (PD-1)、BglIII (New England Biolabs社) およびEcoRI (Takara社) (PD-L1) により処理した後、FastGene Gel/PCR Extraction Kit (NIPPON Genetics社) を用いて精製し、同様の制限酵素処理を行ったpEGFP-N2 vector (Clontech社) を用いてクローニングを行った。得られた目的の発現プラスミドはQIAGEN Plasmid Midi kit (Qiagen社) を用いて抽出し、実験に供するまで-30℃で保存した。以降、作製した発現プラスミドをpEGFP-N2-cPD-1あるいはpEGFP-N2-cPD-L1と表記した。

プライマー (cPD-1-EGFP F) : CCGCTCGAGATGGGGAGCCGGCGGGGGCC (配列番号 29)

プライマー (cPD-1-EGFP R) : CGCGGATCCTGAGGGGCCACAGGCCGGGTC (配列番号 30)

プライマー (cPD-L1-EGFP F) : GAAGATCTATGAGAATGTTTAGTGTC (配列番号 31)

プライマー (cPD-L1-EGFP R) : GGAATTCTGTCTCTTCAAATTGTATATC (配列番号 32)

[0066] 5×10^4 /cm²のCOS-7細胞を6穴プレートに継代し、10% 非働化牛胎仔血清、0.01% L-グルタミンを含むRPMI 1640培地にて37℃、5% CO₂存在下で一晩培養

した。pEGFP-N2-cPD-1、pEGFP-N2-cPD-L1、あるいは陰性対照としてpEGFP-N2 0.4 μ g/cm²をLipofectamine 2000 試薬 (Invitrogen社) を用いて、COS-7 細胞にそれぞれ導入し48時間培養した (cPD-1-EGFP発現細胞およびcPD-L1-EGFP発現細胞)。作製した発現細胞におけるイヌPD-1およびPD-L1の発現を確かめるために、倒立型共焦点レーザー顕微鏡 LSM700 (ZEISS社) により、Enhanced green fluorescent protein (EGFP) の細胞内局在を可視化した(Maekawa N, Konnai S, Ikebuchi R, Okagawa T, Adachi M, Takagi S, Kagawa Y, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. PLoS One. 2014 Jun 10;9(6):e98415.)。

[0067] 2.4 組換えイヌPD-1、PD-L1およびCD80の構築

イヌPD-1、PD-L1およびCD80の予想アミノ酸配列より推定された細胞外領域を増幅するように5'末端側にNheIあるいはEcoRV (PD-1およびPD-L1) の認識配列を付加したプライマー (cPD-1-Ig FおよびR、cPD-L1-Ig FおよびR)、または5'末端側にEcoRVあるいはKpnI (CD80) の認識配列を付加したプライマー (cCD80-Ig FおよびR) を設計した。合成したビーグルPBMC由来cDNAを鋳型にPCRを行い、PCR産物をNheI (Takara社) およびEcoRV (Takara社)、またはEcoRV (Takara社) およびKpnI (New England Biolabs社) によって処理した後、FastGene Gel/PCR Extraction Kit (NIPPON Genetics社) を用いて精製し、同様の制限酵素処理を行ったpCXN2.1-Rabbit IgG Fc vector (Niwa et al., 1991; Zettlmeissl et al., 1990; 順天堂大学大学院医学研究科教授 横溝岳彦 先生より分与されたものを当研究室で改変) を用いて、クローニングを行った。発現プラスミドはQIAGEN Plasmid Midi kit (Qiagen社) によって精製し、実験に供するまで-30°Cにて保存した。以降、作製した発現プラスミドをそれぞれpCXN2.1-cPD-1-Ig、pCXN2.1-cPD-L1-IgあるいはpCXN2.1-cCD80-Igと表記した。

プライマー (cPD-1-Ig F) : CGCGGCTAGCATGGGGAGCCGGCGGGGGCC (配列番号 33)

プライマー (cPD-1-Ig R) : CGCGGATATCCAGCCCCTGCAACTGGCCGC (配列番号 33)

4)

プライマー (cPD-L1-Ig F) : CGCGGCTAGCATGAGAATGTTTAGTGTCTT (配列番号 3

5)

プライマー (cPD-L1-Ig R) : CGCGGATATCAGTCCTCTCACTTGCTGGAA (配列番号 3

6)

プライマー (cCD80-Ig F) : CGCGGATATCATGGATTACACAGCGAAGTG (配列番号 1

1 2 9)

プライマー (cCD80-Ig R) : CGGGGTACCCCAGAGCTGTTGCTGGTTAT (配列番号 1 3

0)

[0068] これらの発現ベクターをExpi293F細胞 (Life Technologies社) ヘトランスフェクションし、組み換えIg融合タンパク質を含む培養上清を得た。産生した組み換えタンパク質は上清よりAb Capcher Extra (プロテインA変異体、ProteNova社) を用いて精製を行い、PD-MidiTrap G-25 (GE Healthcare社) を用いてバッファーをリン酸緩衝生理食塩水 (PBS; pH 7.4) に置換し、実験に供するまで-30° Cにて保存した (cPD-1-I、cPD-L1-IgおよびcCD80-Ig)。タンパク質の濃度はPierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific社) により定量し、以後の実験に用いた。

[0069] 2.5 イヌPD-L1に交差反応を示すラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体の同定

イヌPD-L1に交差反応を示すラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体を同定するため、2.1で作製した抗ウシPD-L1抗体を用いてフローサイトメトリーを行った。2×10⁵-1×10⁶個の細胞に対し、10 μg/mlの抗ウシPD-L1抗体を室温で30分間反応させ、洗浄した後にAllophycocyanine標識抗ラットIgヤギ抗体 (Beckman Coulter社) を用いて抗ウシPD-L1抗体の検出を行った。解析にはFACS Verse (Becton, Dickinson and Company社) を用いた。陰性対照抗体として、ラットIgG2a (κ) アイソタイプコントロール (BD Biosciences社)、ラットIgG1 (κ) アイソタイプコントロール (BD Biosciences社)、ラットIgM (κ) アイソタイプコントロール (BD Biosciences社) を使用した。なお、

すべての洗浄操作および抗体の希釈には、10% 非働化ヤギ血清加PBSを使用した(Maekawa N, Konnai S, Ikebuchi R, Okagawa T, Adachi M, Takagi S, Kagawa Y, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. PLoS One. 2014 Jun 10;9(6):e98415. ウシPD-L1モノクローナル抗体3種: 4G12; Rat IgG2a (κ)、5A2; Rat IgG1 (κ)、および6G7; Rat IgM (κ)を使用した論文)。

[0070] 2.6 ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体樹立のための可変部位の選定試験

以下、イヌPD-L1に交差反応を示したラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体10クローンのうち4G12; Rat IgG2a (κ)、5A2; Rat IgG1 (κ)、および6G7; Rat IgM (κ)を選抜し、これらの抗体がイヌPD-1/PD-L1結合を阻害するか検討した。すなわち、イヌPD-1-Ig(2.4で作製)を平底96穴プレート上に固層化し、1% BSAおよび0.05% Tween20を含むPBSにてブロッキング操作を行った。Lightning-Link Biotin Conjugation Kit (Innova Biosciences社)を用いてビオチン化したイヌPD-L1-Ig(2.4で作製)を、各濃度 (0、2.5、5、10 μ g/ml) のラット抗ウシPD-L1抗体4G12、5A2および 6G7と37°Cで30分間反応させた後、プレートに添加し、cPD-L1-IgのcPD-1-Igに対する結合をNeutravidin-HRP (Thermo Fisher Scientific社) および TMB one component substrate (Bethyl Laboratories社)を用いた発色反応により定量した。ラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体4G12および6G7は良好なイヌPD-1/PD-L1結合阻害活性を示したが、5A2は結合阻害活性を持たなかった。(図1)

[0071] 2.7 ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体発現ベクターの作製(図2)

以下、2.6の選定試験によってイヌPD-1/PD-L1結合に対し良好な阻害活性を示した(図1)ラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体: 4G12および6G7をラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体の可変部とし、2種類のラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体を樹立した。

ラット抗ウシPD-L1抗体4G12および6G7を産生するハイブリドーマより可変領域(重鎖および軽鎖)遺伝子を同定した。さらに、当該ラット抗体重鎖および軽鎖可変領域配列を既知のイヌ抗体の重鎖IgG4の定常領域および軽鎖ラムダ鎖の定常領域と結合させた遺伝子配列を作成し、コドン最適化を行ったの

ち（配列番号 9 及び 10（アミノ酸配列）、配列番号 19 及び 20（コドン最適化後ヌクレオチド配列））、NotI制限酵素認識配列、Kozak配列、キメラ抗体軽鎖配列、ポリA付加シグナル配列（PABGH）、プロモーター配列（PCMV）、SacI制限酵素認識配列、イントロン配列（INRBG）、Kozak配列、キメラ抗体重鎖配列、XbaI制限酵素認識配列を上記の順で配置するように遺伝子合成を行った。合成した遺伝子鎖を、発現用ベクターpDC6（北海道大学 人獣共通感染症リサーチセンター 鈴木 定彦 教授より分与）のクローニングサイト（PCMV下流、INRBGとPABGHの間にあるNotIおよびXbaI制限酵素認識配列）へ制限酵素認識配列を利用して上記の順で配置するように組み込み（図2）、ラット-イヌキメラ抗PD-L1抗体発現ベクターを構築した。この発現ベクターをExpi293F細胞（Life Technologies社）へトランスフェクションし、キメラ抗体を含む培養上清を得た。上清よりAb Capcher Extra（プロテインA変異体、ProteNova社）を用いて精製を行い、さらにゲル濾過クロマトグラフィーにより精製を行った。10%アクリルアミドゲルを用いて非還元条件下にてSDS-PAGEを行い、Quick-CBB kit（和光純薬工業社）により染色を行った後、蒸留水中で脱色を行った。プロテインA精製のみでは夾雑タンパク質が認められたが、ゲル濾過クロマトグラフィー精製をすることで純度の高い精製抗体を得た（図3）。得られた精製抗体はフローサイトメトリーを用いてイヌPD-L1発現細胞に特異的に結合することを確認した（データは示さず）。該キメラ抗体2種のイヌPD-1/PD-L1結合阻害活性を2.6に示した方法により検討した結果、ラット-イヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12は元となったラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体4G12と同様の結合阻害活性を示したが、ラット-イヌキメラ抗PD-L1抗体c6G7では結合阻害能が明らかに減弱した（図4）。よって治療用抗体としてラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体4G12の可変領域配列（配列番号2及び1（アミノ酸配列）、配列番号16及び15（コドン最適化後ヌクレオチド配列））を組込んだラット-イヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12を選定した。c4G12のL鎖のアミノ酸配列及びヌクレオチド配列（コドン最適化後）を配列番号9及び19に、H鎖のアミノ酸配列及びヌクレオチド配列（コド

ン最適化後)を配列番号10及び20に示す。

[0072] 2.8 ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12の発現

2.7で使用したラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12発現pDC6ベクターをジヒドロ葉酸還元酵素欠損細胞であるCHO-DG44細胞(CHO-DG44(dfhr-/-))へトランスフェクションし、高発現クローンをドットブロット法により選抜した。さらに60 nMのメトトレキサート(Mtx)を含む培地で負荷をかけることにより遺伝子増幅処理を行った。遺伝子増幅終了後のラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12安定発現細胞(クローン名:4.3F1)を、Mtxを含まないOpti-CHO培地へ移し、14日間の振盪培養を行った(125 rpm, 37°C, 5% CO₂)。トリパンブルー染色により細胞生存率を算出した(図5)。ELISA法により培養上清中のキメラ抗体産生量を定量した(図5)。14日目の培養上清を10,000 gで10分間遠心し、細胞を除いた後、0.22 µmのフィルターを通し、抗体の精製ステップに進んだ。

なお、培地をDynamis培地に替え、適切なFeedを行うことで、抗体産生量が従来のおよそ2倍に向上した(データは示さず)。

[0073] 2.9. ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12の精製

上記の方法により準備した培養上清は、Ab Capcher Extra (ProteNova社)を用いて精製した。レジンへの結合はオープンカラム法を用い、平衡化バッファーおよび洗浄バッファーとしてPBS pH7.4を使用した。溶出バッファーにはIgG Elution Buffer (Thermo Scientific社)を、中和バッファーには1M Trisを使用した。精製した抗体はAmicon Ultra-15 (50 kDa, Millipore社)を用いて限外濾過法により濃縮と、PBSへのバッファー置換を行った。0.22 µmのフィルターを通し、各実験に使用した。

[0074] 2.10. ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12の精製の確認(図6)

精製した抗体の純度を確かめるため、SDS-PAGEおよびCBB染色により抗体タンパク質の検出を行った。SuperSep Ace 5-20% (Wako社)グラジエントゲルを用い、ラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体4G12およびラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12を還元条件下および非還元条件下にて電気泳動した。Qui

ck-CBB kit (和光純薬工業社) により染色を行った後、蒸留水中で脱色を行った。抗体に相当する分子量の位置にバンドが見られ、夾雑タンパク質のバンドは視認されなかった。

[0075] 2.11. ラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体4G12およびラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12のcPD-L1-Hisに対する結合親和性の測定

イヌPD-L1の予想アミノ酸配列より推定された細胞外領域を増幅するように5'末端側にNheI認識配列を付加したプライマー (cPD-L1-His F) と、5'末端側にEcoRV認識配列および6xHisタグ配列を付加したプライマー (cPD-L1-His R) を設計した。合成したビーグルPBMC由来cDNAを鋳型にPCRを行い、PCR産物をNheI (Takara社) およびEcoRV (Takara社) によって処理した後、FastGene Gel/PCR Extraction Kit (NIPPON Genetics社) を用いて精製し、同様の制限酵素処理を行ったpCXN2.1 vector (Niwa et al., 1991; 順天堂大学大学院医学研究科教授 横溝 岳彦 先生より分与) を用いて、クローニングを行った。発現プラスミドはQIAGEN Plasmid Midi kit (Qiagen社) によって精製し、実験に供するまで-30°Cにて保存した。以降、作製した発現プラスミドをpCXN2.1-cPD-L1-Hisと表記した。

プライマー (cPD-L1-His F) : CGCGGCTAGCATGAGAATGTTTAGTGTCTT (配列番号 131)

プライマー (cPD-L1-His R) : CGCGGATATCTTAATGGTGATGGTGATGGTGAGTCCTCTCACTTGCTGG (配列番号 132)

[0076] 発現ベクターをExpi293F細胞 (Life Technologies社) ヘトランスフェクションし、組み換えタンパク質を含む培養上清を得た。産生した組み換えタンパク質は上清よりTALON Metal Affinity Resin (Clontech社) を用いて精製を行い、Amicon Ultra-4 Ultracel-3 (Merck Millipore社) を用いてバッファーをPBSに置換し、実験に供するまで4°Cにて保存した (cPD-L1-His)。タンパク質の濃度はPierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific社) により定量し、以後の実験に用いた。

生体分子相互作用測定器(Biacore X100)を用いて、ラット抗ウシPD-L1モノ

クローナル抗体4G12およびラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12のcPD-L1-Hisに対する結合親和性 (Avidity) を評価した。すなわち、抗ヒスチジン抗体をCM5センサーチップに固定し、cPD-L1-Hisをキャプチャした後に、モノクローナル抗体をアナライトとして添加することで特異的結合を観察した。両抗体とも特異的結合を示し、Avidityはほぼ同等であった (表1)。また、同様にcPD-L1-Hisに対するイヌPD-1-IgおよびCD80-IgのAvidityを測定したところ、ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12と比べ明らかに結合親和性が低かった (表1)。

[0077] 表1. 各抗体および組み換えタンパク質のイヌPD-L1-Hisに対する結合親和性

	$k_a (\times 10^6/\text{Ms})$	$k_d (\times 10^{-3}/\text{s})$	KD (nM)
4G12	2.42 ± 0.10	4.54 ± 0.19	1.88 ± 0.06
c4G12	3.14 ± 0.19	7.19 ± 0.26	2.30 ± 0.07
cPD-1			25.4 ± 4.89
cCD80			24.3 ± 0.89

[0078] 2.12. ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12のイヌPD-1/PD-L1結合およびCD80/PD-L1結合阻害活性 (図7)

イヌPD-1-Ig、PD-L1-IgおよびCD80-Ig (前述) を用いて、抗PD-L1抗体によるイヌPD-1/PD-L1結合およびCD80/PD-L1結合阻害試験を行った。イヌPD-1-IgあるいはCD80-Igを平底96穴プレート上に固層化し、2.6で行った手順に従い各濃度 (0、2.5、5、10 $\mu\text{g/ml}$) のラット抗ウシPD-L1抗体4G12あるいはラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12と反応させたイヌPD-L1-Igの結合量を評価した。キメラ抗体化による結合阻害活性の変化は認められなかった。

[0079] 2.13. ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12のイヌ免疫担当細胞活性化効果 (図8)

イヌPBMCをスーパー抗原であるStaphylococcal Enterotoxin B (SEB) 刺激化で3日間培養し、ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12の添加によるサイトカイン産生量の変化をDuoset ELISA canine IL-2 or IFN- γ (R&D systems社) を用いて ELISA法により定量した。ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12は

イヌPBMCからのIL-2およびIFN- γ 産生量を増大させた。また同様に、SEB刺激2日目の培養液中に核酸アナログであるEdUを添加し2時間培養後、その取り込みをClick-iT Plus EdU flow cytometry assay kit (Life Technologies社)を用いてフローサイトメトリーにより定量したところ、イヌCD4+またはCD8+リンパ球におけるEdU取り込みがラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12添加により亢進し、細胞増殖能の上昇が認められた。

[0080] 2.14. イヌへの接種試験に用いる腫瘍罹患犬の選抜

本治療法は腫瘍にPD-L1が発現している場合により効果が見込まれるため、免疫組織化学染色法によりイヌ腫瘍部におけるPD-L1発現解析を行った。ホルムアルデヒド固定し、パラフィン包埋した腫瘍組織をミクロトームで4 μ m厚に薄切し、シランコーティングスライドガラス（松浪硝子工業社）に貼付・乾燥させた後、キシレン・アルコールで脱パラフィン処理を行った。クエン酸バッファー {クエン酸（和光純薬工業社）0.37 g、クエン酸3ナトリウム2水和物（キシダ化学社）2.4 g、蒸留水1000 ml} に浸漬しながらマイクロウェーブにて10分間抗原賦活化処理を行い、ニチレイ自動免疫染色装置により染色を行った。前処理として、0.3% 過酸化水素を含むメタノール溶液に室温で15分間浸漬した後、PBSで洗浄し、抗ウシPD-L1モノクローナル抗体を添加して室温で30分反応させた。PBSで洗浄後、ヒストファインシンプルスステインMAX-P0 (Rat) (ニチレイバイオサイエンス社) を添加し室温で30分間反応させた後、3, 3'-diaminobenzidine tetrahydrochlorideで発色し、光学顕微鏡を用いて観察した。腫瘍細胞がPD-L1陽性であった口腔内メラノーマおよび未分化肉腫罹患犬を以下の接種試験（臨床試験）に用いた。抗ウシPD-L1モノクローナル抗体は、ラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体産生ハイブリドーマ(Ikebuchi R, Konnai S, Okagawa T, Yokoyama K, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. Immunology. 2014 Aug;142(4):551-61.)より樹立した。

[0081] 2.15. イヌへの接種試験

臨床試験においてイヌに接種するラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12に

については、夾雑物や重合体タンパク質を除去する目的で、2.8で示した手順により得た培養上清からMabSelect SuRe LX (GE Healthcare社)を用いたアフィニティークロマトグラフィー精製を行った後、BioScale CHT20-I prepacked column (Bio-Rad社)を用いてハイドロキシアパタイトクロマトグラフィー精製を行った。アグリゲイトを含むフラクションはさらにHiScreen Q-Sepharose HP prepacked column (GE Healthcare社)を用いた陰イオン交換クロマトグラフィー精製を行った。

(1)安全性試験：イヌ(ビーグル、避妊雌、13歳、体重 およそ10 kg)に樹立したラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12 2 mg/kgを2週間間隔で全3回点滴静注した。アナフィラキシー他、臨床上問題となるような副作用は観察されなかった。

(2)臨床試験1：PD-L1陽性である口腔内メラノーマ (図9A) 再発犬 (ミニチュアダックスフンド、雄、11歳、体重 およそ7.5 kg) に樹立したラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12 2 mg/kgあるいは5 mg/kgを2週間間隔で22回点滴静注した。治療開始10週時点で顕著な腫瘍の縮小が認められ、治療開始34週時点ではさらなる縮小が確認された (図10)。44週間の観察期間中、リンパ節や肺への転移も認められなかった。ベースライン時と比較して、30%以上の腫瘍長径の減少をPR (部分奏功) と定義すると、16-20週時点および34週以降でPRの基準を満たしていた (図11)。

(3)臨床試験2：原発巣がPD-L1陽性であり (図9B)、全身の筋肉内に複数の転移巣のある未分化肉腫罹患犬 (ウエストハイランドホワイトテリア、去勢雄、12歳、体重およそ8 kg) にラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12 5 mg/kgを2週間間隔で2回点滴静注した。治療開始3週時点で明らかな腫瘍の退縮が認められた (図12)。

(4)臨床試験3：原発巣を外科手術で摘出した口腔内メラノーマ罹患犬 (ビーグル、避妊メス、11歳、体重およそ10 kg) に対し、ラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12 2 mg/kgあるいは5 mg/kgを2週間間隔で9回点滴静注した。治療開始18週時点で複数の肺転移巣が消失した (図13)。

(5)臨床試験4：肺転移のある口腔内メラノーマ罹患犬4頭にラットーイヌキメラ抗PD-L1抗体c4G12 2 mg/kgあるいは5 mg/kgを2週間間隔で点滴静注した。観察期間中に明らかな腫瘍の縮小は見られなかったが、肺転移が確認されてからの生存期間は対照群（抗体非投与、ヒストリカルコントロール群：n = 15）と比べ長い傾向にあったため（図14）、抗体投与により生存期間が延長された可能性がある。

[0082] 2.16. 抗PD-L1抗体のCDR解析

NCBI IGBLAST (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/igblast/>) を用いて、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12の相補性決定領域（CDR）を決定した。結果を図15に示す。

[0083] 「実施例2」抗PD-L1抗体の他の動物種への応用

1.1. ヒツジ、ブタおよびスイギュウPD-L1遺伝子の同定

ヒツジ、ブタおよびスイギュウPD-L1 cDNA コーディング領域（CDS）全長を決定するために、まずヒツジ、ブタおよびウシPD-L1遺伝子の塩基配列（GenBank accession number; XM_004004362、NM_001025221およびXM_613366）から遺伝子のCDS全長を増幅するプライマー（ovPD-L1 CDS FおよびR、poPD-L1 CDS FおよびR、buPD-L1 CDS F1, R1, F2およびR2）を設計しPCR法を行った。得られた増幅産物について、常法に従いキャピラリーシーケンサーにより塩基配列を決定した（Mingala CN, Konnai S, Ikebuchi R, Ohashi K. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis. 2011 Jan;34(1):55-63. スイギュウPD-L1遺伝子を同定した論文）。

プライマー（ovPD-L1 CDS F）：ATGAGGATATATAGTGTCTTAACAT（配列番号109）

プライマー（ovPD-L1 CDS R）：TTACGTCTCCTCAAAATGTG（配列番号110）

プライマー（poPD-L1 CDS F）：ATGAGGATATGTAGTATCTTTACAT（配列番号111）

プライマー（poPD-L1 CDS R）：TTACGTCTCCTCAAATTGTGT（配列番号112）

プライマー（buPD-L1 CDS F1）：ATGAGGATATATAGTGTCTT（配列番号113）

プライマー (buPD-L1 CDS R1) : GCCACTCAGGACTTGGTGAT (配列番号 1 1 4)

プライマー (buPD-L1 CDS F2) : GGGGGTTTACTGTTGCTTGA (配列番号 1 1 5)

プライマー (buPD-L1 CDS R2) : TTACGTCTCCTCAAATTGT (配列番号 1 1 6)

[0084] 1.2. ヒツジPD-1、ヒツジPD-L1、ブタPD-1およびブタPD-L1発現COS-7細胞の構築

ヒツジPD-1、ヒツジPD-L1、ブタPD-1およびブタPD-L1発現プラスミドを作製するため、合成したヒツジまたはブタPBMC由来cDNAを鋳型に、5'末端側に制限酵素BglIIおよびSmaI (ヒツジPD-1)、HindIIIおよびSmaI (ブタPD-1)、またはXhoIおよびSmaI (ヒツジおよびブタPD-L1) 認識部位を付加して設計したプライマー (ovPD-1-EGFP FおよびR、ovPD-L1-EGFP FおよびR、poPD-1-EGFP FおよびR、またはpoPD-L1-EGFP FおよびR) を用いてPCRを行った。得られたPCR産物をBglII (Takara社) およびSmaI (Takara社) (ヒツジPD-1)、HindIII (Takara社) およびSmaI (Takara社) (ブタPD-1)、XhoI (Takara社) およびSmaI (Takara社) (ヒツジおよびブタPD-L1) により処理した後、FastGene Gel/PCR Extraction Kit (NIPPON Genetics社) を用いて精製し、同様の制限酵素処理を行ったpEGFP-N2 vector (Clontech社) に導入し、クローニングを行った。発現プラスミドはFastGene Xpress Plasmid PLUS Kit (NIPPON Genetics社) を用いて抽出し、実験に供するまで-30℃で保存した。以降、作製した発現プラスミドをpEGFP-N2-ovPD-1、pEGFP-N2-ovPD-L1、pEGFP-N2-poPD-1あるいはpEGFP-N2-poPD-L1と表記した。

プライマー (ovPD-1-EGFP F) : GAAGATCTATGGGGACCCCGCGGGCGCCG (配列番号 1 1 7)

プライマー (ovPD-1-EGFP R) : GACCCGGGAGGGGCCAGGAGCAGTGTCC (配列番号 1 1 8)

プライマー (ovPD-L1-EGFP F) : CCGCTCGAGATGAGGATATATAGTGTCT (配列番号 1 1 9)

プライマー (ovPD-L1-EGFP R) : ATCCCGGGCGTCTCCTCAAAATGTGTAG (配列番号 1 2 0)

プライマー (poPD-1-EGFP F) : ACTAAGCTTATGGGGACCCCGCGGG (配列番号 1 2 1)

プライマー (poPD-1-EGFP R) : ACTCCCGGGGAGGGGCCAAGAGCAGT (配列番号 1 2 2)

プライマー (poPD-L1-EGFP F) : CCGCTCGAGATGAGGATATGTAGTATCTT (配列番号 1 2 3)

プライマー (poPD-L1-EGFP R) : ATCCCGGGCGTCTCCTCAAATTGTGTATC (配列番号 1 2 4)

$5 \times 10^4/\text{cm}^2$ のCOS-7細胞を6穴プレートに継代し、10% 非働化牛胎仔血清、0.01% L-グルタミンを含むRPMI 1640培地にて37° C、5% CO₂存在下で一晩培養した。pEGFP-N2-ovPD-1、pEGFP-N2-ovPD-L1、pEGFP-N2-poPD-1、pEGFP-N2-poPD-L1、あるいは陰性対照としてpEGFP-N2 $0.4 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ をLipofectamine 2000 試薬 (Invitrogen社) を用いて、COS-7細胞にそれぞれ導入し48時間培養した (ovPD-1-EGFP発現細胞、ovPD-L1-EGFP発現細胞、poPD-1-EGFP発現細胞およびpoPD-L1-EGFP発現細胞)。作製した発現細胞におけるヒツジPD-1、ヒツジPD-L1、ブタPD-1およびブタPD-L1の発現を確かめるために、倒立型共焦点レーザー顕微鏡 LSM700 (ZEISS社) もしくはオールインワン蛍光顕微鏡 BZ-9000 (KEYENCE社) により、EGFPの細胞内局在を可視化した。

[0085] 1.3. 組換えヒツジPD-L1およびブタPD-L1の構築

ヒツジPD-L1またはブタPD-L1の予想アミノ酸配列より推定された細胞外領域を増幅するように5'末端側にNheIあるいはEcoRVの認識配列を付加したプライマー (ovPD-L1-Ig FおよびR、またはpoPD-L1-Ig FおよびR) を設計した。合成したヒツジまたはブタPBMC由来cDNAを鋳型にPCRを行い、そのPCR産物をNheI (Takara社) およびEcoRV (Takara社) によって処理した後、FastGene Gel/PCR Extraction Kit (NIPPON Genetics社) を用いて精製し、同様の制限酵素処理を行ったpCXN2.1-Rabbit IgG Fc vector (Niwa et al., 1991; Zettlm eissl et al., 1990 ; 順天堂大学大学院医学研究科教授 横溝 岳彦 先生より分与されたものを当研究室で改変) に導入し、クローニングを行った。

発現プラスミドはFastGene Xpress Plasmid PLUS Kit (NIPPON Genetics社) によって精製し、実験に供するまで -30°C にて保存した。以降、作製した発現プラスミドをpCXN2.1-ovPD-L1-IgあるいはpCXN2.1-poPD-L1-Igと表記した。

プライマー (ovPD-L1-Ig F) : GACGCTAGCATGAGGATATATAGTGTCT (配列番号 125)

プライマー (ovPD-L1-Ig R) : GCTCTGATATCCCTCGTTTTTGCTGGAT (配列番号 126)

プライマー (poPD-L1-Ig F) : GACGCTAGCATGAGGATATGTAGTATCTT (配列番号 127)

プライマー (poPD-L1-Ig R) : AGCTTGATATCCCTCTTTCTTGCTGGATC (配列番号 128)

7.5×10^7 個のExpi293F細胞 (Life technologies社) に $30\text{ }\mu\text{g}$ のpCXN2.1-ovPD-L1-Ig、またはpCXN2.1-poPD-L1-IgをExpifectamin (Life technologies社) を用いて導入し、6日間振盪培養を行って培養上清を回収した。Fc融合組換えタンパク質を含む培養上清は、Ab-Capcher Extra (ProteNova社) を用いてFc融合組換えタンパク質を精製した。精製後、PD-10 Desalting Column (GE Healthcare社) によりバッファーをPBS (pH 7.4) に置換し、実験に供するまで -30°C にて保存した (ovine PD-L1-Ig)。精製後ovine PD-L1-Igおよびporcine PD-L1-Igの濃度はRabbit IgG ELISA Quantitation Set (BETHYL社) を用いて測定した。ELISAの各洗浄操作にはAuto Palte Washer BIO WASHER 50 (DS Pharma Biomedical社) を使用し、吸光度の測定にはMicroplate Reader MTP-650FA (コロナ電気社) を使用した。

[0086] 1.4. ヒツジ、ブタPD-L1に対するラット抗ウシPD-L1抗体4G12の反応性

ヒツジおよびブタPD-L1にラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体が交差反応することをフローサイトメトリー法により確認した。ヒツジ、ブタPD-L1-E GFP発現COS-7細胞を10% 非働化ヤギ血清加PBSを用いて室温で15分間ブロッキングし、 $10\text{ }\mu\text{g/ml}$ のラット抗ウシPD-L1抗体4G12を室温で30分間反応させ、

洗浄した後にAllophycocyanine標識抗ラットIgヤギ抗体（Beckman Coulter社）を室温で30分間反応させた。解析にはFACS Verse（BD Biosciences社）を用いた。陰性対照抗体として、ラットIgG2a（ κ ）アイソタイプコントロール（BD Biosciences社）を使用した。なお、すべての洗浄操作および抗体の希釈には、1% ウシ血清アルブミン加PBSを使用した。

実験結果を図16で示す。ラット抗ウシPD-L1抗体4G12は、ヒツジ、ブタのPD-L1に結合することが確認された。

[0087] 1.5. スイギュウの白血球に対するラット抗ウシPD-L1抗体4G12の反応性

スイギュウ（*Bubalus bubalis*; アジアスイギュウ）の末梢血をACKバッファで溶血し、白血球を分離した。10%非働化ヤギ血清加PBSを用いて室温で15分間ブロッキングし、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12・Peridinin-chlorophyll-protein complex/cyanin 5.5標識抗ウシCD14抗体（mouse IgG1, CAM36A, VMRD社）・抗ウシCD11b抗体（mouse IgG2b, CC126, AbD Serotec社）を室温で30分間反応させた。洗浄後、Allophycocyanine標識抗ラットIgヤギ抗体（Beckman Coulter社）・Fluorescein isothiocyanate標識抗マウスIgG2bヤギ抗体（Beckman Coulter社）を室温で30分間反応させた。解析にはFACS Calibur（BD Biosciences社）を用いた。陰性対照抗体として、ラットIgG2a（ κ ）アイソタイプコントロール（BD Biosciences社）を使用した。なお、すべての洗浄操作および抗体の希釈には、10%非働化ヤギ血清加PBSを使用した。

実験結果を図17で示す。ラット抗ウシPD-L1抗体4G12は、スイギュウの血中マクロファージ（CD14+CD11b+細胞）に強く結合した。また、スイギュウのリンパ球（CD14-CD11b-細胞）に対して、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12は弱く結合した。この結合性の違いは、マクロファージとリンパ球におけるPD-L1の発現量を反映していると思われる。

[0088] 1.6. ラット抗ウシPD-L1抗体4G12によるヒツジまたはブタPD-1/PD-L1の結合阻害試験

ヒツジPD-1-EGFP発現COS-7細胞およびヒツジPD-L1-Ig組換えタンパク質、またはブタPD-1-EGFP発現COS-7細胞およびブタPD-L1-Ig組換えタンパク質を

用いて、ラット抗ウシPD-L1抗体（4G12）によるヒツジまたはブタのPD-1/PD-L1結合阻害試験を行った。各濃度（0, 1, 5, 10, 20, 50 $\mu\text{g/ml}$ ）のラット抗ウシPD-L1抗体4G12をあらかじめヒツジPD-L1-Ig（終濃度1 $\mu\text{g/ml}$ ）またはブタPD-L1-Ig（終濃度5 $\mu\text{g/ml}$ ）と37°Cで30分間反応させ、その後 2×10^5 個のヒツジPD-1-EGFP発現COS-7細胞、またはブタPD-1-EGFP発現COS-7細胞へそれぞれ37°Cで30分間反応させた。洗浄後、Alexa Fluor 647標識抗ウサギIgG（H+L）ヤギF(ab')₂（Life Technologies社）により細胞表面に結合したヒツジPD-L1-IgまたはブタPD-L1-Igを検出した。解析にはFACS Verse（BD Biosciences社）を用いた。陰性対照抗体として、ラットIgG2a（ κ ）アイソタイプコントロール（BD Biosciences社）を使用した。抗体非添加時のPD-L1-Ig結合細胞の割合を100%とし、各濃度におけるPD-L1-Ig結合細胞の割合を相対値として表した。

その結果、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12は、ヒツジPD-1/PD-L1およびブタPD-1/PD-L1の結合を濃度依存的に阻害できることが示された（図18）。

[0089] 〔実施例3〕

1. 序論

免疫抑制受容体Programmed death 1（PD-1）とそのリガンドであるProgrammed death ligand 1（PD-L1）は過剰な免疫応答を抑制し、免疫寛容に深く関連している因子として京都大学、本庶 佑氏らによって同定された分子である。腫瘍における免疫抑制に関与していることも近年明らかにされている。本実施例では、ウシの感染症に対する新規治療法の樹立を目的にウシPD-1およびPD-L1の結合を阻害可能なラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体（4G12）の可変領域遺伝子と、ウシ免疫グロブリン（IgG1、ただし、ADCC活性を抑制するために、CH2ドメインのFc γ 受容体予想結合部位に変異を加えた。図19参照。アミノ酸番号及び変異：250 E→P, 251 L→V, 252 P→A, 253 G→deletion, 347 A→S, 348 P→S; Ikebuchi R, Konna S, Okagawa T, Yokoyama K, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. Immunology 2014 Aug; 142(4):551-561.)の定常領域遺伝子を組み合わせたキメラ抗体遺伝子を導入したチ

チャイニーズハムスター卵巢細胞(Chinese hamster ovary cell:CHO細胞)を培養増殖させて得たラットウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12を作製し、in vitro及びin vivoの効果を確認した。

[0090] 2. 材料および方法

ウシPD-1およびPD-L1発現細胞の構築

ウシPD-1遺伝子 (GenBank accession number AB510901; Ikebuchi R, Konnai S, Sundén Y, Onuma M, Ohashi K. Microbiol. Immunol. 2010 May; 54(5):291-298.)、ウシPD-L1遺伝子 (GenBank accession number AB510902; Ikebuchi R, Konnai S, Shirai T, Sundén Y, Murata S, Onuma M, Ohashi K. Vet. Res. 2011 Sep. 26; 42:103.) についてcDNA全長の塩基配列を決定し、その遺伝子情報よりウシPD-1またはPD-L1膜発現細胞を作製した。まず、ウシPD-1またはPD-L1発現プラスミドを作製するため、合成したウシPBMC 由来cDNA を鋳型として、5'末端側に制限酵素NotIおよびHindIII (ウシPD-1)、NheIおよびXhoI (ウシPD-L1) 認識部位を付加したプライマー (boPD-1-myc FおよびR、boPD-L1-EGFP FおよびR) を用いてPCR を行った。得られたPCR 産物をNotI (Takara社) およびHindIII (Takara社; ウシPD-1)、NheI (Takara社) およびXhoI (Takara社; ウシPD-L1) により処理した後、FastGene Gel/PCR Extraction Kit (NIPPON Genetics 社) を用いて精製し、同様の制限酵素処理を行ったpCMV-Tag1 vector (Agilent Technologies社; ウシPD-1) またはpEGFP-N2 vector (Clontech社; ウシPD-L1) へ導入し、クローニングを行った。得られた目的の発現プラスミドはQIAGEN Plasmid Midi kit (Qiagen 社) を用いて抽出し、実験に供するまで-30℃で保存した。以降、作製した発現プラスミドをpCMV-Tag1-boPD-1またはと表記する。

プライマー (boPD-1-myc F) : ATATGCGGCCGCATGGGGACCCGCGGGCGCT (配列番号133)

プライマー (boPD-1-myc R) : GCGCAAGCTTTCAGAGGGCCAGGAGCAGT (配列番号134)

プライマー (boPD-L1-EGFP F) : CTAGCTAGCACCATGAGGATATATAGTGTCTTAAC (配

列番号 1 3 5)

プライマー (boPD-L1-EGFP R) : CAATCTCGAGTTACAGACAGAAGATGACTGC (配列番号 1 3 6)

[0091] 以下の手順に従い、ウシPD-1膜発現細胞を作製した。まず、 4×10^6 個のCHO-DG44 細胞に2.5 μg のpCMV-Tag1-boPD-1をLipofectamine LTX (Invitrogen 社) を用いて導入した。48 時間後、G418 (Enzo Life Science社) 800 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 、GlutaMAX supplement (Life technologies 社) 20 ml/l、10% Pluronic F-68 (Life technologies 社) 18 ml/l を含むCD DG44 培地 (Life technologies 社) へ培地交換し、セレクションを行った。得られた発現細胞をラット抗ウシPD-1抗体5D2 と室温で反応させ、洗浄後、抗ラットIgGマイクロビーズ標識抗体 (Miltenyi Biotec社) と室温でさらに反応させた。Auto MACS (Miltenyi Biotec社) を用いてウシPD-1を高発現する細胞を分離し、さらに純度を高めるため同様の手順で再分離を行った。作製した発現細胞について限界希釈法によりクローニングを行い、ウシPD-1高発現CHO DG44細胞を得た (ウシPD-1発現細胞)。

[0092] 以下の手順に従い、ウシPD-L1膜発現細胞を作製した。まず、 4×10^6 個のCHO-DG44 細胞に2.5 μg のpEGFP-N2-boPD-L1あるいは陰性対照としてpEGFP-N2をLipofectamine LTX (Invitrogen社) を用いて導入した。48 時間後、G418 (Enzo Life Science社) 800 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 、GlutaMAX supplement (Life technologies 社) 20 ml/l、10% Pluronic F-68 (Life technologies 社) 18 ml/l を含むCD DG44 培地 (Life technologies 社) へ培地交換し、セレクションを行うと同時に限界希釈法によりクローニングを行った (ウシPD-L1発現細胞)。作製した発現細胞におけるウシPD-L1 の発現を確かめるために、倒立型共焦点レーザー顕微鏡LSM700 (ZEISS 社) により、EGFPの細胞内局在を可視化した。

[0093] 可溶性ウシPD-1およびPD-L1の構築

以下の手順に従い、ウシPD-1-Ig発現プラスミドを構築した。ウシPD-1 (GenBank accession number AB510901) のシグナルペプチドおよび細胞外領域を

既知のウシIgG1 (GenBank accession number X62916) の定常領域Fc部分と結合させた遺伝子配列を作成し、CHO細胞にコドンの最適化を行った後、制限酵素 (NotI) 認識配列、Kozak配列、ウシPD-1シグナルペプチド配列、ウシPD-1遺伝子細胞外領域配列、ウシIgG1 Fc領域配列、制限酵素 (XbaI) 認識配列を上記の順で配置するように遺伝子合成を行った。なお、ウシIgG1はADCC活性を抑制するために、CH2ドメインのFc γ 受容体予想結合部位に変異を加えた (変異挿入箇所: 185 E→P, 186 L→V, 187 P→A, 189 G→deletion, 281 A→S, 282 P→S; Ikebuchi R, Konnai S, Okagawa T, Yokoyama K, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K, Immunology 2014 Aug; 142(4):551-561. この論文のFigure 2にPD-1-Igのアミノ酸配列、変異挿入箇所が掲載されている)。合成した遺伝子鎖をNotI (Takara社) およびXbaI (Takara社) によって処理した後、FastGene Gel/PCR Extraction Kit (NIPPON Genetics 社) を用いて精製し、同様の制限酵素処理を行った発現用ベクターpDN11 (北海道大学 人獣共通感染症リサーチセンター 鈴木 定彦 教授より分与) のクローニングサイト (PCMV下流、INRBGとPABGHの間にあるNotIおよびXbaI制限酵素認識配列) へ組み込み、ウシPD-1-Ig発現ベクターを構築した。発現プラスミドはQIAGEN Plasmid Midi kit (Qiagen 社) によって精製し、実験に供するまで-30° Cにて保存した。以降、作製した発現プラスミドをpDN11-boPD-1-Igと表記する。

- [0094] 以下の手順に従い、ウシPD-L1-Ig発現プラスミドを構築した。ウシPD-L1 (GenBank accession number AB510902) のシグナルペプチドおよび細胞外領域を増幅するように、5'末端側に制限酵素NheIおよびEcoRV認識部位を付加したプライマー (boPD-L1-Ig FおよびR) を設計した。合成したウシPBMC由来cDNAを鋳型にPCRを行い、PCR産物をNheI (Takara社) およびEcoRV (Takara社) によって処理した後、FastGene Gel/PCR Extraction Kit (NIPPON Genetics社) を用いて精製し、同様の制限酵素処理を行ったpCXN2.1-Rabbit IgG1 Fc vector (Niwa et al., 1991; Zettlmeissl et al., 1990; 順天堂大学大学院医学研究科教授 横溝 岳彦 教授より分与されたものを改変) に導入

し、クローニングを行った。発現プラスミドはQIAGEN Plasmid Midi kit (Qiagen 社) またはFastGene Xpress Plasmid PLUS Kit (NIPPON Genetics社) によって精製し、実験に供するまで -30°C にて保存した。以降、作製した発現プラスミドをpCXN2.1-boPD-L1-Igと表記する。

プライマー (boPD-L1-Ig F) : GCTAGCATGAGGATATATAGTGTCTTAAC (配列番号 137)

プライマー (boPD-L1-Ig R) : GATATCATTCTCTTTTTTGCTGGAT (配列番号 138)

[0095] 以下の手順に従い、可溶性ウシPD-1-Ig発現細胞を作製した。 4×10^6 個のCHO-DG44 細胞に $2.5 \mu\text{g}$ のpDN11-boPD-1-IgをLipofectamine LTX (Invitrogen 社) を用いて導入した。48 時間後、G418 (Enzo Life Science社) $800 \mu\text{g}/\text{ml}$ 、GlutaMAX supplement (Life technologies 社) $20 \text{ ml}/\text{l}$ を含むOptiCHO AGT培地 (Life technologies 社) へ培地交換し、3週間培養してセレクションを行った。得られた細胞株の培養上清中のFc 融合組換えタンパク質の濃度は抗ウシIgG F(c) ウサギポリクローナル抗体 (Rockland社) を用いたELISA法を用いて測定し、Fc 融合組換えタンパク質を高発現する細胞株の選別を行った。得られた高発現細胞株はG418 を含まない培地に移し、14日間振盪培養を行って培養上清を回収した。Fc 融合組換えタンパク質を含む培養上清は、Centricon Plus-70 (Millipore 社) を用いて限外濾過した後に、Ab-Capcher Extra (ProteNova 社) を用いてFc 融合組換えタンパク質を精製した。精製後、PD-10 Desalting Column (GE Healthcare 社) によりバッファーをリン酸緩衝生理食塩水 (PBS; pH 7.4) に置換し、実験に供するまで -30°C にて保存した (ウシPD-1-Ig)。精製後のウシPD-1-Ig の濃度は抗ウシIgG F(c) ウサギポリクローナル抗体 (Rockland社) を用いたELISA法により測定した。ELISA の各洗浄操作にはAuto Plate Washer BIO WASHER 50 (DS Pharma Biomedical 社) を使用し、吸光度の測定にはMicroplate Reader MTP-650FA (コロナ電気社) を使用した。

[0096] 以下の手順に従い、可溶性ウシPD-L1-Ig発現細胞を作製した。 7.5×10^7 個

のExpi293F 細胞 (Life Technologies 社) に30 μ g のpCXN2.1-boPD-L1-Ig をExpifectamine (Life Technologies社) を用いて導入し、7 日間振盪培養を行って培養上清を回収した。培養上清からAb-Capcher Extra (ProteNova 社; ウシPD-L1-Ig) を用いて組換えタンパク質を精製した。精製後、PD Mini Trap G-25 (GE Healthcare 社) によりバッファーをPBS (pH 7.4) に置換し、実験に供するまで-30° C にて保存した (ウシPD-L1-Ig)。精製後のウシPD-L1-Igの濃度はRabbit IgG ELISA Quantitation Set (Bethyl 社) を用いて測定した。ELISA の各洗浄操作にはAuto Plate Washer BIO WASHER 50 (DS Pharma Biomedical社) を使用し、吸光度の測定にはMicroplate Reader MTP-6 50FA (コロナ電気社) を使用した。

[0097] ラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体産生細胞の作製

ウシPD-L1-Ig (Ikebuchi R, Konnai S, Okagawa T, Yokoyama K, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. Immunology 2014 Aug.; 142(4):551-561. この論文に記載した方法でウシPD-L1-Igを作製し、免疫に使用した) をラットの足蹠に免疫し、腸骨リンパ節法を用いてハイブリドーマを樹立して、ラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体産生ハイブリドーマ 4G12株を得た。ラット抗ウシPD-L1モノクローナル抗体の樹立法については、以下の非特許文献にその詳細が記載されている (Ikebuchi R, Konnai S, Okagawa T, Yokoyama K, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. Vet. Res. 2013 Jul. 22; 44:59; Ikebuchi R, Konnai S, Okagawa T, Yokoyama K, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. Immunology 2014 Aug.; 142(4):551-561)。

[0098] ラットウシキメラ抗ウシPD-L1抗体発現ベクターの作製

ラット抗ウシPD-L1抗体4G12を抗体可変領域としてウシIgG1およびウシIg λ の抗体定常領域を融合させた、ラットウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12を樹立した。

[0099] まず、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12を産生するハイブリドーマより可変領域 (重鎖および軽鎖) の遺伝子をそれぞれ同定した。次に、当該ラット抗体それぞれの重鎖および軽鎖可変領域配列を既知のウシIgG1 (重鎖; GenBank Acc

ession number X62916を改変) およびウシIgλ (軽鎖; GenBank Accession number X62917) の定常領域と結合させた遺伝子配列を作成し、コドン最適化を行った (ラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1 抗体ch4G12: 配列番号105および106 (アミノ酸配列)、配列番号107および108 (コドン最適化後ヌクレオチド配列))。なお、ウシIgG1にはADCC活性を抑制するために、CH2ドメインのFcγ受容体予想結合部位に変異を加えた (図19参照。アミノ酸番号及び変異: 250 E→P, 251 L→V, 252 P→A, 253 G→deletion, 347 A→S, 348 P→S; Ikebuchi R, Konna S, Okagawa T, Yokoyama K, Nakajima C, Suzuki Y, Murata S, Ohashi K. Immunology 2014 Aug; 142(4):551-561.)。そして、NotI制限酵素認識配列、Kozak配列、キメラ抗体軽鎖配列、ポリA付加シグナル配列 (PABGH)、プロモーター配列 (PCMV)、SacI制限酵素認識配列、イントロン配列 (INRBG)、Kozak配列、キメラ抗体重鎖配列、XbaI制限酵素認識配列を上記の順で配置するように遺伝子を人工的に合成した。合成した遺伝子鎖をNotI (Takara社) およびXbaI (Takara社) によって処理した後、FastGene Gel/PCR Extraction Kit (NIPPON Genetics 社) を用いて精製し、同様の制限酵素処理を行った発現プラスミドpDC6 (北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター鈴木定彦教授より分与) のクローニングサイト (PCMV下流、INRBGとPABGHの間にあるNotIおよびXbaI制限酵素認識配列) へ導入し、クローニングを行った (図20)。得られた目的の発現プラスミドはQIAGEN Plasmid Midi kit (Qiagen 社) 用いて抽出し、実験に供するまで-30℃で保存した。以降、作製した発現プラスミドをpDC6-boPD-L1ch4G12と表記する。

[0100] ラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1抗体の発現

pDC6-boPD-L1ch4G12を、ジヒドロ葉酸還元酵素欠損細胞であるCHO-DG44 細胞 (CHO-DG44 (dfhr^{-/-})) へ導入した。48 時間後、GlutaMAX supplement (Life technologies 社) 20 ml/lを含むOptiCHO AGT培地 (Life technologies 社) へ培地交換し、3週間培養して発現細胞のセレクションおよび限界希釈法によるクローニングを行った。次に、抗ウシIgG F(c) ウサギポリクローナル抗

体（Rockland社）を用いたドットプロット法およびELISA法により培養上清に含まれるキメラ抗体の濃度を測定し、高発現クローンを選抜した。さらに、選抜したラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1抗体高発現クローンに対して、60 nM のメトトレキサート（Mtx）を含む培地で負荷をかけることにより遺伝子増幅処理を行った。以上のようにして樹立したラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1抗体安定発現細胞を、Mtx を含まないOpti-CHO AGT 培地へ移し、14 日間の振盪培養を行った（125 rpm, 37℃, 5% CO₂）。抗ウシIgG F(c) ウサギポリクローナル抗体（Rockland社）を用いたELISA法を用いて、培養上清中のキメラ抗体産生量を定量した。ELISA の各洗浄操作にはAuto Plate Washer BIO WASHER 50（DS Pharma Biomedical 社）を使用し、吸光度の測定にはMicroplate Reader MTP-650FA（コロナ電気社）を使用した。14 日目の培養上清を10,000 g で10 分間遠心して細胞を除いた後、遠心上清をSteritop-GP 0.22 μmフィルター（Millipore社）に通して滅菌し、精製に供するまで4° C にて保存した。

[0101] ラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1抗体の精製

上記の方法により準備した培養上清から、Ab Capcher Extra（ProteNova社）を用いて各キメラ抗体を精製した。レジンへの結合はオープンカラム法を用い、平衡化バッファーおよび洗浄バッファーとしてPBS（pH 7.4）を使用した。溶出バッファーにはIgG Elution Buffer（Thermo Fisher Scientific社）を、中和バッファーには1M Tris（pH 9.0）を使用した。精製した抗体は、PD-10 Desalting Column（GE Healthcare 社）およびAmicon Ultra-15（50 kDa、Millipore社）を用いて、PBS（pH 7.4）へのバッファー置換および濃縮を行った。精製したキメラ抗体は、0.22 μm シリンジフィルター（Millipore社）を通して滅菌し、実験に供するまで4° C にて保存した。

[0102] ラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1抗体の精製純度の確認（図21）

精製したラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1抗体の純度を確認するため、SDS-PAGE およびCBB 染色により抗体タンパク質の検出を行った。10% アクリルアミドゲルを用いて、精製したラット-ウシキメラ抗体を還元条件下（2-メル

カプトエタノール (Sigma-Aldrich社) により還元) および非還元条件下にて電気泳動した。Quick-CBB kit (和光純薬工業社) により染色を行った後、蒸留水中で脱色を行った。結果を図 2 1 に示す。還元条件では25kDaおよび50kDa、非還元条件では150kDaの想定される位置にバンドが確認された。

[0103] ラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1抗体の結合特異性 (図 2 2)

ラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1抗体がウシPD-L1発現細胞 (前述) に特異的に結合することをフローサイトメトリー法により確認した。まず、ウシPD-L1発現細胞に対してラット抗ウシPD-L1抗体4G12またはラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1 抗体ch4G12を室温で30分間反応させた。洗浄後、APC標識抗ラットIgY抗体 (SouthernBiotech社) またはAlexa Fluor 647標識抗ウシIgG (H+L) ヤギF(ab')₂ (Jackson ImmunoResearch社) を室温で30分間反応させた。陰性対照抗体として、ラットIgG2a(κ) アイソタイプコントロール (BD Biosciences社) またはウシIgG1抗体 (Bethyl社) を使用した。洗浄後、細胞表面に結合した各ラット抗体またはラット-ウシキメラ抗体をFACS Verse (BD Biosciences社) により検出した。なお、すべての洗浄操作および抗体の希釈には、1% ウシ血清アルブミン (Sigma-Aldrich社) を加えたPBSを使用した。

[0104] 実験結果を図 2 2 に示す。ラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12は、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12と同様にウシPD-L1発現細胞に結合することが示された。

[0105] ラット-ウシキメラ抗PD-L1 抗体のウシPD-1/PD-L1 結合阻害活性

(1) ウシPD-L1発現細胞と可溶性ウシPD-1 の結合阻害試験 (図 2 3)

ウシPD-L1発現細胞 (前述) およびウシPD-1-Ig (前述) を用いて、抗ウシPD-L1 抗体によるウシPD-1/PD-L1 結合阻害試験を行った。まず、 2×10^5 個のウシPD-L1 発現細胞を各濃度 (0, 0.32, 0.63, 1.25, 2.5, 5, 10 μ g/ml) のラット抗ウシPD-L1抗体4G12 またはラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1 抗体ch4G12と室温で30分間反応させた。陰性対照抗体として、ラットIgG2a(κ) アイソタイプコントロール (BD Biosciences社) またはウシIgG1抗体 (Bethyl社) を使用した。洗浄後、Lightning-Link Type A Biotin Labeling Kit (Inno

va Biosciences社)を用いてビオチン標識したウシPD-1-Ig を終濃度2 $\mu\text{g}/\text{ml}$ となるよう添加し、室温でさらに30分間反応させた。さらに洗浄後、APC標識ストレプトアビジン (BioLegend社)により細胞表面に結合したウシPD-1-Ig を検出した。解析にはFACS Verse (BD Biosciences社)を用いた。なお、すべての洗浄操作および抗体の希釈には、1% ウシ血清アルブミン (Sigma-Aldrich社)を加えたPBSを使用した。抗体非添加時のウシPD-1-Ig結合細胞の割合を100%とし、各抗体濃度におけるウシPD-1-Ig結合細胞の割合を相対値として表した。

[0106] 実験結果を図23に示す。ラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12は、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12と同様にウシPD-1/PD-L1の結合を濃度依存的に阻害できることが示された。

[0107] (2) ウシPD-1発現細胞と可溶性ウシPD-L1 の結合阻害試験 (図24)

ウシPD-1発現細胞 (前述) およびウシPD-L1-Ig (前述)を用いて、抗ウシPD-L1 抗体によるウシPD-1/PD-L1 結合阻害試験を行った。まず、96穴プレートに終濃度 (0, 0.32, 0.63, 1.25, 2.5, 5, 10 $\mu\text{g}/\text{ml}$) のラット抗ウシPD-L1抗体4G12 またはラットーウシキメラ抗ウシPD-L1 抗体ch4G12と、終濃度1 $\mu\text{g}/\text{ml}$ のウシPD-L1-Igを添加し、室温で30分間反応させた。この混合液を 2×10^5 個のウシPD-1 発現細胞と室温で30分間反応させた。陰性対照抗体として、ラットIgG2a(κ) アイソタイプコントロール (BD Biosciences社) またはウシIgG1抗体 (Bethyl社)を使用した。洗浄後、Alexa Fluor 647 標識抗ウサギIgG (H+L) ヤギF(ab')₂ (Life Technologies社)を室温で30分間反応させ、細胞表面に結合したウシPD-L1-Ig を検出した。解析にはFACS Verse (BD Biosciences社)を用いた。なお、すべての洗浄操作および抗体の希釈には、1% ウシ血清アルブミン (Sigma-Aldrich社)を加えたPBSを使用した。抗体非添加時のウシPD-L1-Ig結合細胞の割合を100%とし、各抗体濃度におけるウシPD-L1-Ig結合細胞の割合を相対値として表した。

[0108] 実験結果を図24に示す。ラットーウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12は、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12と同様にウシPD-1/PD-L1の結合を濃度依存的に阻

害できることが示された。

[0109] ラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1 抗体を用いた生物活性試験

(1) 細胞増殖への影響 (図 2 5)

ラット-ウシキメラ抗PD-L1 抗体によるウシPD-1/PD-L1 結合阻害がリンパ球を活性化することを確かめるため、細胞増殖を指標として生物活性試験を行った。健常牛の末梢血から分離したウシPBMCを 10×10^6 個/mlとなるようにPBSに懸濁し、Carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) を用いて室温で20分間反応させた。10% 非働化ウシ胎仔血清 (Cell Culture Technologies社)、抗生物質 (ストレプトマイシン200 μ g/ml、ペニシリン200 U/ml) (Life Technologies社)、0.01% L-グルタミン (Life Technologies社) を含むRPMI 1640培地 (Sigma-Aldrich社) で2回洗浄した後、抗ウシCD3マウス抗体 (WSU Monoclonal Antibody Center社) と4℃で30分間反応させた。洗浄後、抗マウスIgG1マイクロビーズ (Miltenyi Biotec社) と4℃で15分間反応させ、autoMACS (登録商標) Pro (Miltenyi Biotec) を用いてCD3陽性T細胞を分離した。分離したCD3陽性T細胞に、抗ウシCD3マウス抗体 (WSU Monoclonal Antibody Center社) および抗ウシCD28マウス抗体 (Bio-Rad社) を添加し、10 μ g/mlのラット-ウシキメラ抗ウシPD-L1 抗体ch4G12存在下または非存在下で、ウシPD-L1発現細胞と共培養した (CD3陽性T細胞 : ウシPD-L1発現細胞 = 10 : 1)。抗体のコントロールには、血清由来ウシIgG (Sigma-Aldrich社) を使用し、PD-L1発現細胞のコントロールには、pEGFP-N2を導入したEGFP発現細胞を用いた。6日後、細胞を回収し、抗ウシCD4マウス抗体および抗ウシCD8マウス抗体 (Bio-Rad社) と室温で30分間反応させた。抗体の標識にはZenon Mouse IgG1 Labeling Kits (Life Technologies社) またはLightning-Link Kit (Innova Biosciences社) を用いた。解析にはFACS Verse (BD Biosciences社) を用いた。培養後の洗浄操作および抗体の希釈には、1% ウシ血清アルブミン (Sigma-Aldrich社) を加えたPBSを使用した。

[0110] 実験結果を図 2 5 に示す。ウシPD-L1発現細胞との共培養により、CD4陽性およびCD8陽性T細胞の増殖が有意に抑制された。ラット-ウシキメラ抗ウシP

D-L1抗体ch4G12は、CD4陽性T細胞において、この抑制を阻害することが示された。

[0111] (2) IFN- γ 産生量への影響 (図26)

ラットウシキメラ抗PD-L1抗体によるウシPD-1/PD-L1結合阻害がリンパ球を活性化することを確認するため、IFN- γ 産生量を指標として生物活性試験を行った。BLV感染牛の末梢血から分離したウシPBMCを 4×10^6 個/mlとなるように10% 非働化ウシ胎仔血清 (Cell Culture Technologies社)、抗生物質 (ストレプトマイシン200 μ g/ml、ペニシリン200U/ml) (Life Technologies社)、0.01% L-グルタミン (Life Technologies社) を含むRPMI 1640培地 (Sigma-Aldrich社) に懸濁した。PBMCに10 μ g/mlのラット抗ウシPD-L1抗体4G12 またはラットウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12、2% BLV感染ヒツジ胎仔腎細胞 (FLK-BLV) 培養上清を添加し、37°C, 5% CO₂条件下で6日間培養した。コントロール抗体には、血清由来ラットIgG (Sigma-Aldrich社) および血清由来ウシIgG (Sigma-Aldrich社) を用いた。6日後、培養上清を回収し、Bovine IFN- γ ELISA Kit (BETYL社) を用いてIFN- γ 産生量を定量した。ELISAの各洗浄操作にはAuto Plate Washer BIO WASHER 50 (DS Pharma Biomedical社) を使用し、吸光度の測定にはMicroplate Reader MTP-650FA (コロナ電気社) を使用した。

[0112] 実験結果を図26に示す。ラットウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12は、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12と同様にBLV抗原に対するウシPBMCのIFN- γ 応答を上昇させることが示された ($n = 10$)。

[0113] ラット抗ウシPD-L1抗体のCDR解析

NCBI IGBLAST (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/igblast/>) を用いて、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12の相補性決定領域 (CDR) を決定した。結果を図19に示す。

[0114] 牛への接種試験

BLV実験感染牛 (ホルスタイン種、雄、7ヶ月齢、体重267 kg) に樹立したラットウシキメラ抗ウシPD-L1抗体ch4G12約260 mg (1 mg/kg) を点滴静注し

た。感染牛から経時的に採血を行い、密度勾配遠心法によりPBMCを分離した。

(1) BLV抗原に対するT細胞の細胞増殖応答 (図 2 7)

ウシPBMCをPBSに懸濁し、CFSEを用いて室温で20分間反応させた。10% 非働化ウシ胎仔血清 (Cell Culture Technologies社)、抗生物質 (ストレプトマイシン200 $\mu\text{g/ml}$ 、ペニシリン200 U/ml) (Life Technologies社)、0.01% L-グルタミン (Life Technologies社) を含むRPMI 1640培地 (Sigma-Aldrich社) で2回洗浄した後、同培地で 4×10^6 個/mlに調整した。PBMCに2% BLV感染ヒツジ胎仔腎細胞 (FLK-BLV) 培養上清を添加し、37°C, 5% CO₂条件下で6日間培養した。コントロールには、2% BLV非感染ヒツジ胎仔腎細胞 (FLK) 培養上清を用いた。6日後、PBMCを回収し、抗ウシCD4マウス抗体、抗ウシCD8マウス抗体および抗ウシIgMマウス抗体 (Bio-Rad社) と4°Cで20分間反応させた。抗体の標識にはZenon Mouse IgG1 Labeling Kits (Life Technologies社) またはLightning-Link Kit (Innova Biosciences社) を用いた。解析にはFACS Verse (BD Biosciences社) を用いた。なお、すべての洗浄操作および抗体の希釈には、1% ウシ血清アルブミン (Sigma-Aldrich社) を加えたPBSを使用した。

[0115] 実験結果を図 2 7 に示す。抗体投与により、CD4陽性T細胞のBLV特異的な細胞増殖応答が投与前に比べ増加した。

[0116] (2) BLVプロウイルス量の変化 (図 2 8)

分離したウシPBMCからWizard DNA Purification kit (Promega社) を用いてDNAを抽出した。抽出したDNAの濃度は、Nanodrop 8000 Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific社) を用いて測定した吸光度 (260 nm) を基準として定量した。PBMC中のBLVプロウイルス量を測定するため、Cycleave PCR Reaction Mix SP (TaKaRa社) およびウシ白血病ウイルス検出用 Probe/Primer/Positive control (TaKaRa社) を用いてリアルタイムPCRを行った。測定にはLightCycler480 System II (Roche Diagnosis社) を用いた。

[0117] 実験結果を図 2 8 に示す。BLVプロウイルス量は、試験期間終了まで投与前

に比べて有意に減少した。

本明細書で引用した全ての刊行物、特許および特許出願をそのまま参考として本明細書にとり入れるものとする。

産業上の利用可能性

[0118] 本発明の抗PD-L1抗体は、動物のがんや感染症の予防及び/又は治療に利用できる。

配列表フリーテキスト

[0119] <配列番号 1>

配列番号 1 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域のアミノ酸配列を示す。

MESQTHVLISLLSVSGTYGDIATQSPSSVAVSVGETVTLSCKSSQSLLYSENQKDYLGWYQQKPGQT
PKPLIYWATNRHTGVPDRFTGSGSGTDFTLIISSVQAEDLADYYCGQYLVPFTFGPGTKLELK

<配列番号 2>

配列番号 2 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域のアミノ酸配列を示す。

MGWSQIILFLVAAATCVHSQVQLQQSGAELVKPGSSVKISCKASGYTFTSNFMHWVKQPGNGLEWIGW
IYPEYGNTKYNQKFDGKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCASEEAVISLVYWGGTLTVSS

<配列番号 3>

配列番号 3 は、イヌ抗体のL鎖定常領域のアミノ酸配列を示す。

QPKASPSVTLFPPSSEELGANKATLVCLISDFYPSGVTVAWKASGSPVTQGVEITTKPSKQSNNKYAASS
YLSLTPDKWKSHSSFCLVTHEGSTVEKKVAPAECS

<配列番号 4>

配列番号 4 は、イヌ抗体のH鎖定常領域のアミノ酸配列を示す。

ASTTAPSVFPLAPSCGSTSGSTVALACLVSGYFPEPVTVSWNSGSLTSGVHTFPSVLQSSGLYLSSTV
TVPSSRWPSETFTCNVHPASNTKVDKVPKESTCKCISPCVPESLGGPSVFIFFPKPKDILRITRTP
EITCVVLDLGGREDPEVQISWFDGKEVHTAKTPREQQFNSTYRVVSVLPIEQDWLTGKEFKCRVNH
GLPSPIERTISKARGQAHQPSVYVLPPSPKELSSSDTVTLTCLIKDFFPPEIDVEWQSNGQPEPESKYH
TTAPQLDEGDFLYSKLSVDKSRWQQGDTFTCAVMHEALQNHYTDLSDLHSPGK

<配列番号 5>

配列番号 5 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域のヌクレオチド配列を示す。

ATGGAATCACAGACGCATGTCCTCATTTCCCTTCTGCTCTCGGTATCTGGTACCTATGGGGACATTGCG
ATAACCCAGTCTCCATCCTCTGTGGCTGTGTCAGTAGGAGAGACGGTCACTCTGAGCTGCAAGTCCAGT
CAGAGTCTTTTATACAGTGAAAACCAAAGGACTATTTGGGCTGGTACCAGCAGAAACCAGGGCAGACT
CCTAAACCCCTTATCTACTGGGCAACCAACCGGCACACTGGGGTCCCTGATCGCTTCACAGGTAGTGGA
TCCGGGACAGACTTCACTCTGATCATCAGCAGTGTGCAGGCTGAAGACCTGGCTGATTATTACTGTGGG
CAGTACCTTGTCTATCCGTTACGTTTGGACCTGGGACCAAGCTGGAAGTAAA

配列番号 5 のヌクレオチド配列のコドン最適化後ヌクレオチド配列を<配列番号 1 5>に示す。

ATGGAATCTCAAACCTCATGTTTTGATTTCACTTCTGAGTGTTTCCGGAACCTACGGTGATATCGCT
ATCACTCAATCTCCCTCCTCTGTTGCTGTGTCTGTGGGCGAAACCGTTACCCTGTCTGCAAGTCCAGT
CAGTCTCTTCTCTACTCCGAGAATCAAAGGACTACCTGGGCTGGTACCAACAGAAGCCCGGCCAGACC
CCAAAGCCACTGATATACTGGGCAACCAACAGGCACACCGGAGTGCCCGACAGGTTACAGGCAGTGGA
TCTGGCACCGACTTTACCTTGATCATTTCAAGCGTGCAGGCTGAAGATCTGGCCGACTACTACTGTGGT
CAGTATCTGGTGTATCCTTTCACTTTCCGGCCAGGGACAAAATTGGAATTGAAG

<配列番号 6>

配列番号 6 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域のヌクレオチド配列を示す。

ATGGGATGGAGCCAGATCATCCTCTTTCTGGTGGCAGCAGCTACATGTGTTCACTCCCAGGTACAGCTG
CAGCAATCTGGGGCTGAATTAGTGAAGCCTGGGTCCTCAGTGAAAATTTCTGCAAGGCTTCTGGCTAC
ACCTTCACCAGTAACTTTATGCACTGGGTAAAGCAGCAGCCTGGAATGGCCTTGAGTGGATTGGGTGG
ATTTATCCTGAATATGGTAATACTAAGTACAATCAAAGTTTCGATGGGAAGGCAACACTCACTGCAGAC
AAATCCTCCAGCACAGCCTATATGCAGCTCAGCAGCCTGACATCTGAGGACTCTGCAGTCTATTTCTGT
GCAAGTGAGGAGGCAGTTATATCCCTTGTTTACTGGGGCCAAGGCACTCTGGTCACTGTCTCTTCA

配列番号 6 のヌクレオチド配列のコドン最適化後ヌクレオチド配列を<配列番号 1 6>に示す。

ATGGGTTGGTCTCAAATTATCTTGTGTTTTGGTTGCTGCAGCCACTTGTGTTTATTCTCAGGTGCAGCTG
CAACAAAGCGGCGCAGAAGTGGTGAAACCTGGCAGCAGCGTGAAAATATCTTGTAAGGCCAGCGGATAT
ACTTTCACCTCCAATTTTCATGCATTGGGTCAAACAGCAGCCCGGCAACGGAAGTGGATCGGCTGG
ATCTACCCCGAGTATGGCAACACAAAATATAACCAAAATTTGATGGAAAGGCTACCCTGACTGCCGAT
AAGTCTCCAGCACCGCATACATGCAACTCTCCTCCCTGACCTCCGAGGATAGCGCTGTCTACTTCTGT
GCTTCCGAAGAGGCTGTCATATCCTTGGTCTATTGGGGCCAAGGAAGTCTGGTGACCGTCTCATCT

<配列番号 7>

配列番号 7 は、イヌ抗体のL鎖定常領域のヌクレオチド配列を示す。

CAGCCCAAGGCCTCCCCCTCGGTCACACTCTTCCCGCCCTCCTCTGAGGAGCTCGGCGCCAACAAGGCC
ACCCTGGTGTGCCTCATCAGCGACTTCTACCCAGCGGCGTGACGGTGGCCTGGAAGGCAAGCGGCAGC
CCCGTCACCCAGGGCGTGGAGACCACCAAGCCCTCCAAGCAGAGCAACAACAAGTACGCGGCCAGCAGC
TACCTGAGCCTGACGCCTGACAAGTGAAATCTCACAGCAGCTTCAGCTGCCTGGTCACGCACGAGGGG
AGCACCGTGGAGAAGAAGGTGGCCCCGCGAGGTGCTCTTAG

配列番号 7 のヌクレオチド配列のコドン最適化後ヌクレオチド配列を<配列
番号 17>に示す。

CAGCCCAAAGCCTCTCCAGCGTCACCCTCTTCCACCTTCCAGTGAGGAGCTGGGGGCAAACAAAGCC
ACTTTGGTGTGTCTCATCTCCGATTTTTACCCCTCCGGGGTCACAGTCGCATGGAAGGCCTCCGGATCC
CCTGTGACACAGGGAGTGGAGACAACAAACCTAGCAAGCAGAGTAACAATAAGTATGCCGCCTCAAGC
TATCTCAGCCTTACTCCTGATAAGTGGAAGTCACATAGCAGTTTTAGTTGCCTCGTAACACATGAGGGT
TCAACTGTGGAGAAAAAAGTAGCTCCAGCTGAGTGCTCATGA

<配列番号 8>

配列番号 8 は、イヌ抗体のH鎖定常領域のヌクレオチド配列を示す。

GCCTCCACCACGGCCCCCTCGGTTTTCCCACTGGCCCCCAGCTGCGGGTCCACTTCCGGCTCCACGGTG
GCCCTGGCCTGCCTGGTGTGAGGCTACTTCCCCGAGCCTGTAAGTGTGCTGGAATTCGGCTCCTTG
ACCAGCGGTGTGCACACCTTCCCGTCCGTCTGCAGTCTCAGGGCTCTACTCCCTCAGCAGCACGGTG
ACAGTGCCTCCAGCAGGTGGCCAGCGAGACCTTCACCTGCAACGTGGTCCACCCGGCCAGCAACACT
AAAGTAGACAAGCCAGTGCCCAAGAGTCCACCTGCAAGTGTATATCCCATGCCAGTCCCTGAATCA
CTGGGAGGGCCTTCGGTCTTCATCTTTCCCCGAAACCAAGGACATCCTCAGGATTACCCGAACACCC

GAGATCACCTGTGTGGTGTAGATCTGGGCCGTGAGGACCCTGAGGTGCAGATCAGCTGGTTCGTGGAT
GGTAAGGAGGTGCACACAGCCAAGACGCAGCCTCGTGAGCAGCAGTTCAACAGCACCTACCGTGTGGTC
AGCGTCCTCCCCATTGAGCACCAGGACTGGCTCACCGGAAAGGAGTTCAAGTGCAGAGTCAACCACATA
GGCCTCCCGTCCCCATCGAGAGGACTATCTCAAAGCCAGAGGGCAAGCCATCAGCCAGTGTGTAT
GTCCTGCCACCATCCCCAAAGGAGTTGTCATCCAGTGACACGGTCACCCTGACCTGCCTGATCAAAGAC
TTCTTCCACCTGAGATTGATGTGGAGTGGCAGAGCAATGGACAGCCGGAGCCGAGAGCAAGTACCAC
ACGACTGCGCCCCAGCTGGACGAGGACGGGTCTACTTCTGTACAGCAAGCTCTCTGTGGACAAGAGC
CGCTGGCAGCAGGGAGACACCTTCACATGTGCGGTGATGCATGAAGCTCTACAGAACCACTACACAGAT
CTATCCCTCTCCATTCTCCGGGTAAATGA

配列番号 8 のヌクレオチド配列のコドン最適化後ヌクレオチド配列を<配列
番号 18>に示す。

GCTAGCACAAACGCTCCCTCCGTTTTTCCCTCGCCCCATCCTGCGGGTCAACCAGCGGATCCACCGTC
GCTCTGGCTTGTCTGGTGTGAGGATACTTCCCCGAGCCTGTCACCGTTTCTTGGAATAGCGGCAGCCTT
ACTTCCGGCGTGCATACCTTCCCTAGCGTGCTTCAGTCCTCCGGTCTGTATTCCCTCAGCTCCACCGTA
ACTGTCCCAAGCTCAAGGTGGCCCTCTGAGACATTTACCTGCAATGTGGTCCATCTGCTTCAAATACC
AAAGTGGACAAGCCCGTCCCAAAAGAGTCTACCTGCAAATGTATCAGTCCTTGCCGTGCCGAGTCT
CTGGGCGGACCCTCAGTCTTTATCTTCCACCCAAGCCAAAGGACATATTGCGCATTACACGGACACCC
GAAATCACCTGTGTTGTGTTGGATCTCGGCCGGAAGATCCTGAGGTGCAGATTAGTTGTTTGTGAT
GGCAAGGAGGTGCACACAGCAAAAACACAGCCAGAGAACAGCAGTTCAACAGTACTTATAGAGTAGTG
AGTGTGTTGCCTATAGAGCATCAGGACTGGCTGACAGGCAAAGAATTCAAATGTAGGGTTAACCACATT
GGCCTCCCTAGTCCAATCGAGAGGACAATCTCTAAAGCCCGAGGCCAGGCTCATCAGCCTTCTGTGTAC
GTTCTGCCTCCTAGTCCTAAGGAAGTGTCTTCTTACAGACACAGTAACACTCACTTGCCTGATTAAGGAC
TTTTTCTCCAGAGATTGATGTGGAATGGCAGTCTAACGGGCAGCCAGAGCCAGAATCTAAGTACCAC
ACTACTGCACCACAGCTGGATGAGGATGGGTCTTACTTCTGTACAGTAAGCTGAGTGTGGACAAGTCT
CGATGGCAGCAGGGGATACTTTTACTTGCGCAGTAATGCACGAAGCATTGCAGAACCACTACACTGAC
CTGTCACTTAGTCACTCACCAGGGAAGTAA

<配列番号 9>

配列番号 9 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域とイヌ抗体のL鎖定常領

域とからなるキメラ鎖のアミノ酸配列を示す。

MESQTHVLISLLLSVSGTYGDIAITQSPSSVAVSVGETVTLSCKSSQSLLYSENQKDYLGWYQQKPGQT
PKPLIYWATNRHTGVPDRFTGSGSGTDFTLIISSVQAEDLADYYCGQYLVPFTFGPGTKLELKQPKAS
PSVTLFPPSSEELGANKATLVCLISDFYPSGVTVAWKASGSPVTQGVETTKPSKQSNNKYAASSYLSLT
PDKWKSHSSFCLVTHEGSTVEKKVAPAECS

<配列番号 10>

配列番号 10 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域とイヌ抗体のH鎖定常領域とからなるキメラH鎖のアミノ酸配列を示す。

MGWSQIILFLVAAATCVHSQVQLQQSGAELVKPGSSVKISCKASGYTFTSNFMHWVKQPGNGLEWIGW
IYPEYGNTKYNQKFDGKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCASEEAVISLVYWGGTLVTVSSA
STTAPSVFPLAPSCGSTSGSTVALACLVSIFYPEPVTVSWNSGSLTSGVHTFPSVLQSSGLYLSSTVT
VPSSRPSETFTCNVHPASNTKVDKVPKESTCKCISPCVPESLGGPSVFIFFPKPKDILRITRTP
ITCVVLDLGREDPEVQISWFDGKEVHTAKTPREQQFNSTYRVVSVLPIEHQDWLTGKEFKCRVNHIG
LPSPERTISKARGQAHQPSVYVLPSPKELSSSDTVTLTCLIKDFFPEIDVEWQSNQPEPESKYHT
TAPQLDEDGSYFLYSKLSVDKSRWQQGDTFTCAVMHEALQNHYTDLSLSHSPGK

<配列番号 19>

ラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域とイヌ抗体のL鎖定常領域とからなるキメラL鎖のヌクレオチド配列（コドン最適化後ヌクレオチド配列）を示す。

ATGGAATCTCAAACCTCATGTTTTGATTTTCATTACTTCTGAGTGTTTCCGGAACCTACGGTGATATCGCT
ATCACTCAATCTCCCTCCTCTGTTGCTGTGTCTGTGGCGAAACCGTTACCCTGTCCTGCAAGTCCAGT
CAGTCTCTTCTCTACTCCGAGAATCAAAGGACTACCTGGGCTGGTACCAACAGAAGCCCGGCCAGACC
CCAAAGCCACTGATATACTGGGCAACCAACAGGCACACCGGAGTGCCCGACAGGTTACAGGCAGTGGA
TCTGGCACCAGCTTTACCTTGATCATTTCAAGCGTGACAGGCTGAAGATCTGGCCGACTACTACTGTGGT
CAGTATCTGGTGTATCCTTTCACTTTTCGGGCCAGGGACAAAATTGGAATTGAAGCAGCCCAAAGCCTCT
CCCAGCGTCACCCTCTTCCACCTTCCAGTGAGGAGCTGGGGCAAACAAAGCCACTTTGGTGTGTCTC
ATCTCCGATTTTTACCCCTCCGGGTCACAGTCGCATGGAAGGCCTCCGGATCCCCTGTGACACAGGGA
GTGGAGACAACAAAACCTAGCAAGCAGAGTAACAATAAGTATGCCGCCTCAAGCTATCTCAGCCTTACT
CCTGATAAGTGGAAGTCACATAGCAGTTTTAGTTGCCTCGTAACACATGAGGGTTCAACTGTGGAGAAA

AAAGTAGCTCCAGCTGAGTGCTCATGA

<配列番号 20>

配列番号 20 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域とイヌ抗体のH鎖定常領域とからなるキメラH鎖のヌクレオチド配列（コドン最適化後ヌクレオチド配列）を示す。

ATGGGTTGGTCTCAAATTATCTTGTGTTTTGGTTGCTGCAGCCACTTGTGTTTCATTCTCAGGTGCAGCTG
CAACAAAGCGGCGCAGAACTGGTGAAACCTGGCAGCAGCGTGAAAATATCTTGTAAGGCCAGCGGATAT
ACTTTCACCTCCAATTTTCATGCATTGGGTCAAACAGCAGCCCGGCAACGGACTCGAGTGGATCGGCTGG
ATCTACCCCGAGTATGGCAACACAAAATATAACCAAAATTTGATGGAAAGGCTACCCTGACTGCCGAT
AAGTCCTCCAGCACCGCATACATGCAACTCTCCTCCCTGACCTCCGAGGATAGCGCTGTCTACTTCTGT
GCTTCCGAAGAGGCTGTCATATCCTTGGTCTATTGGGGCCAAGGAACTCTGGTGACCGTCTCATCTGCT
AGCACAACCGCTCCCTCCGTTTTTCCCTCGCCCCATCCTGCGGGTCAACCAGCGGATCCACCGTCGCT
CTGGCTTGTCTGGTGTGAGGATACTTCCCCGAGCCTGTACCGTTTTCTTGAATAGCGGCAGCCTTACT
TCCGGCGTGCATACCTTCCCTAGCGTGCTTCAGTCCTCCGGTCTGTATTCCCTCAGCTCCACCGTAACT
GTCCCAAGCTCAAGGTGGCCCTCTGAGACATTTACCTGCAATGTGGTCCATCCTGCTTCAAATACCAAA
GTGGACAAGCCCGTCCCAAAAGAGTCTACCTGCAAATGTATCAGTCCTTGTCCCGTGCCCGAGTCTCTG
GGCGGACCCTCAGTCTTTATCTTCCACCCAAGCCAAAGGACATATTGCGCATTACACGGACACCCGAA
ATCACCTGTGTTGTGTTGGATCTCGGCCGGAAGATCCTGAGGTGCAGATTAGTTGGTTTGTGATGGC
AAGGAGGTGCACACAGCAAAAACAGCCCAGAGAACAGCAGTTCAACAGTACTTATAGAGTAGTGAGT
GTGTTGCCTATAGAGCATCAGGACTGGCTGACAGGCAAAGAATTCAAATGTAGGGTTAACCACATTGGC
CTCCCTAGTCCAATCGAGAGGACAATCTCTAAAGCCCGAGGCCAGGCTCATCAGCCTTCTGTGTACGTT
CTGCCTCCTAGTCCTAAGGAACTGTCTTCTTCAGACACAGTAACACTCACTTGCCTGATTAAGGACTTT
TTTCTCCAGAGATTGATGTGGAATGGCAGTCTAACGGGCAGCCAGAGCCAGAATCTAAGTACCACACT
ACTGCACCACAGCTGGATGAGGATGGGTCTTACTTCTGTACAGTAAGCTGAGTGTGGACAAGTCTCGA
TGGCAGCAGGGGATACTTTTACTTGGCAGTAATGCACGAAGCATTGCAGAACCACTACACTGACCTG
TCACTTAGTCACTCACCAGGGAAGTAA

<配列番号 11>

配列番号 11 は、ヒト抗体のL鎖定常領域のアミノ酸配列を示す。

TVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKSTYLSLSS
TLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC

<配列番号 1 2>

配列番号 1 2 は、ヒト抗体(IgG4 variant 1)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

STKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVT
VPSSSLGKTKYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEV
TCVVVDVSDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGL
PSSIEKTIKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPV
LDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLGLGK

<配列番号 1 3>

配列番号 1 3 は、ヒト抗体のL鎖定常領域のヌクレオチド配列を示す。

ACTGTGGCTGCACCATCTGTCTTCATCTTCCCGCCATCTGATGAGCAGTTGAAATCTGGAAGTGCCTCT
GTTGTGTGCCTGCTGAATAACTTCTATCCCAGAGAGGCCAAAGTACAGTGGAAGGTGGATAACGCCCTC
CAATCGGGTAACCTCCAGGAGAGTGTACAGAGCAGGACAGCAAGGACAGCACCTACAGCCTCAGCAGC
ACCCTGACGCTGAGCAAAGCAGACTACGAGAAACACAAAGTCTACGCCTGCGAAGTCACCCATCAGGGC
CTGAGCTCGCCCGTCACAAAGAGCTTCAACAGGGGAGAGTGTTAG

<配列番号 1 4>

配列番号 1 4 は、ヒト抗体(IgG4 variant 1)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

TCCACCAAGGGCCCATCCGTCTTCCCCCTGGCGCCCTGCTCCAGGAGCACCTCCGAGAGCACAGCCGCC
CTGGGCTGCCTGGTCAAGGACTACTTCCCCGAACCGGTGACGGTGTGCTGGAAGTCAAGGCGCCCTGACC
AGCGGCGTGCACACCTTCCCGGCTGTCCTACAGTCTCAGGACTCTACTCCCTCAGCAGCGTGGTGACC
GTGCCCTCCAGCAGCTTGGGCACGAAGACCTACACCTGCAACGTAGATCACAAGCCCAGCAACACCAAG
GTGGACAAGAGAGTTGAGTCCAAATATGGTCCCCCATGCCATCATGCCAGCACCTGAGTTCCTGGGG
GGACCATCAGTCTTCTGTTCCCCCAAACCAAGGACACTCTCATGATCTCCCGGACCCCTGAGGTC
ACGTGCGTGGTGGTGGACGTGAGCCAGGAAGACCCGAGGTCCAGTTCAACTGGTACGTGGATGGCGTG
GAGGTGCATAATGCCAAGACAAAGCCGCGGGAGGAGCAGTTCAACAGCACGTACCGTGTGGTCAGCGTC

CTCACCGTCCTGCACCAGGACTGGCTGAACGGCAAGGAGTACAAGTGCAAGGTCTCCAACAAAGGCCTG
CCGTCTCCATCGAGAAAACCATCTCCAAAGCCAAAGGGCAGCCCCGAGAGCCACAGGTGTACACCCTG
CCCCCATCCCAGGAGGAGATGACCAAGAACCAGGTCAGCCTGACCTGCCTGGTCAAAGGCTTCTACCCC
AGCGACATCGCCGTGGAGTGGGAGAGCAATGGGCAGCCGGAGAACAACCTACAAGACCACGCCTCCCGTG
CTGGACTCCGACGGCTCCTTCTTCTCTACAGCAGGCTAACCGTGGACAAGAGCAGGTGGCAGGAGGGG
AATGTCTTCTCATGCTCCGTGATGCATGAGGCTCTGCACAACCACTACACACAGAAGAGCCTCTCCCTG
TCTCTGGGTAAATGA

<配列番号 21～36>

配列番号 21～36 は、順に、プライマー cPD-1 inner F、cPD-1 inner R、cPD-L1 inner F、cPD-L1 inner R、cPD-1 5' GSP、cPD-1 3' GSP、cPD-L1 5' GSP、cPD-L1 3' GSP、cPD-1-EGFP F、cPD-1-EGFP R、cPD-L1-EGFP F、cPD-L1-EGFP R、cPD-1-Ig、cPD-1-Ig R、cPD-L1-Ig F 及び cPD-L1-Ig R のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 37>

配列番号 37 は、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12のL鎖可変領域のCDR1のアミノ酸配列 (QSLLYSENQKDY) を示す。

<配列番号 38>

配列番号 38 は、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12のL鎖可変領域のCDR3のアミノ酸配列 (GQYLVYPFT) を示す。

<配列番号 39>

配列番号 39 は、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12のH鎖可変領域のCDR1のアミノ酸配列 (GYTFTSNF) を示す。

<配列番号 40>

配列番号 40 は、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12のH鎖可変領域のCDR2のアミノ酸配列 (IYPEYGNT) を示す。

<配列番号 41>

配列番号 41 は、ラット抗ウシPD-L1抗体4G12のH鎖可変領域のCDR3のアミノ酸配列 (ASEEAVISLVY) を示す。

＜配列番号 4 2＞

配列番号 4 2 は、ヒツジ抗体(IgG1)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

＜配列番号 4 3＞

配列番号 4 3 は、ヒツジ抗体(IgG1)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

＜配列番号 4 4＞

配列番号 4 4 は、ヒツジ抗体(IgG2)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

＜配列番号 4 5＞

配列番号 4 5 は、ヒツジ抗体(IgG2)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

＜配列番号 4 6＞

配列番号 4 6 は、ヒツジ抗体のL鎖 (Ig kappa(CK)) 定常領域のアミノ酸配列を示す。

＜配列番号 4 7＞

配列番号 4 7 は、ヒツジ抗体のL鎖 (Ig kappa(CK)) 定常領域のヌクレオチド配列を示す。

＜配列番号 4 8＞

配列番号 4 8 は、ヒツジ抗体のL鎖 (Ig lambda(CL)) 定常領域のアミノ酸配列を示す。

＜配列番号 4 9＞

配列番号 4 9 は、ヒツジ抗体のL鎖 (Ig lambda(CL)) 定常領域のヌクレオチド配列を示す。

＜配列番号 5 0＞

配列番号 5 0 は、ブタ抗体(IgG1^a)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

＜配列番号 5 1＞

配列番号 5 1 は、ブタ抗体(IgG1^a)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 5 2>

配列番号 5 2 は、ブタ抗体(IgG1^b)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 5 3>

配列番号 5 3 は、ブタ抗体(IgG1^b)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 5 4>

配列番号 5 4 は、ブタ抗体(IgG2^a)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 5 5>

配列番号 5 5 は、ブタ抗体(IgG2^a)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 5 6>

配列番号 5 6 は、ブタ抗体(IgG2^b)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 5 7>

配列番号 5 7 は、ブタ抗体(IgG2^b)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 5 8>

配列番号 5 8 は、ブタ抗体(IgG3)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 5 9>

配列番号 5 9 は、ブタ抗体(IgG3)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 6 0>

配列番号 6 0 は、ブタ抗体(IgG4^a)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を

示す。

<配列番号 6 1>

配列番号 6 1 は、ブタ抗体(IgG4^a)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 6 2>

配列番号 6 2 は、ブタ抗体(IgG4^b)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 6 3>

配列番号 6 3 は、ブタ抗体(IgG4^b)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 6 4>

配列番号 6 4 は、ブタ抗体(IgG5^a)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 6 5>

配列番号 6 5 は、ブタ抗体(IgG5^a)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 6 6>

配列番号 6 6 は、ブタ抗体(IgG5^b)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 6 7>

配列番号 6 7 は、ブタ抗体(IgG5^b)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 6 8>

配列番号 6 8 は、ブタ抗体(IgG6^a)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 6 9>

配列番号 6 9 は、ブタ抗体(IgG6^a)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

＜配列番号 7 0＞

配列番号 7 0 は、ブタ抗体(IgG6^b)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

＜配列番号 7 1＞

配列番号 7 1 は、ブタ抗体(IgG6^b)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

＜配列番号 7 2＞

配列番号 7 2 は、スイギュウ抗体(IgG1と推定される)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

＜配列番号 7 3＞

配列番号 7 3 は、スイギュウ抗体(IgG1と推定される)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

＜配列番号 7 4＞

配列番号 7 4 は、スイギュウ抗体(IgG2と推定される)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

＜配列番号 7 5＞

配列番号 7 5 は、スイギュウ抗体(IgG2と推定される)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

＜配列番号 7 6＞

配列番号 7 6 は、スイギュウ抗体(IgG3と推定される)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

＜配列番号 7 7＞

配列番号 7 7 は、スイギュウ抗体(IgG3と推定される)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

＜配列番号 7 8＞

配列番号 7 8 は、スイギュウ抗体のL鎖 (Ig lambdaと推定される) 定常領域(CL)のアミノ酸配列を示す。

＜配列番号 7 9＞

配列番号 79 は、スイギュウ抗体のL鎖 (Ig lambdaと推定される) 定常領域 (CL) のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 80>

配列番号 80 は、ヒト抗体 (IgG4 variant 2) のH鎖定常領域 (CH1~CH3) のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 81>

配列番号 81 は、ヒト抗体 (IgG4 variant 2) のH鎖定常領域 (CH1~CH3) のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 82>

配列番号 82 は、ヒト抗体 (IgG4 variant 3) のH鎖定常領域 (CH1~CH3) のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 83>

配列番号 83 は、ヒト抗体 (IgG4 variant 3) のH鎖定常領域 (CH1~CH3) のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 84>

配列番号 84 は、ウシ抗体 (IgG1 variant 1) のH鎖定常領域 (CH1~CH3) のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 85>

配列番号 85 は、ウシ抗体 (IgG1 variant 2) のH鎖定常領域 (CH1~CH3) のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 86>

配列番号 86 は、ウシ抗体 (IgG1 variant 3) のH鎖定常領域 (CH1~CH3) のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 87>

配列番号 87 は、ウシ抗体 (IgG2 variant 1) のH鎖定常領域 (CH1~CH3) のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 88>

配列番号 88 は、ウシ抗体 (IgG2 variant 2) のH鎖定常領域 (CH1~CH3) のアミ

ノ酸配列を示す。

<配列番号 89>

配列番号 89 は、ウシ抗体(IgG2 variant 3)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 90>

配列番号 90 は、ウシ抗体(IgG3 variant 1)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 91>

配列番号 91 は、ウシ抗体(IgG3 variant 2)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のアミノ酸配列を示す。

<配列番号 92>

配列番号 92 は、ウシ抗体(IgG1 variant 1)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 93>

配列番号 93 は、ウシ抗体(IgG1 variant 2)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 94>

配列番号 94 は、ウシ抗体(IgG1 variant 3)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 95>

配列番号 95 は、ウシ抗体(IgG2 variant 1)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 96>

配列番号 96 は、ウシ抗体(IgG2 variant 2)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 97>

配列番号 97 は、ウシ抗体(IgG2 variant 3)のH鎖定常領域(CH1～CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 98>

配列番号 98 は、ウシ抗体(IgG3 variant 1)のH鎖定常領域(CH1~CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 99>

配列番号 99 は、ウシ抗体(IgG3 variant 2)のH鎖定常領域(CH1~CH3)のヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 100>

配列番号 100 は、ウシ抗体のL鎖定常領域（ウシIg lambda, GenBank: X62917）のアミノ酸配列を示す。

QPKSPPSVTLFPPSTEELNGNKATLVCLISDFYPGSVTVVWKADGSTITRNVETTRASKQSNKYAASS
YLSLTSSDWKSKGSYSCEVTHEGSTVTKTVKPSECS

<配列番号 101>

配列番号 101 は、ウシ抗体のL鎖定常領域（ウシIg lambda, GenBank: X62917）のヌクレオチド配列を示す。

CAGCCCCAAGTCCCCACCCTCGGTCACCCTGTTCCCGCCCTCCACGGAGGAGCTCAACGGCAACAAGGCC
ACCCTGGTGTGTCTCATCAGCGACTTCTACCCGGGTAGCGTGACCGTGGTCTGGAAGGCAGACGGCAGC
ACCATCACCCGCAACGTGGAGACCACCCGGGCTCCAAACAGAGCAACAGCAAGTACGCGGCCAGCAGC
TACCTGAGCCTGACGAGCAGCGACTGGAATCGAAAGGCAGTTACAGCTGCGAGGTCACGCACGAGGGG
AGCACCGTGACGAAGACAGTGAAGCCCTCAGAGTGTTCTTAG

配列番号 101 のヌクレオチド配列のコドン最適化後ヌクレオチド配列を<配列番号 104>に示す。

CAGCCTAAGAGTCCTCCTTCTGTAACACTCTTTCCCCCTCTACCGAGGAAGTCAACGGCAATAAAGCT
ACCTTGGTTTGCCTTATTTCTGATTTCTACCCGGGTCTGTGACCGTGGTGTGGAAGCTGATGGGTCC
ACCATTAAGTGGAAATGTGGAACACCCGGGCTTCTAAGCAGTCCAACTCTAAATACGCAGCATCCTCC
TATTTGAGTCTTACTAGTAGTGACTGGAAGTCAAAGGGTAGTTACAGTTGCGAAGTCACACATGAAGGT
TCAACAGTGACAAAGACAGTCAAGCCCTCAGAGTGCTCATAG

<配列番号 102>

配列番号 102 は、ウシ抗体のH鎖定常領域（ウシIgG1, GenBank: X62916を

改変)のアミノ酸配列を示す。変異箇所の下線を引いた。アミノ酸番号および変異: 113E→P, 114L→V, 115P→A, 116G→deletion, 209A→S, 210P→S
ASTTAPKVYPLSSCCGDKSSSTVTLGCLVSSYMPEPVTVTWNSGALKSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSMV
TVPGSTSGQTFTCNVAHPASSTKVDKAVDPTCKPSPCDCCPPPVAGPSVFIFFPKPKDTLTISGTPEV
TCVVVDVGHDDPEVKFSWFVDDVEVNTATTKPREEQFNSTYRVVSALRIQHWDWTGGKEFKCKVHNEGL
PSSIVRTISRTKGPAREPQVYVLAPPQEELSKSTVSLTCMVTSFYDPDYIAVEWQRNGQPESEDKYGTTP
PQLDADSSYFLYSKLRVDRNSWQEGDTYTCVVMHEALHNHYTQKSTSKSAGK

<配列番号 103>

配列番号 103 は、ウシ抗体のH鎖定常領域 (ウシIgG1, GenBank: X62916を改変) のヌクレオチド配列 (コドン最適化後) を示す。

GCTAGCACAACTGCTCCTAAGGTGTACCCCTGAGCTCTTGCTGCGGCGACAAGTCTAGCAGCACCGTG
ACCCTCGGATGCCTCGTCAGCAGCTATATGCCTGAGCCAGTTACAGTGACATGGAATTCTGGTGCCCTT
AAGTCCGGCGTCCATACCTTCCTGCTGTGCTGCAGTCCTCTGGCCTGTACAGTTTGTCTCTATGGTG
ACAGTACCCGGTTCACCTCCGGACAGACCTTTACCTGTAATGTGGCTCATCCCGCCTCTCCACAAAG
GTGGATAAGGCTGTTGACCCTACCTGTAAACCCAGTCCATGCGACTGCTGTCCCCCCCCTCCAGTTGCC
GGACCCTCAGTCTTTATTTTCCACCCAAACCCAAAGACACCCTGACAATCTCTGGAACACCAGAAGTC
ACCTGCGTCGTCGTGGATGTGGGCCACGACGATCCTGAGGTAAAATTCTCATGGTTCGTGACGATGTG
GAAGTGAATACAGCTACTACAAAACCTCGCGAAGAGCAGTTTAACTCTACCTATCGAGTGGTTTCTGCT
TTGCGGATTGAGCATCAGGATTGGACAGGCGGCAAAGAGTTTAAATGTAAAGTCCATAACGAGGGACTT
CCTTCTAGTATCGTGCGCACTATCAGTAGAACTAAAGGCCTGCTCGGGAACCTCAGGTGTACGTCCTG
GCACCTCCACAGGAAGAGCTGAGTAAGTCTACAGTTTCTCTGACTTGTATGGTAACATCTTTTTATCCA
GATTACATCGCAGTTGAATGGCAGAGGAACGGGCAGCCAGAGAGTGAGGATAAGTACGGGACTACTCCA
CCACAGCTGGACGCAGACTCAAGTTACTTCTGTACTCAAAGCTGAGGGTTGACAGAACTCATGGCAG
GAGGGGGACACTTACACTTGCGTAGTTATGCACGAGGCACTTCACAACCACTACACTCAGAAGAGTACT
TCAAAGAGTGCAGGGAAGTAA

<配列番号 105>

配列番号 105 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域とウシ抗体のL鎖定常領域とからなるキメラL鎖のアミノ酸配列を示す。

MESQTHVLISLLSVSGTYGDIAITQSPSSVAVSVGETVTLSCKSSQSLLYSENQKDYLGWYQQKPGQT
PKPLIYWATNRHTGVPDRFTGSGSGTDFTLIISVQAEDLADYYCGQYLVPFTFGPGTKLELKQPKSP
PSVTLFPPSTEELNGNKATLVCLISDFYPGSVTVVWKADGSTITRNVETTRASKQSNSKYAASSYLSLT
SSDWKSKGSYSCEVTHEGSTVTKTVKPSECS

<配列番号 106>

配列番号 106 は、ラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域とウシ抗体のH鎖定常領域（ウシIgG1, GenBank: X62916を改変）とからなるキメラH鎖のアミノ酸配列を示す。

MGWSQIILFLVAAATCVHSQVQLQQSGAELVKPGSSVKISCKASGYTFTSNFMHWVKQQPGNGLEWIGW
IYPEYGNTKYNQKFDGKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCASEEAVISLVYWGGTLVTVSSA
STTAPKVYPLSSCGDKSSSTVTLGCLVSSYMPEPVTVTWNSGALKSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSMVT
VPGSTSGQTFTCNVAHPASSTKVDKAVDPTCKPSPCDCCPPPVAGPSVFIFFPKPKDTLTISGTPEVT
CVVVDVGHDDPEVKFSWFVDDVEVNTATTKPREEQFNSTYRVVSALRIQHQDWTGGKEFKCKVHNEGLP
SSIVRTISRTKGPAREPQVYVLAPPQEELSKSTVSLTCMVTSFYPDYIAVEWQRNGQPESEDKYGTTPP
QLDADSSYFLYSKLRVDRNSWQEGDTYTCVVMHEALHNHYTQKSTSKSAGK

<配列番号 107>

ラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域とウシ抗体のL鎖定常領域とからなるキメラL鎖のヌクレオチド配列（コドン最適化後ヌクレオチド配列）を示す。

ATGGAATCTCAAACCTCATGTTTTGATTTCACTTCTGAGTGTTTCCGGAACCTACGGTGATATCGCT
ATCACTCAATCTCCCTCCTCTGTTGCTGTGTCTGTGGGCGAAACCGTTACCTGTCTGCAAGTCCAGT
CAGTCTCTTCTCTACTCCGAGAATCAAAGGACTACCTGGGCTGGTACCAACAGAAGCCCGGCCAGACC
CCAAAGCCACTGATATACTGGGCAACCAACAGGCACACCGGAGTGCCCGACAGGTTACAGGCAGTGGA
TCTGGCACCAGCTTTACCTTGATCATTTCAAGCGTGCAGGCTGAAGATCTGGCCGACTACTACTGTGGT
CAGTATCTGGTGTATCCTTTCACTTTTCGGGCCAGGGACAAAACCTCGAGCTCAAACAGCCTAAGAGTCCT
CCTTCTGTAACACTCTTTCCCCCTCTACCGAGGAACTCAACGGCAATAAAGCTACCTTGGTTTGCCTT
ATTTCTGATTTCTACCCGGGTCTGTGACCGTGGTGTGAAAGCTGATGGGTCCACCATTACTCGGAAT
GTGGAACACCCGGGCTTCTAAGCAGTCCAACCTCTAAATACGCAGCATCCTCCTATTTGAGTCTTACT
AGTAGTGACTGGAAGTCAAAGGGTAGTTACAGTTGCGAAGTCACACATGAAGGTTCAACAGTGACAAAG

ACAGTCAAGCCCTCAGAGTGCTCATAG

<配列番号 108>

ラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域とウシ抗体のH鎖定常領域（ウシIgG1, GenBank: X62916を改変）とからなるキメラH鎖のヌクレオチド配列（コドン最適化後ヌクレオチド配列）を示す。

ATGGGGTGGTCCCAGATTATATTGTTCTCGTCGCCGCCCACTTGCGTACACAGCCAAGTGCAACTT
CAACAAAGCGGTGCAGAACTGGTAAAGCCCGGTAGCTCTGTGAAAATATCCTGTAAAGCCAGTGGCTAC
ACATTTACCAGCAACTTTATGCACTGGGTGAAGCAACAGCCCGGAAATGGCTTGGAGTGGATTGGCTGG
ATCTATCCCGAATATGGTAACACCAAGTATAATCAGAAGTTCGACGGTAAGGCCACCCTCACCGCCGAT
AAGTCATCCTCCACCGCCTATATGCAGCTCAGCAGCCTGACCAGCGAGGATTCCGCTGTGTACTTCTGT
GCCAGCGAAGAGGCTGTGATCTCATTGGTGTATTGGGGACAGGGCACCCCTCGTCACCGTGTCCAGCGCT
AGCACAACTGCTCCTAAGGTGTACCCCTGAGCTCTTGCTGCGGCGACAAGTCTAGCAGCACCCTGACC
CTCGGATGCCTCGTCAGCAGCTATATGCCTGAGCCAGTTACAGTGACATGGAATTCTGGTGCCCTTAAG
TCCGGCGTCCATACCTTCCCTGCTGTGCTGCAGTCCTCTGGCCTGTACAGTTTGCCTCTATGGTGACA
GTACCCGGTTCCACCTCCGGACAGACCTTTACCTGTAATGTGGCTCATCCCGCCTCCTCCACAAAGGTG
GATAAGGCTGTTGACCCTACCTGTAAACCCAGTCCATGCGACTGCTGTCCCCCCCCTCCAGTTGCCGGA
CCCTCAGTCTTTATTTTCCACCCAAACCCAAAGACACCCTGACAATCTCTGGAACACCAGAAGTCACC
TGCGTCGTCGTGGATGTGGGCCACGACGATCCTGAGGTAAAATTCTCATGGTTCGTCGACGATGTGGAA
GTGAATACAGCTACTACAAACCTCGCGAAGAGCAGTTTAACTCTACCTATCGAGTGGTTTCTGCTTTG
CGGATTCAGCATCAGGATTGGACAGGCGGCAAAGAGTTTAAATGTAAAGTCCATAACGAGGGACTTCCT
TCTAGTATCGTGCGCACTATCAGTAGAACTAAAGGGCCTGCTCGGGAACCTCAGGTGTACGTCCTGGCA
CCTCCACAGGAAGAGCTGAGTAAGTCTACAGTTTCTCTGACTTGTATGGTAACATCTTTTTATCCAGAT
TACATCGCAGTTGAATGGCAGAGGAACGGGCAGCCAGAGAGTGAGGATAAGTACGGGACTACTCCACCA
CAGCTGGACGCAGACTCAAGTTACTTCCTGTAAGCTGAGGGTTGACAGAACTCATGGCAGGAG
GGGGACACTTACACTTGCCTAGTTATGCACGAGGCACTTCACAACCACTACACTCAGAAGAGTACTTCA
AAGAGTGCAGGGAAGTAA

<配列番号 109～132>

配列番号 109～132 は、順に、プライマー ovPD-L1 CDS F、ovPD-L1 CDS

R、poPD-L1 CDS F、poPD-L1 CDS R、buPD-L1 CDS F1、buPD-L1 CDS R1、buPD-L1 CDS F2、buPD-L1 CDS R2、ovPD-1-EGFP F、ovPD-1-EGFP R、ovPD-L1-EGFP F、ovPD-L1-EGFP R、poPD-1-EGFP F、poPD-1-EGFP R、poPD-L1-EGFP F、poPD-L1-EGFP R、ovPD-L1-Ig F、ovPD-L1-Ig R、poPD-L1-Ig F、poPD-L1-Ig R、cCD80-Ig F、cCD80-Ig R、cPD-L1-His F及びcPD-L1-His Rのヌクレオチド配列を示す。

<配列番号 1 3 3 ~ 1 3 8>

配列番号 1 3 3 ~ 1 3 8 は、順に、プライマーboPD-1-myc F, boPD-1-myc R, boPD-L1-EGFP F, boPD-L1-EGFP R, boPD-L1-Ig F, boPD-L1-Ig Rのヌクレオチド配列を示す。

請求の範囲

- [請求項1] (a)QSLLYSENQKDY (配列番号 37) のアミノ酸配列を有するCDR1、WAT のアミノ酸配列を有するCDR2及びGQYLVYPFT (配列番号 38) のアミノ酸配列を有するCDR3を含むL鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域とを有するL鎖と、(b)GYTFTSNF (配列番号 39) のアミノ酸配列を有するCDR1、IYPEYGNT (配列番号 40) のアミノ酸配列を有するCDR2及びASEEAVISLVY (配列番号 41) のアミノ酸配列を有するCDR3を含むH鎖可変領域とラット以外の動物抗体のH鎖定常領域とを有するH鎖とを含む、抗PD-L1抗体。
- [請求項2] L鎖可変領域とH鎖可変領域がラットに由来する請求項1記載の抗体。
- [請求項3] L鎖可変領域がラット抗ウシPD-L1抗体のL鎖可変領域であり、H鎖可変領域がラット抗ウシPD-L1抗体のH鎖可変領域である請求項2記載の抗体。
- [請求項4] L鎖可変領域が配列番号1のアミノ酸配列を有し、H鎖可変領域が配列番号2のアミノ酸配列を有する、請求項3記載の抗体。
- [請求項5] ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域が、Lambda鎖又はKappa鎖の定常領域のアミノ酸配列を有する請求項1～4のいずれかに記載の抗体。
- [請求項6] ラット以外の動物抗体のH鎖定常領域が、ヒトのIgG4に相当する免疫グロブリンの定常領域のアミノ酸配列を有する請求項1～5のいずれかに記載の抗体。
- [請求項7] ラット以外の動物がウシであり、ウシ抗体のH鎖定常領域が、ADCC活性及び/又はCDC活性を低下させる変異が導入されたものである請求項1～5のいずれかに記載の抗体。
- [請求項8] ラット以外の動物がイヌであり、イヌ抗体のL鎖定常領域が、Lambda鎖の定常領域のアミノ酸配列を有し、かつ、イヌ抗体のH鎖定常領域が、ヒトのIgG4に相当する免疫グロブリンの定常領域のアミノ酸配列を有する請求項6記載の抗体。
- [請求項9] ウシ抗体のL鎖定常領域が、Lambda鎖の定常領域のアミノ酸配列を有

- し、かつ、ウシ抗体のH鎖定常領域が、ADCC活性及び/又はCDC活性を低下させる変異が導入されたものである請求項7記載の抗体。
- [請求項10] イヌ抗体のL鎖定常領域が配列番号3のアミノ酸配列を有し、イヌ抗体のH鎖定常領域が配列番号4のアミノ酸配列を有する請求項8記載の抗体。
- [請求項11] ウシ抗体のL鎖定常領域が配列番号100のアミノ酸配列を有し、ウシ抗体のH鎖定常領域が配列番号102のアミノ酸配列を有する請求項9記載の抗体。
- [請求項12] L鎖2本とH鎖2本の4本鎖構造を持つ請求項1～11のいずれかに記載の抗体。
- [請求項13] 請求項1～12のいずれかに記載の抗体を有効成分として含む、医薬組成物。
- [請求項14] がん及び/又は感染症の予防及び/又は治療のための請求項13記載の医薬組成物。
- [請求項15] がん及び/又は感染症が、腫瘍性疾患、白血病、ヨーネ病、アナプラズマ病、細菌性乳房炎、真菌性乳房炎、マイコプラズマ感染症（例えば、マイコプラズマ性乳房炎、マイコプラズマ性肺炎など）、結核、小型ピロプラズマ病、クリプトスポリジウム症、コクシジウム症、トリパノソーマ病及びリーシュマニア症からなる群より選択される請求項14記載の医薬組成物。
- [請求項16] (a') QSLLYSENQKDY（配列番号37）のアミノ酸配列を有するCDR1、WATのアミノ酸配列を有するCDR2及びGQYLVYPFT（配列番号38）のアミノ酸配列を有するCDR3を含むL鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域とを有するL鎖をコードするDNAと、(b') GYTFTSNF（配列番号39）のアミノ酸配列を有するCDR1、IYPEYGNT（配列番号40）のアミノ酸配列を有するCDR2及びASEEAVISLVY（配列番号41）のアミノ酸配列を有するCDR3を含むH鎖可変領域とラット以外の動物抗体のH鎖定常領域とを有するH鎖をコードするDNAとを含む、人工

遺伝子DNA。

- [請求項17] 請求項 1 6 記載の人工遺伝子DNAを含むベクター。
- [請求項18] 請求項 1 7 記載のベクターにより形質転換された宿主細胞。
- [請求項19] 請求項 1 8 記載の宿主細胞を培養し、培養物から抗PD-L1抗体を採取することを含み、抗体の製造方法。
- [請求項20] QSLLYSENQKDY（配列番号 3 7）のアミノ酸配列を有するCDR1、WATのアミノ酸配列を有するCDR2及びGQYLVYPFT（配列番号 3 8）のアミノ酸配列を有するCDR3を含むL鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のL鎖定常領域とを有するL鎖をコードするDNA。
- [請求項21] GYTFTSNF（配列番号 3 9）のアミノ酸配列を有するCDR1、IYPEYGNT（配列番号 4 0）のアミノ酸配列を有するCDR2及びASEEAVISLVY（配列番号 4 1）のアミノ酸配列を有するCDR3を含むH鎖可変領域と、ラット以外の動物抗体のH鎖定常領域とを有するH鎖をコードするDNA。