

BHV-0223 40 mg Zydis Sublingual Fast
Rilutek 50 mg Tablet Swallowed with Water Fast
Plasma Concentration (pg/mL)
2e+05
1e+05
5e+04
2e+04
1e+04
5e+03
2e+03
1e+03
0
5
10
15
20
25
Nominal Time (h)

FIG. 1



BHV-0223 40 mg Zydis Sublingual Fast
BHV-0223 40 mg Zydis Sublingual Fed
Plasma Concentration (pg/mL)
2e+05
1e+05
5e+04
2e+04
1e+04
5e+03
2e+03
1e+03
0
5
10
15
20
25
Nominal Time (h)

FIG. 2




4th Quartile
1x BHV-0223 (40 mg)
1x Rilutek (50 mg)
2000000
1500000
1000000
500000
Dosed with BHV-0223
Dosed with Rilutek

FIG. 3



[a]Observed data are from Liboux et al (*J Clin Pharmacol*.1997).

FIG. 4



A
Plasma Concentration (ug/mL)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
4
8
12
16
20
24
Time (h)
50 mg oral (data from BHV223-101)
50 mg oral (sim)
B
Plasma Concentration (ug/mL)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
4
8
12
16
20
24
Time (h)
50 mg oral (data from Chandu 2010)
50 mg oral (sim)
sim,

FIG. 5




FIG. 6