

[DRAWINGS]


[FIG. 1]




[FIG. 2]




[FIG. 3]


Glocuse level (mg/dL)
250
200
150
100
50
0
Control
Semaglutide
PT403
(min)
0 15 30 60 90 120 180
Day 1
Day 7
Day 16
Day 21
Day 28


[FIG. 4]


Sham Control
Semaglutide
PT403
Body weight (g)
400
350
300
250
200
0
10
20
30
Day
10% reduction
p<0.0001 (ANOVA)


[FIG. 5]


Semaglutide Conc.(ng/ml)
500
400
300
200
100
0
0
7
14
21
28
Time(day)
LC 3% PT403 (Example 3)
LC 4% PT403 (Example 4)
LC 6% PT403 (Example 6)


[FIG. 6]


Cumulative Semaglutide Conc. (%)
100
75
50
25
0
0
10
20
30
40
Day
LC 3% PT403 (Example 3)
LC 4% PT403 (Example 4)
LC 6% PT403 (Example 6)


[FIG. 7]


Semaglutide Conc.(ng/ml)
1200
1000
800
600
400
200
0
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
Time(day)

[FIG. 8]


Cumulative Semaglutide Conc. (%)
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Time(day)

[FIG. 9]


Lilaglutide Conc.(ng/ml)
500
400
300
200
100
0
0
7
14
21
28
Time(day)
Comparative Example 13, 4mg/kg
Comparative Example 14, 4mg/kg