Fig.1



DISSOLUTION RATE AT 60 MINUTES (%)
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300
350
CONTENT OF COMPOUND 2 (mg/CAPSULE SHELL)
GELATIN / INITIAL
HYPROMELLOSE / INITIAL
PULLULAN / INITIAL
TABLET / INITIAL

Fig.2



DISSOLUTION RATE AT 60 MINUTES (%)
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300
350
CONTENT OF COMPOUND 2 (mg/CAPSULE SHELL)
GELATIN / 40℃, 75% RH, 1 MONTH
HYPROMELLOSE / 40℃, 75% RH, 1 MONTH
PULLULAN / 40℃, 75% RH, 1 MONTH
TABLET / 40℃, 75% RH, 1 MONTH

Fig.3




DISSOLUTION RATE (%)
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
15
30
45
60
TIME (MIN)
GELATIN / INITIAL
GELATIN / 40°C, 75% RH, 1 MONTH

Fig.4


DISSOLUTION RATE (%)
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
15
30
45
60
TIME (MIN)
HYPROMELLOSE / INITIAL
HYPROMELLOSE / 40°C, 75% RH, 1 MONTH