


Heterocyclische Oxypropanolamin-Derivate, Verfahren zu ihrer Herstellung und diese Verbindungen enthaltende Arzneimittel

Die vorliegende Erfindung betrifft neue heterocyclische Oxypropanolamin-Derivate der allgemeinen Formel I



in welcher

R_1 , Wasserstoff, eine niedere Alkyl-, Aralkyl- oder niedere Alkanoylgruppe,

R_2 und R_3 , die gleich oder verschieden sein können, jeweils Wasserstoff, eine niedere Alkyl-, Hydroxyalkyl-, Alkoxy-carbonyl- oder Alkanoyloxyalkylgruppe sowie gemeinsam einen Alkylrest,

R_4 , Wasserstoff, eine niedere Alkanoylgruppe oder eine Aroylgruppe,

R_5 , Wasserstoff, eine niedere Alkylgruppe oder eine Aralkylgruppe,

R_6 , Wasserstoff oder eine niedere Alkylgruppe,

R_7 , Wasserstoff, eine Hydroxygruppe oder eine niedere Alkylgruppe,

Z einen Valenzstrich, eine Methylengruppe, ein Sauerstoff- oder Schwefelatom,

Ar einen carbocyclischen Arylrest oder einen Pyridylrest,

R_8 , R_9 und R_{10} , die gleich oder verschieden sein können, jeweils Wasserstoff, Halogen, eine Hydroxygruppe, eine niedere Alkanoylgruppe, eine niedere Alkylgruppe, eine niedere Alkenylgruppe, eine niedere Alkoxygruppe, eine Aralkoxygruppe, eine Allyloxygruppe, eine niedere Alkylthiogruppe, eine Aminocarbonylgruppe, eine Aminosulfonylgruppe, eine niedere Alkanoylaminogruppe oder R_8 und R_9 gemeinsam eine Niederalkylendioxygruppe oder R_9 gemeinsam mit R_7 auch eine $-CH_2-O-$ Gruppe und

A die Gruppe X_1-Y_1 , in der X_1 einen Methylene- oder $-NR_{11}$ -Rest, wobei R_{11} , Wasserstoff oder eine niedere Alkylgruppe bedeutet, und Y_1 einen Methylene- oder die Gruppe $>C=Q$, wobei Q für Sauerstoff oder Schwefel steht, vorstellen, oder die Gruppe $X_2=Y_2$, in der X_2 und Y_2 gleich oder verschieden sein können und jeweils für ein

Stickstoffatom oder für eine $=CR_{12}$ -Gruppe stehen, wobei R_{12} , Wasserstoff, eine niedere Alkyl- oder Alkoxy-carbonylgruppe vorstellt, wobei für den Fall, dass $X_2=Y_2$ eine $-CH=N$ -Gruppe und R_1 eine Alkyl- oder Aralkylgruppe vorstellen, diese wegen der Tautomeriefähigkeit der Indazole auch an dem für Y_2 stehenden Stickstoffatom lokalisiert sein kann, mit der Massgabe, dass jeweils Y_1 mit dem Rest $N-R_1$ der allgemeinen Formel I verbunden ist, bedeuten, wobei für den Fall, dass Q ein Sauerstoffatom oder $X_2=Y_2$ eine $-CR_{12}=CR_{12}$ -Gruppe bedeutet, entweder die beiden Reste R_2

und R_3 nicht gleichzeitig Wasserstoff sein können oder R_7 und R_8 zusammen eine $-CH_2-O-$ Brücke bilden müssen, sowie deren pharmakologisch verträglichen Salze.

Da die Verbindungen der Formel I asymmetrische Kohlenstoffatome besitzen, sind ferner Gegenstand der Erfindung die optisch aktiven Formen und racemische Gemische dieser Verbindungen.

Die Verbindungen der Formel I und ihre pharmakologisch verträglichen Salze besitzen bei geringer Toxizität ausgeprägte vasodilatierende Eigenschaften, die sich im wesentlichen in einer Senkung des Blutdrucks äussern; ausserdem wird eine Hemmung adrenergischer β -Rezeptoren beobachtet. Die erfindungsgemässen Verbindungen eignen sich daher besonders zur Behandlung und Prophylaxe bei Herz- und Kreislauferkrankungen.

In den deutschen Offenlegungsschriften 1 948 507, 2 113 379, 2 230 426, 2 619 164, 2 651 574, 2 700 193 und 2 830 211 sowie in der Schweizer Patentschrift 483 423 sind Verbindungen ähnlicher Struktur und Wirkung beschrieben und beansprucht. Durch Abänderung des heterocyclischen Phenolteils sowie der Aminopropoxy-Seitenkette wurde eine überraschende Wirkungsverbesserung erzielt.

Unter einer niederen Alkylgruppe der Substituenten R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , R_{11} und R_{12} sind geradkettige oder verzweigte Gruppen mit 1-6, vorzugsweise 1-4 Kohlenstoffatomen zu verstehen, wie z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert.-Butyl oder n-Hexyl. Insbesondere kommt jedoch die Methyl- oder Ethylgruppe in Frage. Der von den Substituenten R_2 und R_3 gegebenenfalls gemeinsam gebildete Alkylrest weist 3-4, vorzugsweise 3 Kohlenstoffatome auf.

Unter Alkenylgruppe sind ungesättigte Kohlenwasserstoffreste mit bis 6 C-Atomen zu verstehen, insbesondere der Allyl- und Methylvinyl-Rest.

Hydroxyalkylgruppen der Substituenten R_2 und R_3 enthalten 1-4 Kohlenstoffatome, bevorzugt ist die 2-Hydroxyethyl- und die Hydroxymethylgruppe.

Alkoxygruppen der Substituenten R_8 , R_9 und R_{10} enthalten 1-6, vorzugsweise 1-4 Kohlenstoffatome, wie z.B. die Methoxy-, Ethoxy-, Propoxy-, Butoxy- oder Pentoxygruppe. Bevorzugt sind die Methoxy-, Ethoxy- und Propoxygruppe.

Als Alkoxy-carbonylgruppe der Substituenten R_2 , R_3 und R_{12} kommen insbesondere die Methoxy-carbonyl- und Ethoxy-carbonylgruppe in Frage.

Alkylthiogruppen der Substituenten R_8 , R_9 und R_{10} sind Gruppen mit 1-6, vorzugsweise 1-4 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist der Methylmercaptorest.

Alkanoylgruppen der Substituenten R_1 , R_4 , R_5 , R_6 und R_{10} sowie der Alkanoylteil der Alkanoyloxyalkylgruppe in der Definition der Substituenten R_2

und R_3 und der Alkanoylaminogruppe der Substituenten R_6 , R_7 und R_{10} enthalten 1–8, vorzugsweise 1–5 Kohlenstoffatome, wobei deren Alkylgruppen geradkettig oder verzweigt sein können. Bevorzugt sind der Formyl-, Acetyl- oder der Pivaloylrest. Als Alkanoyloxyalkylgruppen sind Alkanoyloxymethylgruppen besonders bevorzugt.

Unter einer Aroylgruppe in der Definition des Substituenten R_4 ist bevorzugt die Benzoylgruppe zu verstehen, die ein- oder mehrfach durch Halogen, Alkylgruppen mit 1–4 Kohlenstoffatomen oder Alkoxygruppen mit 1–4 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann.

Unter einer Aralkylgruppe in der Definition der Substituenten R_1 und R_2 sowie unter einer Aralkoxygruppe in der Definition der Substituenten R_6 , R_7 und R_{10} sind Reste zu verstehen, die als Arylteil einen Phenyl- oder Naphthylrest und als Alkylteil eine gerade oder verzweigte gesättigte Kohlenwasserstoffkette mit 1–4 Kohlenstoffatomen aufweisen. Besonders bevorzugt ist der Benzylrest.

Der carbocyclische Arylrest Ar kann ein Phenyl- oder auch Naphthylrest sein, wobei der Phenylrest besonders bevorzugt ist.


Als von den Substituenten R_6 und R_7 gemeinsam gebildete Niederalkylendioxygruppe kommen vorzugsweise die Methylen- und Ethylendioxygruppe in Frage.

Das Zeichen A in der allgemeinen Formel I hat insbesondere die Bedeutung, dass als Heterocyclen Benzimidazolinon-2, Benzimidazolinthion-2, Benzimidazol, Benzotriazol, Indol, Indolin und Indazol zu verstehen sind.

Unter Halogen wird im Sinne der Erfindung Fluor, Chlor, Brom und Jod verstanden, insbesondere Fluor, Chlor und Brom.

Die Herstellung der neuen Verbindungen der allgemeinen Formel I ist dadurch gekennzeichnet, dass man in an sich bekannter Weise entweder

a) eine Verbindung der Formel II




in welcher R_1 , R_2 , R_3 und A die oben genannte Bedeutung haben, B eine reaktive Gruppe darstellt und R_4' die oben angegebene Bedeutung für R_4 hat oder zusammen mit B einen Valenzstrich bedeutet, mit einer Verbindung der Formel III




in welcher R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z und Ar die oben angegebene Bedeutung haben, umgesetzt oder

b) eine Verbindung der Formel IV




in welcher R_1 , R_2 , R_3 und A die angegebene Bedeutung haben, mit einer Verbindung der Formel V



in welcher R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z und Ar die oben angegebene Bedeutung haben, B' eine reaktive Gruppe darstellt, D für eine $>CO-$ oder $>CH-OR_4'$ -Gruppe steht, wobei R_4' die oben genannte Bedeutung für R_4 hat oder auch zusammen mit B' einen Valenzstrich bedeutet und R_4' die oben genannte Bedeutung für R_4 hat oder auch zusammen mit B' eine Einfachbindung sein kann, umgesetzt und, falls D die $>CO-$ Gruppe bedeutet, anschließend reduziert oder

c) eine Verbindung der Formel VI




in welcher R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und A die oben angegebene Bedeutung haben, mit einer Verbindung der Formel VII



in welcher B, R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z und Ar die oben angegebene Bedeutung haben, umgesetzt oder

d) ein Gemisch aus einer Verbindung der Formel VI mit einer Verbindung der Formel VIII




in welcher R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z und Ar die oben angegebene Bedeutung haben, hydriert oder

e) eine Verbindung der Formel VI mit einer Verbindung der Formel IX



in welcher $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, Z$ und Ar die angegebene Bedeutung haben und L einen reaktiven Rest darstellt, umgesetzt und das erhaltene Amid anschließend reduziert oder

f) eine Verbindung der Formel X



in welcher $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, Z$ und Ar die angegebene Bedeutung haben und XX_1 oder HX_2 vorstellt, für den Fall, dass A die Gruppe X_1-Y_1 bedeutet, eine Verbindung, in der $X = X_1$ darstellt, mit einer Verbindung der allgemeinen Formel Xla




in der Y_1 die oben angegebene Bedeutung hat, L_1 ein Wasserstoffatom, die Hydroxygruppe oder einen reaktiven Rest T und L_2 ein Wasserstoffatom oder einen reaktiven Rest T bedeuten, oder für den Fall, dass die Gruppe $X_2=Y_2$ bedeutet, eine Verbindung, in der $X = HX_2$ darstellt, mit einer Verbindung der allgemeinen Formel Xlb



in der L_1 und Y_2 die oben angegebene Bedeutung haben, L_2' ein Wasserstoffatom oder einen reaktiven Rest T und L_3 ein Wasserstoffatom oder zusammen mit L_2' ein Sauerstoffatom darstellt, umgesetzt und cyclisiert oder

g) eine Verbindung der Formel XII



in welcher $R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, Z, A$ und Ar die angegebene Bedeutung haben und U eine abspaltbare Gruppe darstellt, reduziert und cyclisiert und gegebenenfalls nachträglich in einer erhaltenen Verbindung der allgemeinen Formel I einen der Reste $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}$ oder R_{12} nach üblichen Methoden in einen anderen, durch den Anspruch definierten Rest $R_1, R_2, R_3, R_4,$

$R_5, R_6, R_7, R_8, R_{10}$ oder R_{12} überführt und die erhaltenen Verbindungen gewünschtenfalls in ihre pharmakologisch verträglichen Salze umwandelt.

Reaktive Reste B in Verbindungen der allgemeinen Formeln II und VII sowie B' in Verbindungen der allgemeinen Formel V sind insbesondere Säurereste, z.B. von Halogenwasserstoffsäuren und Sulfonsäuren. Besonders bevorzugt sind Chloride, Mesyloxy- und Tosyloxyreste.

Reaktive Reste L in Verbindungen der allgemeinen Formel IX sind insbesondere Säurereste, z.B. von Halogenwasserstoffsäuren oder Stickstoffwasserstoffsäure oder von Niederalcarbonsäuren, Niederalkoxy- oder Aryloxygruppen, Amino- oder Imidazolylgruppen. Besonders bevorzugt sind Chloride, Azide und Imidazolylreste.

Die reaktiven Reste T und U in Verbindungen der Formeln Xla, Xlb und XII stehen für alle Reste, die sich nucleophil substituieren lassen. Solche Reste sind vorzugsweise Halogenatome, wie Chlor oder Brom, Amino-, Imidazolyl-, Niederalkoxy-, Niederalcyloxy-, Phenoxygruppen, Mercapto- und Niederalkoxythiocarbonylgruppen. Beispielsweise können als Verbindungen der allgemeinen Formel Xla Carbonylhalogenide, Harnstoff, N,N' -Carbonyldiimidazol, sowie für den Fall, dass Q für Schwefel steht, Thiocarbonylhalogenide, Thioharnstoff oder auch Xanthogenate eingesetzt werden. Verbindungen der allgemeinen Formel Xla können auch in situ aus anderen Verbindungen, z.B. Schwefelkohlenstoff in alkalischer Lösung, in der Reaktionslösung hergestellt werden. Als Verbindungen der allgemeinen Formel Xlb kommen beispielsweise Carbonsäuren, wie Ameisensäure oder Essigsäure, Carbonsäureester oder auch Carbonsäurehalogenide in Frage. Verbindungen Xlb können jedoch auch in situ aus anderen Substanzen in der Reaktionsmischung hergestellt werden, z.B. anorganisches Nitrit in wässriger Mineralsäure, Niederalkylisalpetersäureester in organischen Lösungsmitteln.

Die erfindungsgemässen Verfahren werden zweckmässig in einem unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, z.B. Wasser, Methanol, Ethanol, n -Butanol, Dioxan, Dimethylformamid oder Hexamethylphosphorsäuretriamid, gegebenenfalls in Gegenwart eines säurebindenden Mittels durchgeführt. Die Umsetzungen können auch durch Mischen der Reaktionskomponenten ohne Lösungsmittel erreicht werden. Die Reaktionen werden bei Raumtemperatur oder unter Erwärmen, gegebenenfalls unter einer Schutzgasatmosphäre ausgeführt.

Die gegebenenfalls durchzuführende Reduktion der für D stehenden Gruppe $>C=O$ erfolgt zweckmässig durch katalytische Hydrierung mit Edelmetall- oder Nickelkatalysatoren oder mittels kompletter Metallhydride, wie z.B. Natriumborhydrid.

Die Hydrierung eines Amins der Formel VI mit einer Carbonylverbindung der Formel VIII gemäss Verfahren d) wird in einem geeigneten Lösungsmittel (z.B. Methanol) in Gegenwart eines Katalysators (z.B. Raney-Nickel) durchgeführt.

Die Reduktion der nach Verfahren e) erhaltenen Amide erfolgt vorzugsweise mittels komplexer Metallhydride, z.B. Lithiumaluminiumhydrid.

Die bei den erfindungsgemässen Verfahren eingesetzten Ausgangsverbindungen sind in der Regel literaturbekannte Verbindungen. Neue Verbindungen werden im allgemeinen analog der für die Herstellung dieser bekannten Verbindungen beschriebenen Verfahren erhalten. So können beispielsweise die Amine der allgemeinen Formel III durch Umsetzung von Halogenalkyl-nitrilen mit entsprechenden Phenolen, Naphtholen oder Aryl-Verbindungen (z.B. Chloracetonitril und Phenol) und anschliessender Hydrierung in Gegenwart von Ammoniak hergestellt werden.

Die Amine der allgemeinen Formel VI können aus den entsprechenden (2,3-Epoxypropoxy)-Derivaten durch Umsetzung mit flüssigem Ammoniak erhalten werden.

Reaktive Verbindungen der allgemeinen Formel VII, z.B. p-Toluolsulfonsäureester werden in der Regel aus den entsprechenden Phenolen, Naphtholen, Aryl- oder Pyridyl-Verbindungen durch Umsetzung mit Halogenalkoholen und anschliessender Veresterung mit p-Toluolsulfonsäure hergestellt.

Die Carbonyl-Verbindungen der allgemeinen Formel VIII und die reaktiven Säurederivate der allgemeinen Formel IX werden z.B. aus entsprechenden Phenolen, Naphtholen, Aryl- und Pyridyl-Verbindungen durch Umsetzen mit geeigneten Halogenalkylverbindungen erhalten.

Als gegebenenfalls nachträglich durchzuführende Umwandlung eines der Substituenten R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_7 , R_{10} oder R_{12} in Verbindungen der allgemeinen Formel I in einen anderen, durch den Anspruch definierten Rest R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_7 , R_{10} oder R_{12} kommen beispielsweise die nachträgliche Acylierung einer OH-Gruppe zu einer Alkanoyloxy- bzw. Aroyloxy-Gruppe,

die Reduktion einer Alkoxy-carbonylgruppe zu einem Hydroxymethylrest,

die Hydrolyse einer Alkanoyloxymethylgruppe zu einem Hydroxymethylrest,

die Reduktion einer Alkanoyloxymethylgruppe zu einem Methylsubstituenten oder

die Abspaltung einer Benzylgruppe in Frage.

Die Veresterung einer für $-OR_1$ stehenden Hydroxygruppe kann in an sich üblicher Weise durch Umsetzung mit einem Säurehalogenid oder Säureanhydrid, gegebenenfalls in Gegenwart eines säurebindenden Mittels, wie z.B. Pyridin oder Triethylamin erfolgen.

Die gegebenenfalls durchzuführende Reduktion von Verbindungen der allgemeinen Formel I, in denen R_2 und/oder R_3 eine Alkoxy-carbonyl- bzw. eine Alkanoyloxymethylgruppe vorstellen, in Verbindungen der Formel I, in denen R_2 und/oder R_3 einen Hydroxymethyl- bzw. Methyl-Substituenten darstellen, erfolgt zweckmässig mittels komplexer Metallhydride, wie z.B. Lithiumaluminiumhydrid oder durch katalytische Hydrierung mittels Edelmetallkatalysatoren oder Raney-Nickel.

Die Hydrolyse von Alkanoyloxymethylgruppen R_2 und/oder R_3 in Verbindungen der allgemeinen

Formel I zu Hydroxymethylresten R_2 und/oder R_3 kann in an sich bekannter Weise sauer oder alkalisch erfolgen.

Die Abspaltung einer für R_1 und R_2 stehenden bzw. in R_2 , R_3 oder R_{10} enthaltenen Benzylgruppe erfolgt beispielsweise durch Hydrierung in Gegenwart von Edelmetallkatalysatoren.

Zur Überführung der Verbindungen der Formel I in ihre pharmakologisch unbedenklichen Salze setzt man diese vorzugsweise in einem organischen Lösungsmittel mit einer anorganischen oder organischen Säure, z.B. Salzsäure, Bromwasserstoffsäure, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Essigsäure, Zitronensäure, Maleinsäure oder Benzoesäure um.

Die erfindungsgemässen Verbindungen der Formel I können in Form eines racemischen Gemisches anfallen. Die Trennung des Racemats in die optisch aktiven Formen geschieht nach an sich bekannten Methoden über die diastereomeren Salze. Als aktive Säuren können vorwiegend Weinsäure, Apfelsäure, Camphersäure und Camphersulfonsäure verwendet werden.

Zur Herstellung von Arzneimitteln werden die Verbindungen der Formel I in an sich bekannter Weise mit geeigneten pharmazeutischen Träger-substanzen, Aroma-, Geschmacks- und Farbstoffen gemischt und beispielsweise als Tabletten oder Dragees ausgeformt oder unter Zugabe entsprechender Hilfsstoffe in Wasser oder Öl, wie z.B. Olivenöl, suspendiert oder gelöst.

Die erfindungsgemässen neuen Verbindungen der Formel I und ihre Salze können in flüssiger oder fester Form enteral oder parenteral appliziert werden. Als Injektionsmedium kommt vorzugsweise Wasser zur Anwendung, welches die bei Injektionslösungen üblichen Zusätze wie Stabilisierungsmittel, Lösungsvermittler oder Puffer enthält. Derartige Zusätze sind z.B. Tartrat- und Citratpuffer, Ethanol, Komplexbildner (wie Ethylen-diamintetraessigsäure und deren nichttoxische Salze), hochmolekulare Polymere (wie flüssiges Polyethylenoxyd) zur Viskositätsregulierung. Feste Trägerstoffe sind z.B. Stärke, Lactose, Mannit, Methylcellulose, Talkum, hochdisperse Kieselsäuren, höhermolekulare Fettsäuren (wie Stearinsäure), Gelatine, Agar-Agar, Calciumphosphat, Magnesiumstearat, tierische und pflanzliche Fette und feste hochmolekulare Polymere (wie Polyethylenglykole); für orale Applikation geeignete Zubereitungen können gewünschtenfalls Geschmacks- und Süsstoffe enthalten.

Die verabreichte Dosierung hängt vom Alter, der Gesundheit und dem Gewicht des Empfängers, dem Ausmass der Krankheit, der Art gleichzeitiger gegebenenfalls durchgeführter weiterer Behandlungen, der Häufigkeit der Behandlungen und der Art der gewünschten Wirkung ab. Üblicherweise beträgt die tägliche Dosis der aktiven Verbindungen 0,1–50 mg/kg Körpergewicht. Normalerweise sind 0,5–40 und vorzugsweise 1,0–20 mg/kg/Tag in einer oder mehreren Anwendungen pro Tag wirksam, um die gewünschten Resultate zu erhalten.

15

Neben den in den folgenden Beispielen aufgeführten Verbindungen sind im Sinne der vorliegenden Anmeldung weiterhin bevorzugt:

- 4- <2-Hydroxy-3-[2-(2,6-dimethoxy-phenoxy)-ethylamino]-propoxy> -7-methyl-3-propyl-2-benzimidazolinon 5
- 4- <2-Hydroxy-3-[2-(2-allyloxy-phenoxy)-ethylamino]-propoxy> -6-methylindol
- 4- <2-Hydroxy-3-[2-(2-methylmercapto-phenoxy)-ethylamino]-propoxy> -1-formylindolin 10
- 4- <2-Hydroxy-3-[2-(2-sulfamyl-phenoxy)-ethylamino]-propoxy> -indazol
- 4- <2-Hydroxy-3-[2-(3,4-ethylendioxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy> -indazol
- 4- <2-Hydroxy-3-[2-(3-ethoxy-4-methoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy> -indazol 15
- 4- <2-Hydroxy-3-[2-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy> -indazol
- 4- <2-Hydroxy-3-[2-(3-methoxy-4-hydroxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy> -indazol 20
- 4- <2-Hydroxy-3-[2-(3-hydroxy-4-n-butoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy> -indazol
- 4- <2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dihydroxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy> -indazol
- 4- <2-Hydroxy-3-[3-(3,4-dimethoxy-phenyl)-propylamino]-propoxy> -indazol 25
- 4- <2-Hydroxy-3-[1-(3,4-dimethoxy-phenyl)-propyl-2-amino]-propoxy> -indazol
- 1-Methyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy> -indazol 30
- 1-Methyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy> -indolin
- 4- <2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenylmercapto)-ethylamino]-propoxy> -1-formylindolin
- 4- <2-Benzoyloxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy> -indazol 35
- 4- <2-Hydroxy-3-[1-(3,4-dihydroxy-phenyl)-2-amino-1-propanol]-propoxy> -6-methylindol

Die nachfolgenden Beispiele zeigen einige der zahlreichen Verfahrensvarianten, die zur Synthese der erfindungsgemässen Verbindungen verwendet werden können. Sie sollen jedoch nicht eine Einschränkung des Erfindungsgegenstandes darstellen.

Beispiel 1

4- <2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-propylamino]-propoxy> -7-methyl-2-benzimidazolinon-hydrochlorid

12,3 g 2,3-Diamino-1- <2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-propylamino]-propoxy> -4-methylbenzol-trihydrochlorid werden in 500 ml Wasser gelöst. Man leitet in diese Lösung 45 Minuten bei Raumtemperatur Phosgen ein, spült mit Stickstoff und saugt ab. Das Kristallisat wird aus 300 ml Ethanol/200 ml Methanol unter Zusatz von Aktivkohle umkristallisiert. Es werden 5,0 g (46% d. Th.) vom Fp. 228–230 °C erhalten.

Die hierzu benötigte Ausgangsverbindung wird folgendermassen erhalten:

30,5 g 2,3-Dinitro-1-(2,3-epoxy-propoxy)-4-methylbenzol und 32,6 g N-Benzyl-2-(2-methoxyphenoxy)-propylamin werden in 500 ml Ethanol 3 Stunden unter Rückfluss gekocht. Das Reaktionsgemisch wird über 10 g 10%iger Palladiumkohle in 1 l Ethanol bei 50 °C und 30 bar hydriert. Man befreit vom Katalysator, säuert mit 2n Salzsäure an, klärt mit Aktivkohle und engt zur Trockne ein. Man erhält 59 g 2,3-Diamino-1- <2-hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-propylamino]-propoxy> -4-methylbenzol-trihydrochlorid.

Beispiel 2

Analog Beispiel 1 werden aus Phosgen und dem entsprechend substituierten 1-Propoxy-2,3-diaminobenzol-Derivat erhalten:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Fp. °C (Lösungsmittel)
a) 4-[2-Hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethyl-amino)propoxy]-7-methyl-2-benzimidazolinon-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethyl-amino)propoxy]-4-methylbenzol-trihydrochlorid	42	204–206 (Isopropanol/ Methanol)
b) 4- <2-Hydroxy-3-[2-(2-hydroxyphenoxy)-ethylamino]-propoxy> -7-methyl-2-benzimidazolinon-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1- <2-hydroxy-3-[2-(2-hydroxyphenoxy)-ethylamino]propoxy> -4-methylbenzol-trihydrochlorid	67	262–263 (Methanol/ Wasser)
c) 6,7-Dimethyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(2-methylphenoxy)-ethylamino]propoxy> 2-benzimidazolinon-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-4,5-dimethyl-1- <2-hydroxy-3-[2-(2-methylphenoxy)ethylamino]propoxy> -benzol-trihydrochlorid	34	273–274 (Methanol/ Wasser)
d) 4- <2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]-propoxy> -7-methyl-2-benzimidazolinon-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1- <2-hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-ethylamino]propoxy> -4-methylbenzol-trihydrochlorid	62	202–203 (Ethanol/ Methanol)

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Fp. °C (Lösungsmittel)
e) 4-[2-Hydroxy-3-(benzo[b]-1,4-dioxan-2-yl-methyl-amino)propoxy]-2-benzimidazolinon-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(benzo[b]-1,4-dioxan-2-yl methylamino)propoxy]benzol-trihydrochlorid		
f) 4-[2-Hydroxy-3-(2-phenoxy-ethylamino)propoxy]-7-methyl-2-benzimidazolinon-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(2-phenoxy-ethylamino)-propoxy]-4-methyl-benzol-trihydrochlorid	56	231–233 (Ethanol/ Methanol)
g) 4-[2-Hydroxy-3-(2-phenoxy-ethylamino)propoxy]-6-methyl-2-benzimidazolinon-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(2-phenoxy-ethylamino)-propoxy]-5-methyl-benzol-trihydrochlorid	52	250–252 (Ethanol/ Methanol)
h) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)ethylamino]-propoxy>-6-methyl-2-benzimidazolinon-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-ethylamino]propoxy>-5-methyl-benzol-trihydrochlorid	87	213–215 (Ethanol)
i) 4-[2-Hydroxy-3-(3,4-dimethoxyphenethylamino)propoxy]-6-methyl-2-benzimidazolinon-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(3,4-dimethoxyphenethyl-amino)propoxy]-5-methyl-benzol-trihydrochlorid	15	260–262 (Ethanol)
j) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-allyloxy-phenoxy)ethylamino]-propoxy>-7-methyl-2-benzimidazolinon-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-allyloxy-phenoxy)-ethylamino]propoxy>-4-methyl-benzol-trihydrochlorid		

Beispiel 3

4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-propyl-amino]-propoxy>-7-methyl-benzimidazolhydrochlorid

14,7 g 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-propylamino]-propoxy>-4-methyl-benzol-trihydrochlorid werden in 80 ml Ameisensäure 3 Stunden rückfließend gekocht. Man klärt mit Aktivkohle und engt zur Trockne ein. Die entstandene Formylverbindung wird in 50 ml 2n Salz-

35

säure in der Siedehitze verseift. Nach Einengen zur Trockne wird der Rückstand aus 50 ml Ethanol unter Zusatz von Aktivkohle umkristallisiert. Man erhält 5,6 g (41% d. Th.) Titelverbindung vom Fp. 103–105 °C.

40

Beispiel 4

Analog zu Beispiel 3 erhält man aus Ameisensäure und dem entsprechend substituierten 1-Propoxy-2,3-diaminobenzol-Derivat:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Fp. °C (Lösungsmittel)
a) 4-[2-Hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)propoxy]benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(3,4-dimethoxyphenethyl-amino)propoxy]benzol-trihydrochlorid	50	255–256 (Ethanol)
b) 4-[2-Hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)propoxy]-7-methyl-benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethyl-amino)propoxy]-4-methyl-benzol-trihydrochlorid	20	254–256 (Ethanol/ Wasser)
c) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-hydroxyphenoxy)ethylamino]-propoxy>-7-methyl-benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-hydroxyphenoxy)-ethylamino]propoxy>-4-methyl-benzol-trihydrochlorid	92	229–231 (Wasser)
d) 6,7-Dimethyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(2-methyl-phenoxy)-ethylamino]propoxy>benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-4,5-dimethyl-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methylphenoxy)ethylamino]propoxy>benzol-trihydrochlorid	17	106–109 (Ethanol/ Essigester)

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Fp. °C (Lösungsmittel)
e) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)ethylamino]-propoxy>-7-methyl-benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-ethylamino]propoxy>-4-methyl-benzol-trihydrochlorid	62	219-221 Ethanol/ Methanol)
f) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)ethylamino]-propoxy>benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-ethylamino]propoxy>benzol-trihydrochlorid	17	115-118 (Ethanol)
g) 4-[2-Hydroxy-3-(4-phenyl-2-butylamino)propoxy]-benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(4-phenyl-2-butylamino)-propoxy]benzol-trihydrochlorid	77	amorph
h) 4-[2-Hydroxy-3-(2-phenoxy-ethylamino)propoxy]benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(2-phenoxy-ethylamino)-propoxy]benzol-trihydrochlorid	10	amorph
i) 4-[2-Hydroxy-3-(benzo[b]-1,4-dioxan-2-yl-methylamino)-propoxy]benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(benzo[b]-1,4-dioxan-2-yl-methylamino)propoxy]benzol-trihydrochlorid	19	105-107 (Isopropanol/ Methanol)
j) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)propylamino]-propoxy>benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-propylamino]propoxy>benzol-trihydrochlorid	59	115-116 (Ethanol)

Beispiel 5

4-[2-Hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)-propoxy]-2,7-dimethyl-benzimidazol-hydrochlorid

14,6 g 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)-propoxy]-4-methyl-benzol-trihydrochlorid werden in 50 ml Eisessig 3 Stunden unter Rückfluss erhitzt. Es wird mit Aktivkohle geklärt und vollständig eingeeengt. Der Rückstand wird in 40 ml 2n Salzsäure 2 Stunden unter Rückfluss gekocht und anschliessend zur Trockne eingeeengt. Man reinigt über eine Kieselgelsäule mit Chloroform/Methanol 8:2 als Elutionsmittel und kristallisiert schliesslich aus 100 ml Ethanol 2,2 g (19% d. Th.) Titelverbindung vom Fp. 167-169 °C.

Das als Ausgangsmaterial eingesetzte Diamin wird folgendermassen erhalten:

26,0 g N-Benzyl-3,4-dimethoxy-phenethylamin und 24,3 g 2,3-Dinitro-1-(2,3-epoxy-propoxy)-4-methyl-benzol werden in 300 ml Ethanol 4 Stunden unter Rückfluss gekocht. Die Reaktionsmischung wird mit 300 ml Ethanol verdünnt und bei 50 °C und 30 bar Druck über 7,0 g 10%iger Palladiumkohle hydriert. Man befreit vom Katalysator, säuert mit 2n Salzsäure an und erhält nach Einengen das amorphe Diaminsalz.

Beispiel 6

Analog zu Beispiel 5 wird aus Essigsäure und entsprechend substituierten 1-Propoxy-2,3-diaminobenzol-Derivaten erhalten:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Fp. °C (Lösungsmittel)
a) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-propoxy-phenoxy)ethylamino]-propoxy>-2,7-dimethyl-benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-4-methyl-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-propoxy-phenoxy)-ethylamino]propoxy>benzol-trihydrochlorid	44	143-145 (Alkohol/ Essigester)
b) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-4-methyl-phenoxy)-ethylamino]propoxy>-2,7-dimethyl-benzimidazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-4-methyl-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-4-methyl-phenoxy)ethylamino]propoxy>benzol-trihydrochlorid	62	165-167 (Ethanol)

Beispiel 7

4-[2-Hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)-propoxy]-benzo-triazol-hydrochlorid

14,1 g 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)-propoxy]-benzol-trihydrochlorid werden in 10 ml Wasser und 3,5 ml Eisessig gelöst, auf 5°C abgekühlt und mit 2,07 g Natriumnitrit in 3,6 ml Wasser versetzt. Man rührt 2,5 Stunden bei Raumtemperatur nach. Durch Zugabe von 480 ml Isopropanol wird das entstandene Natriumchlorid ausgefällt. Nach Filtration wird einge-

engt, über eine Kieselgelsäule (Laufmittel Methanol/Essigester 2:1) gereinigt, mit etherischer Salzsäure versetzt und aus Ethanol kristallisiert. Man erhält 1,26 g (10% d. Th.) Titelverbindung vom Fp. 123–124°C.

Beispiel 8

Analog zu Beispiel 7 werden aus Natriumnitrit und dem entsprechend substituierten 1-Propoxy-2,3-diaminobenzol-Derivat erhalten:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Fp. °C (Lösungsmittel)
a) 4-[2-Hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)propoxy]-7-methyl-benzotriazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)propoxy]-4-methyl-benzol-trihydrochlorid	16	184–186 (Isopropanol)
b) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]-propoxy> benzotriazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-ethylamino]propoxy> benzol-trihydrochlorid	25	113–115 (Methanol/ Ether)
c) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]-propoxy>-7-methyl-benzotriazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-ethylamino]propoxy>-4-methyl-benzol-trihydrochlorid	48	109–111 (Isopropanol/ Methanol)
d) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-hydroxyphenoxy)ethylamino]-propoxy> benzotriazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-hydroxyphenoxy)-ethylamino]propoxy> benzol-trihydrochlorid	14	200–203 (Ethanol/ Methanol)
e) 4-[2-Hydroxy-3-(2-methoxy-phenethyl-amino)propoxy]-benzotriazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(2-methoxy-phenethyl-amino)propoxy]benzol-trihydrochlorid	21	82–85 (Alkohol/ Essigester)
f) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)propylamino]-propoxy> benzotriazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-propylamino]propoxy> benzol-trihydrochlorid	62	amorph
g) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-allyloxyphenoxy)-propylamino]-propoxy> benzotriazol-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-allyloxy-phenoxy)-propylamino]propoxy> benzol-trihydrochlorid	15	143–145 (Ethanol/ Essigester)

Beispiel 9

4-[2-Hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)-propoxy]-2-benzimidazolinthion-hydrochlorid

17,4 g 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)-propoxy]-benzol-trihydrochlorid werden in 450 ml Chloroform und 50 ml Ethanol gelöst und bei Raumtemperatur mit 3,2 ml Thiophosgen in 30 ml Chloroform tropfenweise versetzt.

Nach 2 Stunden wird mit Aktivkohle behandelt und zur Trockne eingengt. Man reinigt über eine

Kieselgelsäule (Chloroform/Methanol 8:2) und erhält 10 g (62% d. Th.) einheitliches Produkt. Nach Aufnehmen in Isopropanol und Versetzen mit etherischer Salzsäure wird mit Essigester die Titelverbindung vom Fp. 108–110°C ausgefällt.

Beispiel 10

Analog Beispiel 9 werden aus Thiophosgen und dem entsprechend substituierten 1-Propoxy-2,3-diaminobenzol-Derivat erhalten:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Fp. °C (Lösungsmittel)
a) 4-[2-Hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)propoxy]-7-methyl-2-benzimidazolinthion-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-[2-hydroxy-3-(3,4-dimethoxy-phenethylamino)propoxy]-4-methyl-benzol-trihydrochlorid		

(19)

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Fp. °C (Lösungsmittel)
b) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)propylamino]-propoxy>-7-methyl-2-benzimidazolinthionbenzoat aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-propylamino]propoxy>-4-methyl-benzol-trihydrochlorid	14	169-170 (Ethanol/ Ether)
c) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methylphenoxy)ethylamino]-propoxy>-2-benzimidazolinthion-hydrochlorid aus 2,3-Diamino-1-<2-hydroxy-3-[2-(2-methylphenoxy)-ethylamino]propoxy>-benzol-trihydrochlorid		

Beispiel 11

4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-hydroxy-phenoxy)-ethylamino]-propoxy>-6,7-cyclopenteno-2-benzimidazolinon-hydrochlorid

In die Lösung von 6,5 g (0,0175 mol) 4,5-Diamino-6-<2-hydroxy-3-[2-(2-hydroxy-phenoxy)-ethylamino]-propoxy>-indan-hydrochlorid in 250 ml Wasser und 100 ml Tetrahydrofuran leitet man 1 Stunde Phosgen ein, spült gründlich mit Stickstoff nach, filtriert, nimmt den Niederschlag in verdünnter Natronlauge auf, wäscht mit Methylenchlorid, stellt die wässrige Phase auf pH 7 ein, extrahiert mit Methylenchlorid, engt ein, nimmt in Aceton auf und fällt mit etherischer Salzsäure das Hydrochlorid aus. Man erhält 2,8 g Titelverbindung (36% d. Th.) als amorphes Salz vom Schmp. 145-155°C.

Die als Ausgangsprodukt verwendete Diamino-verbindung kann auf folgendem Weg hergestellt werden:

Die Kondensation von 5-Amino-6-(2,3-epoxy-propoxy)-4-nitro-indan und N-Benzyl-2-(2-benzyl-oxy-phenoxy)-ethylamin liefert 5-Amino-6-<3-[N-benzyl-2-(2-benzyl-oxy-phenoxy)-ethylamino]-2-hydroxy-propoxy>-4-nitro-indan als Öl.

Durch Hydrierung und hydrogenolytische Debenzylierung der vorstehenden Verbindung als Hydrochlorid in methanolischer Lösung über 10%iger Palladiumkohle gelangt man zu 4,5-Diamino-6-<2-hydroxy-3-[2-(2-hydroxy-phenoxy)-ethylamino]-propoxy>-indan-hydrochlorid vom Schmp. 193-195°C.

Beispiel 12

4-<3-[2-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-2-hydroxy-propoxy>-6,7-cyclopenteno-2-benzimidazolinon-hydrochlorid

Analog dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren erhält man aus Phosgen und 4,5-Diamino-6-<3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-2-hydroxy-propoxy>-indan-hydrochlorid die Titelverbindung als Hydrochlorid vom Schmp. 193-195°C.

Die als Ausgangsprodukt verwendete Diamino-verbindung kann auf folgendem Weg hergestellt werden:

Durch Reaktion von 5-Amino-6-(2,3-epoxy-propoxy)-4-nitro-indan und 3,4-Dimethoxy-phenethylamin erhält man 5-Amino-6-<3-[2-(3,4-dimethoxy-

phenyl)-ethylamino]-2-hydroxy-propoxy>-4-nitro-indan vom Schmp. 230-236°C (als Hydrochlorid).

Die Hydrierung der vorstehenden Verbindung in methanolischer Lösung über Platindioxid liefert 4,5-Diamino-6-<3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-2-hydroxy-propoxy>-indan, das als amorphes Hydrochlorid isoliert wird.

Beispiel 13

4-[2-Hydroxy-3-(2-phenoxy-propylamino)-propoxy]-6,7-cyclopenteno-2-benzimidazolinon-hydrochlorid

Analog dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren erhält man aus Phosgen und 4,5-Diamino-6-[2-hydroxy-3-(2-phenoxy-propylamino)-propoxy]-indan-hydrochlorid die Titelverbindung als Hydrochlorid vom Schmp. 261-263°C.

Die als Ausgangsprodukt verwendete Diamino-verbindung lässt sich wie folgt herstellen:

Die Kondensation von 5-Amino-6-(2,3-epoxy-propoxy)-4-nitro-indan und N-Benzyl-2-phenoxy-propylamin liefert 5-Amino-6-[3-(N-benzyl-2-phenoxy-propylamino)-2-hydroxy-propoxy]-4-nitro-indan vom Schmp. 70-80°C (als amorphes Hydrochlorid).

Durch Hydrierung und hydrogenolytische Debenzylierung der vorstehenden Verbindung in methanolischer Lösung über 10%iger Palladiumkohle gelangt man zu 4,5-Diamino-6-[2-hydroxy-3-(2-phenoxy-propylamino)-propoxy]-indan-hydrochlorid vom Schmp. 153-155°C.

Beispiel 14

4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-hydroxy-phenoxy)-ethylamino]-propoxy>-6,7-cyclopenteno-benzimidazol

Eine Mischung aus 4,1 g (0,01 mol) 4,5-Diamino-6-<2-hydroxy-3-[2-(2-hydroxy-phenoxy)-ethylamino]-propoxy>-indan-hydrochlorid und 35 ml Formamid wird 40 Minuten zum Rückfluss erhitzt, eingeengt, mit Wasser versetzt, mit Methylenchlorid extrahiert, der Extrakt eingeengt und mit Essigester verrieben. Man erhält 1,3 g Titelverbindung (34% d. Th.) vom Schmp. 182-183°C.

Beispiel 15

4-<2-Hydroxy-3-[(1-methyl-3-phenyl)-propylamino]-propoxy>-6-methylindol-benzoat
4,9 g 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol (DE-OS 2 508 251) und 3,7 g (1-Methyl-3-phenyl)-

20

propylamin werden in 50 ml n-Butanol 18 Stunden gerührt, im Vakuum eingengt und mit 1n Milchsäure und Ether geschüttelt. Nach Ausfällen der Base mit verdünnter Natronlauge wird mit Ether/Essigester 1 : 1 extrahiert und über Kieselgel mit Methylenchlorid/Methanol 9 : 1 chromatographisch gereinigt. Die erhaltene Base wird in Essigester gelöst, mit der äquivalenten Menge Ben-

zoesäure versetzt und abgesaugt. Man erhält 2,0 g 4-<2-Hydroxy-3-[(1-methyl-3-phenyl)-propylamino]-propoxy>-6-methylindol-benzoat vom Schmp. 119–122 °C (18% d. Th.).

Beispiel 16

In analoger Weise, wie in Beispiel 15 beschrieben, erhält man:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
a) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethylamino]propoxy>-6-methylindol-benzoat aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(3,4-Dimethoxy-phenyl)ethylamin	27	147–148 (Essigester)
b) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-pyridinyl)ethylamino]propoxy>-6-methylindol-di-p-nitrobenzoat aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(2-Pyridinyl)ethylamin	16	146 (Methanol)
c) 4-[2-Hydroxy-3-(2-phenoxy-ethylamino)propoxy]-6-methylindol-benzoat aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-Phenoxy-ethylamin	16	123–125 (Ether)
d) 4-<2-Hydroxy-3-[(1-methyl-2-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-6-methylindol-benzoat aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und (1-Methyl-2-phenyl)-ethylamin	20	125–128 (Essigester)
e) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)ethylamino]-propoxy>-6-methylindol aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin	19	123–125 (Essigester)
f) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(4-carbamido-phenoxy)ethylamino]-propoxy>-6-methylindol aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(4-Carbamido-phenoxy)ethylamin	19	128–130 (Methanol)
g) 4-[2-Hydroxy-3-(benzo[b]-1,4-dioxan-2-yl-methylamino)-propoxy]-6-methylindol-p-chlorbenzoat aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(Aminomethyl)-1,4-benzo[b]dioxan	14	168–170 (Essigester)
h) 4-[2-Hydroxy-3-(2-phenoxy-N-benzyl-propylamino)-propoxy]-6-methylindol aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-Phenoxy-N-benzyl-propylamin	95	Öl
i) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-N-benzyl-propyl-amino]propoxy>-6-methylindol aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(2-Methoxy-phenoxy)-N-benzyl-propylamin	95	Öl
j) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(5-carbamido-2-pyridoxy)-N-benzyl-ethylamino]propoxy>-6-methylindol aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(5-Carbamido-2-pyridoxy)-N-benzyl-ethylamin	76	Öl
k) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-benzyloxy-phenoxy)ethylamino]propoxy>-6-methylindol aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(2-Benzyloxy-phenoxy)ethylamin	16	Öl
l) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethylamino]propoxy>-6-methoxycarbonylindol aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methoxycarbonylindol und 2-(3,4-Dimethoxy-phenyl)ethylamin	59	145–147 (Isopropanol/ Ether)
m) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethylamino]propoxy>-6-hydroxymethylindol aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-hydroxymethylindol und 2-(3,4-Dimethoxy-phenyl)ethylamin	35	60 (amorph)

21

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
n) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-allyloxy-phenoxy)ethylamino]-propoxy>-6-methylindol aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(Allyloxy-phenoxy)ethylamin	36	125 (Methanol)

Beispiel 17

4-[2-Hydroxy-3-(2-phenoxy-propylamino)-propoxy]-6-methylindol-p-chlorbenzoat

Man hydriert 8 g 4-[2-Hydroxy-3-(2-phenoxy-N-benzyl-propylamino)-propoxy]-6-methylindol (Herstellung siehe Beispiel 16h) in 200 ml Methanol und 5 ml Triethylamin bei Raumtemperatur und 1 bar Wasserstoffdruck über 2 g 10%iger Palladiumkohle, filtriert, engt ein, löst den verbleibenden Rückstand in 50 ml Essigester und

15 versetzt mit der berechneten Menge p-Chlorbenzoesäure. Nach Absaugen und Umkristallisieren erhält man 4,3 g 4-[2-Hydroxy-3-(2-phenoxy-propylamino)-propoxy]-6-methylindol-p-chlorbenzoat vom Schmp. 134–136 °C (42% d. Th.).

20

Beispiel 18

In analoger Weise, wie in Beispiel 17 beschrieben, erhält man:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
a) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)propylamino]propoxy>-6-methylindol aus 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-N-benzyl-propylamino]propoxy>-6-methylindol (s. Bsp. 16i)	58	104–106 (Essigester)
b) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(5-carbamido-2-pyridoxy)ethylamino]propoxy>-6-methylindol-di-p-chlorbenzoat aus 4-<2-Hydroxy-3-[2-(5-carbamido-2-pyridoxy)-N-benzyl-ethylamino]propoxy>-6-methylindol (s. Bsp. 16j)	10	141–143 (Isopropanol)
c) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-hydroxy-phenoxy)ethylamino]propoxy>-6-methylindol-benzoat aus 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-benzyloxy-phenoxy)ethylamino]propoxy>-6-methylindol (s. Bsp. 16k)	72	85–90 (Methanol)

Beispiel 19

4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-6-hydroxymethylindol

Zu einer Suspension von 2,3 g Lithiumaluminiumhydrid in 50 ml absolutem Tetrahydrofuran tropft man eine Lösung von 5,0 g 4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-6-methoxycarbonylindol (Herstellung siehe Beispiel 16i) in 150 ml absolutem Tetrahydrofuran, rührt 12 Stunden bei Raumtemperatur nach, zersetzt unter Kühlung mit Natriumchlorid-Lösung und 10n Natronlauge, filtriert, wäscht mit Tetrahydrofuran nach und engt ein. Der Rückstand wird über eine Kieselgelsäure mit Methylenchlorid/Methanol 9 : 1 gereinigt. Die Base wird mit Ether ausgefällt und abgesaugt. Es werden 2,4 g 4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-6-hydroxymethylindol vom Sinterpunkt 60 °C erhalten (51% d. Th.).

50

55

60

65

Beispiel 20

2-Ethoxycarbonyl-4-[2-hydroxy-3-(3-phenyl-propylamino)-propoxy]-6-methylindol

3,6 g 2-Ethoxycarbonyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-6-methylindol (DE-OS 2 626 890) und 1,76 g 3-Phenyl-propylamin werden in 5 ml Hexamethylphosphorsäuretriamid bis zur völligen Umsetzung bei Raumtemperatur gerührt, in Wasser und Ether aufgenommen, die Etherphase mit 1n Weinsäure extrahiert und die Base mit Kaliumcarbonatlösung freigesetzt. Nach Ausschütteln mit Ether, Trocknen und Eindampfen verbleiben 2,0 g 2-Ethoxycarbonyl-4-[2-hydroxy-3-(3-phenyl-propylamino)-propoxy]-6-methylindol vom Schmp. 127 °C (33% d. Th.).

Herstellung des Acetats:

1,4 g 2-Ethoxycarbonyl-4-[2-hydroxy-3-(3-phenyl-propylamino)-propoxy]-6-methylindol werden unter leichtem Erwärmen in 10 ml Essigester ge-

löst, mit 0,2 ml Essigsäure versetzt und nach Erkalten abgesaugt. Man erhält 1,3 g 2-Ethoxycarbonyl-4-[2-hydroxy-3-(3-phenyl-propylamino)-propoxy]-6-methylindol als Acetat vom Schmp. 155°C.

Beispiel 21

In analoger Weise, wie in Beispiel 20 beschrieben, erhält man:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
a) 2-Ethoxycarbonyl-4- < 2-hydroxy-3-[(1-methyl-3-phenyl)-propyl-amino]propoxy > -6-methylindol aus 2-Ethoxycarbonyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-6-methylindol und (1-Methyl-3-phenyl)-propylamin	28	133-134 (Essigester)
b) 2-Ethoxycarbonyl-4- < 2-hydroxy-3-[2-(2-pyridinyl)-ethylamino]propoxy > -6-methylindol-benzoat aus 2-Ethoxycarbonyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(2-Pyridinyl)ethylamin	20	129-131 (Essigester)
c) 2-Ethoxycarbonyl-4- < 2-hydroxy-3-[2-(4-pyridinyl)-ethylamino]propoxy > -6-methylindol aus 2-Ethoxycarbonyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(4-Pyridinyl)ethylamin	32	133-134 (Ether)
d) 2-Ethoxycarbonyl-4-[2-hydroxy-3-(2-phenoxy-ethylamino)propoxy]-6-methylindol-benzoat aus 2-Ethoxycarbonyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-Phenoxy-ethylamin	24	147 (Essigester)
e) 2-Ethoxycarbonyl-4- < 2-Hydroxy-3-[(1-methyl-2-phenoxy)ethylamino]propoxy > -6-methylindol-benzoat aus 2-Ethoxycarbonyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-6-methylindol und 1-Methyl-2-phenoxy-ethylamin	23	135-137 (Ether)
f) 2-Ethoxycarbonyl-4- < 2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)ethylamino]propoxy > -6-methylindol aus 2-Ethoxycarbonyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(2-Methoxy-phenoxy)ethylamin	21	145-147 (Essigester)
g) 2-Ethoxycarbonyl-4- < 2-hydroxy-3-[2-(4-carbamido-phenoxy)ethylamino]propoxy > -6-methylindol-acetat aus 2-Ethoxycarbonyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(4-Carbamido-phenoxy)ethylamin	18	160-165 (Essigester)
h) 2-Ethoxycarbonyl-4-[2-hydroxy-3-(benzo[b]-1,4-dioxan-2-yl-methylamino)propoxy]-6-methylindol aus 2-Ethoxycarbonyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-6-methylindol und 2-(Aminomethyl)-1,4-benzo[b]dioxan	25	135-137 (Ether)

Beispiel 22

4-[2-Hydroxy-3-(3-phenyl-propylamino)-propoxy]-indazol

5 g 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-indazol und 25 g 3-Phenyl-propylamin werden 20 Stunden bei 50°C gerührt. Man destilliert überschüssiges Amin im Vakuum ab, reibt den Rückstand mit Ether an, saugt ab und kristallisiert aus Essigester um. Es werden 4,3 g 4-[2-Hydroxy-3-(3-phenylpropylamino)-propoxy]-indazol vom Schmp. 122-124°C erhalten (50% d. Th.).

55

Beispiel 23

4- < 2-Hydroxy-3-[(1-methyl-2-phenoxy)-äthylamino]-propoxy > -indazol

5 g 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-indazol und 4,17 g (1-Methyl-2-phenoxy-Ethyl)-amin werden in 10 ml 1,2-Dimethoxyethan 20 Stunden auf 50°C erwärmt. Nach Anreiben mit Aceton, Absaugen und Umkristallisieren aus Isopropanol erhält man 3,7 g 4- < 2-Hydroxy-3-[(1-methyl-2-phenoxy)-ethylamino]-propoxy > -indazol vom Schmp. 175-177°C (41% d. Th.).

60

65

23

Beispiel 24

2-Benzyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]propoxy > -indazol

17 g 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-indazol und 20 g 2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamin werden 20 Stunden bei 70°C gerührt. Man löst überschüssiges Amin durch Ausrühren mit Ether und

saugt ab. Es werden 19,1 g Titelverbindung vom Schmp. 101–102°C erhalten (74% d. Th.).

Beispiel 25

In analoger Weise, wie in Beispiel 24 beschrieben, erhält man:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
2-Benzyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(2-benzyloxy-phenoxy)-ethylamino]propoxy > indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(2-Benzylloxy-phenoxy)ethylamin	91	81–83 (Ethanol)

Beispiel 26

2-Benzyl-4-[2-hydroxy-3-(2-phenoxy-ethylamino)-propoxy]-indazol

5 g 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-indazol und 2,6 g 2-Phenoxy-ethylamin werden in 10 ml 1,2-Dimethoxyethan 48 Stunden auf 50°C erwärmt. Man engt ein, löst in Methylenchlorid und reinigt chromatographisch über eine Kieselgelsäule mit den

Laufmitteln Methylenchlorid/Essigester 8:2 und Essigester. Nach Eindampfen werden 4,2 g Titelverbindung als viskoses Öl erhalten (56% d. Th.).

Beispiel 27

In analoger Weise, wie in Beispiel 26 beschrieben, erhält man:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
a) 2-Benzyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-ethylamino]propoxy > indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(2-Methoxy-phenoxy)ethylamin	52	Öl
b) 2-Benzyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-propylamino]propoxy > indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(Methoxy-phenoxy)propylamin	83	Öl
c) 2-Benzyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(4-pyridil)ethylamino]-propoxy > indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(4-Pyridil)ethylamin	51	Öl
d) 2-Benzyl-4-[2-hydroxy-3-(benzo[b]-1,4-dioxan-2-yl-methylamino)propoxy]indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(Aminomethyl)-1,4-benzo[b]dioxan	47	Öl
e) 2-Benzyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(3,4-ethylendioxyphenyl)-ethylamino]propoxy > indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(3,4-Ethylendioxyphenyl)ethylamin	76	165–168 (Isopropanol)
f) 2-Benzyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(3-ethoxy-4-methoxy-phenyl)ethylamino]propoxy > indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(3-Ethoxy-4-methoxy-phenyl)ethylamin	85	Öl
g) 2-Benzyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-ethylamino]propoxy > indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)ethylamin	88	Öl
h) 2-Benzyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(4-benzyloxy-3-methoxy-phenyl)ethylamino]propoxy > -indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(4-Benzylloxy-3-methoxy-phenyl)ethylamin	78	96–98 (Methanol)
i) 2-Benzyl-4- <2-hydroxy-3-[2-(3-benzyloxy-4-butoxy-phenyl)ethylamino]propoxy > indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(3-Benzylloxy-4-butoxy-phenyl)ethylamin	80	Öl

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
j) 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(3,4-dibenzyloxyphenyl)-ethylamino]propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(3,4-Dibenzyloxy-phenyl)ethylamin	84	Öl
k) 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(2-pyridoxy)ethylamino]-propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(2-Pyridoxy)ethylamin	64	Öl

Beispiel 28

2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(2-hydroxy-phenoxy)-N-benzyl-propylamino]-propoxy>-indazol
4,2 g 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-indazol
und 3,85 g 2-(2-Hydroxy-phenoxy)-N-Benzyl-propylamin werden in 30 ml Dioxan 4d unter Stickstoff am Rückfluss gekocht. Man engt ein, löst in Methylenchlorid und reinigt chromatographisch

über eine Kieselgelsäule. Nach Eindampfen verbleiben 5,8 g Titelverbindung als viskoses Öl (72% d. Th.).

20

Beispiel 29

In analoger Weise, wie in Beispiel 23 beschrieben, erhält man:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(4-acetamido-phenoxy)-N-benzyl-ethylamino]propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)indazol und 2-(4-Acetamido-phenoxy)-N-benzyl-ethylamin	67	Öl

Das als Ausgangsprodukt verwendete 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-indazol kann wie folgt erhalten werden:

Man trägt unter Kühlen und Stickstoffatmosphäre 9,2 g Natriumhydrid-Paraffin (55-60%ige Suspension) in eine Lösung von 47,1 g 2-Benzyl-4-hydroxyindazol in 250 ml Dimethylformamid ein, tropft nach beendeter H₂-Entwicklung 19 ml Epibromhydrin zu und rührt 16 Stunden bei Raumtemperatur. Danach rührt man in 1,5 l Wasser ein, extrahiert mit Methylenchlorid und reinigt über eine Kieselgelsäule mit Methylenchlorid/Methanol 99 : 1. Nach Anreiben mit Ligroin/Äther 1 : 1 und Absaugen werden 30 g 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-indazol vom Schmp. 66-68°C erhalten (51% d. Th.).

35

Beispiel 30

4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-indazol

19,1 g 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-indazol (Herstellung siehe Beispiel 24) werden in 700 ml Methanol und 22,4 ml konzentrierte Salzsäure über 2 g 10%iger Palladium-Kohle hydriert. Nach Absaugen wird eingengt, in Wasser gelöst, mit Natronlauge alkalisch gestellt und mit Methylenchlorid extrahiert. Die organische Phase wird eingengt, mit Ether verrieben und abgesaugt.

40

45

Es werden 9,1 g Titelverbindung vom Schmp. 118-119°C erhalten (59% d. Th.).

Durch Lösen in Ethanol und Zugabe von etherischer Salzsäure erhält man das Hydrochlorid vom Schmp. 157-159°C.

50

In analoger Weise, wie oben beschrieben, erhält man:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
a) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-hydroxy-phenoxy)ethylamino]-propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(2-benzyloxy-phenoxy)-ethylamino]propoxy>indazol (s. Bsp. 25)	41	137-139 (Isopropanol)
b) 4-[2-Hydroxy-3-(2-phenoxy-ethylamino)propoxy]indazol aus 2-Benzyl-4-[2-hydroxy-3-(2-phenoxy-ethylamino)propoxy]indazol (s. Bsp. 26)	88	134-135 (Essigester)

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
c) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)ethylamino]-propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-ethylamino]propoxy>indazol (s. Bsp. 27a)	82	106-107 (Essigester)
d) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)propylamino]propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)propylamino]propoxy>indazol (s. Bsp. 27b)	58	127-128 (Essigester)
e) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(4-pyridyl)ethylamino]propoxy>-indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(4-pyridyl)ethylamino]-propoxy>indazol (s. Bsp. 27c)	72	123-125 (Essigester)
f) 4-[2-Hydroxy-3-(benzo[b]-1,4-dioxan-2-yl-phenylamino)propoxy]indazol aus 2-Benzyl-4-[2-hydroxy-3-(benzo[b]-1,4-dioxan-2-yl-methylamino)propoxy]indazol (s. Bsp. 27d)	54	142-143 (Essigester)
g) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-hydroxy-phenoxy)propylamino]-propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(2-hydroxy-phenoxy)-N-benzyl-propylamino]propoxy>indazol (s. Bsp. 28)	57	92-95 (Essigester)
h) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(4-acetamido-phenoxy)ethylamino]propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(4-acetamido-phenoxy)-N-benzyl-ethylamino]propoxy>indazol (s. Bsp. 29)	49	130-133 (Ethanol/ Wasser)
i) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-ethylendioxy-phenyl)ethylamino]propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(3,4-ethylendioxy-phenyl)-ethylamino]propoxy>indazol (s. Bsp. 27e)	59	125-126 (Essigester)
j) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(3-ethoxy-4-methoxy-phenyl)-ethylamino]propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(3-ethoxy-4-methoxy-phenyl)-ethylamino]propoxy>indazol (s. Bsp. 27f)	73	118-119 (Essigester)
k) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)ethylamino]propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-ethylamino]propoxy>indazol (s. Bsp. 27g)	63	171-172 (Essigester)
l) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-ethylamino]propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(4-benzyloxy-3-methoxy-phenyl)ethylamino]propoxy>indazol (s. Bsp. 27h)	57	139-141 (Isopropanol/ Essigester)
m) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(4-butoxy-3-hydroxy-phenyl)ethylamino]propoxy>indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(3-benzyloxy-4-butoxy-phenyl)ethylamino]propoxy>indazol (s. Bsp. 27i)	55	94-97 (Essigester)
n) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dihydroxy-phenyl)ethylamino]-propoxy>indazol-acetat aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(3,4-dibenzyloxy-phenyl)-ethylamino]propoxy>indazol (s. Bsp. 27j)	46	160-162 (Ethanol)
o) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-pyridoxy)ethylamino]propoxy>-indazol aus 2-Benzyl-4-<2-hydroxy-3-[2-(2-pyridoxy)ethylamino]-propoxy>indazol (s. Bsp. 27k)	52	113-115 (Essigester)

Beispiel 31a

4-<2-Hydroxy-3-[1-(3,4-dimethoxy-phenyl)-propyl-2-amino]-propoxy>-indazol

Ein Gemisch aus 4 g 2-Benzyl-4-(3-amino-2-hydroxy-propoxy)-indazol und 3 g 3,4-Dimethoxy-phenyl-aceton wird in 100 ml Methanol in Gegen-

60

wart von 1,5 10%iger Palladiumkohle hydriert. Nach Aufnahme von 1 mol Wasserstoff werden 10 ml konzentrierter Salzsäure zugegeben und bis zur weiteren Aufnahme von 1 mol Wasserstoff geschüttelt.

65

Nach Absaugen und Einengen nimmt man in Wasser und Methylenchlorid auf. Nach Abtrennen der wässrigen Phase wird alkalisch gestellt und mit Methylenchlorid/Methanol 10:1 extrahiert. Nach Trocknen und Eindampfen wird das erhaltene Diastereomerenmisch aus Essigester umkristallisiert. Es werden so 1,1 g der Fraktion A der Titelverbindung vom Schmp. 110–112°C erhalten (21% d. Th.).

Durch Einengen der Mutterlauge und Anreiben mit Ether werden nach Absaugen 1,5 g der Fraktion B der Titelverbindung vom Schmp. 66–73°C erhalten (29% d. Th.).

Das als Ausgangsprodukt verwendete 2-Benzyl-4-(3-amino-2-hydroxy-propoxy)-indazol kann wie folgt erhalten werden:

12 g 2-Benzyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-indazol werden im Autoklav in 100 ml flüssigem Ammoniak 8 Stunden bei 50°C geschüttelt. Man erhält nach Aufnehmen mit Essigester, Absaugen und Nachwaschen 9,3 g der Titelverbindung vom Schmp. 113–115°C (73% d. Th.).

Beispiel 31b

4-<2-Hydroxy-3-[3-(3,4-dimethoxy-phenyl)-propylamino]-propoxy>-indazol-benzoat

6,6 g 4-(3-Amino-2-hydroxy-propoxy)-indazol (Rohprodukt) werden in 80 ml Methylenchlorid gegenwart von 3,1 ml Triethylamin mit 5,1 g 3-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-propionylchlorid 48 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Nach Ausschütteln mit Wasser, Trocknen und Eindampfen verbleiben 9,1 g 4-<2-Hydroxy-3-[3-(3,4-dimethoxyphenyl)-propionamido]-propoxy>-indazol (Schmp. 148–150°C aus Nitromethan).

Das erhaltene Rohprodukt wird in 120 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran mit 1,7 g Lithiumaluminiumhydrid unter Stickstoffatmosphäre 26 Stunden bei 60°C gerührt. Nach der üblichen Zerlegung und Aufarbeitung wird das erhaltene Öl über eine Kieselgelsäule (Laufmittel: Essigester-Methanol 9:1–6:4) gereinigt. Nach Einengen der gewünschten Fraktionen werden 1,7 g farbloses Öl erhalten. Durch Auflösen in Ethanol und Zugabe der berechneten Menge Benzoesäure werden nach Einengen und Zusatz von Ether 1,75 g 4-<2-Hydroxy-3-[3-(3,4-dimethoxy-phenyl)-propylamino]-propoxy>-indazol-benzoat vom Schmp. 131–134°C (15% d. Th.) erhalten.

Das als Ausgangsprodukt verwendete 4-(3-Amino-2-hydroxy-propoxy)-indazol kann wie folgt erhalten werden:

5,1 g 1-Acetyl-4-(2,3-epoxy-propoxy)-indazol, gelöst in 50 ml Methanol werden im Autoklaven mit 250 ml flüssigem Ammoniak 8 Stunden bei 50°C gerührt. Man behandelt die erhaltene Lösung mit Aktivkohle, engt ein und erhält 6,6 g der

Titelverbindung als Rohprodukt, welches ohne weitere Reinigung zur nächsten Stufe eingesetzt werden kann.

5 Beispiel 32

1-Pivaloyl-4-<2-pivaloyloxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-indazol-hydrochlorid

Man rührt ein Gemisch aus 4,2 g 4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-indazol-hydrochlorid (Herstellung s. Beispiel 30), 4,2 ml Pivalinsäureanhydrid und 35 ml Pivalinsäure 50–60 Stunden bei 75°C. Die erhaltene feste Masse wird mit Ligroin gerührt, abgesaugt und mit Ligroin gewaschen. Es verbleiben 4,1 g Titelverbindung vom Schmp. 155–158°C (69% d. Th.).

20 Beispiel 33

4-<2-Pivaloyloxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-indazol

4,0 g 1-Pivaloyl-4-<2-pivaloyloxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-indazol-hydrochlorid (Herstellung siehe Beispiel 32) werden mit 150 ml Isopropylamin 2,5 Stunden unter Rückfluss erhitzt. Man engt ein, löst in Ether, schüttelt mit 1n Natronlauge und reinigt die organische Phase chromatographisch über eine Kieselgelsäule (Laufmittel: Methylenchlorid/Essigester 1:1). Es werden 2,7 g Titelverbindung als Öl erhalten (85% d. Th.).

35 Beispiel 34

4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-1-formylindolin-benzoat

2,2 g 4-(2,3-Hypoxy-propoxy)-1-formylindolin und 1,8 g 2-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-ethylamin werden in 50 ml n-Butanol 18 Stunden bei Raumtemperatur gerührt, im Vakuum eingengt und in Ether und 1n Milchsäure aufgenommen. Die wässrige Phase wird mit 2n Natronlauge alkalisch gestellt und mit Methylenchlorid extrahiert. Nach Trocknen und Eindampfen verbleiben 4 g Rohprodukt. Dieses wird über eine Kieselgelsäule mit Methylenchlorid/Methanol 95:5 gereinigt. So werden 1,3 g gereinigte Base erhalten, welche in 50 ml Essigester gelöst und mit der äquivalenten Menge Benzoesäure versetzt werden. Nach Absaugen verbleiben 1,3 g 4-<2-Hydroxy-3-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)-ethylamino]-propoxy>-1-formylindolin-benzoat vom Schmp. 136–138°C (24% d. Th.).

55 Beispiel 35

In analoger Weise, wie in Beispiel 34 beschrieben, erhält man:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
a) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(4-fluor-phenoxy)ethylamino]propoxy>-1-formylindolin-benzoat aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-1-formylindolin und 2-(4-Fluorphenoxy)ethylamin	20	121–123 (Essigester)

27

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
b) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)ethylamino]-propoxy>-1-formylindolin-benzoat aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-1-formylindolin und 2-(2-Methoxy-phenoxy)ethylamin	19	78-79 (Essigester)
c) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-N-benzyl-propyl-amino]propoxy>-1-formylindolin aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-1-formylindolin und 2-(2-Methoxy-phenoxy)-N-benzyl-propylamin	90	Öl
d) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-benzyloxy-phenoxy)-N-benzyl-ethylamino]propoxy>-1-formylindol aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-1-formylindolin und 2-(2-Benzyloxy-phenoxy)-N-benzyl-ethylamin	95	Öl
e) 4-[2-Hydroxy-3-(2-phenyl-ethylamino)propoxy]-1-formylindolin aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-1-Formylindolin und 2-Phenyl-ethylamin	18	121-123 (Essigester)
f) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-chlor-phenoxy)ethylamino]-propoxy>-1-formylindolin aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-1-formylindolin und 2-(2-Chlor-phenoxy)ethylamin	15	104-107 (Essigester)
g) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methylmercapto-phenoxy)-ethylamino]propoxy>-1-formylindolin aus 4-(2,3-Epoxy-propoxy)-1-formylindolin und 2-(Methylmercapto-phenoxy)ethylamin	20	129-130 (Methanol)

Beispiel 36

4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-propylamino]-propoxy>-1-formylindolin-benzoat

Man hydriert 6,7 g 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-N-benzyl-propylamino]-propoxy>-1-formylindolin (Herstellung siehe Beispiel 35c) in 250 ml Methanol und 20 ml Triethylamin bei Raumtemperatur und 1 bar Wasserstoffdruck über 2 g 10%iger Palladiumkohle, filtriert, engt ein und löst

35

den verbleibenden Rückstand in 50 ml Essigester und versetzt mit der äquivalenten Menge Benzoesäure. Nach Absaugen erhält man 2,1 g 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxy-phenoxy)-propylamino]-propoxy>-1-formylindolin-benzoat vom Schmp. 131-135 °C (31% d Th.).

40

Beispiel 37

In analoger Weise, wie in Beispiel 36 beschrieben, erhält man:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Smp. °C (Lösungsmittel)
4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-hydroxy-phenoxy)ethylamino]propoxy> 1-formylindolin-acetat aus 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-benzyloxy-phenoxy)-N-benzyl-ethylamino]propoxy> 1-formylindolin (s. Bsp. 35d)	41	171-173 (Essigester)

Die zur Herstellung der vorstehenden Verbindungen benötigten Ausgangsstoffe werden wie folgt hergestellt:

4-(2,3-Epoxy-propoxy)-1-formylindolin

48,6 g 2-Benzyloxy-6-nitrotoluol gelöst in 670 ml Dimethylformamid werden mit 29,9 g Paraformaldehyd versetzt und anschliessend werden 200 ml 1n Kalium-tert.-butylatlösung zugetropft. Nach 1 Stunde Rühren bei Raumtemperatur wird in 3 l Eiswasser eingerührt und mit Ether extrahiert. Die Etherphase wird mit Natriumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Es verbleiben 62 g 2-Benzyloxy-6-nitrophenylethanol,

55

welches als Rohprodukt in die nächste Stufe eingesetzt wird.

60

62 g 2-Benzyloxy-6-nitrophenylethanol werden in 500 ml wasserfreiem Pyridin gelöst und unter Kühlen bei ca. 10 °C mit 47,7 g p-Toluolsulfonylchlorid versetzt. Man lässt auf Raumtemperatur ansteigen und rührt bis zur völligen Umsetzung ca. 10 Stunden. Die Reaktionslösung wird in Eiswasser eingerührt. Nach Absaugen, Waschen mit Wasser und Trocknen verbleiben 74 g p-Toluolsulfonsäure-2-(2-benzyloxy-6-nitro-phenyl)-ethyl-ester vom Schmp. 96-98 °C (86% d. Th., bezogen auf 2-Benzyloxy-6-nitrotoluol).

65

74 g p-Toluolsulfonsäure-2-(2-benzyloxy-6-nitro-phenyl)-ethylester werden in 2 l Ethylenglykolmonomethylether gelöst, mit 5 g 10%iger Palladium-Aktivkohle versetzt und bei Raumtemperatur und 1 bar Wasserstoffdruck hydriert. Nach Entfernen des Katalysators wird eingeeengt und der Rückstand mit einer Mischung aus 227 ml Essigsäureanhydrid und 91 ml Ameisensäure [nach C.W. Huffmann, J. org. Chem. 23, 727 (1958)] formyliert. Nach der Umsetzung wird mit Eiswasser zersetzt und mit Essigester extrahiert. Die organische Phase wird neutralisiert, mit Natriumsulfat getrocknet und im Vakuum eingedampft. Der verbleibende Rückstand wird mit 320 ml Epichlorhydrin vermischt und mit 173 ml 2n Natriummethylatlösung versetzt. Nach Rühren über Nacht wird eingeeengt und der Rückstand in Wasser und Essigester gelöst. Aus dem Essigesterrückstand werden durch Anreiben mit Isopropylalkohol und Absaugen 15,8 g 4-(2,3-Epoxypropoxy)-1-formylindolin vom Schmp. 88–89°C erhalten (42% d. Th.).

Beispiel 38

Es wurden Tabletten hergestellt: Jede Tablette enthält 10 mg 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-ethylamino]-propoxy>-methyl-2-benzimidazolinon-hydrochlorid. Die Tabletten wurden gemäss der folgenden Rezeptur hergestellt:

4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)-ethylamino]-propoxy>-methyl-2-benzimidazolinon-hydrochlorid	10 g
Lactose	80 g
Stärke	29 g
Magnesiumstearat	1 g

Vorstehende Verbindung wurde fein pulverisiert und mit Lactose und Stärke vermischt. Das Gemisch wurde in herkömmlicher Weise granuliert. Magnesiumstearat wurde zu dem Granulat gegeben und das Gemisch zu 1000 Tabletten mit einem Einzelgewicht von 0,12 g verpresst.

Beispiel 39

In analoger Weise, wie in Beispiel 23 beschrieben, erhält man:

Bezeichnung	Ausb. % d. Th.	Fp. °C (Lösungsmittel)
a) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-allylphenoxy)-ethyl-amino]-propoxy>-indazol aus 4-(2,3-Epoxypropoxy)-indazol und 2-(2-Allylphenoxy)-ethylamin	47	125–126 (Essigester)
b) 4-<2-Hydroxy-3-[2-(2-allyloxyphenoxy)-ethyl-amino]-propoxy>-indazol aus 4-(2,3-Epoxypropoxy)-indazol und 2-(2-Allyloxyphenoxy)-ethylamin	45	137–139 (Essigester)

Versuchsprotokoll

Die erfindungsgemässen Verbindungen wurden hinsichtlich ihrer vasodilatierenden und β -blockierenden Aktivität an Kaninchen geprüft. Da beide Eigenschaften nicht in einem einzigen Versuchsmodell geprüft werden können, mussten verschiedene Versuchsanordnungen gewählt werden.

a) Prüfung auf vasodilatierende Aktivität

Kaninchen wurden mit 26%igem Urethan 5 ml/kg narkotisiert. Zur fortlaufenden Messung des arteriellen Blutdruckes wurde ein Katheter in die A. femoralis implantiert. Die Messung des Blutdruckes erfolgte mittels eines elektromechanischen Druckwandlers (Statham P 23 Db). Die Impulse wurden auf einem Direktschreiber aufgezeichnet und nach Eichen mit einem Quecksilbermanometer ausgewertet.

Nach Ermittlung des Ausgangswertes wurden beide Halsschlagadern (A. carotis) für 2 Minuten occludiert und auf diese Weise der Blutdruck temporär erhöht (Carotis-Sinus-Entlastungs-Reflex – CSE). Anschliessend wurde die Prüfsubstanz in der niedrigsten Prüfdosis (0,125 mg/kg) i.v. injiziert und 8 Minuten später der CSE-Reflex erneut ausgelöst. Im Abstand von jeweils 15 Minuten wurden in logarithmisch steigender Dosierung

(Faktor 2) die Prüfsubstanzen erneut injiziert und der CSE wiederum ausgelöst.

Substanzen, die unter diesen Bedingungen den Anstieg des Blutdruckes unter CSE abschwächen, können als vasodilatierend angesehen werden. Zur Abschätzung der blutdrucksenkenden Wirkqualität wurde von den Prüfsubstanzen die Dosis, die den CSE-Reflex um 30 mm Hg abschwächt (ED_{-30 mm Hg}), berechnet.

b) Prüfung auf β -blockierende Aktivität

Kaninchen wurden in Holzkäfigen fixiert, die Herzfrequenz wurde bei ihnen über Stichelektroden abgeleitet und auf einem Frequenzzählgerät (Messzeit 15 Sekunden) abgelesen. Über eine Ohrvene wurde zunächst 1 μ g/kg Isoprenalin i.v. injiziert, was eine Erhöhung der Herzfrequenz von ca. 210 Schlägen/Min. auf ca. 370 Schläge/Min. bewirkt. Anschliessend wurden die Prüfsubstanzen in steigender Dosierung (siehe Methode a) i.v. zugeführt und die Herzfrequenz nach Isoprenalin erneut abgelesen. Die Hemmung der Isoprenalin-Tachycardie ist als Mass für die β -Blockade anzusehen. Es wurde die Dosis der Prüfsubstanzen bestimmt, die den Anstieg von Isoprenalin um 50% abschwächt (HD₅₀).

Die Daten aus beiden Versuchen sind in Tabelle I wiedergegeben. Die Berechnung der äquief-

fektiven Dosen ($ED_{-30 \text{ mm Hg}}$ bzw. HD_{50}) wurden auf logarithmischer Basis 4–6 bzw. 6–10 Einzelversuchen vorgenommen. Die aus beiden Versuchen errechneten Dosen (HD_{50} und $ED_{-30 \text{ mm Hg}}$) wurden ins Verhältnis zueinander gesetzt.

Alle geprüften Substanzen besitzen starke β -blockierende Eigenschaften und darüber hinaus eine ausgeprägte blutdrucksenkende Qualität.

Da beide Wirkungen erwünscht sind, sollte das Auftreten beider Effekte durch möglichst naheliegende Dosen bewirkt werden, da sonst der Nutzen einer 2. Wirkqualität (wegen relativer Unterdosierung) nicht relevant würde. Optimal erscheint aus theoretischer Sicht ein Quotient von 1. Da jedoch klinische Erfahrungen noch nicht vorliegen, kommt auch allen Substanzen mit nicht allzu stark von 1 abweichenden Quotienten Interesse zu.


Tabelle I

Vasodilatierende und β -blockierende Aktivität der erfindungsgemässen Substanzen im Vergleich zu dem Handelsprodukt
PROPRANOLOL = 1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol

Beispiel Nr.	$ED_{-30 \text{ mm Hg}}$ (vasodilat. Akt.) ($\mu\text{g/kg i.v.}$)	HD_{50} (β -blockierende Akt.) ($\mu\text{g/kg i.v.}$)	$\frac{HD_{50}}{ED_{-30 \text{ mm Hg}}}$
2d	641	406	0,63
3	1410	2485	1,76
4a	3420	762	0,22
4b	1910	3460	1,81
4c	2240	5222	2,33
4f	1660	931	0,51
4h	3170	1338	0,42
4i	5790	4338	0,75
7	3060	544	0,18
11	1160	233	0,20
15	400	59	0,15
16a	1359	160	0,12
16b	1580	487	0,31
16c	1920	569	0,30
16l	280	105	0,36
18c	420	252	0,60
30f	1980	154	0,21
34	3780	1253	0,33
35b	1620	991	0,61
Propranolol	> 3550	393	< 0,11

Patentansprüche

1. Heterocyclische Oxypropanol-Derivate der allgemeinen Formel I



in welcher

R_1 Wasserstoff, eine Aralkyl-, C_{1-6} -Alkyl- oder C_{1-6} -Alkanoylgruppe,

R_2 und R_3 , die gleich oder verschieden sein können, jeweils Wasserstoff, eine Alkoxy-carbonyl-, C_{1-6} -Alkyl-, C_{1-4} -Hydroxyalkyl- oder (C_{1-6} -Alkanoyl)alkylgruppe sowie gemeinsam einen Alkylrest mit bis 6 C-Atomen,

R_4 Wasserstoff, eine C_{1-6} -Alkanoylgruppe oder eine Aroylgruppe,

R_5 Wasserstoff, eine C_{1-6} -Alkylgruppe oder eine Aralkylgruppe,

R_6 Wasserstoff oder eine C_{1-6} -Alkylgruppe,

R_7 Wasserstoff, eine Hydroxygruppe oder eine C_{1-6} -Alkylgruppe,


Z einen Valenzstrich, eine Methylengruppe, ein Sauerstoff- oder Schwefelatom,

Ar einen carbocyclischen Arylrest oder einen Pyridylrest,

R_8 , R_9 und R_{10} die gleich oder verschieden sein können, jeweils Wasserstoff, Halogen, eine Hydroxygruppe, eine C_{1-6} -Alkanoylgruppe, eine C_{1-6} -Alkylgruppe, eine Alkenylgruppe mit bis 8 C-Atomen, eine C_{1-6} -Alkoxygruppe, eine Aralkoxygruppe, die Allyloxygruppe, eine C_{1-6} -Alkylthiogruppe, eine Aminocarbonylgruppe, eine Aminosulfonylgruppe, eine C_{1-6} -Alkanoylaminogruppe oder R_8 und R_9 gemeinsam eine Niederalkylendioxygruppe oder R_8 gemeinsam mit R_9 auch eine $-\text{CH}_2-\text{O}-$ Gruppe und

A die Gruppe X_1-Y_1 , in der X_1 einen Methylen- oder $-NR_{11}$ -Rest, wobei R_{11} Wasserstoff oder eine C_{1-6} -Alkylgruppe bedeutet, und Y_1 einen Methylenrest oder die Gruppe $>C=Q$, wobei Q für Sauerstoff oder Schwefel steht, vorstellen, oder die Gruppe $X_2=Y_2$, in der X_2 und Y_2 gleich oder verschieden sein können und jeweils für ein Stickstoffatom oder für eine $=CR_{12}$ -Gruppe stehen, wobei R_{12} Wasserstoff, eine Alkoxycarbonylgruppe oder eine C_{1-6} -Alkylgruppe vorstellt, wobei für den Fall, dass $X_2=Y_2$ eine $-CH=N$ -Gruppe und R_1 eine Aralkylgruppe oder eine C_{1-6} -Alkylgruppe vorstellen, diese wegen der Tautomeriefähigkeit der Indazole auch an dem für Y_2 stehenden Stickstoffatom lokalisiert sein kann, mit der Massgabe, dass jeweils Y_1 mit dem Rest $N-R_1$ der allgemeinen Formel I verbunden ist, bedeuten, wobei für den Fall, dass Q ein Sauerstoffatom oder $X_2=Y_2$ eine $-CR_{12}=CR_{12}$ -Gruppe bedeutet, entweder die beiden Reste R_2 und R_3 nicht gleichzeitig Wasserstoff sein können oder R_7 und R_8 zusammen eine $-CH_2-O$ -Brücke bilden müssen, sowie deren pharmakologisch verträglichen Salze.

2. Verfahren zur Herstellung von Aminopropanderivaten der allgemeinen Formel I



in welcher

R_1 Wasserstoff, eine Aralkyl-, C_{1-6} -Alkyl- oder C_{1-6} -Alkanoylgruppe,

R_2 und R_3 , die gleich oder verschieden sein können, jeweils Wasserstoff, eine Alkoxycarbonyl-, C_{1-6} -Alkyl-, C_{1-6} -Hydroxyalkyl- oder (C_{1-6} -Alkanoyl)oxyalkylgruppe sowie gemeinsam einen Alkylrest mit bis 6 C-Atomen,

R_4 Wasserstoff, eine C_{1-6} -Alkanoylgruppe oder eine Aroylgruppe,

R_5 Wasserstoff, eine C_{1-6} -Alkylgruppe oder eine Aralkylgruppe,

R_6 Wasserstoff oder eine C_{1-6} -Alkylgruppe,

R_7 Wasserstoff, eine Hydroxygruppe oder eine C_{1-6} -Alkylgruppe,


Z einen Valenzstrich, eine Methylengruppe, ein Sauerstoff- oder Schwefelatom,

Ar einen carbocyclischen Arylrest oder einen Pyridylrest,


R_8 , R_9 und R_{10} , die gleich oder verschieden sein können, jeweils Wasserstoff, Halogen, eine Hydroxygruppe, eine C_{1-6} -Alkanoylgruppe, eine C_{1-6} -Alkylgruppe, eine Alkenylgruppe mit bis 6 C-Atomen, eine C_{1-6} -Alkoxygruppe, eine Aralkoxygruppe, die Allyloxygruppe, eine C_{1-6} -Alkylthio-Gruppe, eine Aminocarbonylgruppe, eine Aminosulfonylgruppe, eine C_{1-6} -Alkanoylaminogruppe oder R_8 und R_9 gemeinsam eine Niederalkylen-dioxygruppe oder R_8 gemeinsam mit R_9 auch eine $-CH_2-O$ -Gruppe und

A die Gruppe X_1-Y_1 , in der X_1 einen Methylen- oder $-NR_{11}$ -Rest, wobei R_{11} Wasserstoff oder eine C_{1-6} -Alkylgruppe bedeutet, und Y_1 einen Methylenrest oder die Gruppe $>C=Q$, wobei Q für Sauerstoff oder Schwefel steht, vorstellen, oder die Gruppe $X_2=Y_2$, in der X_2 und Y_2 gleich oder verschieden sein können und jeweils für ein Stickstoffatom oder für eine $=CR_{12}$ -Gruppe stehen, wobei R_{12} Wasserstoff, eine Alkoxycarbonyl- oder C_{1-6} -Alkylgruppe vorstellt, wobei für den Fall, dass $X_2=Y_2$ eine $-CH=N$ -Gruppe und R_1 eine Aralkyl- oder C_{1-6} -Alkylgruppe vorstellen, diese wegen der Tautomeriefähigkeit der Indazole auch an dem für Y_2 stehenden Stickstoffatom lokalisiert sein kann, mit der Massgabe, dass jeweils Y_1 mit dem Rest $N-R_1$ der allgemeinen Formel I verbunden ist, bedeuten, wobei für den Fall, dass Q ein Sauerstoffatom oder $X_2=Y_2$ eine $-CR_{12}=CR_{12}$ -Gruppe, entweder die beiden Reste R_2 und R_3 nicht gleichzeitig Wasserstoff sein können oder R_7 und R_8 zusammen eine $-CH_2-O$ -Brücke bilden müssen, sowie deren pharmakologisch verträglichen Salze, dadurch gekennzeichnet, dass man in an sich bekannter Weise entweder

a) eine Verbindung der Formel II




in welcher R_1 , R_2 , R_3 und A die oben genannte Bedeutung haben, B eine reaktive Gruppe darstellt und R_{10} die oben angegebene Bedeutung für R_4 hat oder zusammen mit B einen Valenzstrich bedeutet, mit einer Verbindung der Formel III




in welcher R_5 , R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z und Ar die oben angegebene Bedeutung haben, umgesetzt oder

b) eine Verbindung der Formel IV




in welcher R_1 , R_2 , R_3 und A die angegebene Bedeutung haben, mit einer Verbindung der Formel V



(37)

in welcher $R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, Z$ und Ar die oben angegebene Bedeutung haben, B' eine reaktive Gruppe darstellt, D für eine $>CO-$ oder $>CH-OR_4$ -Gruppe steht, wobei R_4 die oben genannte Bedeutung für R_4 hat oder auch zusammen mit B' einen Valenzstrich bedeutet und R_5 die oben genannte Bedeutung für R_5 hat oder auch zusammen mit B' eine Einfachbindung sein kann, umgesetzt und, falls D die $>CO$ -Gruppe bedeutet, anschliessend reduziert oder


c) eine Verbindung der Formel VI



in welcher R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 und A die oben angegebene Bedeutung haben, mit einer Verbindung der Formel VII




in welcher $B, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, Z$ und Ar die angegebene Bedeutung haben, umgesetzt oder
d) ein Gemisch aus einer Verbindung der Formel VI mit einer Verbindung der Formel VIII




in welcher $R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, Z$ und Ar die angegebene Bedeutung haben, hydriert oder

e) eine Verbindung der Formel VI mit einer Verbindung der Formel IX



in welcher R_7, R_8, R_9, R_{10}, Z und Ar die angegebene Bedeutung haben und L einen reaktiven Rest darstellt, umgesetzt und das erhaltene Amid anschliessend reduziert oder

f) eine Verbindung der Formel X




in welcher $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, Z$ und Ar die angegebene Bedeutung haben und XX_1 oder HX_2 vorstellt, für den Fall, dass A die Gruppe

X_1-Y_1 bedeutet, eine Verbindung, in der $X=X_1$ darstellt, mit einer Verbindung der allgemeinen Formel XIa




in der Y_1 die oben angegebene Bedeutung hat, L_1 ein Wasserstoffatom, die Hydroxygruppe oder einen reaktiven Rest T und L_2 ein Wasserstoffatom oder einen reaktiven Rest T bedeuten, oder für den Fall, dass A die Gruppe $X_2=Y_2$ bedeutet, eine Verbindung, in der $X = HX_2$ darstellt, mit einer Verbindung der allgemeinen Formel XIb



in der L_1 und Y_2 die oben angegebene Bedeutung haben, L_2' ein Wasserstoffatom oder einen reaktiven Rest T und L_3 ein Wasserstoffatom oder zusammen mit L_2' ein Sauerstoffatom darstellt, umgesetzt und cyclisiert oder

g) eine Verbindung der Formel XII




in welcher $R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, Z, A$ und Ar die angegebene Bedeutung haben und U eine abspaltbare Gruppe darstellt, reduziert und cyclisiert und gegebenenfalls nachträglich in einer erhaltenen Verbindung der allgemeinen Formel I einen der Reste $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}$ oder R_{12} nach üblichen Methoden in einen anderen, durch den Anspruch definierten Rest $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}$ oder R_{12} überführt und die erhaltenen Verbindungen gewünschtenfalls in ihre pharmakologisch verträglichen Salze umwandelt.

3. Arzneimittel, enthaltend einen Wirkstoff der allgemeinen Formel I sowie an sich bekannte pharmakologisch verträgliche Träger- und Hilfsstoffe.

4. Aminopropanole gemäss Anspruch 1 oder deren Salze zur Verwendung als Arzneimittel zur Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen.

Claims

1. Heterocyclic oxypropanol derivatives of the general formula I



in which

R_1 signifies hydrogen, an aralkyl, C_{1-6} alkyl or C_{1-8} alkanoyl group,

R_2 and R_3 , which can be the same or different, each signify hydrogen, an alkoxycarbonyl, C_{1-6} alkyl, C_{1-4} hydroxyalkyl or (C_{1-8} alkanoyl)oxyalkyl group, as well as together signify an alkylene radical with up to 6 C-atoms,

R_4 signifies hydrogen, a C_{1-8} alkanoyl group or an aroyl group,

R_5 signifies hydrogen, a C_{1-6} alkyl group or an aralkyl group,

R_6 signifies hydrogen or a C_{1-6} alkyl group,
 R_7 signifies hydrogen, a hydroxyl group or a C_{1-6} alkyl group,


Z signifies a valency bond, a methylene group, an oxygen or sulphur atom,

Ar signifies a carbocyclic aryl radical or a pyridyl radical,

R_8 , R_9 and R_{10} , which can be the same or different, each signify hydrogen, halogen, a hydroxy group, a C_{1-8} alkanoyl group, a C_{1-6} alkyl group, an alkenyl group with up to 8 C-atoms, a C_{1-6} alkoxy group, an aralkoxy group, the allyloxy group, a C_{1-6} alkylthio group, an aminocarbonyl group, an aminosulphonyl group, a C_{1-8} alkanoylamino group or R_8 and R_9 together signify a lower alkylenedioxy group or R_8 together with R_7 also a $-CH_2-O-$ group and

A signifies the group X_1-Y_1 , in which X_1 represents a methylene or $-NR_{11}$ radical, whereby R_{11} signifies hydrogen or a C_{1-6} alkyl group, and Y_1 represents a methylene radical or the group $>C=Q$, whereby Q stands for oxygen or sulphur; or the group $X_2=Y_2$, in which X_2 and Y_2 can be the same or different and each stands for a nitrogen atom or for a $=CR_{12}$ group, whereby R_{12} represents hydrogen, an alkoxycarbonyl group or a C_{1-4} alkyl group, whereby for the case in which $X_2=Y_2$ represents a $-CH=N-$ group and R_1 an aralkyl group or a C_{1-6} alkyl group, because of the ability to tautomerise of the indoles, this can also be localised on the nitrogen atom standing for Y_2 , with the proviso that in each case Y_1 is connected to the radical $N-R_1$ of the general formula I, whereby for the case in which Q signifies an oxygen atom or $X_2=Y_2$ a $-CR_{12}=CR_{12}-$ group, either the two residues R_2 and R_3 cannot simultaneously be hydrogen or R_7 and R_8 must together form a $-CH_2-O-$ bridge, as well as their pharmacologically compatible salts.


2. Process for the preparation of aminopropanol derivatives of the general formula I



in which R_1 signifies hydrogen, an aralkyl, C_{1-4} alkyl or C_{1-8} alkanoyl group, R_2 and R_3 , which can be the same or different, each signify hydrogen, an alkoxycarbonyl, C_{1-6} alkyl, C_{1-4} hydroxyalkyl or (C_{1-8} alkanoyl)oxyalkyl group, as well as together signify an alkylene radical with up to 6 C-atoms, R_4 signifies hydrogen, a C_{1-8} alkanoyl group or an aroyl group, R_5 signifies hydrogen, a C_{1-6} alkyl group or an aralkyl group, R_6 signifies hydrogen or a C_{1-6} alkyl group, R_7 signifies hydrogen, a hydroxyl group or a C_{1-6} alkyl group, Z signifies a valency bond, a methylene group, an oxygen or sulphur atom, Ar signifies a carbocyclic aryl radical or a pyridyl radical, R_8 , R_9 and R_{10} , which can be the same or different, each signify hydrogen, halogen, a hydroxyl group, a C_{1-8} alkanoyl group, a C_{1-6} alkyl group, an alkenyl group with up to 6 C-atoms, a C_{1-6} alkoxy group, an aralkoxy group, the allyloxy group, a C_{1-6} alkylthio group, an aminocarbonyl group, an aminosulphonyl group, a C_{1-8} alkanoylamino group or R_8 and R_9 together signify a lower alkylenedioxy group or R_8 together with R_7 also signifies a $-CH_2-O-$ group and A signifies the group X_1-Y_1 , in which X_1 signifies a methylene or $-NR_{11}$ radical, whereby R_{11} signifies hydrogen or a C_{1-6} alkyl group and Y_1 signifies a methylene radical or the group $>C=Q$, whereby Q stands for oxygen or sulphur; or the group $X_2=Y_2$, in which X_2 and Y_2 can be the same or different and each

stands for a nitrogen atom or for a $=CR_{12}$ group, whereby R_{12} represents hydrogen, an alkoxycarbonyl or C_{1-6} alkyl group, whereby for the case in which $X_2=Y_2$ represents a $-CH=N-$ group and R_1 an aralkyl or C_{1-6} alkyl group, this, because of the ability to tautomerise of the indazoles, can also be localised on the nitrogen atom standing for Y_2 , with the proviso that in each case Y_1 is connected with the radical $N-R_1$ of the general formula I, whereby for the case in which Q signifies an oxygen atom or $X_2=Y_2$ a $-CR_{12}=CR_{12}-$ group, either the two residues R_2 and R_3 cannot simultaneously be hydrogen or R_7 and R_8 must together form a $-CH_2-O-$ bridge, as well as of their pharmacologically compatible salts, characterised in that, in per se known manner, one either

a) reacts a compound of the formula II




in which R_1 , R_2 , R_3 and A have the above-mentioned meaning, B represents a reactive group and R_4 has the above-given meaning for R_4 or, together with B, signifies a valency bond, with a compound of the formula III




in which R_5 , R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z and Ar have the above-given meaning; or

b) reacts a compound of the formula IV




in which R_1 , R_2 , R_3 and A have the given meaning, with a compound of the formula V



in which R_5 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z and Ar have the above-given meaning, B' represents a reactive group, D stands for a $>\text{CO}$ or $>\text{CH}-\text{OR}_4$ group, whereby R_4 has the above-mentioned meaning for R_4 or, together with B', also signifies a valency bond and R_9 has the above-mentioned meaning for R_9 or, together with B', can also be a single bond, and, if D signifies the $>\text{CO}$ group, subsequently reduces; or

c) reacts a compound of the formula VI




in which R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 and A have the above-given meaning, with a compound of the formula VII



in which B, R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z and Ar have the given meaning; or

d) hydrogenates a mixture of a compound of the formula VI with a compound of the formula VIII




in which R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z and Ar have the given meaning; or

e) reacts a compound of the formula VI with a compound of the formula IX



in which R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z and Ar have the given meaning and L represents a reactive residue, and subsequently reduces the amide obtained; or


f) a compound of the formula X



in which R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z and Ar have the given meaning and X represents X_1 or HX_2 , for the case in which A signifies the group X_1-Y_1 , reacts and cyclises a compound in which $X = X_1$ with a compound of the general formula XIa




in which Y_1 has the above-given meaning, L_1 signifies a hydrogen atom, the hydroxyl group or a reactive residue T and L_2 a hydrogen atom or a reactive residue T, or for the case in which A signifies the group $X_2=Y_2$, reacts and cyclises a compound in which X represents HX_2 with a compound of the general formula XIb



in which L_1 and Y_2 have the above-given meaning, L_2 represents a hydrogen atom or a reactive residue T and L_3 a hydrogen atom or, together with L_2 , an oxygen atom; or

g) reduces and cyclises a compound of the formula XII



in which R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z, A and Ar have the given meaning and U represents a group which can be split off, and possibly subse-




quently, in a compound obtained of the general formula I, converts one of the residues $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}$ or R_{11} according to conventional methods into another residue $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}$ or R_{11} defined in the claim and, if desired, converts the compounds obtained into their pharmacologically compatible salts.

3. Medicaments containing an active material of the general formula I, as well as per se known pharmacologically compatible carrier and adjuvant materials.

4. Aminopropanols according to claim 1 or their salts for use as medicaments for the treatment of heart and circulatory diseases.

Revendications

1. Dérivés hétérocycliques d'oxypropanol de formule générale I



dans laquelle:

R_1 est de l'hydrogène, un groupe aralkyle, alkyle C_{1-6} , ou alcanoyl C_{1-8} .

R_2 et R_3 pouvant être identiques ou différents, sont chacun un atome d'hydrogène, un groupe alcoxycarbonyl, alkyle C_{1-6} , hydroxyalkyle C_{1-4} ou (alcanoyl C_{1-8}) oxyalkyle, ou forment ensemble un reste alkylène ayant jusqu'à 6 atomes de carbone,

R_4 est de l'hydrogène, un groupe alcanoyl C_{1-8} ou un groupe aroyle,

R_5 est de l'hydrogène, un groupe alkyle C_{1-6} ou un groupe aralkyle,

R_6 est de l'hydrogène ou un groupe alkyle C_{1-6} ,

R_7 est de l'hydrogène, un groupe hydroxyle ou un groupe alkyle C_{1-6} ,

Z est un trait de valence, un groupe méthylène, un atome d'oxygène ou de soufre,


Ar est un reste aryle carbocyclique ou un reste pyridyle,

R_8, R_9 et R_{10} pouvant être identiques ou différents, sont chacun de l'hydrogène, de l'halogène, un groupe hydroxyle, un groupe alcanoyl C_{1-8} , un groupe alkyle C_{1-6} , un groupe alcényle ayant jusqu'à 8 atomes de carbone, un groupe alcoxy C_{1-6} , un groupe aralcoxy, le groupe allyloxy, un groupe alkyle-thio C_{1-6} , un groupe aminocarbonyl, un groupe amino sulfonyl, un groupe alcanoylamino C_{1-8} , ou R_8 et R_9 forment ensemble un groupe alkylènedioxy inférieur ou bien R_8 forme avec R_9 aussi un groupe $-CH_2O-$, et

A est le groupe X_1-Y_1 , dans lequel X_1 est un reste méthylène ou un reste $-NR_{11}$, où R_{11} est de l'hydrogène ou un groupe alkyle C_{1-6} et Y_1 un reste méthylène ou le groupe $>C=Q$, où Q désigne l'oxygène ou le soufre, ou, est le groupe $X_2=Y_2$,

dans lequel X_2 et Y_2 sont identiques ou différents et désignent chacun un atome d'azote ou un groupe $=CR_{12}$, où R_{12} est de l'hydrogène, un groupe alcoxycarbonyl ou un groupe alkyle C_{1-6} , et au cas où $X_2=Y_2$ est un groupe $-CH=N$ et R_1 , un groupe aralkyle ou un groupe alkyle C_{1-6} , celui-ci peut être lié à l'atome d'azote représenté par Y_2 , en raison des tautomères que les indazoles sont susceptibles de former, sous la condition que dans chaque cas Y_1 est lié au reste $N-R_1$ de la formule générale I, et dans le cas où Q est un atome d'oxygène ou $X_2=Y_2$, un groupe $-CR_{12}=CR_{12}$, ou bien les deux restes R_2 et R_3 ne sont pas en même temps de l'hydrogène, ou bien R_7 et R_8 doivent former ensemble un pont $-CH_2O-$, ainsi que leurs sels pharmacologiquement tolérables.

2. Procédé pour la préparation de dérivés d'aminopropanol de formule générale I



dans laquelle:

R_1 est de l'hydrogène, un groupe aralkyle, alkyle C_{1-6} , ou alcanoyl C_{1-8} .

R_2 et R_3 pouvant être identiques ou différents, sont chacun un atome d'hydrogène, un groupe alcoxycarbonyl, alkyle C_{1-6} , hydroxyalkyle C_{1-4} ou (alcanoyl C_{1-8}) oxyalkyle, ou forment ensemble un reste alkylène ayant jusqu'à 6 atomes de carbone,

R_4 est de l'hydrogène, un groupe alcanoyl C_{1-8} ou un groupe aroyle,

R_5 est de l'hydrogène, un groupe alkyle C_{1-6} ou un groupe aralkyle,

R_6 est de l'hydrogène ou un groupe alkyle C_{1-6} ,

R_7 est de l'hydrogène, un groupe hydroxyle ou un groupe alkyle C_{1-6} ,

Z est un trait de valence, un groupe méthylène, un atome d'oxygène ou de soufre,

Ar est un reste aryle carbocyclique ou un reste pyridyle,

R_8, R_9 et R_{10} pouvant être identiques ou différents, sont chacun de l'hydrogène, de l'halogène, un groupe hydroxyle, un groupe alcanoyl C_{1-8} , un groupe alkyle C_{1-6} , un groupe alcényle ayant jusqu'à 8 atomes de carbone, un groupe alcoxy C_{1-6} , un groupe aralcoxy, le groupe allyloxy, un groupe alkyle-thio C_{1-6} , un groupe aminocarbonyl, un groupe amino sulfonyl, un groupe alcanoylamino C_{1-8} , ou R_8 et R_9 forment ensemble un groupe alkylènedioxy inférieur ou bien R_8 forme avec R_9 aussi un groupe $-CH_2O-$,

A est le group X_1-Y_1 , dans lequel X_1 est un reste méthylène ou un reste $-NR_{11}$, où R_{11} est de l'hydrogène ou un groupe alkyle C_{1-6} et Y_1 un reste méthylène ou le groupe $>C=Q$, où Q désigne l'oxy-




35


gène ou le soufre, ou, est le groupe $X_2=Y_2$, dans lequel X_2 et Y_2 sont identiques ou différents et désignent chacun un atome d'azote ou un groupe

$=CR_{12}$, où R_{12} est de l'hydrogène, un groupe alcoxycarbonyle ou un groupe alkyle C_{1-4} , et au cas où $X_2=Y_2$ est un groupe $-CH=N$ et R_1 , un groupe aralkyle ou un groupe alkyle C_{1-6} , celui-ci peut être lié à l'atome d'azote représenté par Y_2 , en raison des tautomères que les indazoles sont susceptibles de former, sous la condition que dans chaque cas Y_1 est lié au reste $N-R_1$ de la formule générale I, et dans le cas où Q est un atome d'oxygène ou $X_2=Y_2$, un groupe $-CR_{12}=CR_{12}$, ou bien les deux restes R_2 et R_3 ne sont pas en même temps de l'hydrogène, ou bien R_7 et R_8 doivent former ensemble un pont $-CH_2O-$, ainsi que leurs sels pharmacologiquement tolérables, caractérisé en ce que de façon en soi connue, soit:

a) on fait réagir un composé de formule II




dans laquelle R_1 , R_2 , R_3 et A ont la signification donnée ci-dessus, B est un groupe réactif et R_4' a la signification donnée ci-dessus pour R_4 , ou forme ensemble avec B un trait de valence, avec un composé de formule III




dans laquelle R_5 , R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z et Ar ont la signification ci-dessus, soit,

b) on fait réagir un composé de formule IV




dans laquelle R_1 , R_2 , R_3 et A ont la signification indiquée, avec un composé de formule V




dans laquelle R_5 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z et Ar ont la signification indiquée ci-dessus, B' est un groupe réactif, D est un groupe $>CO$ ou $>CH-OR_4''$ où R_4'' a la signification donnée ci-dessus pour R_4 , ou forme ensemble avec B' un trait de valence et R_6' a la signification donnée ci-dessus pour R_6 , ou

peut former avec B' une liaison simple et au cas où D est le groupe $>CO$ on réduit ensuite, soit c) on fait réagir un composé de formule VI




dans laquelle R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 et A ont la signification indiquée ci-dessus, avec un composé de formule VII



dans laquelle B, R_5 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z et Ar ont la signification indiquée, soit

d) on soumet un mélange d'un composé de formule VI avec un composé de formule VIII




dans laquelle R_5 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z et Ar ont la signification indiquée, à une hydrogénation, soit

e) on fait réagir un composé de formule VI avec un composé de formule IX



dans laquelle R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z et Ar ont la signification indiquée et L est un reste réactif et on réduit ensuite l'amide obtenu, soit

f) on fait réagir et on cyclise un composé de formule X



dans laquelle R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} , Z et Ar ont la signification indiquée et X représente X, ou HX_2 , c'est-à-dire dans le cas où A est le groupe X_1-Y_1 , un composé dans lequel $X = X_1$, avec un composé de formule générale XIa




dans laquelle Y_1 a la signification indiquée ci-dessus, L_1 est un atome d'hydrogène, le groupe hydroxyle ou un reste réactif T et L_2 un atome d'hydrogène ou un reste T, ou dans le cas où A est le groupe $X_2=Y_2$, un composé dans lequel $X = HX_2$, avec un composé de formule générale Xlb



dans laquelle L_1 et Y_2 ont la signification donnée ci-dessus, L_2' est un atome d'hydrogène ou un reste réactif T et L_3 est un atome d'hydrogène, ou forme ensemble avec L_2' un atome d'oxygène, soit

g) on réduit et on cyclise un composé de formule XII



dans laquelle $R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}, Z, A$ et Ar ont la signification indiquée et U est un groupe éliminable, et éventuellement on transforme ultérieurement dans un composé de formule générale I obtenu, un des restes $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}$ ou R_{12} selon une méthode habituelle en un autre reste $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8, R_9, R_{10}$ ou R_{12} défini dans la revendication et on transforme les composés obtenus éventuellement en leurs sels pharmacologiquement tolérables.

3. Médicaments contenant une substance active de formule générale I ainsi que des substances de support et auxiliaires pharmacologiquement tolérables et en soi connues.

4. Des aminopropanols selon la revendication 1 ou leurs sels destinés à être employés comme médicaments pour le traitement des maladies du cœur et de la circulation.

