




[図1]




[図2]




[図3]




[図4]




[図5]




[図6]



【図7】




【図8】




[図9]


A




B




[図10]




[図11]




[図12]




[図13]



[図14]



[図15]




[図16]

判定	判定用スコア (MCIリスク値)	説明
A	0.0-0.5	血漿から見た認知症リスクは低いです。
B	0.5-1.0	早期の認知障害に特徴的な血漿の兆候が認められます。
C	1.0-1.5	認知機能障害に特徴的な血漿の兆候が認められます。
D	1.5-2.0	進んだ認知機能障害に特徴的な血漿の兆候が認められます。


[図17]

判定	判定用スコア (MCIリスク値)	説明
A	0.0-0.5	MCIリスクはほぼありません。
B	0.5-1.0	MCIリスクは低めです。
C	1.0-1.5	MCIリスクは中程度です。
D	1.5-2.0	MCIリスクは高めです。

[図18]



[図19]



[図20]

栄養・脂質

バイオマーカー		量 (mg/dL)	標準範囲 (mg/dL)	判定結果
栄養	ALB	2910	3151-3674	やや低値です。 リスクがやや高い状態です。
	TTR	7.8	10-13	やや低値です。 リスクがやや高い状態です。
脂質代謝	APOA1	98.2	102-141	やや低値です。 リスクがやや高い状態です。
	APOC1	2.4	3.2-4.6	低値です。

免疫・凝固線溶

バイオマーカー		量 (mg/dL)	標準範囲 (mg/dL)	判定結果
免疫	C3	57.4	41-57	やや高値です。
	C4G	2.3	1.7-2.6	異常なし。
	A1BG	16.7	13-20	異常なし。
	HPX	56.5	50-67	異常なし。
凝固線溶	A2M	81.7	82-120	やや低値です。
	A2AP	3.3	3.4-4.4	やや低値です。 リスクがやや高い状態です。

[図21]

