
滞留量（μg/g）
大鼠皮肤含量（μg/g）
60
50
40
30
20
10
0
实施例1
实施例2
实施例3
实施例4
实施例5

图 1


皮内滞留量
皮内滞留量（μg/cm2）
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
对照组
实施例4

图 2


实施例4
对照组
累积渗透量/ng/cm2
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
4
8
12
16
20
24
时间/h

图 3


在离体猪皮肤中的平均累积渗透量-时间曲线
药物累积渗透量（ng•cm-2）
700
600
500
400
300
200
100
0
0
4
8
12
16
20
24
渗透时间（h）
实施例4
对照组
实施例12

图 4


单位质量皮肤滞留量μg/g
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
实施例4
对照组
实施例12

图 5


红斑指数变化
治疗时间
2周
4周
6周
8周
-54.13
-16.82
-68.47
-35.65
-78.14
-36.53
-81.81
-38.46
治疗组
对照组

图 6


脱屑指数变化
治疗时间
2周
4周
6周
8周
-55.31
-18.26
-75.24
-27.39
-78.47
-36.53
-85.7
-37.44
治疗组
对照组

图 7