Fig.1



Counts
0 10 20 30 40 50
10^0 10^1 10^2 10^3 10^4
Counts
0 10 20 30 40 50
10^0 10^1 10^2 10^3 10^4

Fig.2



Responder A : Stimulator B
^{3}[H] TdR (cpm x 10^3)
50
40
30
20
10
0
Ly
GM-7-negative
GM-7-positive

Fig.3




100
75
50
25
0
Ag.-pos. cells %
CD 14+
CD 2+
CD3+/CD14+
Mo d 0
Mo d 5
Mo + Ly d 0
Mo + Ly d 5

Fig.4


Suppressor function
PhaLy + „Mo“ + 1-MT
PhaLy + „Mo“
PhaLy + „Mo+Ly“ + 1-MT
PhaLy + „Mo+Ly“
PhaLy
Ly
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000
22500
c.p.m



day 5 after surgery prior to cell administration
GM-7+: 0,5%
R2
day 3 after cell administration
GM-7+: 21%

Fig.5

Fig.6




Fig.7



Body weight changes (%) after end of DSS treatment
130
120
110
100
90
80
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
days
group 1
group 2
group 3
group 4

Fig.8



Histological score [mean ± SEM]
5
4
3
2
1
0
group 1
group 2
group 3
group 4

Fig.9



% of weight after 6 weks
125
120
115
110
105
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
days

Fig.10 A




Fig.10 B




Fig.11



histological score [mean ± SEM]
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
group 1
group 3
group 2

Fig.12

