

明 細 書

発明の名称：ペプチド及びペプチドを含む剤

技術分野

[0001] 本発明は、ペプチド及び当該ペプチドを含む剤などに関する。

背景技術

[0002] 胚性幹細胞（E S細胞）や人工多能性幹細胞（i P S細胞）など多能性を有する幹細胞がこれまでに報告されている。これらの多能性幹細胞から分化誘導された細胞を利用して、再生医療や病態モデルの作製が試みられている。

[0003] 成長因子（G r o w t h f a c t o r s）は、胚発生、組織修復、及び細胞間コミュニケーションの調節に関与する重要なシグナル伝達分子であり、幹細胞の生存、自己複製、分化、及び脱分化において重要な働きをする多数の成長因子が同定されている。このような成長因子を組み合わせることにより、幹細胞培養をさまざまに制御することができる。

[0004] 骨形成タンパク質（BMP、B o n e M o r p h o g e n e t i c P r o t e i n s）は、T G F - β スーパーファミリーに属する分泌型シグナル伝達分子である。BMPはもともと軟骨組織や骨形成の制御因子として発見された。少なくとも20種類のBMPが存在し、成長因子として作用することが明らかとなっている。N o g g i nは、BMP阻害活性を有する分泌性タンパク質である。N o g g i nは、BMP自体に結合して、BMPが受容体に結合するのを妨げることにより、BMPシグナル伝達を抑制して、細胞の分化・誘導に影響を与える。例えば、ヒトE S細胞をN o g g i n添加培地で培養すると、E S細胞が内因性に産生するBMP-2の作用を抑制することにより、E S細胞の胚体外内胚葉細胞への分化が抑制され、E S細胞の未分化状態が維持される。その後、引き続き神経分化培養条件下で培養することにより、神経細胞への分化誘導が促進される（特許文献1）。このようなBMP阻害剤として作用する分泌性タンパク質としてはN o g g i nの

他、Chordin、follistatinなどが知られている。しかしながら、これらはタンパク質であるため、細胞の培養に用いる際には、培養コストがかかる上、再現性に乏しいなどの問題点があった。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：国際特許公開第01／98463号パンフレット

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] 本発明者らは、BMP結合活性を有するペプチドを創出することを目的として鋭意研究に努めた結果、本発明を想到した。本発明は、新規なペプチド、当該ペプチドを含む各種剤、及び当該ペプチドの利用を提供する。

課題を解決するための手段

[0007] 上記の課題は、配列番号1などで示される配列を有する新規ペプチドなどにより解決される。

[0008] この明細書に記載されるある発明は、以下のペプチド、又はその薬学的に許容される塩に関する。

以下のアミノ酸配列：

E-R-V-F4COO-At p-D-R-Bph-P-Y-P-Bph
-Y-F4COO-F4COO-S-C（配列番号1）

又は、上記のアミノ酸配列の1番目、2番目、4番目、5番目、6番目、7番目、8番目、9番目、10番目、11番目、12番目、13番目、14番目、15番目および16番目のアミノ酸残基からなるグループから選択される、1-15個のアミノ酸残基において、置換、付加、欠失又は挿入を有するアミノ酸配列を含む、ペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[0009] この明細書に記載されるある発明は、以下のペプチド、又はその薬学的に許容される塩に関する。

以下のアミノ酸配列：

X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10-X11-X12-X13-X14-X15-X16-X17（配列番号2）で示されるアミノ酸配列を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩、もしくは又は配列番号2で示されるアミノ酸配列から1～10個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩であって、

X1は、E、A、T、Q又はLであり；

X2は、R、K、Hgl、任意の極性アミノ酸又は任意の脂肪族アミノ酸であり、

X3は、Vであり；

X4は、複素環であってもよい芳香族環を側鎖に有するアミノ酸であり；

X5は、任意の脂肪族アミノ酸、Y、D、Atp、Cha4tH、Gthp、又はA1Ac4pipであり；

X6は、D、任意の塩基性アミノ酸又は任意の極性アミノ酸であり；

X7は、任意の塩基性アミノ酸又は任意の極性アミノ酸であり；

X8は、置換基を有していてもよく、芳香環上のCがNに置換されていてもよいビフェニルアラニンであり；

X9は、任意のアミノ酸であり、

X10は、Y、Hty又は4Pyであり；

X11は、任意のアミノ酸であり、

X12は、置換基を有していてもよく、芳香環上のCがNに置換されていてもよいビフェニルアラニンであり；

X13は、非置換の若しくは置換されたF、4Py又は3Py6NH2であり；

X14は、F4COO、D又はGであり；

X15は、F4COO、Y、4Py、3Py6NH2、W7N、Hph又はNであり；

X 1 6 は、任意のアミノ酸であり；

X 1 7 は、Cである

ペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[0010] 配列番号2で示されるアミノ酸配列から1～10個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有するペプチドは、後述するようにBMP4結合能を有するものが好ましい。また、配列番号2で示されるアミノ酸配列から1～9個（1～8個，1～5個，1～4個，1～3個，2個，又は1個）のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩であってもよい。

[0011] 上記のペプチド、又はその薬学的に許容される塩の好ましい例は、

X 1 は、Eであり；

X 2 は、R又は任意の極性アミノ酸であり、

X 3 は、Vであり；

X 4 は、非置換の若しくは置換されたY又はF4COOであり；

X 5 は、V又はAtpであり；

X 6 は、D又はKCOpipzaaであり；

X 7 は、Rであり；

X 8 は、Bphであり；

X 9 は、P又はSであり；

X 1 0 は、Y又はHtyであり；

X 1 1 は、任意の脂肪族アミノ酸であり；

X 1 2 は、非置換の若しくは置換されたBphであり；

X 1 3 は、非置換の若しくは置換されたFであり；

X 1 4 は、F4COOであり；

X 1 5 は、F4COO又は4Pyであり；

X 1 6 は、任意のアミノ酸であり；

X 1 7 は、Cである。

[0012] 上記のペプチド、又はその薬学的に許容される塩の好ましい例は、

- X 1 は、E、A、T、Q又はLであり；
X 2 は、R又はK C O p i p z a aであり；
X 3 は、Vであり；
X 4 は、Y、F 4 F、F 4 C O O、4 P y、H、又はF 4 a a Oであり；
X 5 は、任意の脂肪族アミノ酸、A t p、C h a 4 t H、G t h p、又はA 1 A c 4 p i pであり；
X 6 は、D、S又はK C O p i p z a aであり；
X 7 は、R又はKであり；
X 8 は、3 P y 6 P h、B p h、B p h 4 C、p B p h 2 F又はB p h 3 Cであり；
X 9 は、S、P、K C O p i p z a a又はHであり；
X 1 0 は、Y又はH t yであり；
X 1 1 は、任意の脂肪族アミノ酸又はH y pであり；
X 1 2 は、置換基を有していてもよいビフェニルアラニンであり；
X 1 3 は、非置換の若しくは置換されたF又は4 P yであり；
X 1 4 は、F 4 C O Oであり；
X 1 5 は、F 4 C O O又は4 P yであり；
X 1 6 は、Sであり；
X 1 7 は、Cである。

[0013] 上記のペプチド、又はその薬学的に許容される塩の好ましい例は、

以下のアミノ酸配列：X 1－X 2－X 3－X 4－X 5－X 6－X 7－X 8－X 9－X 1 0－X 1 1－X 1 2－X 1 3－X 1 4－X 1 5－X 1 6－C（配列番号4）で示されるアミノ酸配列を有するペプチド又は配列番号4で示されるアミノ酸配列から1～10個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩であり、

- X 1 は、Aであり；
X 2 は、R、K A c、Q又はK C O p i p z a aであり；

X 3 は、V であり；
X 4 は、Y、F 4 F 又は 4 P y であり；
X 5 は、V であり；
X 6 は、D、K C O p i p z a a、K、R、G 又は H であり；
X 7 は、R、K、K A c、4 P y、S 又は C i t であり；
X 8 は、3 P y 6 P h 又は B p h であり；
X 9 は、P、S、K、H、G、S 又は K C O p i p z a a であり；
X 1 0 は、Y であり；
X 1 1 は、任意の脂肪族アミノ酸であり；
X 1 2 は、B p h 又は 3 P y 6 P h であり；
X 1 3 は、Y 又は F 4 F であり；
X 1 4 は、F 4 C O O であり；
X 1 5 は、F 4 C O O 又は 4 P y であり；
X 1 6 は、S である。

[0014] 配列番号 4 で示されるアミノ酸配列から 1 ～ 1 0 個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩は、後述するように B M P 4 結合能を有するものが好ましい。また、配列番号 4 で示されるアミノ酸配列から 1 ～ 9 個（1 ～ 8 個，1 ～ 5 個，1 ～ 4 個，1 ～ 3 個，2 個，又は 1 個）のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩であってもよい。

[0015] 上記したペプチド、又はその薬学的に許容される塩の好ましい例は、B M P 4 への結合能を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩である。

[0016] 上記したペプチド、又はその薬学的に許容される塩の好ましい例は、B M P 4 の阻害活性を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩である。

[0017] 上記したペプチドの好ましい例は、配列番号 5 - 1 8 7、及び配列番号 2 4 3 - 4 2 1 のいずれか 1 つに記載のアミノ酸配列からなるペプチド、又はその薬学的に許容される塩であるか、

配列番号 5-187、及び配列番号 243-421 のいずれか 1 つに記載のアミノ酸配列から 1～10 個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有し、BMP4 への結合能又は BMP4 の阻害活性を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩である。

[0018] この明細書に記載されるある発明は、以下のペプチド、又はその薬学的に許容される塩に関する。

以下のアミノ酸配列：

F-G-Me F-G-B p h-G-D-D-C h a-A-Me F-L-H-C (配列番号 241) 又は、上記のアミノ酸配列の 1 番目、3 番目、4 番目、5 番目、6 番目、7 番目、8 番目、9 番目、10 番目、11 番目、12 番目および 13 番目のアミノ酸残基からなるグループから選択される、1～12 個のアミノ酸残基において、置換、付加、欠失または挿入を有するアミノ酸配列を含むペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[0019] この明細書に記載されるある発明は、以下のペプチドに関する。

以下のアミノ酸配列：

X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10-X11-X12-X13-X14 (配列番号 242) で示されるアミノ酸配列を有するペプチド又は配列番号 242 で示されるアミノ酸配列から 1～12 個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩であって、

X1 は、置換基を有していてもよく、芳香環上の C が N に置換されていてもよいフェニルアラニンであり；

X2 は、G であり；

X3 は、置換基を有していてもよい N-メチルフェニルアラニンであり；

X4 は、G、D 体であってもよい脂肪族アミノ酸又は極性アミノ酸であり；

X5 は、芳香環上の C が N に置換されていてもよいビフェニルアラニン、又は置換基を有していてもよいフェニルアラニンであり；

X 6 は、G、又はD体であってもよいAであり；

X 7 は、任意の極性アミノ酸であり；

X 8 は、任意の酸性アミノ酸であり；

X 9 は、任意の脂肪族アミノ酸であり；

X 1 0 は、任意のアミノ酸であり；

X 1 1 は、置換基を有していてもよいN-メチルフェニルアラニンであり

；

X 1 2 は、任意の脂肪族アミノ酸であり；

X 1 3 は、任意のアミノ酸であり；

X 1 4 は、Cである

ペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[0020] 上記したペプチドの好ましい例は、BMP 7 の阻害活性を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩である。

[0021] 上記ペプチドの好ましい例は、配列番号322-421のいずれか1つに記載のアミノ酸配列からなるペプチド、又はその薬学的に許容される塩であるか、

配列番号322-421のいずれか1つに記載のアミノ酸配列から1～10個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有し、BMP 7 の阻害活性を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩である。

[0022] 上記したペプチドの好ましい例は、環状ペプチド、又はその薬学的に許容される塩である。

[0023] 上記したペプチドの好ましい例は、クロロアセチル化したアミノ酸と、前記ペプチドに含まれるシステイン残基とが結合された環状構造を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩である。

[0024] 上記したペプチドの好ましい例は、付加的なアミノ酸残基配列をさらに含むペプチド、又はその薬学的に許容される塩である。付加的なアミノ酸残基配列の例は、リンカーである。

- [0025] 上記したペプチドの好ましい利用例は、上記したいずれかのペプチド、又はその薬学的に許容される塩を含むBMP 4 及び／又はBMP 7 シグナル伝達阻害剤である。
- [0026] 上記したペプチドの好ましい利用例は、上記したいずれかのペプチド、又はその薬学的に許容される塩を含む、ヒト幹細胞分化誘導制御剤である。
- [0027] 上記したペプチド、又はその薬学的に許容される塩、BMP 4 及び／又はBMP 7 シグナル伝達阻害剤及びヒト幹細胞分化誘導制御剤の好ましい利用例は、これらのうちいずれか1 種又は2 種以上を含む、培地添加物である。これらを培養培地に添加することで、対象のBMP 4 及び／又はBMP 7 シグナル伝達を阻害したり、ヒト幹細胞の分化誘導を制御したりできる。
- [0028] 上記したペプチド、又はその薬学的に許容される塩の好ましい利用例は、上記したいずれかのペプチド、又はその薬学的に許容される塩を用いて、BMP 4 及び／又はBMP 7 のシグナル伝達活性を阻害する方法である。例えば、対象（例えば、ヒト又は非ヒト動物）に上記したいずれかのペプチドを投与することで、対象におけるBMP 4 及び／又はBMP 7 のシグナル伝達活性を阻害できる。また、試験管内やインビボ実験において、上記したいずれかのペプチドを対象細胞に投与することで、対象細胞におけるBMP 4 及び／又はBMP 7 のシグナル伝達活性を阻害できる。
- [0029] 上記したペプチド、又はその薬学的に許容される塩の好ましい利用例は、上記したいずれかのペプチド、又はその薬学的に許容される塩を用いて、ヒト幹細胞の分化誘導を制御する方法である。例えば、対象（例えば、ヒト）に上記したいずれかのペプチド、又はその薬学的に許容される塩を投与することで、対象におけるヒト幹細胞の分化誘導を制御できる。また試験管内やインビボ実験において、上記したいずれかのペプチドを対象細胞に投与することで、対象細胞における、ヒト幹細胞の分化誘導を制御できる。

発明の効果

- [0030] 本発明のペプチド、又はその薬学的に許容される塩は、BMP 4 結合能、BMP 4 の阻害活性、好ましくは、BMP 4 シグナル伝達阻害活性、より好

ましくは、ヒト幹細胞分化誘導制御活性を有する。本発明のペプチド、又はその薬学的に許容される塩は、BMP 7シグナル伝達阻害活性、好ましくは、ヒト幹細胞分化誘導制御活性を有する。本発明のペプチド、又はその薬学的に許容される塩は、ヒト幹細胞の培養用培地等に使用することができる。

図面の簡単な説明

[0031] [図1]図1は、本発明のペプチド及びNogginを用いた、SMAD1のリン酸化によるBMPシグナル伝達阻害評価の結果を示すグラフである。AはBMP 4シグナル伝達阻害評価結果を、BはBMP 7シグナル伝達阻害評価結果を示す。図中、黒三角はBMP 4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 177、白三角はBMP 4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 181、白丸はBMP 4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 87、黒四角はNogginを示す。横軸はペプチドの濃度（nM）を、縦軸は、無刺激状態のSMAD1のリン酸化値を100%阻害、BMPにより誘導されるSMAD1のリン酸化の最大値を0%阻害したときの、阻害率を示す。

[図2]図2は、本発明のペプチド及びNogginを用いた、SMAD1のリン酸化によるBMPファミリーシグナル伝達阻害評価の結果を示すグラフである。図中の三角はBMP 4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 177、四角はNogginを示す。横軸はペプチドの濃度（nM）を、縦軸は、無刺激状態のSMAD1のリン酸化値を100%阻害、BMPにより誘導されるSMAD1のリン酸化の最大値を0%阻害したときの、阻害率を示す。

発明を実施するための形態

[0032] 1. 略語

本明細書において、特に明記しない限り、以下の略語は下記の意味で使用される。

略語（一般）

オングストローム（単位）としてÅ；

ウシ血清アルブミンとしてBSA；

tert-ブトキシカルボニル基としてBoc；

クロロアセチルとしてC l A c ;
ジクロロメタン又は塩化メチレンとしてD C M ;
N、N' -ジイソプロピルカルボジイミドとしてD I P C I ;
N、N-ジイソプロピルエチルアミンとしてD I P E A又はD I E A ;
ジメチルスルホキシドとしてD M S O ;
N、N-ジメチルホルムアミドとしてD M F ;
3、6-ジオキサー1、8-オクタンジチオールとしてD O D T ;
ダルベッコ改変イーグル培地としてD M E M ;
50%効果濃度としてE C 50 ;
ウシ胎児血清としてF B S ;
9-フルオレニルメチルオキシカルボニルとしてF m o c ;
グラム（単位）としてg ;
O-（7-アザベンゾトリアゾール-1-イル）-N、N、N'、N'-テ
トラメチルウロニウムヘキサフルオロリン酸塩としてH A T U ;
高速液体クロマトグラフィーとしてH P L C ;
液体クロマトグラフィー質量分析計としてL C-MSもしくはL C / M S ;
モラー（単位）としてM ;
ミリグラム（単位）としてm g ;
ミリリットル（単位）としてm L ;
ミリモラー（単位）としてm M ;
アセトニトリルとしてM e C N ;
分（単位）としてm i n ;
ミリメートル（単位）としてm m ;
O-3-メチル-ペント-3-イル基としてM p e 基 ;
N-ヒドロキシコハク酸イミドとしてN H S ;
ナノメートル（単位）としてn m ;
マイクロリットル（単位）としてμ L ;
スクシンイミドとしてO S u ;

2、2、4、6、7-ペンタメチルジヒドロベンゾフラン-5-スルホニル基としてPbf；

ポリエチレングリコールとしてPEG；

回転毎分（単位）としてrpm；

tert-ブチル基としてtBu；

トリフルオロ酢酸としてTFA；

トリイソプロピルシランとしてTIS；

トリチル基としてTrtまたはTr。

[0033] 略語（非天然アミノ酸）

以下の非天然アミノ酸に関する略語は、主鎖のアミノ基がBoc基やFmoc基等の一般的な保護基で保護されているものも含む。

3Py6NH₂、または3Py6-NH₂：(S)-2-アミノ-3-(6-アミノピリジン-3-イル)プロパン酸（CAS番号：1269968-61-7）；

Aib：2-アミノ-2-メチルプロパン酸（CAS番号：62-57-7）；

aMeP：(S)-2-メチルピロリジン-2-カルボン酸（CAS番号：42856-71-3）；

Aze：(S)-アゼチジン-2-カルボン酸（CAS番号：2133-34-8）；

Cit：L-シトルリン（CAS番号：372-75-8）；

F3aa：(S)-2-アミノ-3-(3-(カルボキシメチル)フェニル)プロパン酸（CAS番号：1270107-31-7）；

F44pip (S)-2-アミノ-3-(4-(ピペリジン-4-イル)フェニル)プロパン酸（CAS番号：1888705-98-3）；

F4G：(S)-2-アミノ-3-(4-グアニジノフェニル)プロパン酸（CAS番号：59574-11-7）；

Hcit：N6-カルバモイル-L-リシン（CAS番号：1190-4

9-4) ;

Hph : (S) - 2-アミノ-4-フェニルブタン酸 (CAS番号 : 943-73-7) ;

Hpr : (S) - ピペリジン-2-カルボン酸 (CAS番号 : 3105-95-1) ;

Hty : ホモ-L-チロシン (CAS番号 : 221243-01-2) ;

5Ind : (S) - 2-アミノ-3-(1H-インドール-5-イル) プロパン酸 (CAS番号 : 460096-38-2) ;

KCOpipzaa : N6-(4-(カルボキシメチル) ピペラジン-1-カルボニル) -L-リシン (キシダ化学株式会社) ;

MeA : N-メチル-L-アラニン (CAS番号 : 3913-67-5)

;

MeKCOpipzaa : N6-(4-(カルボキシメチル) ピペラジン-1-カルボニル) -N2-メチル-L-リシン (キシダ化学株式会社) ;

MeV : N-メチル-L-バリン (CAS番号 : 2480-23-1) ;

P4F2 : (S) - 4,4-ジフルオロピロリジン-2-カルボン酸 (CAS番号 : 52683-81-5) ;

Pc4F : (2S, 4S) - 4-フルオロピロリジン-2-カルボン酸 (CAS番号 : 2438-57-5) ;

Pt4F : (2S, 4R) - 4-フルオロピロリジン-2-カルボン酸 (CAS番号 : 2507-61-1) ;

W7N : (S) - 2-アミノ-3-(1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン-3-イル) プロパン酸 (CAS番号 : 49758-35-2) ;

Y3COO : (S) - 5-(2-アミノ-2-カルボキシエチル) -2-ヒドロキシ安息香酸 (CAS番号 : 4303-95-1) ;

Y3CONmm : (S) - 2-アミノ-3-(4-ヒドロキシ-3-(メ

チルカルバモイル) フェニル) プロパン酸 ;

OCOMPEG10000 : メトキシポリエチレングリコールカーボネート (平均分子量 10,000) ;

PEG12Me : 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35-ドデカオキサヘプタトリアコンタン-37-アミン ; 3Py (S)-2-アミノ-3-(ピリジン-3-イル) プロパン酸 (CAS 番号 : 64090-98-8) ;

3Py6Ph (S)-2-アミノ-3-(6-フェニルピリジン-3-イル) プロパン酸 (CAS 番号 : 1335566-07-8) ;

4Py 3-(4-ピリジル)-L-アラニン (CAS 番号 : 37535-49-2) ;

4Py2NH2 (S)-2-アミノ-3-(2-アミノピリジン-4-イル) プロパン酸 (CAS 番号 : 1269969-46-1) ;

A1Ac4pip (S)-3-(1-アセチルピペリジン-4-イル)-2-アミノプロパン酸 (CAS 番号 : 2349666-59-5) ;

Abu (S)-2-アミノブタン酸 (CAS 番号 : 1492-24-6) ;

Acpe (S)-2-アミノ-3-シクロペンチルプロパン酸 (CAS 番号 : 99295-82-6) ;

Ahp (S)-2-アミノヘプタン酸 (CAS 番号 : 44902-02-5) Atp (2S)-2-アミノ-3-(オキサン-4-イル) プロパン酸 (CAS 番号 : 1344910-91-3) ;

bA 3-アミノプロピオン酸 (CAS 番号 : 107-95-9) Bph (S)-3-([1, 1'-ビフェニル]-4-イル)-2-アミノプロパン酸 (CAS 番号 : 155760-02-4) ;

Bph3C (S)-2-アミノ-3-(3'-クロロ-[1, 1'-ビフェニル]-4-イル) プロパン酸 (Fmoc 保護体 CAS 番号 : 1380437-47-7) ;

Bph3F (S) - 2 - アミノ - 3 - (3' - フルオロ - [1, 1' - ビフェニル] - 4 - イル) プロパン酸 (CAS 番号: 1380437-41-1) ;

Bph3Me (S) - 2 - アミノ - 3 - (3' - メチル - [1, 1' - ビフェニル] - 4 - イル) プロパン酸 (CAS 番号: 1241680-67-0) ;

Bph3OMe (S) - 2 - アミノ - 3 - (3' - メトキシ - [1, 1' - ビフェニル] - 4 - イル) プロパン酸 (CAS 番号: 1417316-70-1) ;

Bph4C (S) - 2 - アミノ - 3 - (4' - クロロ - [1, 1' - ビフェニル] - 4 - イル) プロパン酸 (CAS 番号: 1270097-85-2) ;

Bph4F (S) - 2 - アミノ - 3 - (4' - フルオロ - [1, 1' - ビフェニル] - 4 - イル) プロパン酸 (CAS 番号: 2230870-07-0) ;

Cba (S) - 2 - アミノ - 3 - シクロブチルプロパン酸 (CAS 番号: 1201593-65-8) ;

CF3A (S) - 2 - アミノ - 4, 4, 4 - トリフルオロブタン酸 (CAS 番号: 15960-05-1) ;

Cha (S) - 2 - アミノ - 3 - シクロヘキシルプロパン酸 (CAS 番号: 27527-05-5) ;

Cha4tH (S) - 2 - アミノ - 3 - ((1r, 4S) - 4 - ヒドロキシシクロヘキシル) プロパン酸 (CAS 番号: 221243-22-7) ;

Chg (S) - 2 - アミノ - 2 - シクロヘキシル酢酸 (CAS 番号: 14328-51-9) ;

da D - アラニン (CAS 番号: 338-69-2) ;

de D - グルタミン酸 (CAS 番号: 6893-26-1) ;

d s D-セリン (CAS番号: 312-84-5) ;

F 3 C (S) - 2-アミノ-3-(3-クロロフェニル) プロパン酸 (CAS番号: 80126-51-8) ;

F 3 M e (S) - 2-アミノ-3-(m-トルイル) プロパン酸 (114926-37-3) ;

F 4 2 P y (S) - 2-アミノ-3-(4-(ピリジン-2-イル) フェニル) プロパン酸 (CAS番号: 1336207-47-6) ;

F 4 3 P y (S) - 2-アミノ-3-(4-(ピリジン-3-イル) フェニル) プロパン酸 (CAS番号: 916911-74-5) ;

F 4 4 P y (S) - 2-アミノ-3-(4-(ピリジン-4-イル) フェニル) プロパン酸 (Fmoc保護体 CAS番号: 1282042-56-1) ;

F 4 4 t h p (S) - 2-アミノ-3-(4-(テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) フェニル) プロパン酸 (メチルエステル保護体 CAS番号: 938197-48-9) ;

F 4 a a o (S) - 2-アミノ-3-(4-(カルボキシメトキシ) フェニル) プロパン酸 (CAS番号: 24558-63-2) ;

F 4 C (S) - 2-アミノ-3-(4-クロロフェニル) プロパン酸 (CAS番号: 14173-39-8) ;

F 4 C O O (S) - 4-(2-アミノ-2-カルボキシエチル) 安息香酸 (CAS番号: 126109-42-0) ;

F 4 F (S) - 2-アミノ-3-(4-フルオロフェニル) プロパン酸 (CAS番号: 1132-68-9) ;

F 4 M e (S) - 2-アミノ-3-(p-トルイル) プロパン酸 (CAS番号: 1991-87-3) ;

G c p r (S) - 2-アミノ-2-シクロプロピル酢酸 (CAS番号: 49606-99-7) ;

G t h p (S) - 2-アミノ-2-(テトラヒドロ-2H-ピラン-4

－イル) 酢酸 (CAS 番号 : 8 1 1 8 4 2 - 2 5 - 8) ;

H g l L - 2 - アミノアジピン酸 (CAS 番号 : 1 1 1 8 - 9 0 - 7)

;

H g n (S) - 2, 6 - d i アミノ - 6 - オキソヘキサン酸 (CAS 番号 : 7 4 3 3 - 3 2 - 1) ;

H t y ホモ - L - チロシン (CAS 番号 : 2 2 1 2 4 3 - 0 1 - 2)

H y p (2 S, 4 R) - 4 - ヒドロキシピロリジン - 2 - カルボン酸 (CAS 番号 : 5 1 - 3 5 - 4) ;

K C O p i p z a a N 6 - (4 - (カルボキシメチル) ピペラジン - 1 - カルボニル) - L - リシン (F m o c 保護 / t e r t - ブチルエステル保護体 CAS 番号 : 2 6 8 0 6 0 7 - 3 4 - 3) ;

M e F メチル - L - フェニルアラニン (CAS 番号 : 2 5 6 6 - 3 0 - 5) ;

M e F 3 C (S) - 3 - (3 - クロロフェニル) - 2 - (メチルアミノ) プロパン酸 (CAS 番号 : 2 2 5 5 3 2 4 - 9 1 - 3) ;

M e F 3 M e (S) - 2 - (メチルアミノ) - 3 - (m - トルイル) プロパン酸 (F m o c 保護体 CAS 番号 : 2 6 4 2 3 3 1 - 2 0 - 0) ;

M e F 4 C (S) - 3 - (4 - クロロフェニル) - 2 - (メチルアミノ) プロパン酸 (CAS 番号 : 3 4 7 8 5 1 - 7 0 - 1) ;

M e F 4 M e (S) - 2 - (メチルアミノ) - 3 - (p - トルイル) プロパン酸 (CAS 番号 : 2 3 0 7 7 8 2 - 2 5 - 6) ;

M e Y メチル - L - チロシン (CAS 番号 : 5 3 7 - 4 9 - 5) ;

P 4 S h (2 S, 4 S) - 4 - ヒドロキシピロリジン - 2 - カルボン酸 (CAS 番号 : 6 1 8 - 2 7 - 9) ;

p B p h 2 F (S) - 2 - アミノ - 3 - (2 - フルオロ - [1, 1' - ビフェニル] - 4 - イル) プロパン酸 (CAS 番号 : 1 3 8 9 9 0 0 - 8 8 - 2) ;

p B p h 3 F (S) - 2 - アミノ - 3 - (3 - フルオロ - [1, 1' -

ビフェニル] - 4 - イル) プロパン酸。

[0034] 2. ペプチド (A)

本発明の一態様は、ペプチド、又はその薬学的に許容される塩に関する。
一態様において、本発明のペプチドは、以下のアミノ酸配列：

E - R - V - F 4 C O O - A t p - D - R - B p h - P - Y - P - B p h
- Y - F 4 C O O - F 4 C O O - S - C (配列番号 1)

あるいは、上記のアミノ酸配列の 1 番目、2 番目、4 番目、5 番目、6 番目、7 番目、8 番目、9 番目、10 番目、11 番目、12 番目、13 番目、14 番目、15 番目及び 16 番目のアミノ酸残基からなるグループから選択される、1 - 15 個のアミノ酸残基において、置換、付加、欠失又は挿入を有するアミノ酸配列を含む。

[0035] E - R - V - F 4 C O O - A t p - D - R - B p h - P - Y - P - B p h
- Y - F 4 C O O - F 4 C O O - S - C (配列番号 1) は、本願明細書の実施例において、BMP 結合活性を有することが確認されたペプチドである。

配列番号 1 のアミノ酸配列の 1 番目、2 番目、4 番目、5 番目、6 番目、7 番目、8 番目、9 番目、10 番目、11 番目、12 番目、13 番目、14 番目、15 番目及び 16 番目のアミノ酸残基からなるグループから選択される、1 - 15 個のアミノ酸残基において、置換、付加、欠失又は挿入を有していてもよい。アミノ酸の置換、欠失、付加及び／又は挿入されたアミノ酸の数は、1 個以上 10 個以下であればよく、その下限は 1 個である。その上限は 10 個、9 個、8 個、7 個、6 個、5 個、4 個、3 個、2 個であり、最小 1 個である。好ましくは、アミノ酸の「置換」である。かかるアミノ酸の置換は、好適には保存的アミノ酸置換である。

[0036] 「保存的アミノ酸置換 (conservative amino acid substitution)」とは、機能的に等価又は類似のアミノ酸との置換を意味する。ペプチドにおける保存的アミノ酸置換は、通常、当該ペプチドの機能及び／又は活性に影響を及ぼさない。一般に、あるグループ内の置換は構造及び機能について保存的であると考えることができる。しか

しながら、当業者には自明であるように、特定のアミノ酸残基が果たす役割は当該アミノ酸を含む分子の三次元構造における意味合いにおいて決定され得る。例えば、システイン残基は、還元型の（チオール）フォームと比較してより極性の低い、酸化型の（ジスルフィド）フォームをとることができる。アルギニン側鎖の長い脂肪族の部分は構造的及び機能的に重要な特徴を構成し得る。また、芳香環を含む側鎖（トリプトファン、チロシン、フェニルアラニン）はイオン-芳香族相互作用又は陽イオン- π 相互作用に寄与し得る。かかる場合において、これらの側鎖を有するアミノ酸を、酸性又は非極性グループに属するアミノ酸と置換しても、構造的及び機能的には保存的であり得る。プロリン、グリシン、システイン（ジスルフィド・フォーム）等の残基は主鎖の立体構造に直接的な効果を与える可能性があり、しばしば構造的ゆがみなしに置換することはできない。

[0037] 保存的アミノ酸置換は、以下に示すとおり、側鎖の類似性に基づく特異的置換（例えば、レーニンジャー、生化学、改訂第2版、1975年刊行、73-75頁：L. Lehninger, Biochemistry, 2nd edition, pp73-75, Worth Publisher, New York (1975)に記載の置換）及び典型的置換を含む。また、保存的アミノ酸置換は、例えば、以下のように天然のアミノ酸をその共通する側鎖の性質に基づいて分けたグループにおいて、あるアミノ酸が属するグループと同じグループに属するアミノ酸への置換が好ましい。

[0038] 疎水性（非極性とも言う）アミノ酸：疎水性（非極性）を示すアミノ酸であって、アラニン（「A l a」又は単に「A」とも記す）、グリシン（「G l y」又は単に「G」とも記す）、バリン（「V a l」又は単に「V」とも記す）、ロイシン（「L e u」又は単に「L」とも記す）、イソロイシン（「I l e」又は単に「I」とも記す）、プロリン（「P r o」又は単に「P」とも記す）、フェニルアラニン（「P h e」又は単に「F」とも記す）、トリプトファン（「T r p」又は単に「W」とも記す）、チロシン（「T y r」又は単に「Y」とも記す）、メチオニン（「M e t」又は単に「M」

とも記す)を含む。

なお、疎水性アミノ酸はさらに以下のグループに分けることもできる。

脂肪族アミノ酸：側鎖に脂肪酸又は水素を有するアミノ酸であって、Ala、Gly、Val、Ile、Leuを含む。

脂肪族・分岐鎖アミノ酸：側鎖に分岐型脂肪酸を有するアミノ酸であって、Val、Ile、Leuを含む。

芳香族アミノ酸：側鎖に芳香環を有するアミノ酸であって、Trp、Tyr、Pheを含む。

[0039] 親水性（極性とも言う）アミノ酸：親水性（極性）を示すアミノ酸であって、セリン（「Ser」又は単に「S」とも記す）、スレオニン（「Thr」又は単に「T」とも記す）、システイン（「Cys」又は単に「C」とも記す）、アスパラギン（「Asn」又は単に「N」とも記す）、グルタミン（「Gln」又は単に「Q」とも記す）、アスパラギン酸（「Asp」又は単に「D」とも記す）、グルタミン酸（「Glu」又は単に「E」とも記す）、リジン（リシンとも記す。「Lys」又は単に「K」とも記す）、アルギニン（「Arg」又は単に「R」とも記す）、ヒスチジン（「His」又は単に「H」とも記す）を含む。

なお、親水性アミノ酸はさらに以下のグループに分けることもできる。

酸性アミノ酸：側鎖が酸性を示すアミノ酸であって、Asp、Gluを含む。

塩基性アミノ酸：側鎖が塩基性を示すアミノ酸であって、Lys、Arg、Hisを含む。

[0040] 中性アミノ酸：側鎖が中性を示すアミノ酸であって、Ser、Thr、Asn、Gln、Cysを含む。

また、Gly及びProについては、「主鎖の方角に影響を与えるアミノ酸」に分けることもでき、側鎖に硫黄分子を含むアミノ酸、Cys及びMetは、「含硫アミノ酸」に分けることもできる。

[0041] 本明細書において、「アミノ酸」は、天然のアミノ酸のみならず、非天然

のアミノ酸も含む。非天然のアミノ酸には、例えば、上記記載した天然のアミノ酸がN-アルキル化されたN-アルキルアミノ酸、ペプチド結合を形成する窒素が分岐した若しくは分岐しない低級（例えば、C1-C5の、好ましくは、C1-C3、より好ましくはC1）のアルキル基で修飾されたもの、が含まれる。N-アルキルアミノ酸においては、好ましくはN-エチルアミノ酸、N-ブチルアミノ酸又はN-メチルアミノ酸であり、さらに好ましくはN-メチルアミノ酸である。また、非天然のアミノ酸には、D型アミノ酸（D-アミノ酸とも記する）、 β -アミノ酸、 γ -アミノ酸、アミノ酸変異体、アミノ酸誘導体等の化学修飾されたアミノ酸、ノルロイシンやオルニチン等の生体内でタンパク質の構成材料とならないアミノ酸などが含まれる。さらに、天然のアミノ酸の側鎖に官能基がさらに付加された又は別の官能基に置換されたアミノ酸（例えば、側鎖のアリーレン基、アルキレン基等の部分に置換や付加を有するアミノ酸、側鎖のアリーレン基、アルキレン基やアルキル基のC数が増加したアミノ酸、側鎖の芳香環に置換を有するアミノ酸や、複素環化や縮合環化したアミノ酸など）が含まれる。

[0042] なお、天然のアミノ酸の側鎖に官能基等の構造が付加又は置換等されることで、天然のアミノ酸とは異なる性質を付与することができる。例えば、A4pはアラニンの側鎖にピペリジル基を有するアミノ酸であるが、当該ピペリジル基が付加されたことで、非極性アミノ酸グループに属するアラニンとは異なり、塩基性を有する極性アミノ酸の性質を示す。すなわち、天然のアミノ酸をその共通する側鎖の性質に基づいて分けた、前述のグループに、同様の側鎖の性質を有する非天然アミノ酸を含めることが出来る。例えば、塩基性アミノ酸に属するアルギニンの主鎖窒素原子がメチル化されたアミノ酸であるN-メチルアルギニン（MeR）は、非天然アミノ酸であるが、塩基性を示すため、塩基性アミノ酸に分類することができる。このように、あるアミノ酸と同様の側鎖の性質を示す非天然アミノ酸についても、保存的アミノ酸置換の対象として含むことができる。なお、deなどのD-アミノ酸は、D-アミノ酸として分類することもできるが、その側鎖の性質に従い分類

することもでき、N-メチルアミノ酸については、N-アルキルアミノ酸として分類することもでき、N-メチル化されていない元のアミノ酸の側鎖の性質に従い分類することもできる。

本明細書において、「非限定的に」、「一態様において」は、同義に用いられ得る。

[0043] 「その薬学的に許容される塩」は、いずれかのペプチドの塩を意味する。薬学的に許容される塩の例は、硫酸、塩酸、燐酸などの鉱酸との塩、酢酸、シュウ酸、乳酸、酒石酸、フマル酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸などの有機酸との塩、トリメチルアミン、メチルアミンなどのアミンとの塩、又はナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオンなどの金属イオンとの塩である。経時変化により、水分を含有することとなった化合物については、そのような水分も薬学的に許容される塩に含まれる。

[0044] 本発明の前記ペプチドは、以下に記載する、グループA1に属するペプチド、グループA2に属するペプチド、グループA3に属するペプチド、及びグループA4に属するペプチドを含む。

[0045] グループA1に属する本発明のペプチドは、一態様において、

以下のアミノ酸配列：

$E-R-V-F_4COO-Atp-D-R-Bph-P-Y-P-Bph-Y-F_4COO-F_4COO-S-C$ （配列番号1）、

又は、上記のアミノ酸配列において、以下の(1-i)～(1-xii)から選択される5つ以下のアミノ酸置換を有するアミノ酸配列を含む、ペプチドである。

(1-i) 配列番号1に記載のアミノ酸配列の1番目がAに置換。

(1-ii) 配列番号1に記載のアミノ酸配列の2番目が任意の極性アミノ酸に置換。

(1-iii) 配列番号1に記載のアミノ酸配列の4番目が非置換の若しくは置換されたYに置換。

(1-i v) 配列番号 1 に記載のアミノ酸配列の 5 番目が V に置換。

(1-v) 配列番号 1 に記載のアミノ酸配列の 6 番目が K C O p i p z a a に置換。

(1-v i) 配列番号 1 に記載のアミノ酸配列の 9 番目が S に置換。

(1-v i i) 配列番号 1 に記載のアミノ酸配列の 10 番目が H t y に置換。

(1-v i i i) 配列番号 1 に記載のアミノ酸配列の 11 番目が任意の脂肪族アミノ酸に置換。

(1-i x) 配列番号 1 に記載のアミノ酸配列の 12 番目が置換された B p h に置換。

(1-x) 配列番号 1 に記載のアミノ酸配列の 13 番目が F 4 F に置換。

(1-x i) 配列番号 1 に記載のアミノ酸配列の 15 番目が 4 P y に置換。

(1-x i i) 配列番号 1 に記載のアミノ酸配列の 16 番目が S を除く任意のアミノ酸に置換。

限定されるものではないが、上記 (1-i i) の任意の極性アミノ酸は、H c i t 又は K C O p i p z a a であってよく、上記 (1-i i i) の非置換の若しくは置換された Y は、非置換の Y であってよく、上記 (1-v i i i) の任意の脂肪族アミノ酸は、V であってよく、上記 (1-x i i) の S を除く任意のアミノ酸は、H であってよい。

また、限定されるものではないが、グループ A 1 に属する本発明のペプチドは、配列番号 1 に記載のアミノ酸配列において、上記 (1-i) ~ (1-x i i) から選択される 4 つ以下、3 つ以下、2 つ以下又は 1 つのアミノ酸置換を有するアミノ酸配列を含むペプチドであってよい。

[0046] また、グループ A 2 に属する本発明のペプチドは、一態様において、

以下のアミノ酸配列：

E-R-V-Y-V-D-R-3 P y 6 P h-S-Y-V-B p h-Y-F 4 C O O-F 4 C O O-S-C (配列番号 2)、

あるいは、上記のアミノ酸配列において、以下の (2-i) ~ (2-x i)

から選択される5つ以下のアミノ酸置換を有するアミノ酸配列を含む、ペプチド。

(2-i) 配列番号2に記載のアミノ酸配列の1番目がAに置換。

(2-ii) 配列番号2に記載のアミノ酸配列の2番目がK C O p i p z a aに置換。

(2-iii) 配列番号2に記載のアミノ酸配列の4番目がF 4 F又はF 4 C O Oに置換。

(2-iv) 配列番号2に記載のアミノ酸配列の6番目がK C O p i p z a aに置換。

(2-v) 配列番号2に記載のアミノ酸配列の7番目がKに置換。

(2-vi) 配列番号2に記載のアミノ酸配列の8番目がB p hに置換。

(2-vii) 配列番号2に記載のアミノ酸配列の9番目がP又はK C O p i p z a aに置換。

(2-viii) 配列番号2に記載のアミノ酸配列の11番目が任意の脂肪族アミノ酸に置換。

(2-ix) 配列番号2に記載のアミノ酸配列の12番目が置換されたB p hに置換。

(2-x) 配列番号2に記載のアミノ酸配列の13番目が置換されたFに置換。

(2-xi) 配列番号2に記載のアミノ酸配列の15番目が4 P yに置換。

限定されるものではないが、上記(2-viii)の任意の脂肪族アミノ酸は、P、H y p、P 4 S h、P c 4 F、P t 4 F、P 4 F 2又はa M e P Vであってよく、上記(2-x)の置換されたFは、F 4 Fであってよい。

また、限定されるものではないが、グループA2に属する本発明のペプチドは、配列番号2に記載のアミノ酸配列において、上記の(2-i)～(2-xi)から選択される4つ以下、3つ以下、2つ以下又は1つのアミノ酸置換を有するアミノ酸配列を含むペプチドであってよい。

[0047] また、グループA3に属する本発明のペプチドは、一態様において、

以下のアミノ酸配列：

A-R-V-Y-V-D-R-Bph-P-Y-A-Bph-Y-F4C
OO-F4COO-S-C（配列番号3）、

あるいは、上記のアミノ酸配列において、以下の（3-i）～（3-x）から選択される5つ以下のアミノ酸置換を有するアミノ酸配列を含む、ペプチド。

（3-i）配列番号3に記載のアミノ酸配列の2番目がK、KAc、Q又はKCOpipzaaに置換。

（3-ii）配列番号3に記載のアミノ酸配列の4番目がF4F又は4Pyに置換。

（3-iii）配列番号3に記載のアミノ酸配列の6番目がKCOpipzaa、K、R、G又はHに置換。

（3-iv）配列番号3に記載のアミノ酸配列の7番目がK、KAc、4Py、S又はCitに置換。

（3-v）配列番号3に記載のアミノ酸配列の8番目が3Py6Phに置換。

（3-vi）配列番号3に記載のアミノ酸配列の9番目がS、K、H、G、S又はKCOpipzaaに置換。

（3-vii）配列番号3に記載のアミノ酸配列の11番目が任意の脂肪族アミノ酸に置換。

（3-viii）配列番号3に記載のアミノ酸配列の12番目が3Py6Phに置換。

（3-ix）配列番号3に記載のアミノ酸配列の13番目がF4Fに置換。

（3-x）配列番号3に記載のアミノ酸配列の15番目が4Pyに置換。

限定されるものではないが、上記（3-vii）の任意の脂肪族アミノ酸は、V、P又はAであってよい。

また、限定されるものではないが、グループA3に属する本発明のペプチドは、配列番号3に記載のアミノ酸配列において、上記の（3-i）～（3

－x) から選択される4つ以下、3つ以下、2つ以下又は1つのアミノ酸置換を有するアミノ酸配列を含むペプチドであってよい。

また、グループA4に属する本発明のペプチドは、一態様において、以下のアミノ酸配列：

F－G－M e F－G－B p h－G－D－D－C h a－A－M e F－L－H－C
(配列番号241)、

又は、上記のアミノ酸配列において、以下の(4－i)～(4－xii)から選択される4つ以下のアミノ酸置換を有するアミノ酸配列を含む、ペプチドである。

(4－i) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の1番目が置換されたフェニルアラニンに置換。

(4－ii) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の3番目が置換されたN－メチルフェニルアラニンに置換。

(4－iii) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の4番目がd a若しくはd sに置換。

(4－iv) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の5番目が、芳香環上のCがNに置換されたビフェニルアラニンに置換。

(4－v) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の6番目がA若しくはd aに置換。

(4－vi) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の7番目がNに置換。

(4－vii) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の8番目がEに置換。

(4－viii) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の9番目がA c p eに置換。

(4－ix) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の10番目が任意の極性アミノ酸に置換。

(4－x) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の11番目が置換されたN－メチルフェニルアラニンに置換。

(4－xi) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の12番目が任意の脂肪

族アミノ酸に置換。

(4-x i i) 配列番号241に記載のアミノ酸配列の13番目が任意の極性アミノ酸に置換。

限定されるものではないが、上記(4-i x)の任意の極性アミノ酸は、H g l又はQであってよく、上記(4-x i)の任意の脂肪族アミノ酸は、側鎖の炭素数が7以下であってよく、上記(4-x i i)の任意の極性アミノ酸は、P 4 S h又はF 4 C O Oであってよい。

また、限定されるものではないが、グループA4に属する本発明のペプチドは、配列番号241に記載のアミノ酸配列において、上記の(4-i)～(4-x i i)から選択される3つ以下、2つ以下又は1つのアミノ酸置換を有するアミノ酸配列を含むペプチドであってよい。

前記ペプチドは、一態様において、環状ペプチドである。「環状ペプチド」については、「3. ペプチド(B)」で詳述する。

[0048] 前記ペプチドは、配列番号5～187、配列番号188～240、配列番号243～321、及び配列番号322～421のアミノ酸配列に加えて、付加的なアミノ酸残基を含んでもよい。「付加的なアミノ酸残基」については、「3. ペプチド(B)」で詳述する。

[0049] 前記グループA1乃至A3に属する本発明のペプチドは、BMP4に結合する。グループA1に属する本発明のペプチドは、好ましくは、さらにBMP7に結合する。また、グループA2に属する本発明のペプチドは、好ましくは、BMP7に結合しない。

[0050] 前記グループA1乃至A3に属する本発明のペプチドは、BMP4阻害活性を有する。前記ペプチドは、より好ましくは、ヒト幹細胞分化誘導制御活性を有する。「BMP4に結合する」、「BMP4阻害活性を有する」、「ヒト幹細胞分化誘導制御活性を有する」について、「3. ペプチド(B)」で詳述する。

前記グループA4に属するペプチドは、BMP7阻害活性を有する。前記ペプチドは、より好ましくは、ヒト幹細胞分化誘導制御活性を有する。「B

MP7 阻害活性を有する」、「ヒト幹細胞分化誘導制御活性を有する」について、「3. ペプチド (B)」で詳述する。

[0051] 3. ペプチド (B)

本発明の上記とは別の一態様は、以下のペプチド (B) に関する。

この態様の本発明のペプチドは、以下のアミノ酸配列：

X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10-X11
-X12-X13-X14-X15-X16-C (配列番号4)

ここにおいて、

X1 は、E、A、T 又は Q であり；

X2 は、R、K、H g l、任意の極性アミノ酸又は任意の脂肪族アミノ酸であり；

X3 は、V であり；

X4 は、複素環であってもよい芳香族環を側鎖に有するアミノ酸であり；

X5 は、任意の脂肪族アミノ酸、Y、D 又は A t p であり；

X6 は、D、任意の塩基性アミノ酸又は任意の極性アミノ酸であり；

X7 は、任意の塩基性アミノ酸又は任意の極性アミノ酸であり；

X8 は、置換基を有していてもよく、芳香環上の C が N に置換されていて
もよいビフェニルアラニンであり；

X9 は、任意のアミノ酸であり；

X10 は、Y、H t y 又は 4 P y であり；

X11 は、任意のアミノ酸であり；

X12 は、置換基を有していてもよく、芳香環上の C が N に置換されてい
てもよいビフェニルアラニンであり；

X13 は、非置換の若しくは置換された F、4 P y 又は 3 P y 6 N H 2 で
あり；

X14 は、F 4 C O O、D 又は G であり；

X15 は、F 4 C O O、Y、4 P y、3 P y 6 N H 2、W 7 N、H p h 又

はNであり；

X 1 6は、任意のアミノ酸である
を含む。

X 1－X 1 6の上記選択肢は任意の組み合わせで選択しうる。

なお、置換されたFは、フェニルアラニンが側鎖に有するベンゼン環に置換基を有するアミノ酸、複素環化した環を有するFの誘導体アミノ酸、又は、縮合多環構造を有するFの誘導体アミノ酸などを含む。よって、置換されたFはYを含む。

一態様において、X 2が、R、K、H g l、H c i t、K C O p i p z a a又はT i cである。

一態様において、X 5が、V、Y、D又はA t pである。

一態様において、X 6が、D、R、H、K、K C O p i p z a a、V、Y、D又はA t pである。

一態様において、X 7が、R、K又は任意の極性アミノ酸である。

一態様において、X 8が、非置換のB p h又は非置換の3 P y 6 P hである。

一態様において、X 1 2が、非置換のB p h又は非置換の3 P y 6 P hである。

一態様において、X 1 3が、非置換の若しくは置換されたFである。

一態様において、X 1 6が、S又はHである。

[0052] 本発明の前記ペプチドは、以下に記載する、グループB 1に属するペプチド、グループB 2に属するペプチド、グループB 3に属するペプチド、及びグループB 4に属するペプチドを含む。

[0053] 限定されるものではないが、グループB 1に属する本発明のペプチドは、以下のアミノ酸配列：

X 1－X 2－X 3－X 4－X 5－X 6－X 7－X 8－X 9－X 1 0－X 1 1
－X 1 2－X 1 3－X 1 4－X 1 5－X 1 6－C（配列番号4）

ここにおいて、

X 1 は、E であり；
X 2 は、R 又は任意の極性アミノ酸であり、
X 3 は、V であり；
X 4 は、非置換の若しくは置換された Y 又は F 4 C O O であり；
X 5 は、V 又は A t p であり；
X 6 は、D 又は K C O p i p z a a であり；
X 7 は、R であり；
X 8 は、B p h であり；
X 9 は、P 又は S であり；
X 1 0 は、Y 又は H t y であり；
X 1 1 は、任意のアミノ酸であり；
X 1 2 は、非置換の若しくは置換された B p h であり；
X 1 3 は、非置換の若しくは置換された F であり；
X 1 4 は、F 4 C O O であり；
X 1 5 は、F 4 C O O 又は 4 P y であり；
X 1 6 は、任意のアミノ酸である

を含む。

X 1 - X 1 6 の上記選択肢は任意の組み合わせで選択しうる。

一態様において、X 2 が、R、H c i t 又は K C O p i p z a a である。

一態様において、X 4 が、Y 又は F 4 C O O である。

一態様において、X 1 1 が、任意の脂肪族アミノ酸である。

一態様において、X 1 2 が、B p h である。

一態様において、X 1 3 は、Y 又は F 4 F である。

一態様において、X 1 5 は、F 4 C O O である。

一態様において、X 1 6 は、S 又は H である。

一態様において、X 2 が K C O p i p z a a であり、かつ、X 1 5 が 4 P y である。

[0054] また、限定されるものではないが、グループ B 2 に属する本発明のペプチ

ドは、

以下のアミノ酸配列：

X 1－X 2－X 3－X 4－X 5－X 6－X 7－X 8－X 9－X 1 0－X 1 1
－X 1 2－X 1 3－X 1 4－X 1 5－X 1 6－C（配列番号4）

ここにおいて、

X 1 は、E 又は A であり；

X 2 は、R 又は K C O p i p z a a であり；

X 3 は、V であり；

X 4 は、Y、F 4 F 又は F 4 C O O であり；

X 5 は、V であり；

X 6 は、D 又は K C O p i p z a a であり；

X 7 は、R 又は K であり；

X 8 は、3 P y 6 P h 又は B p h であり；

X 9 は、S、P 又は K C O p i p z a a であり；

X 1 0 は、Y であり；

X 1 1 は、任意の脂肪族アミノ酸でありであり；

X 1 2 は、B p h であり；

X 1 3 は、非置換の若しくは置換された F であり；

X 1 4 は、F 4 C O O であり；

X 1 5 は、F 4 C O O 又は 4 P y であり；

X 1 6 は、S である

を含む。

X 1－X 1 6 の上記選択肢は任意の組み合わせで選択しうる。

一態様において、X 1 1 が、V、P、H y p、P 4 S h、P c 4 F、P t
4 F、P 4 F 2 又は a M e P である。

一態様において、X 1 2 が、B p h である。

一態様において、X 1 3 は、Y 又は F 4 F である。

一態様において、X 1 5 は、F 4 C O O である。

[0055] また、限定されるものではないが、グループB 3に属する本発明のペプチドは、

以下のアミノ酸配列：

X 1－X 2－X 3－X 4－X 5－X 6－X 7－X 8－X 9－X 1 0－X 1 1
－X 1 2－X 1 3－X 1 4－X 1 5－X 1 6－C（配列番号4）

ここにおいて、

X 1 は、Aであり；

X 2 は、R、K A c、Q又はK C O p i p z a aであり；

X 3 は、Vであり；

X 4 は、Y、F 4 F又は4 P yであり；

X 5 は、Vであり；

X 6 は、D、K C O p i p z a a、K、R、G、又はHであり；

X 7 は、R、K、K A c、4 P y、S、又はC i tであり；

X 8 は、3 P y 6 P h又はB p hであり；

X 9 は、P、S、K、H、G、S又はK C O p i p z a aであり；

X 1 0 は、Yであり；

X 1 1 は、任意の脂肪族アミノ酸であり；

X 1 2 は、B p h又は3 P y 6 P hであり；

X 1 3 は、Y又はF 4 Fであり；

X 1 4 は、F 4 C O Oであり；

X 1 5 は、F 4 C O O又は4 P yであり；

X 1 6 は、Sである

を含む。

X 1－X 1 6の上記選択肢は任意の組み合わせで選択しうる。

一態様において、X 1 1 が、V、P又はAである。

[0056] また、限定されるものではないが、グループB 4に属する本発明のペプチドは、

以下のアミノ酸配列：

X 1 - X 2 - X 3 - X 4 - X 5 - X 6 - X 7 - X 8 - X 9 - X 1 0 - X 1 1
- X 1 2 - X 1 3 - X 1 4 (配列番号 2 4 2)

ここにおいて、

X 1 は、置換基を有していてもよく、芳香環上のCがNに置換されていてもよいフェニルアラニンであり；

X 2 は、Gであり；

X 3 は、置換基を有していてもよいN-メチルフェニルアラニンであり；

X 4 は、G、D体であってもよい脂肪族アミノ酸又は極性アミノ酸であり；

X 5 は、芳香環上のCがNに置換されていてもよいビフェニルアラニン、又は置換基を有していてもよいフェニルアラニンであり；

X 6 は、G、又はD体であってもよいAであり；

X 7 は、任意の極性アミノ酸であり；

X 8 は、任意の酸性アミノ酸であり；

X 9 は、任意の脂肪族アミノ酸であり；

X 1 0 は、任意のアミノ酸であり；

X 1 1 は、置換基を有していてもよいN-メチルフェニルアラニンであり；

X 1 2 は、任意の脂肪族アミノ酸であり；

X 1 3 は、任意のアミノ酸であり；

X 1 4 は、Cである

を含む。

[0057] 前記ペプチドは、一態様において、環状ペプチドである。「環状ペプチド」は、ペプチド中の2つのアミノ酸が結合し、その全部又は一部が環状になっているものをいう。前記ペプチドは、ペプチド中のアミノ酸が架橋構造を形成したもの、ラクタム環形成又はマクロ環化反応により環状構造を形成したもの、ラッセペプチド状構造を有するもの等も含む。すなわち、前記環状ペプチドは、その一部が環状構造を形成するものであればよく、直鎖部を有

していてもよい。

ペプチドは、一般的に生体内において代謝安定性が悪く、またサイズが大きいため細胞膜を透過しづらいという問題がある。そのような課題に対し、ペプチドを環状化させるという方法がとられてきた。ペプチドを環状化すると、プロテアーゼ耐性が向上し代謝安定性が向上し、またコンフォメーション変化にも制限が加わるため、剛直性が増して膜透過性や標的タンパク質との親和性が向上することが示唆されてきた。

一態様において、前記ペプチドは、クロロアセチル化したアミノ酸と、前記ペプチドに含まれるシステイン残基とが結合された環状構造を有する。一態様において、前記ペプチドは、N末端アミノ酸（1番目のアミノ酸残基）と、前記ペプチドに含まれるシステイン残基とが結合された環状構造を有する。一態様において、前記ペプチドは、N末端アミノ酸（1番目のアミノ酸残基）と、前記ペプチドに含まれる17番目のシステイン残基とが結合された環状構造を有する。一態様において、前記ペプチドは、クロロアセチル化したN末端アミノ酸（1番目のアミノ酸残基）と、前記ペプチドに含まれる17番目のシステイン残基とが結合された環状構造を有する。「クロロアセチル化」は、他のハロゲンによる「ハロゲンアセチル化」でもよい。また、「アセチル化」は、アセチル基以外のアシル基による「アシル化」でもよい。

[0058] 前記ペプチドは、一態様において、配列番号5-187、配列番号188～240、配列番号243～321、及び配列番号322～421のいずれか1つに記載のアミノ酸配列を含む、又はからなる。前記ペプチドは、一態様において、配列番号5-187、配列番号188～240、配列番号243～321、及び配列番号322～421のいずれか1つに記載のアミノ酸配列を含む、又はからなる、環状ペプチドである。前記ペプチドは、配列番号5-187、配列番号188～240、配列番号243～321、及び配列番号322～421のいずれか1つに記載のアミノ酸配列からなるペプチドであるか、それらから1～10個（好ましくは1～4個、1～3個、2個

又は1個)のアミノ酸残基が、置換、欠失、挿入又は付加したアミノ酸配列からなるペプチドである。なお、アミノ酸残基が付加した配列については、付加部分がリンカーであれば、多くのアミノ酸残基(例えば1~10個の残基)配列がさらに付加してもよい。また、これらアミノ酸残基が、置換、欠失、挿入又は付加したアミノ酸配列からなるペプチドは、例えばBMP 4への結合能を有するか、BMP 4及び/又はBMP 7阻害活性を有するものが好ましい。

[0059] 前記ペプチドは、配列番号4及び配列番号242に記載のアミノ酸配列に加えて、付加的なアミノ酸残基を含んでもよい。付加的なアミノ酸残基は、環状構造を成すペプチドに含まれてもよいし、当該環状ペプチドからさらにアミノ酸残基がリンカー状に付加されていてもよい。ペプチド、ペプチド部位のアミド結合の数(アミノ酸の数・長さ)は特に限定されない。

また、環状ペプチドからさらにリンカーが付加されていてもよい。リンカーとしては、例えば、前述のアミノ酸リンカー(ペプチドリinker)、化学リンカー、脂肪酸リンカー、核酸リンカー、糖鎖リンカーなどが挙げられ、また、例えば化学リンカーとペプチドリinkerなどの複合体であってもよい。化学リンカーとしては、例えば、1~24個のエチレングリコール単位からなるPEGリンカーであってよい。また、リンカーは、脂肪酸から誘導される二価化学部分を含む脂肪酸リンカーでもよい。アミノ酸(ペプチド)リンカーは、少なくとも1個のアミノ酸を含むリンカーであり、例えば、米国特許第7、271、149号に記載のような、配列[Gly-Gly-Gly-Gly-Ser]_n(式中、nは1、2、3、4、5又は6である)を有するペプチドなどのグリシンリッチペプチドや、米国特許第5、525、491号に記載のセリンリッチペプチドリinkerを用いることができる。なお、ペプチドリinkerにおいては、アミノ酸-アミノ酸間又はアミノ酸-化学リンカー間の結合が、アミノ酸の側鎖を介して結合していても良い。非限定的に、リンカーの付加によりペプチドの物性(例えば溶解度)が変化する場合がある。

リンカーの付加位置については、どこに付加されていても良い。例えば、C末端側に位置するCysに結合していてもよく、環状ペプチドに含まれるアミノ酸に結合していても良い。好ましくはC末端側に位置するCysに結合しているか、環状ペプチドに含まれるアミノ酸の側鎖に結合しているものである。

[0060] さらに、前記ペプチドは、リンカーなどを介して多量体を形成していてもよい。

前記グループB1乃至B3に属するペプチドは、BMP4への結合能を有する。グループB1に属する本発明のペプチドは、好ましくは、さらにBMP7への結合能を有する。また、グループB2に属する本発明のペプチドは、好ましくは、BMP7への結合能を有さない。

前記グループB4に属するペプチドは、BMP7阻害活性を有する。好ましくは、BMP4阻害活性を有さない。

[0061] BMPに結合することについて

前記ペプチドとBMPタンパク質との結合は、公知の分子間結合を測定する任意の方法によって測定することができる。非限定的に、例えば、表面プラズモン共鳴（SPR）アッセイ、スキャチャード解析ならびに／又は放射免疫アッセイ（RIA）、酵素免疫アッセイ（EIA）及びサンドイッチ競合アッセイなどの競合結合アッセイ、ならびに当技術分野でそれ自体公知であるその異なるバリエーションを含む、それ自体公知である任意の適切な様式で決定することが可能である。限定されるものではないが、ペプチドとBMPタンパク質について、このような公知の分子間結合を測定する任意の方法（例えば実施例15に示される方法）によって測定した結果、KD値が100nM以下であった場合に、当該ペプチドは、当該BMPタンパク質への結合能を有するものとしてよい。

なお、この明細書は新規ペプチドを提供する。BMPの阻害活性を有するペプチドは、好ましくは、BMPの結合活性を有するペプチドである。これは、実施例11、12で示されたBMP4及び／又はBMP7の阻害活性を

有するペプチドが、実施例 15（SPR 測定）結果で示された通り BMP への結合活性を有することからも示唆される。BMP の阻害活性を有するペプチドは、BMP が関与する各種疾患の治療や予防に有効である。BMP の結合活性を有するペプチドは、BMP が関与する各種疾患についての各種実験に有効である。骨形成因子 4（BMP 4）は、主に骨や軟骨の形成と発達に作用し、様々な骨の疾患とも関連がある（特許 6516724 号公報）。BMP 4 は、BMP シグナル伝達経路作用物質である（特許第 7120585 号公報）。骨形成因子 7（BMP-7）は、BMP シグナル伝達経路作用物質である（特許第 7120585 号公報）。

[0062] BMP 4 阻害活性を有することについて

BMP 4 阻害活性については、BMP 4 刺激による SMAD 1 のリン酸化により評価できる。具体的な方法は、例えば実施例 11 に記載の方法に基づいて評価すればよい。BMP 4 活性阻害剤として Noggin が知られている。BMP 4 阻害活性を有するペプチドは、公知の BMP 4 活性阻害剤と同程度の BMP 4 阻害活性を有することが好ましい。

本明細書において、BMP 4 阻害活性と BMP 4 シグナル伝達阻害活性は同義である。

[0063] BMP 7 阻害活性を有することについて

BMP 7 阻害活性については、BMP 7 刺激による SMAD 1 のリン酸化により評価できる。具体的な方法は、例えば実施例 12 に記載の方法に基づいて評価すればよい。BMP 7 活性阻害剤として Noggin が知られている。BMP 7 阻害活性を有するペプチドは、公知の BMP 7 活性阻害剤と同程度の BMP 7 阻害活性を有することが好ましい。

本明細書において、BMP 7 阻害活性と BMP 7 シグナル伝達阻害活性は同義である。

[0064] ヒト幹細胞分化誘導制御活性を有することについて

上記の通り、BMP 4 及び／又は BMP 7 阻害活性を有することについて評価することで、ヒト幹細胞分化誘導制御活性（阻害活性）を有することを

評価できる。

[0065] 本明細書において「ペプチド」は、特に言及しない限り、「2. ペプチド (A)」と、「3. ペプチド (B)」の双方を含む。また、本明細書において、ペプチドにはその薬学的に許容される塩も含まれる。

[0066] 4. ペプチドの製造

本発明のペプチドは、例えば以下のような、ペプチド製造のための任意の公知の方法によって、製造することができる。

液相法、固相法、液相法と固相法を組み合わせたハイブリッド法等の化学合成法；

遺伝子組み換え法、等。

[0067] 固相法は、例えば、水酸基を有するレジンの水酸基と、 α -アミノ基が保護基で保護された第一のアミノ酸（通常、目的とするペプチドのC末端アミノ酸）のカルボキシ基をエステル化反応させる。エステル化触媒としては、1-メシチレンスルホニル-3-ニトロ-1, 2, 4-トリアゾール (MSNT)、ジシクロヘキシルカルボジイミド (DCC)、ジイソプロピルカルボジイミド (DIC) 等の公知の脱水縮合剤を用いることができる。

次に、第一アミノ酸の α -アミノ基の保護基を脱離させるとともに、主鎖のカルボキシ基以外のすべての官能基が保護された第二のアミノ酸を加え、当該カルボキシ基を活性化させて、第一及び第二のアミノ酸を結合させる。さらに、第二のアミノ酸の α -アミノ基を脱保護し、主鎖のカルボキシ基以外のすべての官能基が保護された第三のアミノ酸を加え、当該カルボキシ基を活性化させて、第二及び第三のアミノ酸を結合させる。これを繰り返して、目的とする長さのペプチドが合成されたら、すべての官能基を脱保護する。

固相合成のレジンとしては、例えば、Merri field resin、MBHA resin、Cl-Trt resin、SASRIN resin、Wang resin、Rink amide resin、HMF resin、Amino-PEGA resin (メルク社)、HM

P A - P E G A resin (メルク社) 等が挙げられる。これらのレジンは、溶剤 (ジメチルホルムアミド (DMF)、2-プロパノール、塩化メチレン等) で洗浄してから用いることができる。

α -アミノ基の保護基としては、例えば、ベンジルオキシカルボニル (Cbz 又は Z) 基、tert-ブトキシカルボニル (Boc) 基、9-フルオレニルメチルオキシカルボニル (Fmoc) 基、ベンジル基、アリル基、アリルオキシカルボニル (Alloc) 基等が挙げられる。Cbz 基はフッ化水素酸、水素化等によって脱保護でき、Boc 基はトリフルオロ酢酸 (TFA) により脱保護でき、Fmoc 基はピペリジン又はピロリジンによる処理で脱保護できる。

α -カルボキシ基の保護は、例えば、メチルエステル、エチルエステル、アリルエステル、ベンジルエステル、tert-ブチルエステル、シクロヘキシルエステル等を用いることができる。

カルボキシ基の活性化は、縮合剤を用いて行うことができる。縮合剤としては、例えば、ジシクロヘキシルカルボジイミド (DCC)、ジイソプロピルカルボジイミド (DIC)、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド (EDC あるいはWSC)、(1H-ベンゾトリアゾール-1-イルオキシ) トリス (ジメチルアミノ) ホスホニウムヘキサフルオロホスファート (BOP)、1-[ビス (ジメチルアミノ) メチル]-1H-ベンゾトリアゾリウム-3-オキシドヘキサフルオロホスファート (HBTU) 等が挙げられる。

レジンからのペプチド鎖の切断は、TFA、フッ化水素 (HF) 等の酸で処理することによって行うことができる。

[0068] 遺伝子組み換え法 (翻訳合成系) によるペプチドの製造は、前記ペプチドをコードする核酸を用いて行うことができる。前記ペプチドをコードする核酸は、DNAであってもRNAであってもよい。

前記ペプチドをコードする核酸は、公知の方法又はそれに準ずる方法で調製することができる。例えば、自動合成装置によって合成することができる。

。得られたDNAをベクターに挿入するために制限酵素認識部位を加えてもよい。あるいは、できたペプチド鎖を酵素などで切り出すためのアミノ酸配列をコードする塩基配列を組み込んでよい。

宿主由来のプロテアーゼによる分解を抑制するため、目的のペプチドを他のペプチドとのキメラペプチドとして発現させるキメラタンパク質発現法を用いることもできる。この場合、前記核酸としては、目的とするペプチドと、これに結合するペプチドとをコードする核酸が用いられる。

続いて、当該ペプチドをコードする核酸を用いて発現ベクターを調製する。核酸はそのまま、又は制限酵素で消化し、又はリンカーを付加する等して、発現ベクターのプロモータの下流に挿入することができる。ベクターとしては、例えば、大腸菌由来プラスミド（pBR322、pBR325、pUC12、pUC13、pUC18、pUC19、pUC118、pBlue script II等）、枯草菌由来プラスミド（pUB110、pTP5、pC1912、pTP4、pE194、pC194等）、酵母由来プラスミド（pSH19、pSH15、YEp、YRp、Ylp、YAC等）、バクテリオファージ（φファージ、M13ファージ等）、ウイルス（レトロウイルス、ワクシニアウイルス、アデノウイルス、アデノ随伴ウイルス（AAV）、カリフラワーマザイクウイルス、タバコモザイクウイルス、バキュロウイルス等）、コスミド等が挙げられる。

プロモータは、宿主の種類に応じて適宜選択することができる。宿主が動物細胞である場合は、例えば、SV40（simian virus 40）由来プロモータ、CMV（cytomegalovirus）由来プロモータを用いることができる。宿主が大腸菌である場合は、trpプロモータ、T7プロモータ、lacプロモータ等を用いることができる。

発現ベクターには、例えば、DNA複製開始点（ori）、選択マーカー（抗生物質抵抗性、栄養要求性等）、エンハンサー、スプライシングシグナル、ポリA付加シグナル、タグ（FLAG、HA、GST、GFPなど）をコードする核酸等を組み込むこともできる。

次に、前記発現ベクターで適当な宿主細胞を形質転換する。宿主は、ベクターとの関係で適宜選択することができる。宿主としては、例えば、大腸菌、枯草菌、バチルス属菌、酵母、昆虫又は昆虫細胞、動物細胞等が用いられる。動物細胞として、例えば、HEK293T細胞、CHO細胞、COS細胞、ミエローマ細胞、HeLa細胞、Vero細胞を用いることができる。形質転換は、宿主の種類に応じ、リポフェクション法、リン酸カルシウム法、エレクトロポレーション法、マイクロインジェクション法、パーティクルガン法等、公知の方法に従って行うことができる。形質転換体を常法に従って培養することにより、目的とするペプチドが発現する。

[0069] 形質転換体の培養物からのペプチドの精製は、培養細胞を回収し、適当な緩衝液に懸濁してから超音波処理、凍結融解などの方法により細胞を破壊し、遠心分離やろ過によって粗抽出液を得る。培養液中にペプチドが分泌される場合には、上清を回収する。

粗抽出液又は培養上清からの精製も公知の方法又はそれに準ずる方法（例えば、塩析、透析法、限外ろ過法、ゲルろ過法、SDS-PAGE法、イオン交換クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィー、逆相高速液体クロマトグラフィー等）で行うことができる。

得られたペプチドは、公知の方法又はそれに準ずる方法で遊離体から塩に、又は塩から遊離体に変換してもよい。

[0070] 一態様において、翻訳合成系は、無細胞翻訳系としてもよい。無細胞翻訳系によれば、一般に、発現産物を精製することなく純度の高い形で得ることができる。無細胞翻訳系は、例えば、リボソームタンパク質、アミノアシルtRNA合成酵素（ARS）、リボソームRNA、アミノ酸、rRNA、GTP、ATP、翻訳開始因子（IF）伸長因子（EF）、終結因子（RF）、及びリボソーム再生因子（RRF）、並びに翻訳に必要なその他の因子を含む。発現効率を高くするために大腸菌抽出液や小麦胚芽抽出液を加えてもよい。他に、ウサギ赤血球抽出液や昆虫細胞抽出液を加えてもよい。

これらを含む系に、透析を用いて連続的にエネルギーを供給することで、

非限定的に、数100 μ gから数mg/mLのタンパク質を生産することができる。遺伝子DNAからの転写を併せて行うためにRNAポリメラーゼを含む系としてもよい。市販されている無細胞翻訳系として、大腸菌由来の系としてはロシュ・ダイアグノスティックス社のRTS-100（登録商標）、ジーンフロンティア社のPURESYSTEMやNEW ENGLAND Biolabs社のPURExpress In Vitro Protein Synthesis Kit等を、小麦胚芽抽出液を用いた系としてはゾイジーン社やセルフリーサイエンス社のもの等を使用できる。

[0071] 細胞翻訳系においては、天然のアミノアシルtRNA合成酵素に合成されるアミノアシルtRNAに代えて、所望のアミノ酸又はヒドロキシ酸をtRNAに連結（アシル化）した人工のアミノアシルtRNAを用いてもよい。かかるアミノアシルtRNAは、人工のリボザイムを用いて合成することができる。

かかるリボザイムとしては、フレキシザイム（flexizyme）（H. Murakami, H. Saito, and H. Suga, (2003)、Chemistry & Biology, Vol. 10, 655-662；及びWO2007/066627等）が挙げられる。フレキシザイムは、原型のフレキシザイム（Fx）、及び、これから改変されたジニトロベンジルフレキシザイム（dFx）、エンハンストフレキシザイム（eFx）、アミノフレキシザイム（aFx）等の呼称でも知られる。

フレキシザイムによって生成された、所望のアミノ酸又はヒドロキシ酸が連結されたtRNAを用いることにより、所望のコドン、所望のアミノ酸又はヒドロキシ酸と関連付けて翻訳することができる。所望のアミノ酸としては、特殊アミノ酸を用いてもよい。例えば、上述した環状化に必要な非天然アミノ酸もこの方法により、結合ペプチドに導入することができる。

[0072] 前記ペプチドの化学合成は、例えば、段階的固相合成、配座的に支援される再ライゲーションを経るペプチドフラグメントの半合成、化学ライゲーションを含めた様々な当該技術分野において汎用される方法を使用して合成で

きる。前記ペプチドの合成は、例えば、K. J. Jensen、P. T. Shelton、S. L. Pedersen、Peptide Synthesis and Applications、2nd Edition、Springer、2013などに記載されるような種々の固相技術を使用する化学合成である。好ましいストラテジーとして、 α -アミノ基を一時的に保護しかつ塩基による選択的除去を可能とするFmoc基と、側鎖官能基を一時的に保護しかつ脱Fmoc条件に安定な保護基の組み合わせに基づく。そのような一般的なペプチド側鎖の選択は前述のPeptide Synthesis and Applications、第2版やG. B. Fields、R. L. Noble、Solid Phase Peptide Synthesis Utilizing 9-Fluorenylmethoxycarbonyl Amino Acids、Int. J. Peptide Protein Res. 35、1990、161-214などに記載されているが、好ましいペプチド側鎖保護基としては、例えば、セリンやトレオニンのヒドロキシ基に対するベンジル基やtert-ブチル基及びトリチル(Trt)基、チロシンのヒドロキシ基に対する2-ブロモベンジルオキシカルボニル基やtert-ブチル基、リジン側鎖のアミノ基に対するBoc基、メチルテトラゾールチオール(Mtt)基、Alloc基、及びivDde基、ヒスチジンのイミダゾール基に対するTrt基やBoc基、アルギニンのグアニジル基に対する2、2、4、6、7-ペンタメチルジヒドロベンゾフラン-5-スルホニル基(Pbf)基、グルタミン酸やアスパラギン酸をはじめとするカルボキシル基に対するtert-ブチル基、アリル基、及び3-メチルペンタン(Mpe)基、グルタミンやアスパラギンのカルボキサミド基に対するTrt基、また、システインのチオール基に対するTrt基及びモノメトキシトリチル(Mmt)基が挙げられる。

[0073] 前記ペプチドは、前述した固相樹脂上で段階的方法において合成できる。使用するC末端アミノ酸及び合成に使用するすべてのアミノ酸やペプチドは、 α -アミノ保護基が合成過程において、選択的に除去されなければならな

い。好ましくは前述の固相樹脂を用い、N末端がFmoc基等により適切に保護されたペプチドのC末端カルボキシル基又はFmoc基で保護されたアミノ酸のC末端カルボキシル基を適切な試薬により活性化エステルとしたのち固相樹脂上のアミノ基に付加することにより開始する。引き続くペプチド鎖の伸長は、目的とするペプチドのアミノ酸配列に従って、N末端保護基（Fmoc基）の除去、次いで保護アミノ酸誘導体の縮合を順次繰り返すことにより達成することが可能である。なお、これらは目的のペプチドを最終段階で遊離させることができる。たとえば遊離させる条件として、Teixeira、W. E. Benckhuijsen、P. E. de Koning、A. R. P. M. Valentijn、J. W. Drijfhout、Protein Pept. Lett.、2002、9、379–385などに挙げられる、TFA中に捕捉剤として、水／シリルヒドリド／チオールを含むTFA溶液で遊離させることができる。典型的な例として、TFA／Water／TIS／DODT（体積比92.5：2.5：2.5：2.5）が挙げられる。

[0074] 本明細書に記載するペプチドの合成は、単又は多チャンネルペプチド合成機、たとえばCEM社のLiberty Blue合成機又はBiotage社のSyro 1合成機やそれらの後継機などを使用することで実施できる。

[0075] カルボキシ基の活性化は、縮合剤を用いて行うことができる。縮合剤としては、例えば、ジシクロヘキシルカルボジイミド（DCC）、ジイソプロピルカルボジイミド（DIPCDI）、1-エチル-3-（3-ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド（EDCあるいはWSC）、（1H-ベンゾトリアゾール-1-イルオキシ）トリス（ジメチルアミノ）ホスホニウムヘキサフルオロホスファート（BOP）、1-[ビス（ジメチルアミノ）メチル]-1H-ベンゾトリアゾリウム-3-オキシドヘキサフルオロホスファート（HBTU）等が挙げられる。

[0076] ペプチドの環化については、公知の方法に従って行うことができる。非限

定的に、例えば、ペプチドに2個以上のシステイン残基を含むよう設計することで、翻訳された後、ジスルフィド結合により環状構造を形成できる。また、Gotoらの方法(Y. Goto, et al., ACS Chem. Biol., 3, 120-129 (2008))に従い、遺伝暗号のリプログラミング技術により、N末端にクロロアセチル基を有するペプチドを合成し、ペプチド中に硫黄分子を含むシステイン残基を配置しておくことによっても環状化できる。これにより、翻訳後に自発的にメルカプト基がクロロアセチル基に求核攻撃し、ペプチドがチオエーテル結合により環状化する。遺伝暗号のリプログラミング技術により、結合して環状を形成するその他のアミノ酸の組合せをペプチド内に配置して環状化してもよい。あるいは、ペプチド中にL-2-アミノアジピン酸残基を配置し、N末端の主鎖アミノ基との間で結合することによって、環状化してもよい。このように、公知の環状化方法であれば、特に制限されず用いることができる。

[0077] 5. 本発明のペプチドを含むBMP4及び／又はBMP7シグナル伝達阻害剤、ヒト幹細胞の分化誘導制御剤、培養用培地添加物、培養用培地

本発明のペプチドは、BMP4への結合能を有する。BMP4は、その受容体であるBMPRIIと強く結合して、シグナルを細胞内に伝達し、細胞の分化・誘導を制御する機能を有することが知られている。本発明のペプチドは、BMP4と結合することにより、BMP4とBMP4受容体との結合を阻害し、これにより細胞内にBMP4シグナルが伝達するのを阻害する活性を有する。

本発明のペプチドは、BMP7シグナル伝達阻害活性を有する。

よって、本発明は、一態様において、前記ペプチドを含むBMP4及び／又はBMP7シグナル伝達阻害剤を提供する。

本発明は、一態様において、前記ペプチドを含むBMP4及び／又はBMP7シグナル伝達阻害のための組成物を提供する。

本発明は、一態様において、前記ペプチドをBMP4と接触させる工程を含む、BMP4のシグナル伝達活性を阻害する方法を提供する。限定される

ものではないが、前記ペプチドをBMP 4と接触させる工程は、*in vitro*で接触させる工程であってよい。

本発明は、一態様において、BMP 7のシグナル伝達活性を阻害する方法を提供する。

また、BMP 4及び／又はBMP 7は、前記シグナル伝達を通じて、ヒト幹細胞の分化・誘導を制御することから、BMP 4及び／又はBMP 7シグナル伝達阻害活性を有する前記ペプチドは、ヒト幹細胞の分化誘導制御活性を有する。

よって、本発明は、一態様において、前記ペプチドを含むヒト幹細胞の分化誘導制御剤を提供する。

本発明は、一態様において、前記ペプチドを含むヒト幹細胞の分化誘導制御能を有する組成物を提供する。

また、本発明は、一態様において、前記ペプチドを用いて、ヒト幹細胞の分化誘導を制御する方法を提供する。限定されるものではないが、前記方法は、前記ペプチドを、ヒト幹細胞を培養するための培地に添加することによって、実施することができる。前記方法は、好ましくは、*in vitro*で実施する方法であってよい。

[0078] ここで、前記ヒト幹細胞は、胚性幹細胞（ES細胞）や人工多能性幹細胞（iPS細胞）などの多能性幹細胞、間葉系幹細胞などの多分化能幹細胞を含む。

また、前記分化誘導制御能は、分化誘導の促進能又は抑制能であってよく、前記ヒト幹細胞の種類によって異なる。

上記のBMP 4及び／又はBMP 7シグナル伝達阻害のための組成物及び／又はヒト幹細胞の分化誘導制御剤、ヒト幹細胞の分化誘導制御能を有する組成物は、一態様として、医薬組成物であってもよく、また、医薬組成物製造のための原体であってもよい。

[0079] さらに、本発明は、一態様において、ヒト幹細胞の培養用培地添加物であって、前記ペプチド、前記BMP 4及び／又はBMP 7シグナル伝達阻害剤

、及び／又は、前記ヒト幹細胞分化誘導阻害剤を含む、培地添加物と、前記培地添加物を含むヒト幹細胞の培養用培地を提供する。培養用培地添加物は、溶液の形態であっても、乾燥した固体（例えば、固形状、粉末状等）の形態であってもよい。溶液の形態である場合には、そのまま培養用の培地として用いてもよいし、溶媒で希釈し、必要に応じて上述した添加剤を加えたものを、培養用の培地として用いてもよい。希釈する際に用いる溶媒としては、例えば、水、緩衝液、生理食塩水、各種細胞や組織培養に用いられる培地等が挙げられ、これらは単独で用いても、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

本発明の培養用培地は、細胞又は組織を培養するための培地であれば特に限定はされないが、その基本培地として、対象とするヒト幹細胞の培養に通常使用される培地を適宜使用して調製することができる。

[0080] BMP阻害剤として作用し、分化誘導制御能を有する分泌性タンパク質としては、N o g g i nやC h o r d i n、f o l l i s t a t i nなどが知られていたが、これらはタンパク質であるため、細胞の培養に用いる際には、培養コストがかかる上、再現性に乏しいなどの問題点があった。本発明の前記ペプチドを含むヒト幹細胞の分化誘導制御剤は、上記のタンパク質と比べ、製造コストが安価であり、精製が容易なため含有不純物も少ない。従って、本発明の培養培地の使用により、従来のものと比べ、培養コストを抑制し、再現性が高いヒト幹細胞分化誘導実験を行うことができる。

[0081] 本発明のペプチドを含む組成物は、本発明のペプチド以外に公知の担体（例えば、水、生理食塩水、又は賦形剤）を適宜含んでもよい。

[0082] 本発明のペプチドを含む剤は、本発明のペプチドを有効成分として有効量含む。本発明のペプチドを含む剤は、例えば、本発明のペプチドと公知の担体とを混合することで製造できる。そのような剤の剤形の例は、注射剤、及び経口投与剤である。本発明の剤を哺乳類（例えば、ヒト、マウス、ラット、モルモット、ウサギ、イヌ、ウマ、サル、ブタ、ヒツジ等）、特にヒトに投与する場合の投与量は、症状、患者の年齢、性別、体重、感受性差、投与

方法、投与間隔、有効成分の種類、製剤の種類によって異なり、特に限定されないが、例えば、 $30\mu\text{g}\sim 1000\text{mg}$ 、 $100\mu\text{g}\sim 500\text{mg}$ 、 $100\mu\text{g}\sim 100\text{mg}$ を1回又は数回に分けて投与することができる。注射投与の場合、患者の体重により、 $1\mu\text{g}/\text{kg}\sim 3000\mu\text{g}/\text{kg}$ 、 $3\mu\text{g}/\text{kg}\sim 1000\mu\text{g}/\text{kg}$ を1回又は数回に分けて投与してもよい。

[0083] [実施例]

以下、実施例に基づいて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。当業者は本明細書の記載に基づいて容易に本発明に修飾及び変更を加えることができ、それらは本発明の技術的範囲に含まれる。

[0084] 化学合成

以下の実施例における化学合成において使用された全ての原料、ビルディングブロック、試薬、酸、塩基、固相樹脂、溶媒は、市販品をそのまま用いたか、もしくは当業者にて有機化学的手法を用いて合成できるものである。なお、保護基を含むアミノ酸は特記が無い限り市販品をそのまま用いた。

固相樹脂におけるペプチド鎖の伸長は、それぞれの実施例に記載された樹脂を出発原料とし、通常用いられるペプチドカップリング反応条件とFmoc除去反応条件を用いて行った。反応はペプチド自動合成機であるBiotage社のSyro[®] I、Biotage社のSyro[®] II、CEM社のLiberty Blue、CEM社のLiberty Blue HT12、又はCEM社のLiberty Primeを使用し、製造元のマニュアルに従って行った。

使用した樹脂は、Fmoc-D-Glu(tBu)-Wang resin、NovaPEG Rink Amide resin、又はSeiber Amide resinを用い、使用した量は各ペプチドに応じて4mg-2gの範囲であった。

側鎖の脱保護および固相樹脂からの切り出しに用いる反応剤カクテルは、各ペプチドに応じて0.2mL-50mLであり、以下の組成の溶液を用い

た。

組成A : TFA / H₂O / TIS / DODT (92.5 / 2.5 / 2.5 / 2.5)

組成B : TFA / H₂O / TIS / DODT (90 / 2.5 / 2.5 / 5)

[0085] 使用した一般的なアミノ酸を下記に列挙し、側鎖保護基はカッコ内に示した。

Fmoc-Ala-OH ;
Fmoc-Arg (Pbf) -OH ;
Fmoc-Asn (Trt) -OH ;
Fmoc-Asp (OMpe) -OH ;
Fmoc-Asp (OtBu) -OH ;
Fmoc-Cys (Trt) -OH ;
Fmoc-Gln (Trt) -OH ;
Fmoc-Glu (OtBu) -OH ;
Fmoc-Gly-OH ;
Fmoc-Ile-OH ;
Fmoc-His (Boc) -OH ;
Fmoc-His (Trt) -OH ;
Fmoc-Leu-OH ;
Fmoc-Lys (Boc) -OH ;
Fmoc-Phe-OH ;
Fmoc-Pro-OH ;
Fmoc-Ser (tBu) -OH ;
Fmoc-Ser (Trt) -OH ;
Fmoc-Thr (tBu) -OH ;
Fmoc-Thr (Trt) -OH ;
Fmoc-Tyr (tBu) -OH ;
Fmoc-Val-OH。

[0086] 得られた粗精製ペプチドの精製方法として、Waters社AutoPurification System-SQD2 single quadrupole mass spectrometerで逆相分取HPLCを使用し、目的物由来の m/z イオンをモニタリングしながら溶出した。ESI-positiveのスキャンモードで得られるマススペクトルと目的物の分子式より計算される多価イオンを含むマススペクトルが使用した質量分析器の誤差範囲で一致していることを確認した。なお、使用したカラムを含む精製条件はそれぞれの実施例に示した。

化学合成されたペプチドの構造決定は、目的配列に従って用いたアミノ酸と必要に応じて用いたビルディングブロックを考慮し計算された分子量を、質量スペクトル分析法におけるESI-MS (+)により確認した。なお、“ESI-MS (+)”とは、正イオンモードで実施したエレクトロスプレーイオン化質量スペクトル分析法を示す。検出された質量は“ m/z ”単位表記によって報告された。なお、分子量がおおよそ1000より大きい化合物は、多価イオンとして高頻度で検出された。

以下の実施例において合成されたペプチドの質量スペクトル分析には、特に記載がない限り、以下の基本分析装置および基本条件を用いた。勾配B (%)はX/Y/Zのいずれかの条件を用いて分析を行った。

[0087] 装置: Shimadzu LC/MS system (LC-20AD XR, CTO-20AC, SPD-M20A, SIL-20AXR, CBM-20A and LCMS-2020)
カラム温度: 60°C
移動相A: 0.025% TFA in H₂O
移動相B: 0.025% TFA in MeCN
流速: 0.5 mL/min
波長: 225 nm PDA
勾配B (%): X: 20-60%/7.15 min, 60-95%/0.3 min, 95-95%/1.55 min;

Y : 40–80% / 7.15 min, 80–95% / 0.3 min, 95–95% / 1.55 min ;


Z : 5–45% / 7.15 min, 45–95% / 0.3 min, 95–95% / 1.55 min

実施例 1

[0088] BMP 4 シグナル伝達阻害ペプチド N o. 5 (配列番号 5) の合成

本実施例では、以下の構造を有する BMP 4 シグナル伝達阻害ペプチド N o. 5 (配列番号 5) を合成した。

[0089] [化1]



[0090] Sieber amide resin (Merck社、0.49 mol / g) を用い、一般的方法にて Fmoc 基の除去から開始し、目的の

ペプチドを合成した。その際、Biotage社のSyro IIを固相合成機として使用し、製造元のマニュアルに従って合成を行った。各残基の導入には樹脂1当量に対し、Fmoc-AA/HATU/DIEA（4.2当量/3.9当量/8.4当量）を用いDMF中75℃下、10分間2回反応を行った。ただし2残基目、7残基目、17残基目は50℃下、30分間2回反応を行った。

Fmoc除去は、室温下20%ピペリジンのDMF溶液と5分間反応させた後、溶液を除去後、再度室温下20%ピペリジンのDMF溶液と15分間反応させた。

クロロアセチル基の導入は、前工程で得られたFmoc保護されたペプチドが保持された固相樹脂に対し、前述した方法で α -アミノ基のFmoc基を除去したのち、0.3M クロロ酢酸のDMF溶液（4.2当量）、0.28M HCTUのDMF溶液（3.92当量）、1.05M DIPEAのDMF溶液（8.4当量）を固相樹脂に加え室温にて30分間振盪を2回繰り返すことにより行った。

側鎖の脱保護および固相樹脂からの切り出しは、まずクロロアセチル基導入工程後に得られた樹脂をDMFで5回と塩化メチレンで3回洗浄した後、減圧下乾燥し、続いて固相樹脂の入った反応容器に、反応剤カクテルA（TFA/H₂O/TIS/DODTの体積比92.5:2.5:2.5:2.5の混合物）を加え、室温で60分間振盪した。反応液をフリットより濾過回収した。この濾液を冷やした過剰のジイソプロピルエーテルに加えると沈殿が生じ、この混合物を遠心分離し（8500 rpm、30秒間）、溶液をデカンテーションした。得られた固体を再度冷やしたジエチルエーテル/ヘキサン（1/1）の混合溶媒にて洗浄後、減圧下乾燥した。得られた固体を次の環化反応に用いた。

ペプチドの環化反応は、ペプチドの終濃度が固相樹脂のモル数を基に2.5mMとなるようにDMSOに溶解後、トリエチルアミン（0.01mL）を加えて、室温で終夜振盪した。得られた反応溶液を減圧濃縮し、得られた

残差にDMSO (0.1 mL) を加えた。

得られた上記溶液は以下のとおり固相抽出した。(1) Gilson A SPEC (登録商標) C18 500mg 3mL (Gilson社) カラムを抽出液A (0.1% TFA in 95% MeCN/H₂O, 3mL) で洗浄した。(2) 抽出液B (0.1% TFA in 5% MeCN/H₂O, 3mL) で前記カラムを平衡化した。(3) 上記反応溶液0.1 mL を前記カラムにローディングした。(4) 抽出液B (4 mL) で前記カラムを洗浄した。(5) 抽出液A (4 mL) で抽出した。得られた抽出液を減圧濃縮した。

目的物の主たるピークの一つの純度は以下の分析条件のLC/MS (UV 波長220 nm) クロマトグラムの面積比から算出し43.4%であった。

分析条件：保持時間＝1.39分；

カラム：Kinetex (登録商標) EVO C18 1.7 μm 2, 1 × 50 mm；

移動相：A = 0.025% TFA in H₂O、B = 0.025% TFA in MeCN；

温度：60℃；

グラジエント (%B conc)：2.10分間かけて5-95%、その後0.75分間かけて95-95%；

流量：0.6 mL/min；

ESI-MS (+) 観測値 m/z = 1258.0 (M+2H)²⁺.


実施例 2

[0091] BMP4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 177 (配列番号177) の合成

本実施例では、以下の構造を有するBMP4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 177 (配列番号177) を合成した。

[0092]

[化2]



[0093] Fmoc-D-Glu(tBu)-Wang resin (渡辺化学、
0.62 mmol/g) を用い、一般的方法にて Fmoc 基の除去から開始し、目的のペプチドを合成した。Biotage 社の Syro 1 を固相合成機として使用し、製造元のマニュアルに従って合成を行った。各残基の導入には樹脂 1 当量に対し、Fmoc-AA/HATU/DIPEA (4.2 当量/4 当量/8.4 当量) を用い DMF 中 75℃下、20 分間 2 回反応を行った。ただし 2 残基目、7 残基目は室温下、30 分間 2 回反応を行った。17 残基目は室温下、30 分間 1 回反応を行った。18 残基目は 75℃下、20 分間 1 回反応を行った。

Fmoc 基除去は、室温下 20% ピペリジンの DMF 溶液と 5 分間反応させた後、溶液を除去後、再度室温下 20% ピペリジンの DMF 溶液と 15 分間反応させる条件を用いた。

クロロアセチル基の導入は、前工程で得られた Fmoc 保護されたペプチ

ドが保持された固相樹脂に対し、前述した方法で α -アミノ基のFmoc基を除去した後、クロロ酢酸（10当量）、DIPCI（10当量）とHOSu（10当量）から調整されたCIACOSuのDCM/DMF溶液を固相樹脂に加え室温にて60分間振盪することにより行った。

側鎖の脱保護および固相樹脂からの切り出しは、まずクロロアセチル基導入工程後に得られた樹脂をDMFで5回と塩化メチレンで3回洗浄した後、減圧下乾燥し、続いて固相樹脂の入った反応容器に、反応剤カクテルA（TFA/H₂O/TIS/DODTの体積比92.5:2.5:2.5:2.5の混合物）を加え、室温で90分間振盪した。反応液をフリットより濾過回収した。反応容器に残った固相樹脂は切り出し用カクテルと再度振盪し、フリットより溶液成分を回収、前述の濾液と混合した。この濾液をジエチルエーテル/ヘキサン（1/1）の混合溶媒に加えると沈殿が生じ、この混合物を遠心分離し、溶液をデカンテーションした。得られた固体を再度ジエチルエーテルにて洗浄後、減圧下乾燥した。得られた固体を次の環化反応に用いた。

[0094] ペプチドの環化反応は、ペプチドの終濃度が固相樹脂のモル数を基に5 mMとなるようにMeCN/H₂O（1/1）に溶解後、トリエチルアミン（10当量）を加えて、室温で15時間振盪した。得られた反応溶液に酢酸を加えた後Genevac EZ-11 eliteを用いて減圧濃縮した。

得られた粗生成物を以下の条件を用いて精製した。

カラム：Waters XBridge（登録商標） C18、30 x 150 mm；

移動相：A = 0.1% TFA in H₂O、B = 0.1% TFA in MeCN；温度：50℃；グラジエント（%B conc.）：3分間かけて9-34%、その後8分間かけて34-39%、その後1分間かけて39-60%；流量：45 mL/分。

目的物の純度は以下の分析条件のLC/MS（UV波長225 nm）クロマトグラムの面積比から算出し93.5%であった。

分析条件：保持時間＝4.49分；

カラム：Kinetex（登録商標） EVO C18 2.6 μm 2
 .1 x 150mm、100 Å；

移動相：A = 0.025% TFA in H_2O 、B = 0.025% TFA in MeCN；

温度：60 °C；グラジエント（%B conc）：7.15分間かけて
 20－60%、その後0.30分間かけて 60－95%、その後1.55
 分間かけて95－95%；

流量：0.5 mL／分


ESI-MS（+） 観測値 m/z = 1400.9 ($M+2H$)²⁺.

実施例 3

[0095] BMP4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 84（配列番号84）の合成

本実施例では、以下の構造を有するBMP4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 84（配列番号84）を合成した。

[0096] [化3]



[0097] Fmoc-D-Glu(OtBu)-Wang resin (渡辺化学、0.79 mmol/g) を用い、一般的方法にて Fmoc 基の除去から開始し、目的のペプチドを合成した。Biotage 社の Syro 1 を固相合成機として使用し、製造元のマニュアルに従って合成を行った。各残基の導入には樹脂 1 当量に対し、Fmoc-AA/HATU/DIPEA (4.2 当量/4 当量/8.4 当量) を用い DMF 中 75℃ 下、20 分間 2 回反応を行った。ただし 2 残基目は 75℃ 下、30 分間 2 回反応を行った。7 残基目は 50℃ 下、30 分間 2 回反応を行った。17 残基目は室温下、30 分間 2 回反応を行った。

Fmoc 基除去は、室温下 20% ピペリジンの DMF 溶液と 5 分間反応させた後、溶液を除去後、再度室温下 20% ピペリジンの DMF 溶液と 15 分間反応させる条件を用いた。

クロロアセチル基の導入は、前工程で得られた Fmoc 保護されたペプチドが保持された固相樹脂 1 当量に対し、ClAcOH/DIPCl/HOSu (5.3 当量/5.25 当量/5.3 当量) から調整された ClAcOSu の NMP/DCM 溶液を固相樹脂に加え室温にて 90 分間振盪することにより行った。

側鎖の脱保護および固相樹脂からの切り出しは、まずクロロアセチル基導入工程後に得られた樹脂を DMF で 5 回と塩化メチレンで 3 回洗浄した後、減圧下乾燥し、続いて固相樹脂の入った反応容器に、反応剤カクテル A (TFA/H₂O/TIS/DODT の体積比 92.5 : 2.5 : 2.5 : 2.5 の混合物) を加え、室温で 90 分間振盪した。反応液をフリットより濾過回収した。反応容器に残った固相樹脂は切り出し用カクテルと再度振盪し、フリットより溶液成分を回収、前述の濾液と混合した。この濾液を冷やした過剰のジイソプロピルエーテルに加えると沈殿が生じ、この混合物を遠心分離し、上澄みを除去した。得られた固体を再度冷やしたジエチルエーテルにて洗浄後、減圧下乾燥した。得られた固体を次の環化反応に用いた。

ペプチドの環化反応は、ペプチドの終濃度が固相樹脂のモル数を基に 2.5 mM となるように DMSO/H₂O (9/1) に溶解後、トリエチルアミン (10 当量) を加えて、室温で 2 時間振盪した。得られた反応溶液に酢酸を加えた後 Genevac EZ-11 elite を用いて減圧濃縮した。

得られた粗生成物を以下の条件にて精製した。

カラム: Jeanius One-Column、20 x 150 mm (Chroma Jean 社) ;

移動相: A = 0.1% TFA in H₂O、B = 0.1% TFA in MeCN ; 温度: 室温; グラジエント (%B conc) : 9 分間かけて 25.9-45.9%、その後 0.01 分間かけて 45.9-90% ;

流量: 20 mL/分。

目的物の純度は以下の分析条件の LC/MS (UV 波長 225 nm) クロマトグラムの面積比から算出し 82.8% であった。

分析条件: 保持時間 = 4.14 分; カラム: Kinetex (登録商標)

EVO C18 2.6 μm 2.1 x 150 mm、100 Å ; 移

動相: A = 0.025% TFA in H₂O、B = 0.025%

TFA in MeCN ; 温度: 60 °C ; グラジエント (%B conc) : 7.15 分間かけて 20-60%、その後 0.30 分間かけて 60-95%、その後 1.55 分間かけて 95-95% ; 流量: 0.5 mL/分
ESI-MS (+) 観測値 m/z = 1359.9 (M+2H)²⁺.


実施例 4

[0098] BMP4 シグナル伝達阻害ペプチド No. 87 (配列番号 87) の合成

本実施例では、以下の構造を有する BMP4 シグナル伝達阻害ペプチド No. 87 (配列番号 87) を合成した。

[0099]

[化4]



[0100] Sieber Amide resin (Merck社、0.48 mmol/g)を用い、前述の一般的方法にてFmoc基の除去から開始し、目的のペプチドを合成した。Biotage社のSyro 1を固相合成機として使用し、製造元のマニュアルに従って合成を行った。各残基の導入には樹脂1当量に対し、Fmoc-AA/HATU/DIPEA (4.2当量/4当量/8.4当量)を用いDMF中75℃下、20分間2回反応を行った。ただし2残基目は75℃下、30分間2回反応を行った。7残基目は50℃下、30分間2回反応を行った。17残基目は室温下、30分間2回反応を行った。

Fmoc基除去は、室温下20%ピペリジンのDMF溶液と5分間反応させた後、溶液を除去後、再度室温下20%ピペリジンのDMF溶液と15分間反応させる条件を用いた。

クロロアセチル基の導入は、前工程で得られたFmoc保護されたペプチド

が保持された固相樹脂 1 当量に対し、C I A c O H / D I P C I / H O S u (5 . 3 当量 / 5 . 2 5 当量 / 5 . 3 当量) から調整された C I A c O S u の N M P / D C M 溶液を固相樹脂に加え室温にて 9 0 分間振盪することにより行った。

側鎖の脱保護および固相樹脂からの切り出しは、まずクロロアセチル基導入工程後に得られた樹脂を D M F で 5 回と塩化メチレンで 3 回洗浄した後、減圧下乾燥し、続いて固相樹脂の入った反応容器に、反応剤カクテル A (T F A / H₂O / T I S / D O D T の体積比 9 2 . 5 : 2 . 5 : 2 . 5 : 2 . 5 の混合物) を加え、室温で 9 0 分間振盪した。反応液をフリットより濾過回収した。反応容器に残った固相樹脂は切り出し用カクテルと再度振盪し、フリットより溶液成分を回収、前述の濾液と混合した。この濾液を冷やした過剰のジイソプロピルエーテルに加えると沈殿が生じ、この混合物を遠心分離し、上澄みを除去した。得られた固体を再度冷やしたジエチルエーテルにて洗浄後、減圧下乾燥した。得られた固体を次の環化反応に用いた。

ペプチドの環化反応は、ペプチドの終濃度が固相樹脂のモル数を基に 2 . 5 m M となるように D M S O / H₂O (9 / 1) に溶解後、トリエチルアミン (1 0 当量) を加えて、室温で 2 時間振盪した。得られた反応溶液に酢酸を加えた後 G e n e v a c E Z - 1 1 e l i t e を用いて減圧濃縮した。

得られた粗生成物を以下の条件を用いて精製した。

カラム : J e a n i o u s O n e - C o l u m n 、 2 0 x 1 5 0 m m (C h r o m a J e a n 社) ;

移動相 : A = 0 . 1 % T F A i n H₂O 、 B = 0 . 1 % T F A i n M e C N ; 温度 : 室温 ; グラジエント (% B c o n c) : 9 分間かけて 1 8 . 7 - 3 8 . 7 % 、その後 0 . 0 1 分間かけて 3 8 . 7 - 9 0 % ; 流量 : 2 0 m L / 分。

目的物の純度は以下の分析条件の L C / M S (U V 波長 2 2 5 n m) クロマトグラム の面積比から算出し 9 0 . 3 % であった。

分析条件 : 保持時間 = 3 . 1 5 分 ; カラム : K i n e t e x (登録商標)


EVO C18 2.6 μ m 2.1 x 150mm、100 Å；移動相：A = 0.025% TFA in H₂O、B = 0.025% TFA in MeCN；温度：60 °C；グラジエント（%B conc）：7.15分間かけて20–60%、その後0.30分間かけて60–95%、その後1.55分間かけて95–95%；流量：0.5 mL／分
ESI-MS（+） 観測値m/z = 1283.6 (M+2H)²⁺.

実施例 5

[0101] BMP 7シグナル伝達阻害ペプチドの合成

本実施例では、以下の構造を有するBMP 7シグナル伝達阻害ペプチド（C I Ac-F-G-Me F-G-B ph-G-D-D-Ch a-A-Me F-L-H-C-G-NH₂，配列番号371，-NH₂は付加配列）を合成した。

[0102] [化5]



[0103] Sieber amide resin（渡辺化学，0.57 mmol／g）を用い、一般的方法にてFmoc基の除去から開始し、目的のペプチドを合成した。その際、Biotage社のSyro IIを固相合成機として使用し、製造元のマニュアルに従って合成を行った。各残基の導入には

樹脂 1 当量に対し、Fmoc-AA/HATU/DIEA (4.2 当量／3.9 当量／8.4 当量) を用い DMF 中 75℃下、20 分間 2 回反応を行った。ただし 11 残基目、13 残基目 50℃下、30 分間 2 回反応を行った。14 残基目は 25℃下、20 分間 2 回反応を行った。

Fmoc 除去は、室温下 20% ピペリジンの DMF 溶液と 5 分間反応させた後、溶液を除去後、再度室温下 20% ピペリジンの DMF 溶液と 15 分間反応させた。

クロロアセチル基の導入は、前工程で得られた Fmoc 保護されたペプチドが保持された固相樹脂に対し、前述した方法で α -アミノ基の Fmoc 基を除去したのち、0.3 M クロロ酢酸の DMF 溶液 (4.2 当量)、0.28 M HCTU の DMF 溶液 (3.9 当量)、1.05 M DIEA の DMF 溶液 (8.4 当量) を固相樹脂に加え室温にて 30 分間振盪を 2 回繰り返すことにより行った。

側鎖の脱保護および固相樹脂からの切り出しは、まずクロロアセチル基導入工程後に得られた樹脂を DMF で 3 回と塩化メチレンで 3 回洗浄した後、減圧下乾燥し、続いて固相樹脂の入った反応容器に、反応剤カクテル A (TFA/H₂O/TIS/DODT の体積比 92.5 : 2.5 : 2.5 : 2.5 の混合物) を加え、室温で 60 分振盪した。反応液をフリットより濾過回収した。この濾液を冷やした過剰のジイソプロピルエーテルに加えると沈殿が生じ、この混合物を遠心分離し (8500 rpm、30 秒間)、溶液をデカンテーションした。得られた固体を再度冷やしたジエチルエーテル／ヘキサン (1 / 1) の混合溶媒にて洗浄した。再度この固体を遠心分離し (8500 rpm、30 秒間)、溶液をデカンテーションした後、減圧下乾燥した。得られた固体を次の環化反応に用いた。

ペプチドの環化反応は、ペプチドの終濃度が固相樹脂のモル数を基に 2.5 mM となるように 30% 含水 DMSO に溶解後、トリエチルアミン (10 当量) を加えて、室温で終夜振盪した。得られた反応溶液を Genevac EZ-2 Elite を用いて減圧濃縮し、得られた残差に DMSO (0.

1 mL)を加えた。

得られた上記溶液はギルソン社のカラムを用い固相抽出した（カラム：G i l s o n A S P E C C 1 8 5 0 0 m g 3 m L）：（１）カラムを抽出液A（0.1% T F A i n 9 5 % M e C N / H ₂ O、3 mL）で洗浄した。（２）抽出液B（0.1% T F A i n 5 % M e C N / H ₂ O、3 mL）でカラムを平衡化した。（３）上記反応溶液0.1 mLをカラムにローディングした。（４）抽出液B（4 mL）でカラムを洗浄した。（５）抽出液A（4 mL）で抽出した。得られた抽出液をE Z - 2 E l i t eを用いて減圧濃縮した。

目的物の主たるピークの一つの純度は以下の分析条件のL C / M S（U V 波長220 nm）クロマトグラムの面積比から算出し60.1%であった。

分析条件：保持時間＝1.58分；カラム：K i n e t e x E V O C 1 8 1.7 μ m 2.1 × 5 0 m m；移動相：A ＝ 0.025% T F A i n H ₂ O、B ＝ 0.025% T F A i n M e C N；温度：60℃；グラジエント（%B c o n c）：2.10分間かけて5-95%、その後0.75分間かけて95-95%；流量：0.6 mL / m i n

E S I - M S（+） 観測値m / z ＝ 894.2（M + 2 H）²⁺。


実施例 6

[0104] BMP 7シグナル伝達阻害ペプチドの合成

本実施例では、以下の構造を有するBMP 7シグナル伝達阻害ペプチド（C I A c - F 4 F - G - M e F - G - 3 P y 6 P h - G - D - E - C h a - H g I - M e F 4 M e - L - P 4 S h - C - b A - d e - O H，配列番号417，b A - d e - O Hは付加配列）を合成した。

[0105]

[化6]



[0106] Fmoc-d-Glu(tBu)-Wang resin (渡辺化学, 0.62 mmol/g) を用い, 一般的方法にて Fmoc 基の除去から開始し, 目的のペプチドを合成した。CEM 社の Liberty Prime を固相合成機として使用し, 製造元のマニュアルに従って合成を行った。各残基の導入には樹脂 1 当量に対し, Fmoc-AA/DIC/Oxyma pure (5.25 当量/10 当量/5 当量) を用い DMF 中 105℃下、2 分間 1 回反応を行った。ただし 5 残基目は、NMP に溶解した Fmoc-AA を用いた。2 残基目、10 残基目は 90℃下、10 分間 2 回反応を行った。14 残基目は 50℃下、15 分間 1 回反応を行った。

Fmoc基除去は、4%ピロリジンのDMF溶液と110℃下、1分間反応させる条件を基本として用いた。ただし1残基目、3残基目、4残基目、5残基目、6残基目、7残基目は10%ピロリジンのDMF溶液と50℃下、90秒間反応させた。2残基目、10残基目は10%ピロリジンのDMF溶液と1分間反応させた後、溶液を除去後、再度室温下10%ピロリジンのDMF溶液と1分間反応させる条件を用いた。

クロロアセチル基の導入は、 ClAcOSu (10当量) のDCM/DMF 溶液を固相樹脂に加え室温にて60分間振盪することにより行った。

側鎖の脱保護および固相樹脂からの切り出しは、まずクロロアセチル基導入工程後に得られた樹脂をDMFと塩化メチレン、ついでジエチルエーテルで洗浄した後、減圧下乾燥し、続いて固相樹脂の入った反応容器に、反応剤カクテル-A (TFA/H₂O/TIS/DODTの体積比92.5 : 2.5 : 2.5 : 2.5の混合物)を加え、室温で75分間振盪した。反応液をフリットより濾過回収した。

得られた濾液を冷やした過剰のジエチルエーテル/ヘキサン (1/1) の混合溶媒に加えると沈殿が生じ、この混合物を遠心分離し、溶液をデカンテーションした。得られた固体を再度ジエチルエーテルにて洗浄後、減圧下乾燥した。得られた固体を次の環化反応に用いた。

ペプチドの環化反応は、ペプチドの終濃度が固相樹脂のモル数を基に5 mMとなるようにDMSOに溶解後、トリエチルアミン (10当量)を加えて、室温で20時間振盪した。得られた反応溶液に酢酸を加えた後Genevac EZ-11 eliteを用いて減圧濃縮した。

得られた粗生成物を以下の条件を用いて精製した。(カラム: Waters XBridge (登録商標) C18, 19 x 150 mm; 移動相: A = 0.1% TFA in H₂O, B = 0.1% TFA in MeCN; 温度: 50°C; グラジエント (%B conc.): 3分間かけて12-37%, その後8分間かけて37-42%, その後1分間かけて42-60%; 流量: 17 mL/分。

目的物の純度は以下の分析条件のLC/MS (UV波長225 nm) クロマトグラムの面積比から算出し97.93%であった。

分析条件: 保持時間=5.48分; カラム: Kinetex EVO C18 2.6 μm 2.1 x 150 mm, 100 Å; 移動相: A = 0.025% TFA in H₂O, B = 0.025% TFA in MeCN; 温度: 60 °C; グラジエント (%B conc): 7.15分間かけて20-60%, その後0.30分間かけて60-95%, その後1.55分間かけて95-95%; 流量: 0.5 mL/分


ESI-MS (+) 観測値 $m/z = 1013.5 (M+2H)^{2+}$.

実施例 7

[0107] BMP 7 シグナル伝達阻害ペプチドの合成

__本実施例では、以下の構造を有する BMP 7 シグナル伝達阻害ペプチド (C I A c - F - G - M e F - G - 3 P y 6 P h - G - D - E - C h a - H g I M e F - L - P 4 S h - C - b A - d e - O H , 配列番号 4 1 5 , b A - d e - O H は付加配列) を合成した。

[0108] [化7]



[0109] Fmoc-d-Glu(tBu)-Wang resin (渡辺化学, 0.62 mmol/g) を用い、一般的方法にて Fmoc 基の除去から開始し、目的のペプチドを合成した。CEM 社の Liberty Prime を固相合成機として使用し、製造元のマニュアルに従って合成を行った。各残基の導入には樹脂 1 当量に対し、Fmoc-AA/DIC/Oxyma pure (5.25 当量/10 当量/5 当量) を用い DMF 中 105℃ 下、2 分間 1 回反応を行った。ただし 5 残基目は、NMP に溶解した Fmoc-AA を用いた。2 残基目、10 残基目は 90℃ 下、10 分間 2 回反応を行った。14 残基目は 50℃ 下、15 分間 1 回反応を行った。15 残基目は 105℃ 下、1 分間 1 回反応を行った。

Fmoc 基除去は、4% ピロリジンの DMF 溶液と 110℃ 下、1 分間反応させる条件を基本として用いた。

ただし1残基目、3残基目、4残基目、5残基目、6残基目、7残基目は10%ピロリジンのDMF溶液と50℃下、90秒間反応させた。2残基目、10残基目は10%ピロリジンのDMF溶液と1分間反応させた後、溶液を除去後、再度室温下10%ピロリジンのDMF溶液と1分間反応させる条件を用いた。

クロロアセチル基の導入は、ClAcOSu（10当量）のDCM/DMF溶液を固相樹脂に加え室温にて60分間振盪することにより行った。

側鎖の脱保護および固相樹脂からの切り出しは、まずクロロアセチル基導入工程後に得られた樹脂をDMFと塩化メチレン、ついでジエチルエーテルで洗浄した後、減圧下乾燥し、続いて固相樹脂の入った反応容器に、反応剤カクテル-A（TFA/H₂O/TIS/DODTの体積比92.5:2.5:2.5:2.5の混合物）を加え、室温で75分間振盪した。反応液をフリットより濾過回収した。

得られた濾液を冷やした過剰のジエチルエーテル/ヘキサン（1/1）の混合溶媒に加えると沈殿が生じ、この混合物を遠心分離し、溶液をデカンテーションした。得られた固体を再度ジエチルエーテルにて洗浄後、減圧下乾燥した。得られた固体を次の環化反応に用いた。

ペプチドの環化反応は、ペプチドの終濃度が固相樹脂のモル数を基に5mMとなるようにDMSOに溶解後、トリエチルアミン（10当量）を加えて、室温で20時間振盪した。得られた反応溶液に酢酸を加えた後Genevac EZ-11 eliteを用いて減圧濃縮した。

得られた粗生成物を以下の条件を用いて精製した。（カラム：Jeanius One-Column 20mm I.D. x 150mm L；移動相：A = 0.1% TFA in H₂O, B = 0.1% TFA in MeCN；温度：60℃；グラジエント（%B conc.）：9分間かけて27.6-47.6%；流量：20mL/分。

目的物の純度は以下の分析条件のLC/MS（UV波長225nm）クロマトグラム の面積比から算出し94.88%であった。


分析条件：保持時間＝5.40分；カラム：Kinetex EVO C18 2.6 μm 2.1 x 150mm, 100 Å；移動相：A＝0.025% TFA in H_2O , B＝0.025% TFA in MeCN；温度：60 °C；グラジエント（%B conc）：7.15分間かけて20－60%，その後0.30分間かけて60－95%，その後1.55分間かけて95－95%；流量：0.5 mL／分
ESI－MS（+） 観測値 m/z ＝997.5 ($M+2H$)²⁺.

実施例 8

[0110] BMP 4 シグナル伝達阻害ペプチドの合成

本実施例では、以下の構造を有するBMP 4シグナル伝達阻害ペプチド（C1Ac－E－R－V－F4COO－V－KCOPipzaa－R－3Py6Ph－KCOPipzaa－Y－Hyp－Bph－Y－F4COO－F4COO－S－C－G－NH₂，配列番号277）を合成した。

[0111] [化8]



[0112] Sieber amide resin (渡辺化学, 0.57 mmol/g) を用い, 一般的方法にて Fmoc 基の除去から開始し, 目的のペプチドを合成した。CEM 社の Liberty Prime を固相合成機として使用し, 製造元のマニュアルに従って合成を行った。各残基の導入には樹脂 1 当量に対し, Fmoc-AA/DIC/Oxyma pure (4.2 当量/16 当量/6 当量) を用い DMF 中 105℃下、90 秒間 1 回反応を行った。ただし 8 残基目は、NMP に溶解した Fmoc-AA を用いた。2 残基目、7 残基目は 50℃下、15 分間 2 回反応を行った。17 残基目は 50℃下、15 分間 1 回反応を行った。

Fmoc 基除去は、4%ピロリジンの DMF 溶液と 110℃下、1 分間反応させる条件を用いた。

クロロアセチル基の導入は、ClAcOSu (5 当量) の DMF 溶液を固相樹脂に加え室温にて 60 分間振盪することにより行った。

側鎖の脱保護および固相樹脂からの切り出しは、まずクロロアセチル基導入工程後に得られた樹脂を DMF と塩化メチレン、ついでジエチルエーテルで洗浄した後、減圧下乾燥し、続いて固相樹脂の入った反応容器に、反応剤カクテル-A (TFA/H₂O/TIS/DODT の体積比 92.5 : 2.5 : 2.5 : 2.5 の混合物) を加え、室温で 90 分間振盪した。反応液をフリットより濾過回収した。

得られた濾液を冷やした過剰のジイソプロピルエーテル/ヘキサン (1/1) の混合溶媒に加えると沈殿が生じ、この混合物を遠心分離し、溶液をデカンテーションした。得られた固体を再度ジエチルエーテルにて洗浄後、減圧下乾燥した。得られた固体を次の環化反応に用いた。

ペプチドの環化反応は、ペプチドの終濃度が固相樹脂のモル数を基に 2.5 mM となるように DMSO に溶解後、トリエチルアミン (10 当量) を加えて、室温で 8 時間振盪した。得られた反応溶液に酢酸を加えた後 Genevac EZ-11 elite を用いて減圧濃縮した。

得られた粗生成物を以下の条件を用いて精製した。（カラム：W a t e r s X B r i d g e（登録商標） C 1 8, 3 0 x 1 5 0 mm；移動相：A = 0.1% T F A i n H₂O, B = 0.1% T F A i n M e C N；温度：5 0℃；グラジエント（%B c o n c.）：3 分間かけて5 - 2 2 %, その後8 分間かけて2 2 - 2 7 %, その後1 分間かけて2 7 - 6 0 %；流量：4 5 mL / 分。

目的物の純度は以下の分析条件のLC / MS（UV波長2 2 5 nm）クロマトグラム の面積比から算出し9 3. 2 9 %であった。

分析条件：保持時間=5. 3 6 分；カラム：K i n e t e x E V O C 1 8 2. 6 μm 2. 1 x 1 5 0 mm, 1 0 0 Å；移動相：A = 0. 0 2 5 % T F A i n H₂O, B = 0. 0 2 5 % T F A i n M e C N；温度：6 0 °C；グラジエント（%B c o n c）：7. 1 5 分間かけて5 - 4 5 %, その後0. 3 0 分間かけて4 5 - 9 5 %, その後1. 5 5 分間かけて9 5 - 9 5 %；流量：0. 5 mL / 分

E S I - M S（+） 観測値m / z = 1 0 0 1. 3 (M + 3 H)³⁺.


実施例 9

[0113] BMP 4 シグナル伝達阻害ペプチドの合成

本実施例では、以下の構造を有するBMP 4 シグナル伝達阻害ペプチド（C I A c - E - R - V - F 4 C O O - V - K C O p i p z a a - R - 3 P y 6 P h - K C O p i p z a a - Y - H y p - B p h 3 F - Y - F 4 C O O - F 4 C O O - S - C - G - N H 2, 配列番号3 1 1）を合成した。

[0114]

[化9]



[0115] Sieber amide resinを用い、一般的方法にてFmoc基の除去から開始し、目的のペプチドを合成した。CEM社のLiberty Primeを固相合成機として使用し、製造元のマニュアルに従って合成を行った。各残基の導入には樹脂1当量に対し、Fmoc-AA/DIC/Oxyma pure (4.2当量/16当量/6当量)を用いDMF中105℃下、90秒間1回反応を行った。ただし8残基目は、NMPに溶解したFmoc-AAを用いた。2残基目、7残基目は50℃下、15分間2回反応を行った。

Fmoc基除去は、4%ピロリジンのDMF溶液と110℃下、1分間反応させる条件を用いた。

クロロアセチル基の導入は、ClAcOH/HATU/DIEA (5当量/5当量/10当量)のDMF溶液を固相樹脂に加え室温にて30分間振盪することにより行った。

側鎖の脱保護および固相樹脂からの切り出しは、まずクロロアセチル基導入

工程後に得られた樹脂をDMFと塩化メチレン、ついでジエチルエーテルで洗淨した後、減圧下乾燥し、続いて固相樹脂の入った反応容器に、反応剤カクテル-A (TFA/H₂O/TIS/DODTの体積比92.5 : 2.5 : 2.5 : 2.5の混合物)を加え、室温で60分間振盪した。反応液をフリットより濾過回収した。

得られた濾液を冷やした過剰のジエチルエーテル/ヘキサン(1/1)の混合溶媒に加えると沈殿が生じ、この混合物を遠心分離し、溶液をデカンテーションした。得られた固体を再度ジエチルエーテルにて洗淨後、減圧下乾燥した。得られた固体を次の環化反応に用いた。

ペプチドの環化反応は、ペプチドの終濃度が固相樹脂のモル数を基に2 mMとなるようにMeCN/H₂O(1/1)に溶解後、トリエチルアミン(20当量)を加えて、室温で終夜振盪した。得られた反応溶液に酢酸(30当量)を加えた後Genevac HT-12を用いて減圧濃縮した。

得られた粗生成物を以下の条件を用いて精製した。(カラム: Waters XBridge (登録商標) C18, 30 x 150 mm; 移動相: A = 0.1% TFA in H₂O, B = 0.1% TFA in MeCN; 温度: 50°C; グラジエント(%B conc.): 3分間かけて5-23%, その後8分間かけて23-28%, その後1分間かけて28-60%; 流量: 45 mL/分。

目的物の純度は以下の分析条件のLC/MS(UV波長225 nm)クロマトグラムの面積比から算出し95.52%であった。

分析条件: 保持時間=5.04分; カラム: Kinetex EVO C18 2.6 μm 2.1 x 150 mm, 100 Å; 移動相: A = 0.025% TFA in H₂O, B = 0.025% TFA in MeCN; 温度: 60 °C; グラジエント(%B conc): 7.15分間かけて5-45%, その後0.30分間かけて45-95%, その後1.55分間かけて95-95%; 流量: 0.5 mL/分

ESI-MS (+) 観測値m/z = 1007.7 (M+3H)³⁺.

実施例 10

[0116] 各種ペプチド合成

本実施例では、実施例 1 または 2 と同様に、各種環状ペプチドを化学合成した。合成したペプチドの配列を、表 1、表 5、表 6 及び表 7 に示す。なお、実施例 1 と同様の方法で合成、精製したペプチドは表 1、表 6 及び表 7 の Synthesis 列に 1 と、実施例 2 と同様の方法で合成、精製したペプチドは Synthesis 列に 2 と示した。また、表 1 において、配列番号 46 以外のアミノ酸配列を有するペプチドは、クロロアセチル化された 1 番目のアミノ酸と 17 番目のアミノ酸 Cys が結合した環化構造をとり、さらにその Cys 末端に Gly や bA、さらに PEG が結合した構造を有する。なお、配列番号 46 は、配列番号 47 乃至 50 に記載のアミノ酸配列を有するが、C 末端のグリシン (G) 等の付加構造を有さない。表 6 のペプチドは 5' 末端のアミノ酸残基がクロロアセチル (ClAc) 基で置換されたものである。合成したペプチドを、基本分析装置および基本条件や実施例 1-9 に記載する分析条件で分析し、質量スペクトル分析法における ESI-MS (+) により構造を確認した。得られた ESI-MS (+) 観測値 (ESI (m/z)) と、その場合における価数 ([M+XH]^{X+}) を表 1 に示す。

[0117] 表 1

[表1-1]

SEQ ID No.	Peptide Sequence									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
6	A	R	V	Y	V	K	R	Bph	P	Y
7	A	R	V	Y	V	R	R	Bph	P	Y
8	A	R	V	Y	V	G	R	Bph	P	Y
9	A	R	V	Y	V	S	R	Bph	P	Y
10	A	R	V	Y	V	H	R	Bph	P	Y
11	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	K	Y
12	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	H	Y
13	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
14	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
15	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
16	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
17	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	G	Y
18	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	S	Y
19	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	V	Y
20	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	Y	Y
21	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
22	A	R	V	Y	V	K	R	Bph	KCOipzaa	Y
23	A	KCOipzaa	V	Y	V	K	R	Bph	P	Y
24	A	KCOipzaa	V	Y	V	KCOipzaa	R	Bph	P	Y
25	A	K	V	Y	V	D	R	Bph	K	Y
26	A	R	V	4Py	V	D	R	Bph	P	Y
27	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	4Py
28	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
29	A	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	P	Y
30	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
31	A	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	P	Y
32	A	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	P	Y
33	A	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	P	Y
34	A	K	V	Y	V	D	H	Bph	P	Y
35	A	K	V	Y	V	D	K	Bph	P	Y
36	A	K	V	Y	V	KCOipzaa	K	Bph	P	Y
37	A	KAc	V	Y	V	D	K	Bph	P	Y
38	A	KCOipzaa	V	Y	V	D	K	Bph	P	Y
39	A	Q	V	Y	V	D	K	Bph	P	Y
40	A	S	V	Y	V	D	K	Bph	P	Y

[0118]

[表1-2]

SEQ ID	Peptide Sequence(続き)									
	No.	11	12	13	14	15	16	17		
	5	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	6	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	7	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	8	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	9	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	10	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	11	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	12	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	13	A	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	14	P	Bph	Y	F4COO	Y	S	C	G	-NH2
	15	P	Bph	Y	F4COO	4Py	S	C	G	-NH2
	16	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	K	C	G	-NH2
	17	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	18	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	19	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	20	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	21	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	22	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	23	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	24	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	25	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	26	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	27	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	28	P	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	29	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	30	P	3Py6Ph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	31	P	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	32	P	3Py6Ph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	33	P	3Py6Ph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	34	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	35	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	36	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	37	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	38	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	39	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2
	40	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2

[0119]

[表1-3]

SEQ ID	(続き)					
No.	Ret time	ESI (m/z)	[M+XH]X+	aLISA BMP4	aLISA BMP7	Synthesis
5	4.288	1257.63	2	A	C	2
6	3.6	1264.26	2	A	C	2
7	3.62	1278.22	2	A	C	2
8	4.356	1228.64	2	A	C	2
9	4.316	1243.68	2	A	C	2
10	3.652	1268.7	2	A	C	2
11	3.388	1273.24	2	A	C	2
12	3.476	1277.67	2	A	C	2
13	4.188	1244.68	2	A	C	2
14	4.204	1243.87	2	B	C	2
15	3.576	824.63	3	A	B	2
16	3.556	852.65	3	A	C	2
17	3.924	1237.81	2	A	C	2
18	4.024	1252.72	2	A	C	2
19	4.484	1258.74	2	A	C	2
20	4.336	1290.71	2	A	C	2
21	4.376	1258.73	2	A	C	2
22	3.092	1364.86	2	A	C	2
23	3.676	1335.32	2	A	C	2
24	3.952	1420.41	2	A	C	2
25	3.612	1259.22	2	A	C	2
26	3.696	1250.19	2	A	C	2
27	3.272	1250.17	2	A	D	2
28	3.584	1250.16	2	A	C	2
29	3.46	1258.19	2	A	ND	2
30	3.404	1258.19	2	A	ND	2
31	2.924	834.15	3	A	ND	2
32	5.48	1258.67	2	A	ND	2
33	5.064	1251.17	2	C	ND	2
34	4.208	1234.15	2	A	C	2
35	4.096	1229.7	2	A	ND	2
36	3.836	1321.29	2	A	ND	2
37	4.808	1250.63	2	A	ND	2
38	4.396	1314.77	2	A	ND	2
39	4.748	1229.63	2	C	ND	2
40	4.828	1209.17	2	D	ND	2

[0120]

[表1-4]

SEQ ID No.	Peptide Sequence									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	A	Tic	V	Y	V	D	K	Bph	P	Y
42	A	K	V	Y	V	D	KAc	Bph	P	Y
43	A	K	V	Y	V	D	4Py	Bph	P	Y
44	A	K	V	Y	V	D	S	Bph	P	Y
45	A	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	K	Bph	P	Y
46	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
47	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
48	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
49	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
50	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
51	A	KCOpipzaa	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
52	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
53	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
54	Q	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
55	A	Cit	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
56	A	R	V	F4F	V	D	R	Bph	P	Y
57	A	R	V	Y	V	D	KCOpipzaa	Bph	P	Y
58	A	R	V	Y	V	D	Cit	Bph	P	Y
59	A	KCOpipzaa	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
60	A	KCOpipzaa	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
61	A	KCOpipzaa	V	Y	V	D	KCOpipzaa	Bph	P	Y
62	A	KCOpipzaa	V	Y	V	D	KCOpipzaa	Bph	P	Y
63	E	KCOpipzaa	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
64	E	KCOpipzaa	V	Y	V	D	KCOpipzaa	Bph	P	Y
65	E	KCOpipzaa	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
66	E	KCOpipzaa	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
67	E	KCOpipzaa	V	Y	V	D	KCOpipzaa	Bph	P	Y
68	E	KCOpipzaa	V	Y	V	D	KCOpipzaa	Bph	P	Y
69	A	K	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
70	A	R	V	Y	V	D	K	Bph	P	Y
71	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
72	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
73	E	KCOpipzaa	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
74	E	R	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
75	E	R	V	Y	V	D	KCOpipzaa	Bph	P	Y
76	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	KCOpipzaa	Bph	P	Y
77	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	KCOpipzaa	Y
78	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	KCOpipzaa	Y

[0121]

[表1-5]

SEQ ID	Peptide Sequence(続き)									
No.	11	12	13	14	15	16	17			
41	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
42	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
43	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
44	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
45	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
46	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	-NH2		
47	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
48	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	K	-NH2
49	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	PEG12Me	
50	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	K(OCOmPEG10000)	-NH2
51	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
52	P	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
53	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
54	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
55	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
56	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
57	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
58	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
59	P	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
60	P	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
61	P	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
62	P	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
63	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
64	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
65	P	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
66	P	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
67	P	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
68	P	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
69	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
70	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
71	P	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
72	P	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	G	-NH2	
73	P	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	G	-NH2	
74	P	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	G	-NH2	
75	P	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	G	-NH2	
76	P	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	G	-NH2	
77	P	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
78	P	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	G	-NH2	

[0122]

[表1-6]

SEQ ID	(続き)						
	No.	Ret time	ESI (m/z)	[M+XH]X+	aLISA BMP4		aLISA BMP7
41		5.296	1245.17	2	C	ND	2
42		4.988	1250.72	2	A	ND	2
43		4.248	1239.79	2	C	ND	2
44		4.928	1209.26	2	A	ND	2
45		4.02	1406.33	2	A	ND	2
46		4.204	1229.18	2	A	ND	2
47		4.172	1329.8	2	A	ND	2
48		3.64	886.17	3	C	ND	2
49		4.652	1024.37	3	C	ND	2
50		3.475	681.69	-	D	B	2
51		4.42	1328.83	2	A	ND	2
52		4.576	1258.73	2	A	ND	2
53		4.152	1286.76	2	A	ND	2
54		4.124	1286.28	2	A	C	2
55		4.792	1258.26	2	A	C	2
56		4.448	1258.74	2	A	ND	2
57		4.528	1328.81	2	C	C	2
58		4.888	1258.22	2	A	C	2
59		4.76	1329.85	2	A	C	2
60		3.832	1321.3	2	A	ND	2
61		4.984	1400.83	2	C	C	2
62		4.056	1392.35	2	D	ND	2
63		4.34	1357.8	2	A	C	2
64		4.576	1428.86	2	C	D	2
65		4.66	1358.78	2	A	C	2
66		3.764	1350.29	2	C	ND	2
67		4.888	1429.89	2	C	C	2
68		3.984	1421.39	2	D	ND	2
69		4.228	1243.73	2	A	C	2
70		4.224	1243.72	2	A	C	2
71		4.396	1287.85	2	A	C	2
72		3.852	844.51	3	A	C	2
73		4.012	891.91	3	A	B	2
74		3.508	905.59	3	A	C	2
75		4.092	891.93	3	C	C	2
76		3.836	1000.36	3	C	C	2
77		3.82	925.95	3	A	C	2
78		3.388	911.6	3	A	C	2

[0123]

[表1-7]

SEQ ID No.	Peptide Sequence									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	E	KCOpipzaa	V	Y	V	D	R	Bph	KCOpipzaa	Y
80	E	KCOpipzaa	V	Y	V	D	R	Bph	KCOpipzaa	Y
81	E	KCOpipzaa	V	Y	V	D	R	Bph	MeKCOpipzaa	Y
82	A	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
83	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
84	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
85	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	S	Y
86	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
87	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
88	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
89	E	K	V	Y	V	D	K	Bph	P	Y
90	E	K	V	Y	V	D	K	Bph	P	Y
91	E	K	V	Y	V	D	K	Bph	Y	Y
92	E	K	V	Y	V	D	K	Bph	Y	Y
93	E	K	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
94	A	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
95	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	S	Y
96	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
97	E	R	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	S	Y
98	E	R	V	Y	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	S	Y
99	E	KCOpipzaa	V	Y	V	D	R	Bph	S	Y
100	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	S	Y
101	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	S	Y
102	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	S	Y
103	E	R	V	F4C00	V	KCOpipzaa	R	Bph	S	Y
104	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
105	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
106	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
107	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
108	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
109	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
110	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
111	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
112	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
113	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
114	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
115	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
116	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y

[0124]

[表1-8]

SEQ ID	Peptide Sequence(続き)									
No.	11	12	13	14	15	16	17			
79	P	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
80	P	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	G	-NH2	
81	P	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	G	-NH2	
82	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
83	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
84	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
85	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
86	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
87	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
88	V	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
89	V	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
90	V	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	bA	de	-OH
91	V	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	bA	de	-OH
92	V	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	G	-NH2	
93	V	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
94	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
95	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
96	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
97	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
98	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
99	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
100	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
101	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
102	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
103	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
104	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
105	Aze	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
106	Hpr	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
107	Hyp	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
108	P4Sh	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
109	Pc4F	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
110	Pt4F	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
111	P4F2	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
112	aMeP	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
113	MeV	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
114	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
115	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-OH	
116	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	-OH	

[0125]

[表1-9]

SEQ ID	(続き)					
No.	Ret time	ESI (m/z)	[M+XH] ⁺ X ⁺	aLISA BMP4	aLISA BMP7	Synthesis
79	3.968	973.32	3	C	D	2
80	3.524	958.96	3	A	C	2
81	3.54	963.66	3	A	C	2
82	4.052	947.94	3	C	ND	2
83	3.924	967.28	3	A	ND	2
84	4.14	1359.91	2	A	C	2
85	3.956	1354.87	2	A	C	2
86	3.232	903.94	3	A	C	2
87	3.148	856.05	3	A	ND	2
88	4.476	1360.94	2	A	C	2
89	4.396	1333.08	2	C	B	2
90	3.98	874.74	3	C	B	2
91	4.028	896.71	3	C	C	2
92	3.984	848.73	3	C	C	2
93	4.428	1347.05	2	A	C	2
94	4.036	995.95	3	A	C	2
95	3.888	1353.89	2	A	C	2
96	3.184	903.17	3	A	C	2
97	3.588	963.91	3	A	B	2
98	2.956	964.23	3	A	C	2
99	4.064	1424.96	2	A	C	2
100	3.776	1011.31	3	A	C	2
101	3.076	1011.63	3	A	C	2
102	3.828	1011.95	3	C	C	2
103	3.532	973.27	3	A	A	2
104	4.028	1359.16	2	A	B	2
105	4.084	1351.88	2	C	C	2
106	4.408	1365.91	2	C	C	2
107	3.86	1366.89	2	A	C	2
108	3.94	1366.92	2	A	B	2
109	4.088	1367.83	2	C	C	2
110	3.992	1367.88	2	A	B	2
111	4.216	1376.88	2	A	C	2
112	4.38	1365.92	2	A	B	2
113	4.3	1366.92	2	C	C	2
114	3.92	966.63	3	A	C	2
115	4.136	966.97	3	A	C	2
116	3.904	971.93	3	A	C	2

[0126]

[表1-10]

SEQ ID No.	Peptide Sequence									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
118	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
119	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	S	Y
120	E	KCOpipzaa	V	Y	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	S	Y
121	E	R	V	F4COO	V	D	R	Bph	P	Y
122	E	R	V	F4COO	V	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
123	E	R	V	F4COO	V	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
124	E	R	V	F4COO	V	KCOpipzaa	R	Bph	S	Y
125	E	Hgl	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
126	E	Hph	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
127	E	Hcit	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
128	E	R	V	H	V	D	R	Bph	P	Y
129	E	R	V	W7N	V	D	R	Bph	P	Y
130	E	R	V	Y	Y	D	R	Bph	P	Y
131	E	R	V	Y	D	D	R	Bph	P	Y
132	E	R	V	Y	V	S	R	Bph	P	Y
133	E	R	V	Y	V	D	3Py6-NH2	Bph	P	Y
134	E	R	V	Y	V	D	F4G	Bph	P	Y
135	E	R	V	Y	V	D	Hcit	Bph	P	Y
136	E	R	V	Y	V	D	Atp	Bph	P	Y
137	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	Hcit	Y
138	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	W7N	Y
139	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	D	Y
140	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Hty
141	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
142	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
143	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
144	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
145	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
146	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
147	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
148	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
149	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
150	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
151	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
152	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
153	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
154	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y

[0127]

[表1-11]

SEQ ID	Peptide Sequence(続き)									
No.	11	12	13	14	15	16	17			
117	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
118	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-NH2
119	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
120	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
121	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
122	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
123	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
124	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
125	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
126	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
127	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
128	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
129	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
130	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
131	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
132	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
133	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
134	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
135	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
136	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
137	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
138	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
139	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
140	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
141	F4COO	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
142	F3aa	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
143	Y	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
144	R	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
145	Hcit	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
146	Atp	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
147	Q	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
148	V	Bph	3Py6-NH2	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
149	V	Bph	Y	F4COO	Y	S	C	G	-NH2	
150	V	Bph	Y	F4COO	3Py6-NH2	S	C	G	-NH2	
151	V	Bph	Y	F4COO	W7N	S	C	G	-NH2	
152	V	Bph	Y	F4COO	N	S	C	G	-NH2	
153	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	Hgl	C	G	-NH2	
154	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	E	C	G	-NH2	

[0128]

[表1-12]

SEQ ID	(続き)						
	No.	Ret time	ESI (m/z)	[M+XH]X+	aLISA BMP4	aLISA BMP7	Synthesis
117		3.952	1014.68	3	C	C	2
118		3.872	1014.34	3	A	C	2
119		3.168	1445.97	2	C	ND	2
120		3.056	963.62	3	A	ND	2
121		4.172	1372.87	2	A	B	2
122		3.724	976.57	3	A	C	2
123		3.78	977.28	3	A	C	2
124		3.632	973.93	3	A	C	2
125		1.5	1281.8	2	E	E	1
126		1.6	1290.3	2	F	ND	1
127		1.5	1295.9	2	D	F	1
128		1.4	1274.9	2	D	E	1
129		1.4	1300.5	2	D	E	1
130		1.4	1320	2	E	E	1
131		1.4	1296.2	2	D	F	1
132		1.4	1273.9	2	E	ND	1
133		1.4	1291.4	2	E	E	1
134		1.4	1312	2	E	E	1
135		1.5	1295.4	2	E	E	1
136		1.6	1287.4	2	E	E	1
137		1.4	1325.1	2	D	E	1
138		1.4	1332.8	2	E	F	1
139		1.4	1296.9	2	D	E	1
140		1.4	1295.2	2	E	ND	1
141		1.4	1334.6	2	D	E	1
142		1.4	1340.8	2	D	E	1
143		1.4	1320	2	D	E	1
144		1.3	1316.8	2	D	E	1
145		1.4	1324.1	2	D	E	1
146		1.4	1316.5	2	D	E	1
147		1.4	1302.4	2	D	E	1
148		1.3	1288.2	2	D	E	1
149		1.4	1273.9	2	E	E	1
150		1.3	1273.7	2	E	E	1
151		1.4	1286	2	E	E	1
152		1.4	1249.3	2	F	E	1
153		1.4	1315.8	2	D	E	1
154		1.4	1309.2	2	D	E	1

[0129]

[表1-13]

SEQ ID No.	Peptide Sequence									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
156	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
157	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
158	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
159	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
160	E	R	V	Y	Atp	D	R	Bph	P	Y
161	E	R	V	Y	Atp	D	R	Bph	S	Y
162	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	S	Y
163	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	S	Y
164	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	S	Y
165	E	R	V	Y	Atp	D	R	Bph	S	Y
166	E	R	V	Y	Atp	D	R	Bph	S	Y
167	E	R	V	Y	Atp	D	R	Bph	S	Y
168	E	Hcit	V	Y	V	D	R	Bph	S	Y
169	E	Hcit	V	Y	Atp	D	R	Bph	S	Y
170	E	R	V	Y	Atp	KCOpipzaa	R	Bph	S	Y
171	E	R	V	Y	Atp	KCOpipzaa	R	Bph	S	Y
172	A	R	V	Y3COO	V	D	R	Bph	P	Y
173	A	R	V	Y3CONmm	V	D	R	Bph	P	Y
174	A	R	V	F4COO	V	D	R	Bph	P	Y
175	E	R	V	F4COO	Atp	D	R	Bph	P	Y
176	E	R	V	F4COO	Atp	D	R	Bph	P	Y
177	E	R	V	F4COO	Atp	D	R	Bph	P	Y
178	E	R	V	F4COO	Atp	D	R	Bph	P	Y
179	E	R	V	F4COO	Atp	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
180	E	R	V	F4COO	Atp	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
181	E	R	V	F4COO	Atp	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
182	E	R	V	Y	Atp	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
183	E	R	V	Y	Atp	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
184	E	R	V	Y	Atp	KCOpipzaa	R	Bph	P	Y
185	E	KCOpipzaa	V	F4COO	Atp	D	R	Bph	P	Y
186	E	KCOpipzaa	V	F4COO	Atp	D	R	Bph	P	Y
187	E	KCOpipzaa	V	F4COO	Atp	D	R	Bph	P	Y

[0130]

[表1-14]

SEQ ID	Peptide Sequence(続き)									
	No.	11	12	13	14	15	16	17		
155	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	V	C	G	-NH2	
156	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	Aib	C	G	-NH2	
157	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	Hph	C	G	-NH2	
158	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	H	C	G	-NH2	
159	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	Hcit	C	G	-NH2	
160	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
161	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
162	F3aa	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
163	Y	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
164	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	H	C	bA	de	-OH
165	F3aa	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
166	Y	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
167	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	H	C	bA	de	-OH
168	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	H	C	bA	de	-OH
169	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	H	C	bA	de	-OH
170	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
171	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
172	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
173	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
174	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2	
175	F3aa	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
176	P4Sh	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
177	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
178	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
179	F3aa	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
180	P4Sh	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
181	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
182	F3aa	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
183	P4Sh	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
184	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA	de	-OH
185	F3aa	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	bA	de	-OH
186	P4Sh	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	bA	de	-OH
187	P	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C	bA	de	-OH

[0131]

[表1-15]

SEQ ID No.	(続き)		[M+XH]X+	aLISA BMP4	aLISA BMP7	Synthesis
	Ret time	ESI (m/z)				
155	1.5	1294.2	2	D	E	1
156	1.5	1287.1	2	E	E	1
157	1.5	1325.2	2	E	F	1
158	1.3	1313.4	2	D	F	1
159	1.4	1329.9	2	D	E	1
160	4.264	1387.96	2	A	B	2
161	3.948	1382.88	2	A	B	2
162	3.988	1407.9	2	A	B	2
163	3.908	1386.9	2	A	B	2
164	3.396	920.26	3	A	C	2
165	4.192	1435.98	2	A	B	2
166	4.104	1415	2	A	B	2
167	3.536	939.01	3	A	C	2
168	4.008	925.35	3	A	C	2
169	3.624	944.26	3	C	C	2
170	3.42	982.96	3	A	B	2
171	3.528	983.65	3	A	B	2
172	4.256	1279.73	2	C	C	2
173	4.524	1286.35	2	A	C	2
174	4.092	1271.77	2	A	C	2
175	4.516	970.27	3	A	B	2
176	3.848	1408.84	2	A	B	2
177	4.488	1400.91	2	A	B	2
178	4.612	1401.85	2	A	B	2
179	4.156	1031.35	3	C	B	2
180	3.94	1000.66	3	A	B	2
181	3.708	995.24	3	A	B	2
182	3.784	1021.91	3	A	B	2
183	3.452	991.68	3	A	B	2
184	3.664	986.36	3	A	B	2
185	4.052	1004.29	3	C	B	2
186	3.828	973.2	3	A	B	2
187	4.432	967.96	3	C	B	2

実施例 11

[0132] BMP 4 シグナル伝達阻害活性評価試験

本実施例では、実施例 10 で合成した配列番号 5-240、243-421 に記載のアミノ酸配列からなる各ペプチドの BMP 4 シグナル伝達阻害活性を、BMP 4 刺激による SMAD 1 のリン酸化により検証した。

A549 細胞を 10% FBS (サーモフィッシャーサイエンティフィック社) と 1×Non-essential amino acids (サー

モフィッシャーサイエンティフィック社)、 50 ug/mL Gentamicinを含むMEM (サーモフィッシャーサイエンティフィック社)で培養した。TrypLE (Gibco社)を用いて細胞を剥離後、1ウェルあたり20000細胞となるように接着細胞用96穴プレートに播種し、48時間培養した。

上記の通り細胞を培養後、培養液のFBSの代わりに0.1% BSA (Sigma社)が含まれた栄養飢餓培地で各濃度に希釈したペプチド溶液とRecombinant Human Noggin Protein (R&D社)溶液に交換し、30分培養後、BMP4を0.2 nM (最終濃度)加え60分刺激した。培地を除去し、AlphaLISA (登録商標)

SureFire (登録商標) Ultra SMAD1 (p-ser 463/465) Assay キット (PerkinElmer社)に付属するLysis Bufferで細胞を溶解した。キットのプロトコールに沿って実施し、シグナルの検出にはSpectraMax (登録商標)

Paradigm (登録商標) multimode microplate reader (Molecular Devices社)を使用した。得られたシグナルをGraphPad Prism (GraphPad Software社)で解析し、無刺激を100%阻害、BMP刺激のみを0%阻害として% inhibitionを計算した。

[0133] なお、配列番号5-187についてはペプチドの濃度は、実施例2と同様の方法にて合成したペプチド (Synthesis列に2と示した)は0.02、0.2、2 nMで、実施例1と同様の方法にて合成したペプチド (Synthesis列に1と示した)は0.2、2、20 nMで、それぞれ実施した。

評価結果は、実施例2と同様の方法にて合成したペプチドを用い評価した結果について、ペプチドを0.2 nMになるように添加した区において50%以上の阻害活性を示したものをA、0.2 nM添加区において50%未満、かつ2 nM添加区において50%以上の阻害活性を示したものをBまたはC

、2 nM添加区において50%未満の阻害活性を示したものをDと示した。

[0134] また、実施例1と同様の方法にて合成したペプチドを用い評価した結果について、0.2 nM添加区において50%以上の阻害活性を示したものをD、0.2 nM添加区において50%未満、かつ2 nM添加区において50%以上の阻害活性を示したものをE、2 nM添加区において50%未満、かつ20 nM添加区において50%以上の阻害活性を示したものをFとして示した。各ペプチドの評価結果を表1に示す。

[0135] 配列番号243-321については、表6に記載した濃度で試験を実施した。評価結果は、ペプチドを0.02 nMになるように添加した区において30%以上の阻害活性を示したものをA、0.02 nM添加区において30%未満、かつ0.2 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをB、0.2 nM添加区において30%未満、かつ2 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをCと示した。

各ペプチドの評価結果を表6に示す。

[0136] 配列番号322-421については、表7に記載した濃度で試験を実施した。まず、BMP4に対する評価結果は、ペプチド2 nM添加区において30%未満、かつ20 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをA、20 nM添加区において30%未満、かつ200 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをBと示した。各ペプチドの評価結果を表7に示す。

なお、結果のNDは、評価した最高濃度で30%未満の阻害活性であったことを示す。

本結果より、本発明のペプチドはBMP4シグナル伝達阻害活性を有することが示された。

実施例 12

[0137] BMP7シグナル伝達阻害活性評価試験

本実施例では、実施例10で合成した配列番号5-240、243-421に記載のアミノ酸配列からなる各ペプチドのBMP7シグナル伝達阻害活

性を、BMP 7 刺激によるS M A D 1 のリン酸化により検証した。

評価は、BMP 4 のかわりにBMP 7 を1 0 n M使用した。

[0138] なお、配列番号5－2 4 0についてはペプチドの濃度は、実施例1 1と同様に、実施例2と同様の方法にて合成したペプチド（S y n t h e s i s 列に2と示した）は1、1 0、1 0 0 n Mで、実施例1と同様の方法にて合成したペプチド（S y n t h e s i s 列に1と示した）は1 0、1 0 0、1 0 0 0 n Mで、それぞれ実施した。

[0139] 配列番号5－2 4 0のうち、実施例2と同様の方法にて合成したペプチドについては、ペプチドをそれぞれ1 n M、1 0 n M、1 0 0 n Mのモル濃度で添加した以外は、実施例1 1のA 5 4 9細胞を用いた検証と同様に実施した。評価結果は、ペプチドを1 n Mになるように添加した区において5 0 %以上の阻害活性を示したものをA、1 n M添加区において5 0 %未満、かつ1 0 n M添加区において5 0 %以上の阻害活性を示したものをB、1 0 n M添加区において5 0 %未満、かつ1 0 0 n M添加区において5 0 %以上の阻害活性を示したものをC、1 0 0 n M添加区において5 0 %未満の阻害活性を示したものをDとした。

[0140] また、実施例1と同様の方法にて合成したペプチドを用い評価した結果については、ペプチドをそれぞれ1 0 n M、1 0 0 n M、1 0 0 0 n Mのモル濃度で添加した以外は同様に実施した。評価結果は、それぞれ1 0 n Mになるように添加した区において5 0 %以上の阻害活性を示したものをE、1 0 n M添加区において5 0 %未満、かつ1 0 0 n M添加区において5 0 %以上の阻害活性を示したものをF、1 0 0 n M添加区において5 0 %未満、かつ1 0 0 0 n M添加区において5 0 %以上の阻害活性を示したものをG、1 0 0 0 n M添加区において3 0 %以上5 0 %未満の阻害活性を示したものをHとして示した。各ペプチドの評価結果を表1に示す。

なお、結果のN Dは、評価した最高濃度で3 0 %未満の阻害活性であったことを示す。

[0141] 配列番号2 4 3－2 7 3，及び配列番号2 9 9－3 2 1については、表6

に記載した濃度（10, 100, 1000 nM）で試験を実施した。評価結果は、ペプチドを10 nMになるように添加した区において30%未満、かつ100 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをD、1000 nM添加区において30%未満、かつ1000 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをEとして示した。

[0142] また、配列番号274-298については、表6に記載した濃度（100, 300, 1000 nM）で試験を実施した。

100 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをF、100 nM添加区において30%未満、かつ300 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをG、300 nM添加区において30%未満かつ、かつ1000 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをHとして示した。各ペプチドの評価結果を表6に示す。

なお、結果のNDは、評価した最高濃度で30%未満の阻害活性であったことを示す。

[0143] 配列番号322-370及び配列番号393-421については、濃度（1, 10, 100 nm）で試験を実施した。評価結果は、ペプチドを1 nMになるように添加した区において30%未満、かつ10 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをC、10 nM添加区において30%未満、かつ100 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをDとして示した。

[0144] また、配列番号371-391については、濃度（10, 30, 90 nM）で試験を実施した。評価結果は、10 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをE、10 nM添加区において30%未満、かつ30 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをF、30 nM添加区において30%未満、かつ90 nM添加区において30%以上の阻害活性を示したものをGとして示した。

各ペプチドの評価結果を表7に示す。

本結果より、本発明のペプチドは、BMP 4 及びBMP 7 両方のシグナル伝

達阻害活性を有するもの、又はBMP 7シグナル伝達阻害活性を有するものを含むことが示された。

実施例 13

[0145] BMP 4 及びBMP 7 に対するIC₅₀ 値

本実施例では、実施例 1 乃至 10 で合成した各BMP 4 およびBMP 7 シグナル伝達阻害ペプチドを用い、BMP 4 及びBMP 7 シグナル阻害活性 (IC₅₀) を算出した。

配列番号 87、177 及び181 のシグナル伝達阻害活性評価試験は、BMP 4 の阻害活性評価についてはペプチド濃度を2 nMから1/3 倍公比で8 点用いた以外はA549 細胞を用いた実施例 11 と同様に実施し、BMP 7 の阻害活性評価についてはペプチド濃度を100 nMから1/3 倍公比で8 点用いた以外は実施例 12 と同様に実施した。なお、ポジティブコントロールとしてRecombinant Human Noggin Protein (R&D 社) を、ペプチドと同じ濃度で用いた。

また配列番号 277 (実施例 8) について、BMP 4 阻害活性評価はペプチド濃度を20 nMから1/3 公比で8 点で実施例 11 と同様に、BMP 7 阻害活性評価はペプチド濃度1000 nMから1/3 公比で8 点で実施例 12 と同様に実施した。

また配列番号 417 (実施例 6) について、BMP 4 阻害活性評価はペプチド濃度を300 nMから1/4 公比で8 点で実施例 11 と同様に、BMP 7 阻害活性評価はペプチド濃度300 nMから1/4 公比で8 点で実施例 12 と同様に実施した。

結果を図 1、表 2-1、及び表 2-2 に示す。

なお、結果のNDは、本評価系において、IC₅₀ が算出されなかったことを示す。

[0146]

[表2-1]

表 2

Peptide SEQ ID No.	IC50 (nM)	
	BMP4	BMP7
87	0.08	ND
177	0.053	1.4
181	0.052	1.6
Noggin	0.08	2.7

[0147] [表2-2]

表2-2

Peptide SEQ ID No.	IC50(nM)	
	BMP4	BMP7
277	0.073	455
417	ND	15.6
Noggin	0.13	5.74

[0148] 表2-1の結果より、BMP4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 87、No. 177、No. 181はNogginと同程度のBMP4阻害活性を有することが示された。またBMP4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 177、No. 181はNogginと同程度のBMP7阻害活性をもつことが示された。なお、No. 87はBMP7のシグナル伝達を阻害しないことが示された。

表2-2の結果より、BMP4シグナル伝達阻害ペプチド配列番号277（実施例8）はNogginと同程度のBMP4阻害活性を有することが示された。また、BMP7シグナル伝達阻害ペプチド配列番号417（実施例6）はNogginと同程度のBMP7阻害活性を有し、BMP4のシグナル伝達を阻害しないことが示された。

実施例 14

[0149] その他のBMPファミリーシグナル伝達阻害活性評価試験

本実施例では、実施例2、実施例8、実施例6で合成したBMP4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 177、ペプチドNo. 29986（配列番号277（実施例8））、ペプチド配列番号417（実施例6）について、各BMPファミリーに属するBMP2、5、6、9、12、14によるシグナル伝達阻害活性の有無について実施例13と同様に検証した。

なお、評価における各BMPの濃度について、BMP2は0.3 nM、BMP5は2 nM、BMP6は3 nM、BMP9及びBMP12は10 nM、BMP14は0.6 nMを添加し刺激を与えた。

また、No. 177について、ペプチドの濃度は、BMP2に関しては10 nMから、BMP5に関しては200 nMから、BMP6に関しては100 nMから、BMP9およびBMP12に関しては1000 nMから、BMP14に関しては60 nMからそれぞれ1/3倍公比で8点で実施した。上記の点以外は実施例11と同様に評価した。なお、ポジティブコントロールとしてRecombinant Human Noggin Protein（R&D社）をペプチドと同じ濃度で用いた。

また、ペプチド配列番号277（実施例8）について、ペプチドの濃度は、BMP2に関しては30 nMから、BMP5に関しては200 nMから、BMP6に関しては300 nMから、BMP12に関しては1000 nMから、BMP14に関しては60 nMからそれぞれ1/3倍公比で8点で実施した。

また、ペプチド配列番号417（実施例6）について、ペプチドの濃度は、BMP2に関しては300 nMから、BMP5に関しては200 nMから、BMP6に関しては300 nMから、BMP12に関しては1000 nMから、BMP14に関しては60 nMからそれぞれ1/3倍公比で8点で実施した。

[0150] 得られた測定値から各BMPファミリーのIC50を算出した結果を表3に記載した。

なお、結果のNDは、本評価系において、IC50が算出されなかったこ

とを示し、結果のNTは、試験を実施していないことを示す。

また、BMP 4シグナル伝達阻害ペプチド配列番号No. 177の阻害曲線は図2に記載した。図中の三角はBMP 4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 177、四角はNogginを示す。結果より、BMP 4シグナル伝達阻害ペプチドNo. 177は、BMP 4と7のみならずBMP 2、5及び6に対してもシグナル伝達阻害活性を有することが示された。

[0151] [表3]

表3									
Seq. ID. No.	Ligand Conc.	BMP2	BMP4	BMP5	BMP6	BMP7	BMP9	BMP12	BMP14
		0.3 nM	0.2 nM	2 nM	3 nM	10 nM	10 nM	10 nM	0.6 nM
177		0.21 nM	0.053 nM	9.17 nM	3.9 nM	1.43 nM	ND	ND	ND
277		0.45 nM	0.073 nM	ND	ND	455 nM	NT	ND	ND
417		ND	ND	19.3 nM	28.7 nM	15.6 nM	NT	ND	ND

実施例 15

[0152] 表面プラスモン共鳴（SPR）によるBMP 4／BMP 7とペプチドとの分子間相互作用評価試験

本実施例では、実施例2及び3で合成した各ペプチドについて、BMP 4／BMP 7に対するペプチドの表面プラスモン共鳴（SPR）による分子間相互作用を、以下に示す方法によって試験を実施した。具体的な試験方法を以下に示す。

[0153] [SPR測定]

Biacore T200（Cytiva社）にCM5センサーチップ（Cytiva社）を挿入し、ランニング緩衝液：HBS-EP+（Cytiva社）でプライム操作を3回実施し、流速30 μ L/minで平衡化した。60 mM EDC溶液（Cytiva社）、650 mM NHS溶液（Cytiva社）を各々50 μ Lずつ混合させた後、流速10 μ L/minで420秒反応させた。10 mM 酢酸溶液（pH 5.0）で希釈して0.2 μ M BMP 4／BMP 7溶液150 μ L調製し、流速10 μ L/minで420秒反応させCM5センサーチップにBMP 4／BMP 7を固定化した。固定化後、1.0 M エタノールアミン水溶液（Cytiva）を流速10

$\mu\text{L}/\text{min}$ で420秒反応させキャッピングを行った。DMSO溶液中で10 mMに調製されたペプチド溶解液を、終濃度が10 μM のペプチド溶解液になるようにランニング緩衝液で希釈した後、100 nM、50 nM、25 nM、10 nM、5 nMのペプチド溶液を作製した。上述のサンプルを用い、BMP4/BMP7に対するペプチドのカイネティクスをSPR測定により取得した。

カイネティクス評価モデルは、Single Cycle Kineticsとし、Biacore T200 Evaluation Software Version 3.0 (Cytiva社)を使用してカーブフィッティングを行った。得られたセンサーグラムに対して、最小二乗法によるカーブフィッティングを実施し、そのKD値を求めることでペプチドのBMP4/BMP7に対する結合を評価した。得られた結果を表4に示す。

[0154] [表4]

表 4

Peptide SEQ ID No.	BMP4 (nM)	BMP7 (nM)
84	2.1	21.7
177	0.4	2.3

実施例 16

[0155] 各種ペプチドの合成

実施例10で作成したペプチドを表5、表6及び表7に示す。

[0156] 表5

[表5-1]

SEQ ID No.	Peptide Sequence									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	da	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
189	L	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
190	T	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
191	F	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
192	K	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
193	E	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
194	Q	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
195	A	A	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
196	A	KCOpiozaa	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
197	A	Cit	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
198	A	R	V	F4F	V	D	R	Bph	P	Y
199	A	R	V	5Ind	V	D	R	Bph	P	Y
200	A	R	V	Y	V	D	A	Bph	P	Y
201	A	R	V	Y	V	D	KCOpiozaa	Bph	P	Y
202	A	R	V	Y	V	D	Cit	Bph	P	Y
203	A	R	V	Y	V	D	R	F4Me	P	Y
204	A	R	V	Y	V	D	R	F44pip	P	Y
205	A	R	V	Y	V	D	R	F44pyz	P	Y
206	A	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	P	Y
207	A	R	V	Y	V	D	R	F43Py	P	Y
208	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	MeA	Y
209	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	F4F
210	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	5Ind
211	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
212	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
213	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
214	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
215	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y

[0157]

[表5-2]

SEQ ID No.	Peptide Sequence (続き)							
	11	12	13	14	15	16	17	
188	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
189	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
190	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
191	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
192	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
193	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
194	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
195	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
196	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
197	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
198	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
199	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
200	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
201	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
202	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
203	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
204	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
205	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
206	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
207	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
208	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
209	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
210	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
211	MeA	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
212	P	F4Me	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
213	P	F44pip	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
214	P	F44pyz	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂
215	P	3Pv6Ph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH ₂

[0158]

[表5-3]

SEQ ID No.	Peptide Sequence									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
217	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
218	A	R	V	Y	V	D	R	Bph	P	Y
219	T	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
220	Q	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
221	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
222	E	R	V	Y	V	S	R	3Py6Ph	S	Y
223	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
224	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
225	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
226	E	R	V	Y	V	KCOipzaa	R	3Py6Ph	S	Y
227	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
228	Q	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
229	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
230	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
231	Q	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
232	Q	R	V	F4aa	V	D	R	3Py6Ph	S	Y
233	E	R	V	F4COO	CF3A	D	R	3Py6Ph	S	Y
234	E	R	V	F4COO	Gcpr	D	R	3Py6Ph	S	Y
235	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
236	A	R	V	F4COO	V	D	R	Bph	P	Y
237	E	R	V	F4COO	V	D	R	Bph	P	Y
238	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	Bph	P	Y
239	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	Bph	P	Y
240	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	Bph	S	Y

[0159] [表5-4]

SEQ ID No.	Peptide Sequence (続き)						
	11	12	13	14	15	16	17
216	P	F43Py	Y	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
217	P	Bph	F4F	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
218	P	Bph	5Ind	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
219	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
220	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
221	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
222	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
223	Hyp	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
224	A	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
225	V	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
226	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
227	V	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
228	V	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
229	V	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
230	V	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
231	V	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
232	V	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
233	V	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
234	V	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
235	V	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
236	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
237	P	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C G -NH2
238	P	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C bA de -OH
239	V	Bph	F4F	F4COO	4Py	S	C bA de -OH
240	V	Bph	F4F	F4COO	4Pv	S	C bA de -OH

表 6

[0160] [表6-1-1]

Seq. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
244	A	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
245	L	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
246	E	R	V	4Py	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
247	E	R	V	F4F	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
248	E	KCO _{pipzaa}	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
249	E	R	V	H	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
250	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	H	Y	V
251	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Hty	V
252	L	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
253	E	R	V	Y	V	S	R	3Py6Ph	S	Y	V
254	E	R	V	Y	V	S	R	3Py6Ph	S	Hty	V
255	E	R	V	Y	V	KCO _{pipzaa}	R	3Py6Ph	S	Y	V
256	E	R	V	F4F	V	S	R	3Py6Ph	S	Y	V
257	T	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
258	Q	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
259	E	R	V	Y	V	S	R	3Py6Ph	S	Y	V
260	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	Hyp
261	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	A
262	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
263	E	R	V	Y	V	KCO _{pipzaa}	R	3Py6Ph	S	Y	V

[0161]

[表6-1-2]

										Ret time
Seq. No.	12	13	14	15	16	17	additional amino acids			
243	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.29
244	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.31
245	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.34
246	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.24
247	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.31
248	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.32
249	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.24
250	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.24
251	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.3
252	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.28
253	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.23
254	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.31
255	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.21
256	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		1.25
257	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		3.444
258	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		3.408
259	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		3.464
260	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		5.748
261	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		5.884
262	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		5.576
263	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G	-NH2		5.892

[0162]

[表6-1-3]

Seq. No.	ESI (m/z)	[M+XH] ⁺ X ⁺	aLIZA BMP4 (0.2 nM) % inh	aLIZA BMP7 (10 nM) % inh	Synthesis	Peptide Conc. in Assay (nM)	
						BMP4 Assay	BMP7 Assay
243	855.9	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
244	836.5	3	C	ND	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
245	850.7	3	C	ND	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
246	850.9	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
247	856.5	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
248	903.1	3	C	ND	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
249	847.2	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
250	872.5	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
251	860.5	3	C	ND	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
252	845.6	3	C	ND	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
253	841.6	3	C	ND	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
254	851.3	3	C	ND	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
255	912	3	C	ND	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
256	842.4	3	C	ND	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
257	846.52	3	C	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
258	855.54	3	B	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
259	846.56	3	C	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
260	860.54	3	B	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
261	846.52	3	C	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
262	850.89	3	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
263	916.96	3	C	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000

[0163]

[表6-2-1]

Seq.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	V
265	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
266	Q	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
267	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
268	E	R	V	Y	V	D	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	V
269	Q	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
270	Q	R	V	F4aao	V	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
271	E	R	V	F4COO	CF3A	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
272	E	R	V	F4COO	Gcpr	D	R	3Py6Ph	S	Y	V
273	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	V
274	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
275	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
276	E	R	V	F4COO	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
277	E	R	V	F4COO	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
278	E	KCOpipzaa	V	F4COO	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
279	E	KCOpipzaa	V	F4COO	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
280	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
281	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	V
282	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
283	E	R	V	F4COO	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
284	E	R	V	F4COO	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	V

[0164]

[表6-2-2]

									Ret	ESI	[M+XH]X+
Seq.No.	12	13	14	15	16	17	additional amino acids		time	(m/z)	
264	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.888	926.3	3
265	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		3.372	865.2	3
266	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.576	850.54	3
267	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.656	860.21	3
268	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.024	921.67	3
269	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.548	859.85	3
270	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.268	870.21	3
271	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.684	873.43	3
272	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.552	859.41	3
273	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.032	930.99	3
274	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.068	935.15	3
275	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.556	940.22	3
276	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		4.884	996.22	3
277	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.356	1001.3	3
278	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.036	1043.6	3
279	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2		5.472	1048.6	3
280	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	bA OH		4.984	940.26	3
281	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	bA OH		5.412	935.55	3
282	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	bA OH		5.528	945.28	3
283	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	bA OH		4.808	1001.3	3
284	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	bA OH		5.14	996.64	3

[0165]

[表6-2-3]

Seq.No.	aLIZA BMP4 (0.2 nM) % inh	aLIZA BMP7 (10 nM) % inh	Synthesis	Peptide Conc. in Assay (nM)	
				BMP4 Assay	BMP7 Assay
264	C	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
265	B	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
266	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
267	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
268	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
269	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
270	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
271	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
272	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
273	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
274	B	ND	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
275	B	G	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
276	B	ND	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
277	B	H	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
278	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
279	B	H	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
280	B	H	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
281	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
282	B	G	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
283	B	H	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
284	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000

[0166]

[表6-3-1]

Seq.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285	E	KCOipzaa	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
286	E	R	V	F4COO	V	D	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
287	E	R	V	F4COO	Atp	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
288	E	R	V	F4COO	Cha4tH	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
289	E	R	V	F4COO	Gthp	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
290	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	Bph4C	KCOipzaa	Y
291	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	pBph2F	KCOipzaa	Y
292	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
293	E	R	V	F4COO	Cha4tH	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
294	E	R	V	F4COO	Cha4tH	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
295	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	Bph4C	KCOipzaa	Y
296	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
297	E	R	V	F4COO	Atp	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
298	E	R	V	F4COO	Cha4tH	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
299	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
300	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
301	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
302	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y
303	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	Bph3C	KCOipzaa	Y
304	E	R	V	F4COO	V	KCOipzaa	R	pBph2F	KCOipzaa	Y
305	E	R	V	F4COO	A1Ac4pip	KCOipzaa	R	3Py6Ph	KCOipzaa	Y

[0167]

[表6-3-2]

Seq.No.	11	12	13	14	15	16	17	additional amino acids	Ret time	ESI (m/z)
285	Hyp	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	bA OH	5	1048.7
286	Hyp	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	bA de OH	4.956	983.31
287	Hyp	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	4.824	1014.9
288	Hyp	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	4.74	1019.6
289	Hyp	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	4.808	1010.2
290	Hyp	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.284	1007.9
291	Hyp	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.504	1001.9
292	Hyp	Bph3OMe	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	4.924	1006.3
293	Hyp	Bph3OMe	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	4.744	1029.6
294	Hyp	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.228	1024.6
295	Hyp	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	3.396	1012.5
296	Hyp	Bph3OMe	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.356	1011.2
297	Hyp	Bph3OMe	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.3	1029.9
298	Hyp	Bph3OMe	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.22	1034.6
299	Hyp	Bph4F	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.34	1007.6
300	Hyp	Bph3Me	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.35	1006.3
301	Hyp	pBph3F	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.34	1007.6
302	Hyp	pBph2F	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.34	1007.7
303	Hyp	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.42	1012.4
304	Hyp	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.4	1007.3
305	Hyp	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.31	1033.8

[0168]

[表6-3-3]

Seq.No.	[M+XH]X+	aLIZA BMP4 (0.2 nM) % inh	aLIZA BMP7 (10 nM) % inh	Synthesis	Peptide Conc. in Assay (nM)	
					BMP4 Assay	BMP7 Assay
285	3	C	H	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
286	3	B	G	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
287	3	C	H	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
288	3	B	F	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
289	3	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
290	3	B	G	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
291	3	B	G	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
292	3	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
293	3	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
294	3	B	F	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
295	3	B	F	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
296	3	B	ND	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
297	3	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
298	3	B	H	2	0.02, 0.2, 2	100, 300, 1000
299	3	C	ND	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
300	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
301	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
302	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
303	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
304	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
305	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000

[0169]

[表6-4-1]

Seq.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	E	R	V	F4COO	Cba	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
307	E	R	V	F4COO	Chg	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
308	E	R	V	F4COO	Cha	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
309	E	R	V	F4COO	Gthp	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
310	E	R	V	F4COO	Atp	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
311	E	R	V	F4COO	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
312	E	R	V	F4COO	V	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
313	E	R	V	F4COO	Cba	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
314	E	R	V	F4COO	Cba	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
315	E	R	V	F4COO	Cba	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
316	E	R	V	F4COO	Cba	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
317	E	R	V	F4COO	Cba	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
318	E	R	V	F4COO	Cha4tH	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
319	E	R	V	F4COO	Cha4tH	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
320	E	R	V	F4COO	Cha4tH	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp
321	E	R	V	F4COO	Cha4tH	KCOpipzaa	R	3Py6Ph	KCOpipzaa	Y	Hyp

[0170] [表6-4-2]

Seq.No.	12	13	14	15	16	17	additional amino acids	Ret time	ESI (m/z)
306	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.35	1010.2
307	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.35	1014.9
308	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.37	1019.5
309	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.31	1015.7
310	Bph	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	1.31	1020.2
311	Bph3F	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.044	1007.7
312	Bph3C	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.212	1013.2
313	Bph3F	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.528	1015.9
314	Bph3C	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.68	1021.5
315	Bph	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.028	1005
316	Bph3F	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	4.984	1011
317	Bph3C	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.248	1016.3
318	Bph3F	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.132	1030.6
319	Bph3C	Y	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	5.304	1036.1
320	Bph3F	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	4.592	1025.6
321	Bph3C	4Py	F4COO	F4COO	S	C	G -NH2	4.768	1031.1

[0171] [表6-4-3]

Seq.No.	[M+XH] ⁺ X ⁺	aLIZA BMP4 (0.2 nM) % inh	aLIZA BMP7 (10 nM) % inh	Synthesis	Peptide Conc. in Assay (nM)	
					BMP4 Assay	BMP7 Assay
306	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
307	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
308	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
309	3	C	ND	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
310	3	C	E	1	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
311	3	B	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
312	3	A	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
313	3	A	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
314	3	B	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
315	3	B	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
316	3	C	ND	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
317	3	B	ND	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
318	3	B	D	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
319	3	B	D	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
320	3	B	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000
321	3	B	E	2	0.02, 0.2, 2	10, 100, 1000

表 7

[0172]

[表7-1-1]

Seq ID										
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
322	4Py	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
323	3Py	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
324	F	G	MeF	G	F	G	D	D	Cha	A
325	F	G	MeF	G	F44Py	G	D	D	Cha	A
326	F	G	MeF	G	F43Py	G	D	D	Cha	A
327	F	G	MeF	G	F42Py	G	D	D	Cha	A
328	F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	D	Cha	A
329	F	G	MeF	G	F44thp	G	D	D	Cha	A
330	F	G	MeF	da	Bph	G	D	D	Cha	A
331	F	G	MeF	ds	Bph	G	D	D	Cha	A
332	F	G	MeF	G	Bph	A	D	D	Cha	A
333	F	G	MeF	G	Bph	da	D	D	Cha	A
334	F	G	MeF	G	Bph	G	N	D	Cha	A
335	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Acpe	A
336	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	E
337	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	Hgl
338	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	Ahp
339	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	Abu
340	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	Q
341	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	S
342	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	T
343	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	Hgn
344	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
345	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
346	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A

[0173]

[表7-1-2]

Seq ID							Ret	ESI
No.	11	12	13	14	additional amino acids		time	(m/z)
322	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.46	894.4
323	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.47	894.6
324	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.57	855.9
325	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.38	894.4
326	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.4	894.4
327	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.43	894.4
328	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.48	894.4
329	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.59	898
330	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.66	900.9
331	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.64	908.9
332	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.65	900.9
333	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.65	900.9
334	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.64	893.3
335	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.62	886.8
336	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.62	922.9
337	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.63	929.9
338	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.73	922
339	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.66	900.8
340	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.61	922.4
341	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.63	901.8
342	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.64	908.9
343	MeF	L	H	C	G	-NH ₂	1.62	929.4
344	MeF	Cha	H	C	G	-NH ₂	1.78	914.1
345	MeF	Ahp	H	C	G	-NH ₂	1.68	900.9
346	MeF	I	H	C	G	-NH ₂	1.63	893.9

[0174]

[表7-1-3]

Seq ID No.	[M+XH] ⁺ X ⁺	aLISA BMP4 (0.2 nM) % inh	aLISA BMP7 (10nM) % inh	Synthesis	Peptide Conc. in Assay (nM)	
					BMP4 Assay	BMP7 Assay
322	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
323	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
324	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
325	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
326	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
327	2	A	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
328	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
329	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
330	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
331	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
332	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
333	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
334	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
335	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
336	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
337	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
338	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
339	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
340	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
341	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
342	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
343	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
344	2	A	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
345	2	A	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
346	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100

[0175]

[表7-2-1]

Seq ID										
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
347	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
348	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
349	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
350	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
351	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
352	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
353	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
354	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
355	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
356	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
357	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
358	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	A
359	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	A
360	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	A
361	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	A
362	F	G	MeF	G	F	G	D	E	Cha	A
363	F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	A
364	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Q
365	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Abu
366	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Hgl
367	F	G	MeF	G	F	G	D	E	Cha	Q
368	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Q
369	F	G	MeF	G	F	G	D	E	Cha	Q
370	F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Q
371	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A

[0176]

[表7-2-2]

Seq ID							Ret	ESI
No.	11	12	13	14	additional amino acids		time	(m/z)
347	MeF	Chg	H	C	G	-NH2	1.66	906.9
348	MeF	L	A	C	G	-NH2	1.84	860.8
349	MeF	L	L	C	G	-NH2	1.9	881.8
350	MeF	L	Abu	C	G	-NH2	1.86	867.8
351	MeF	L	4Py2NH2	C	G	-NH2	1.65	906.8
352	MeF	L	G	C	G	-NH2	1.84	853.8
353	MeF	L	S	C	G	-NH2	1.82	868.8
354	MeF	L	N	C	G	-NH2	1.81	882.3
355	MeF	L	Hyp	C	G	-NH2	1.8	881.9
356	MeF	L	P4Sh	C	G	-NH2	1.82	881.8
357	MeF	L	F4COO	C	G	-NH2	1.82	920.9
358	MeF	L	H	C	G	-NH2	6.092	900.9
359	MeF	L	Abu	C	G	-NH2	3.747	875.2
360	MeF	L	4Py2NH2	C	G	-NH2	6.176	914
361	MeF	L	F4COO	C	G	-NH2	3.447	928.3
362	MeF	L	H	C	G	-NH2	5.004	863.3
363	MeF	L	H	C	G	-NH2	4.72	901.5
364	MeF	L	H	C	G	-NH2	5.792	929.5
365	MeF	L	H	C	G	-NH2	6.228	907.9
366	MeF	L	H	C	G	-NH2	6.056	937
367	MeF	L	H	C	G	-NH2	5.016	891.5
368	MeF	L	F4COO	C	G	-NH2	3.064	956.8
369	MeF	L	F4COO	C	G	-NH2	6.3	918.4
370	MeF	L	F4COO	C	G	-NH2	5.088	957.4
371	MeF	L	H	C	G	-NH2	1.6	894.2

[0177]

[表7-2-3]

Seq ID No.	[M+XH] ⁺ X ⁺	aLISA BMP4 (0.2 nM) % inh	aLISA BMP7 (10nM) % inh	Synthesis	Peptide Conc. in Assay (nM)	
					BMP4 Assay	BMP7 Assay
347	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
348	2	A	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
349	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
350	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
351	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
352	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
353	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
354	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
355	2	A	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
356	2	A	C	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
357	2	ND	D	1	0.2, 2, 20	1, 10, 100
358	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
359	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
360	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
361	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
362	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
363	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
364	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
365	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
366	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
367	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
368	2	ND	C	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
369	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
370	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
371	2	A	E	1	2, 20, 200	10, 30, 90

[0178]

[表7-3-1]

Seq ID										
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
372	F3C	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
373	F4C	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
374	F3Me	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
375	F4Me	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
376	F	G	MeF	G	3Py	G	D	D	Cha	A
377	F	G	MeF	G	4Py	G	D	D	Cha	A
378	F	G	MeF	G	F4F	G	D	D	Cha	A
379	F	G	MeF	G	F3C	G	D	D	Cha	A
380	F	G	MeF	G	F4C	G	D	D	Cha	A
381	F	G	MeF	G	F3Me	G	D	D	Cha	A
382	F	G	MeF	G	F4Me	G	D	D	Cha	A
383	F	G	MeF	G	Y	G	D	D	Cha	A
384	F	G	MeF3C	G	Bph	G	D	D	Cha	A
385	F	G	MeF4C	G	Bph	G	D	D	Cha	A
386	F	G	MeF3Me	G	Bph	G	D	D	Cha	A
387	F	G	MeY	G	Bph	G	D	D	Cha	A
388	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
389	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
390	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
391	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
392	F4F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
393	F	G	MeF4Me	G	Bph	G	D	D	Cha	A
394	F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A
395	F4F	G	MeF4Me	G	Bph	G	D	D	Cha	A
396	F4F	G	MeF	G	Bph	G	D	D	Cha	A

[0179]

[表7-3-2]

Seq ID								Ret	ESI
No.	11	12	13	14	additional amino acids			time	(m/z)
372	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.63	911.4
373	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.63	911.5
374	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.63	901.2
375	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.63	901.2
376	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.31	856.6
377	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.3	856.5
378	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.52	864.8
379	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.54	873.4
380	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.55	873.3
381	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.54	863.1
382	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.54	863.1
383	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.44	864.1
384	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.64	911.5
385	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.64	911.5
386	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.63	901.2
387	MeF	L	H	C	G	-NH2		1.54	902.1
388	MeF3C	L	H	C	G	-NH2		1.63	911.7
389	MeF4C	L	H	C	G	-NH2		1.63	911.7
390	MeF3Me	L	H	C	G	-NH2		1.62	901.2
391	MeY	L	H	C	G	-NH2		1.55	902.1
392	MeF	L	H	C	G	-NH2		5.804	903.2
393	MeF	L	H	C	G	-NH2		5.968	901.2
394	MeF4Me	L	H	C	G	-NH2		5.932	901.3
395	MeF	L	H	C	G	-NH2		6.024	910.4
396	MeF4Me	L	H	C	G	-NH2		6	910.3

[0180]

[表7-3-3]

Seq ID No.	[M+XH] ⁺ X ⁺	aLISA BMP4 (0.2 nM) % inh	aLISA BMP7 (10nM) % inh	Synthesis	Peptide Conc. in Assay (nM)	
					BMP4 Assay	BMP7 Assay
372	2	ND	G	1	2, 20, 200	10, 30, 90
373	2	A	F	1	2, 20, 200	10, 30, 90
374	2	ND	G	1	2, 20, 200	10, 30, 90
375	2	B	F	1	2, 20, 200	10, 30, 90
376	2	ND	G	1	2, 20, 200	10, 30, 90
377	2	ND	F	1	2, 20, 200	10, 30, 90
378	2	ND	F	1	2, 20, 200	10, 30, 90
379	2	ND	G	1	2, 20, 200	10, 30, 90
380	2	B	F	1	2, 20, 200	10, 30, 90
381	2	ND	G	1	2, 20, 200	10, 30, 90
382	2	ND	G	1	2, 20, 200	10, 30, 90
383	2	ND	F	1	2, 20, 200	10, 30, 90
384	2	B	E	1	2, 20, 200	10, 30, 90
385	2	B	F	1	2, 20, 200	10, 30, 90
386	2	B	F	1	2, 20, 200	10, 30, 90
387	2	A	F	1	2, 20, 200	10, 30, 90
388	2	B	E	1	2, 20, 200	10, 30, 90
389	2	B	E	1	2, 20, 200	10, 30, 90
390	2	B	E	1	2, 20, 200	10, 30, 90
391	2	A	F	1	2, 20, 200	10, 30, 90
392	2	A	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
393	2	A	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
394	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
395	2	A	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
396	2	A	C	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100

[0181]

[表7-4-1]

Seq ID										
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
397	F	G	MeF4Me	G	Bph	G	D	D	Cha	A
398	F4F	G	MeF4Me	G	Bph	G	D	D	Cha	A
399	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Q
400	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Q
401	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Hgl
402	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Hgl
403	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Hgl
404	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Q
405	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Q
406	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Q
407	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Q
408	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Hgl
409	F	G	MeF	G	Bph	G	D	E	Cha	Hgl
410	F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl
411	F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl
412	F4F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl
413	F4F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl
414	F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl
415	F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl
416	F4F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl
417	F4F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl
418	F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl
419	F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl
420	F4F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl
421	F4F	G	MeF	G	3Py6Ph	G	D	E	Cha	Hgl

[0182]

[表7-4-2]

Seq ID								Ret	ESI
No.	11	12	13	14	additional amino acids			time	(m/z)
397	MeF4Me	L	H	C	G	-NH2		6.156	908.3
398	MeF4Me	L	H	C	G	-NH2		6.204	917.3
399	MeF	L	Abu	C	G	-NH2		3.652	903.3
400	MeF	L	P4Sh	C	G	-NH2		3.256	917.3
401	MeF	L	F4COO	C	G	-NH2		3.56	963.8
402	MeF	L	Abu	C	G	-NH2		3.844	910.8
403	MeF	L	P4Sh	C	G	-NH2		3.44	924.8
404	MeF	L	F4COO	C	-NH2			3.596	927.8
405	MeF	L	F4COO	C	G	OH		3.476	956.9
406	MeF	L	F4COO	C	bA	OH		3.504	963.9
407	MeF	L	F4COO	C	bA	de	OH	3.168	1028
408	MeF	L	F4COO	C	-NH2			3.857	935.4
409	MeF	L	F4COO	C	bA	de	OH	3.317	1036
410	MeF	L	F4COO	C	-NH2			5.7	935.8
411	MeF	L	F4COO	C	bA	de	OH	5.044	1037
412	MeF4Me	L	F4COO	C	-NH2			6.216	952
413	MeF4Me	L	F4COO	C	bA	de	OH	5.88	1053
414	MeF	L	P4Sh	C	-NH2			5.14	897.2
415	MeF	L	P4Sh	C	bA	de	OH	5.396	997.5
416	MeF4Me	L	P4Sh	C	-NH2			6.012	912.9
417	MeF4Me	L	P4Sh	C	bA	de	OH	5.48	1013
418	MeF	L	Abu	C	-NH2			5.948	882.9
419	MeF	L	Abu	C	bA	de	OH	5.576	983.5
420	MeF4Me	L	Abu	C	-NH2			5.852	899.2
421	MeF4Me	L	Abu	C	bA	de	OH	6.04	999.5

[0183]

[表7-4-3]


Seq ID No.	[M+XH] ⁺ X ⁺	aLISA BMP4 (0.2 nM) % inh	aLISA BMP7 (10nM) % inh	Synthesis	Peptide Conc. in Assay (nM)	
					BMP4 Assay	BMP7 Assay
397	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
398	2	A	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
399	2	ND	C	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
400	2	ND	C	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
401	2	ND	C	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
402	2	ND	C	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
403	2	ND	C	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
404	2	ND	C	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
405	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
406	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
407	2	ND	C	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
408	2	ND	C	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
409	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
410	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
411	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
412	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
413	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
414	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
415	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
416	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
417	2	ND	C	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
418	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
419	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
420	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100
421	2	ND	D	2	0.2, 2, 20	1, 10, 100

実施例 17

[0184] (2S)-2-({[(9H-フルオレン-9-イル)メトキシ]カルボニル}アミノ)-3-{3-フルオロ-[1,1'-ビフェニル]-4-イル}プロパン酸 (p B p h 3 F) の合成

本実施例では、本発明において使用される以下の構造を有するアミノ酸を合成した。

[0185] [化10]



[0186] 窒素雰囲気下、1-ブロモ-2-フルオロ-4-ヨードベンゼン（15.0 g、49.9 mmol）とフェニル硼酸のトルエン（200 mL）、水（200 mL）、エタノール（50 mL）の混合溶液に、炭酸ナトリウム（10.6 g、54.9 mmol）および[1, 1'-ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン]パラジウム（II）ジクロリド ジクロロメタン付加物（2.04 g、5.50 mmol）を加え、混合物を110℃にて16時間撹拌した後、酢酸エチル（100 mL）で三度抽出した。合わせた有機抽出物を飽和食塩水（100 mL）で三度洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥、ろ過、ろ液を濃縮した。得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー（酢酸エチル：石油エーテル＝1：25）にて精製した。

窒素雰囲気下、亜鉛（6.25 g、95.6 mmol）のDMF（200 mL）懸濁液に、メチル（2R）-2-（{〔（9H-フルオレン-9-イル）メトキシ〕カルボニル}アミノ）-3-ヨードプロパネート（17.3 g、38.2 mmol）、ヨウ素（2.44 g、9.61 mmol）を加え、混合物を室温にて30分間撹拌した。この反応液に前述で得られた生成物の一部（8.00 g、31.9 mmol）、トリス（（1E, 4E）-1, 5-ジフェニルペンタ-1, 4-ジエン-3-オン）ジパラジウム（0.730 g、0.797 mmol）、ジシクロヘキシル（{2', 6'-ジメトキシ-[1, 1'-ビフェニル]-2-イル}）ホスファン（0.640 g、1.56 mmol）を加え、混合物を50℃にて約16時間撹拌した。固体をろ別し、ろ液に水600 mLを加えて反応を停止した後、酢酸エチル（2

00 mL) で三度抽出した。合わせた有機抽出物を飽和食塩水 (200 mL) で三度洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥、ろ過、ろ液を濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル : 石油エーテル = 1 : 3) にて精製した。

得られた生成物 (12 g、24.4 mmol) の2-プロパノール (120 mL)、水 (40 mL)、THF (40 mL) の混合溶液に、塩化カルシウム (43.0 g、387 mmol) を加え、混合物を0℃にて10分間攪拌した。この反応液に水酸化リチウム-水和物 (4.06 g、96.8 mmol) を加え、混合物を室温にて約16時間攪拌した。クエン酸水溶液を用いて反応液をpH7に調整した後、固体をろ別し、メタノール : ジクロロメタン = 1 / 10 (200 mL) で洗浄した。ろ液と洗浄液を合わせ、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥、ろ過、ろ液を濃縮した。得られた残渣をジエチルエーテルで洗浄し、減圧乾燥し、表記化合物を得た。¹H NMR (500 MHz, DMSO-d₆) δ 7.88 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 7.69–7.53 (m, 4H), 7.48–7.21 (m, 11H), 6.76–6.14 (m, 1H), 4.25–3.85 (m, 4H), 3.31–3.11 (m, 1H), 2.88–2.66 (m, 1H). LC-MS (ESI, m/z) : [M-H]⁻ 480.

[0187] 本明細書中の表と配列表に、万が一齟齬があった場合には、表の記載が正しいと解釈する。

産業上の利用可能性

[0188] この発明は、医薬産業や生物工学産業において利用されうる。

請求の範囲

[請求項1]

以下のアミノ酸配列：

E-R-V-F4COO-At p-D-R-B p h-P-Y-P-B p h-Y-F4COO-F4COO-S-C（配列番号1）

又は、上記のアミノ酸配列の1番目、2番目、4番目、5番目、6番目、7番目、8番目、9番目、10番目、11番目、12番目、13番目、14番目、15番目および16番目のアミノ酸残基からなるグループから選択される、1-15個のアミノ酸残基において、置換、付加、欠失又は挿入を有するアミノ酸配列を含む、ペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[請求項2]

以下のアミノ酸配列：

X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10-X11-X12-X13-X14-X15-X16-X17（配列番号2）で示されるアミノ酸配列を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩、もしくは配列番号2で示されるアミノ酸配列から1-10個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩であって、

X1は、E、A、T、Q又はLであり；

X2は、R、K、H g l、任意の極性アミノ酸又は任意の脂肪族アミノ酸であり、

X3は、Vであり；

X4は、複素環であってもよい芳香族環を側鎖に有するアミノ酸であり；

X5は、任意の脂肪族アミノ酸、Y、D、A t p、C h a 4 t H、G t h p、又はA 1 A c 4 p i pであり；

X6は、D、任意の塩基性アミノ酸又は任意の極性アミノ酸であり；

X7は、任意の塩基性アミノ酸又は任意の極性アミノ酸であり；

X 8 は、置換基を有していてもよく、芳香環上の C が N に置換されていてもよいビフェニルアラニンであり；

X 9 は、任意のアミノ酸であり、

X 1 0 は、Y、H t y 又は 4 P y であり；

X 1 1 は、任意のアミノ酸であり、

X 1 2 は、置換基を有していてもよく、芳香環上の C が N に置換されていてもよいビフェニルアラニンであり；

X 1 3 は、非置換の若しくは置換された F、4 P y 又は 3 P y 6 N H 2 であり；

X 1 4 は、F 4 C O O、D 又は G であり；

X 1 5 は、F 4 C O O、Y、4 P y、3 P y 6 N H 2、W 7 N、H p h 又は N であり；

X 1 6 は、任意のアミノ酸であり；

X 1 7 は、C である

ペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[請求項3]

請求項 3 に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩であって、

X 1 は、E であり；

X 2 は、R 又は任意の極性アミノ酸であり、

X 3 は、V であり；

X 4 は、非置換の若しくは置換された Y 又は F 4 C O O であり；

X 5 は、V 又は A t p であり；

X 6 は、D 又は K C O p i p z a a であり；

X 7 は、R であり；

X 8 は、B p h であり；

X 9 は、P 又は S であり；

X 1 0 は、Y 又は H t y であり；

X 1 1 は、任意の脂肪族アミノ酸であり；

X 1 2 は、非置換の若しくは置換された B p h であり；

X 1 3 は、非置換の若しくは置換された F であり；

X 1 4 は、F 4 C O O であり；

X 1 5 は、F 4 C O O 又は 4 P y であり；

X 1 6 は、任意のアミノ酸であり；

X 1 7 は、C である

ペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[請求項4] 請求項2に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩であって

、

X 1 は、E、A、T、Q 又は L であり；

X 2 は、R 又は K C O p i p z a a であり；

X 3 は、V であり；

X 4 は、Y、F 4 F、F 4 C O O、4 P y、H、又は F 4 a a O であり；

X 5 は、任意の脂肪族アミノ酸、A t p、C h a 4 t H、G t h p、又は A 1 A c 4 p i p であり；

X 6 は、D、S 又は K C O p i p z a a であり；

X 7 は、R 又は K であり；

X 8 は、3 P y 6 P h、B p h、B p h 4 C、p B p h 2 F 又は B p h 3 C であり；

X 9 は、S、P、K C O p i p z a a 又は H であり；

X 1 0 は、Y 又は H t y であり；

X 1 1 は、任意の脂肪族アミノ酸又は H y p であり；

X 1 2 は、置換基を有していてもよいビフェニルアラニンであり；

X 1 3 は、非置換の若しくは置換された F 又は 4 P y であり；

X 1 4 は、F 4 C O O であり；

X 1 5 は、F 4 C O O 又は 4 P y であり；

X 1 6 は、S であり；

X 1 7 は、C である

ペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[請求項5]

請求項2に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩であって、

以下のアミノ酸配列：X 1－X 2－X 3－X 4－X 5－X 6－X 7－X 8－X 9－X 1 0－X 1 1－X 1 2－X 1 3－X 1 4－X 1 5－X 1 6－C（配列番号4）で示されるアミノ酸配列を有するペプチド又は配列番号4で示されるアミノ酸配列から1～10個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有するペプチドであり、

X 1 は、A であり；

X 2 は、R、K A c、Q 又はK C O p i p z a a であり；

X 3 は、V であり；

X 4 は、Y、F 4 F 又は4 P y であり；

X 5 は、V であり；

X 6 は、D、K C O p i p z a a、K、R、G 又はH であり；

X 7 は、R、K、K A c、4 P y、S 又はC i t であり；

X 8 は、3 P y 6 P h 又はB p h であり；

X 9 は、P、S、K、H、G、S 又はK C O p i p z a a であり；

X 1 0 は、Y であり；

X 1 1 は、任意の脂肪族アミノ酸であり；

X 1 2 は、B p h 又は3 P y 6 P h であり；

X 1 3 は、Y 又はF 4 F であり；

X 1 4 は、F 4 C O O であり；

X 1 5 は、F 4 C O O 又は4 P y であり；

X 1 6 は、S である

ペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[請求項6] BMP 4 への結合能を有する、請求項 1－5 のいずれか 1 項に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[請求項7] BMP 4 の阻害活性を有する、請求項 1－5 のいずれか 1 項に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[請求項8] 請求項 1－7 のいずれか 1 項に記載のペプチドであって、配列番号 5－187、及び配列番号 243－421 のいずれか 1 つに記載のアミノ酸配列からなるペプチド、又はその薬学的に許容される塩であるか、

配列番号 5－187、及び配列番号 243－421 のいずれか 1 つに記載のアミノ酸配列から 1～10 個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有し、BMP 4 への結合能又は BMP 4 の阻害活性を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[請求項9] 以下のアミノ酸配列：

F－G－M e F－G－B p h－G－D－D－C h a－A－M e F－L－H－C (配列番号 241)

又は、上記のアミノ酸配列の 1 番目、3 番目、4 番目、5 番目、6 番目、7 番目、8 番目、9 番目、10 番目、11 番目、12 番目および 13 番目のアミノ酸残基からなるグループから選択される、1～12 個のアミノ酸残基において、置換、付加、欠失または挿入を有するアミノ酸配列を含むペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[請求項10] 以下のアミノ酸配列：

X 1－X 2－X 3－X 4－X 5－X 6－X 7－X 8－X 9－X 10－X 11－X 12－X 13－X 14 (配列番号 242) で示されるアミノ酸配列を有するペプチド又は配列番号 245 で示されるアミノ酸配列から 1～12 個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有するペプチド、又はその薬学的に許容される塩であって、

X 1 は、置換基を有していてもよく、芳香環上のCがNに置換されていてもよいフェニルアラニンであり；

X 2 は、Gであり；

X 3 は、置換基を有していてもよいN-メチルフェニルアラニンであり；

X 4 は、G、D体であってもよい脂肪族アミノ酸又は極性アミノ酸であり；

X 5 は、芳香環上のCがNに置換されていてもよいビフェニルアラニン、又は置換基を有していてもよいフェニルアラニンであり；

X 6 は、G、又はD体であってもよいAであり；

X 7 は、任意の極性アミノ酸であり；

X 8 は、任意の酸性アミノ酸であり；

X 9 は、任意の脂肪族アミノ酸であり；

X 1 0 は、任意のアミノ酸であり；

X 1 1 は、置換基を有していてもよいN-メチルフェニルアラニンであり；

X 1 2 は、任意の脂肪族アミノ酸であり；

X 1 3 は、任意のアミノ酸であり；

X 1 4 は、Cである

ペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[請求項11] BMP 7 の阻害活性を有する、請求項 9 又は 1 0 に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩。

[請求項12] 請求項 9 又は 1 0 に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩であって、配列番号 2 4 3 - 4 2 1 のいずれか 1 つに記載のアミノ酸配列からなるペプチドであるか、

配列番号 2 4 3 - 4 2 1 のいずれか 1 つに記載のアミノ酸配列から 1 ~ 1 0 個のアミノ酸配列が置換、欠失、付加又は挿入したアミノ酸配列を有し、BMP 7 の阻害活性を有するペプチド、又はその薬学的

に許容される塩。

- [請求項13] 環状ペプチドである、請求項1－12のいずれか1項に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩。
- [請求項14] クロロアセチル化したアミノ酸と、前記ペプチドに含まれるス테인残基とが結合された環状構造を有する、請求項13に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩。
- [請求項15] 付加的なアミノ酸残基配列をさらに含むペプチド、又はその薬学的に許容される塩である、請求項1－14のいずれか1項に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩。
- [請求項16] 請求項1－15のいずれか1項に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩を含むBMP4及び／又はBMP7シグナル伝達阻害剤。
- [請求項17] 請求項1－15のいずれか1項に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩を含む、ヒト幹細胞分化誘導制御剤。
- [請求項18] ヒト幹細胞培養用の培地添加物であって、請求項1－15のいずれか1項に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩、請求項16に記載のBMP4及び／又はBMP7シグナル伝達阻害剤、および請求項17に記載のヒト幹細胞分化誘導制御剤のうちいずれか1種又は2種以上を含む、培地添加物。
- [請求項19] 請求項1－15のいずれか1項に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩を用いて、BMP4及び／又はBMP7のシグナル伝達活性を阻害する方法。
- [請求項20] 請求項1－15のいずれか1項に記載のペプチド、又はその薬学的に許容される塩を用いて、ヒト幹細胞の分化誘導を制御する方法。