


[図1]


沈着した有害タンパク
平滑筋細胞
有害タンパク
毛細血管
動脈


[図2]


平滑筋細胞
有害タンパク
クリアランス
毛細血管
動脈

[図3]




(b)




(a)


[図4]




[図5]


(%)
P=0.04
*
25
20
15
10
5
0
コントロール
シロスタゾール


[図6]


(%)
P=0.02
*
25
20
15
10
5
0
コントロール
シロスタゾール


[図7]




[図8]




[図9]




[図10]




[図11]


(μm)
3500
3000
2500
2000
P=0.03
*
コントロール
(n=3)
シロスタゾール
(n=4)

[図12]


(μm)
4000
3500
3000
2500
2000
P=0.01
*
コントロール
(n=3)
シロスタゾール
(n=4)

[図13]



(b)



(a)

[図14]




(b)




(a)


[図15]


(%)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
P=0.02
*
P=0.03
*
ｺﾝﾄﾛｰﾙ
ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ
ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ
前頭葉
海馬


[図16]


(%)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
P=0.02
*
P=0.005
*
ｺﾝﾄﾛｰﾙ
ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ
ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ
前頭葉
海馬


[図17]




[図18]




[図19]




[図20]




[図21]




[図22]




[図23]


(%)
P=0.03
*
25
20
15
10
5
0
コントロール
シロスタゾール


[図24]


(%)
P=0.02
*
25
20
15
10
5
0
コントロール
シロスタゾール


[図25]


(/年)
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
MMSEの変化率
単独群
併用群


[図26]


(/年)
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
−1.2
時間の見当識の変化率
単独群
併用群


[図27]


(/年)
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
場所の見当識の変化率
単独群
併用群


[図28]


(/年)
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
遅延再生の変化率
単独群
併用群


[図29]


(/年)
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
−1.2
−1.4
MMSEの変化率
単独群
併用群


[図30]


(/年)
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
−0.7
時間の見当識の変化率
単独群
併用群

[図31]


(/年)
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
場所の見当識の変化率
単独群
併用群

[図32]


(/年)
0
−0.05
−0.1
−0.15
−0.2
−0.25
−0.3
−0.35
−0.4
−0.45
−0.5
遅延再生の変化率
単独群
併用群