

FIGURE 1




	pH 6.5	pH 7.0	pH 7.5	pH 8.0	pH 8.5
Fibrinogen Recovery	91.4	98	98.1	98.1	94.7
Plaminogen Recovery	15.7	15.2	15.8	13.3	14.4
t-PA Recovery	27.8	31.2	52.4	43	50.3

FIGURE 2




	pH 6.5	pH 7.0	pH 7.5	pH 8.0	pH 8.5
Fibrinogen Recovery	72.4	76	78.3	78.2	82.1
Plaminogen Recovery	13.1	16.1	13.1	15.2	14.4
t-PA Recovery	22.8	31.6	27.9	19.1	38
Factor II	14.4	14.4	19.6	14.4	26.1

FIGURE 3




	pH 6.5	pH 7.0	pH 7.5	pH 8.0	pH 8.5
Fibrinogen Recovery	78.3	79.2	83.7	85.4	97
Plaminogen Recovery	23.6	25.1	26.4	28.6	33.2
t-PA Recovery	22	21.8	33.8	50.8	54.3
Factor II	35.6	40.7	45.3	58.5	63.6

FIGURE 4a




	pH 6.5	pH 7.0	pH 7.5	pH 8.0	pH 8.5
Fibrinogen Recovery	91	90	98	100.0	93
Plaminogen Recovery	1.7	1.8	2.2	5	3.2
t-PA Recovery	12.6	11.7	18.5	27.1	27.4
Factor II Recovery	1.8	0.5	0.6	1.5	1.8

FIGURE 4b




	pH 6.5	pH 7.0	pH 8.0	pH 8.5
T = 1 day	107	104	118.0	95
T = 3 days	108	102	99.0	92
T = 6 days	115	95	116	101

Figure 4c




	pH 6.5	pH 7.0	pH 8.0	pH 8.5
T = 1	75	81	78.0	80
T = 3 days	78	80	80.0	77
T = 6 days	77	78	81	77

FIGURE 5



	Cryo Extraction	Alhydrogel adsorption	GlyNaCl precipitation	HEA Hypercel	SD Incubation & Macroprep-HQ
Fibrinogen	100.0	80.0	76.0	70.0	55.0
Fibronectin	100.0	70.0	25.0	26.0	2.0
Plasminogen	100.0	94.6	43.6	2.6	0.1
tPA	100.0	39.0	39.0	8.0	2.8
Factor II	100.00	0.34	0.06	0.02	0.00

FIGURE 6



Processed Channel: 280NM

	Processed Channel	Retention Time (min)	Area	% Area	Height
1	280NM	14.798	1039217	3.42	12701
2	280NM	17.369	29360277	96.58	367205

FIGURE 7




25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Flow Rate (L./m2/hour)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Time (min)

FIGURE 8


Stability of MQ eluate at 2-8°C over time
% of initial activity remaining
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Storage period (Week)
2-8°C
30°C