

Beschreibung

Carbonsäurederivate mit einem Oxazolo[4,5-c]pyridinring


- 5 Die Erfindung betrifft Carbonsäurederivate mit einem Oxazolo[4,5-c]pyridinring und deren physiologisch akzeptable Salze.

Es sind bereits strukturähnliche Verbindungen im Stand der Technik beschrieben (siehe WO2009/154775), die zur Behandlung multipler Sklerose geeignet sind. Die

- 10 Wirkungsweise dieser Verbindungen besteht darin, durch Aktivierung des EDG-1 Rezeptors eine Desensitisierung des EDG-1 Signalweges zu verursachen (sog. Superagonismus), der dann einem funktionellen Antagonismus des EDG-1-Signalweges gleichkommt. Systemisch bedeutet das, daß vor allem auf Lymphozyten der EDG-1 Signalweg dauerhaft unterdrückt wird, wodurch diese Zellen nicht mehr
- 15 chemotaktisch dem S1P Gradienten zwischen Blut und Lymphflüssigkeit folgen können. Dies bedingt, dass die betroffenen Lymphozyten nicht mehr das sekundäre lymphatische Gewebe verlassen können (verstärktes Homeing) und die Zahl der frei zirkulierenden Lymphozyten im Plasma stark gesenkt wird. Dieser Mangel an Lymphozyten im Plasma (Lymphopenie) bewirkt eine Immunsuppression, die zwingend
- 20 für den Wirkmechanismus der in WO 2009/154775 beschriebenen EDG-1-Rezeptor-Modulatoren erforderlich ist.

- Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, Verbindungen zur Verfügung zu stellen, die eine therapeutisch verwertbare Wirkung entfalten. Insbesondere bestand die Aufgabe
- 25 darin, neue Verbindungen zu finden, die spezifisch zur Wundheilung und insbesondere zur Behandlung von Wundheilungsstörungen von Diabetes Patienten geeignet sind. Weiter war es wünschenswert Verbindungen zur Verfügung zu stellen, die zur Behandlung des Diabetische Fußsyndroms (DFS) geeignet sind.
- Weiter war es wünschenswert eine wiederholbare Aktivierung des EDG-1-Rezeptor
- 30 Signalweges zu erreichen, was damit pharmakologisch eine persistente Aktivierung des EDG-1 Signalweges ermöglicht.

Die Erfindung betrifft daher Verbindungen der Formel I



5 worin X, Y, R¹, R² und R³ wie nachstehend definiert sind.

Der Wirkmechanismus der Verbindungen der Formel I beruht nicht auf Desensitisierung des EDG-1-Signalweges und steht somit dem in WO 2009/154775 beschriebenen Wirkmechanismus diametral gegenüber. Die Erfindung betrifft ferner Verfahren zur
10 Herstellung von Verbindungen der Formel I, ihre Verwendung, insbesondere als Wirkstoff in Pharmazeutika, und pharmazeutische Zusammensetzungen, die sie enthalten.


Patienten mit Diabetes haben gegenüber gesunden Menschen eine verzögerte Wundheilung und eine erhöhte Infektionsrate, vor allem bei länger währernder
15 Hyperglykämie, zum Beispiel hervorgerufen durch eine schlechte Blutzuckereinstellung. Zu den Ursachen gehören Durchblutungsstörungen, vor allem im Bereich der kleinen Gefäße, die zu einer verschlechterten Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des Gewebes führen. Außerdem besteht eine verminderte Zellteilungs- und Zellmigrationsrate von Keratinozyten, Fibroblasten und dermalen Endothelzellen.
20 Zusätzlich ist die Aktivität verschiedener Abwehrzellen (Granulozyten) mit reduzierter Phagozytose (Aufnahme und Zerstörung von Bakterien) eingeschränkt. Auch die Funktion der Antikörper (Immunglobuline) gegen Bakterien ist bei hohen Blutzuckerwerten eingeschränkt. Dementsprechend müssen Wunden und Infektionen bei Diabetes-Patienten besonders versorgt werden.

25 Der Edg-1-Rezeptor gehört zur Familie der Edg-Rezeptoren (Edg = Endothelial Differentiation Gene) von gegenwärtig acht identifizierten GPCRs (G-Protein-gekoppelten Rezeptoren) der Klasse A. Diese Familie kann in Unterfamilien von durch Sphingosin-1-Phosphat (S1P) aktivierten Rezeptoren (fünf Mitglieder) und durch
30 Lysophosphatidsäure (LPA) aktivierte Rezeptoren (drei Mitglieder) unterteilt werden.

Der endogene Ligand S1P ist ein pluripotentes Lysophospholipid, das durch Aktivierung von GPCRs aus der Edg-Rezeptorfamilie, nämlich Edg-1 (= S1P1), Edg-3 (= S1P3), Edg-5 (= S1P2), Edg-6 (= S1P4) und Edg-8 (S1P5), auf verschiedene Zelltypen wirkt. Wenngleich S1P auch als intrazellulärer Botenstoff beschrieben wird, werden zahlreiche zelluläre Antworten von S1P über die Aktivierung von Edg-Rezeptoren - vermittelt werden. S1P wird durch die Enzymfamilie der Sphingosinkinasen (SPHK) erzeugt und durch verschiedene Phosphatasen oder Lyasen abgebaut.

Bekannte Indikationen von Edg-1-Rezeptor-Agonisten sind beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atherosklerose, Herzversagen, Cardioprotektion, periphere arterielle Verschlusskrankheit, Nierenerkrankungen und Atemwegserkrankungen.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Verbindungen der Formel I in einer beliebigen ihrer stereoisomeren Formen oder einer Mischung von stereoisomeren Formen in beliebigem Verhältnis oder ein physiologisch akzeptables Salz davon oder ein physiologisch akzeptables Solvat einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes,



worin

X ausgewählt ist aus (C₁-C₆)-Alkandiyl, (C₂-C₆)-Alkendiyl, (C₂-C₆)-Alkindiyl, (C₃-C₇)-Cycloalkandiyl, (C₁-C₆)-Alkandiyloxy und (C₃-C₇)-Cycloalkandiyloxy, die alle gegebenenfalls durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten substituiert sind, die aus Fluor und Hydroxy ausgewählt sind, wobei das Sauerstoffatom der (C₁-C₆)-Alkandiyloxy- und (C₃-C₇)-Cycloalkandiyloxygruppen an die Gruppe Y gebunden ist;

Y ausgewählt ist aus Phenylen und einem zweiwertigen Rest eines aromatischen, 5-gliedrigen bis 6-gliedrigen monocyclischen Heterocyclus, der 1, 2 oder 3 gleiche oder

verschiedene Ringheteroatome enthält, die aus N, O und S ausgewählt sind, wobei eines der Ringstickstoffatome ein Wasserstoffatom oder einen Substituenten R^4 tragen kann und wobei das Phenylen und der zweiwertige Rest eines aromatischen Heterocyclus gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringkohlenstoffatomen durch
5 gleiche oder verschiedene Substituenten R^5 substituiert sind;

R^1 ausgewählt ist aus Wasserstoff und (C_1-C_4) -Alkyl;

R^2 und R^3 unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, Halogen, Hydroxy, (C_1-C_4) -Alkyl-, (C_1-C_4) -Alkyloxy, (C_1-C_4) -Alkyl-S(O) $_m$ -, Amino, Nitro, Cyano,
10 Hydroxycarbonyl, (C_1-C_4) -Alkyloxycarbonyl, Aminocarbonyl und Aminosulfonyl, (C_3-C_7) -Cycloalkyl- C_wH_{2w} - und Oxy, wobei w aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist;

R^4 ausgewählt ist aus (C_1-C_4) -Alkyl, (C_3-C_7) -Cycloalkyl- C_wH_{2w} - und Oxy, wobei w
15 aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist;

R^5 ausgewählt ist aus Halogen, Hydroxy, (C_1-C_4) -Alkyl-, (C_3-C_5) -Cycloalkyl- C_zH_{2z} -,
20 (C_1-C_4) -Alkyloxy, (C_1-C_4) -Alkyl-S(O) $_m$ -, Amino, Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, (C_1-C_4) -Alkyloxycarbonyl, Aminocarbonyl und Aminosulfonyl, wobei z aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist;

m aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist.

25 Strukturelemente wie Gruppen, Substituenten, Heteroringglieder, Zahlen oder andere Merkmale, beispielsweise Alkylgruppen, Gruppen wie R^5 , Zahlen wie m, die in den Verbindungen der Formel I mehrmals vorkommen können, können alle unabhängig voneinander eine beliebige der angegebenen Bedeutungen besitzen und in jedem Fall gleich oder voneinander verschieden sein. Beispielsweise können die Alkylgruppen in
30 einer Dialkylaminogruppe gleich oder verschieden sein.

Alkyl-, Alkenyl- und Alkynylgruppen können linear, d.h. geradkettig, oder verzweigt sein. Dies gilt auch, wenn sie Teil anderer Gruppen, beispielsweise Alkyloxygruppen (= Alkoxygruppen, Alkyl-O-Gruppen), Alkyloxycarbonylgruppen oder alkylsubstituierter Aminogruppen, sind oder wenn sie substituiert sind. Je nach der jeweiligen Definition

5 kann die Zahl der Kohlenstoffatome in einer Alkylgruppe 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 oder 1, 2, 3 oder 4 oder 1, 2 oder 3 betragen. Beispiele für Alkyl sind Methyl, Ethyl, Propyl einschließlich n-Propyl und Isopropyl, Butyl, einschließlich n-Butyl, sek.-Butyl, Isobutyl und tert.-Butyl, Pentyl einschließlich n-Pentyl, 1-Methylbutyl, Isopentyl, Neopentyl und tert.-Pentyl und Hexyl einschließlich n-Hexyl, 3,3-Dimethylbutyl und Isohexyl.

10 Doppelbindungen und Dreifachbindungen in Alkenylgruppen und Alkynylgruppen können in beliebigen Positionen vorliegen. In einer Ausführungsform der Erfindung enthalten Alkenylgruppen eine Doppelbindung und Alkynylgruppen eine Dreifachbindung. In einer Ausführungsform der Erfindung enthält eine Alkenylgruppe oder Alkynylgruppe mindestens drei Kohlenstoffatome und ist über ein Kohlenstoffatom,

15 das nicht Teil einer Doppelbindung oder Dreifachbindung ist, an den Rest des Moleküls gebunden. Beispiele für Alkenyl und Alkynyl sind Ethenyl, Prop-1-enyl, Prop-2-enyl (= Allyl), But-2-enyl, 2-Methylprop-2-enyl, 3-Methylbut-2-enyl, Hex-3-enyl, Hex-4-enyl, Prop-2-ynyl (= Propargyl), But-2-ynyl, But-3-ynyl, Hex-4-ynyl oder Hex-5-ynyl. Substituierte Alkylgruppen, Alkenylgruppen und Alkynylgruppen können in beliebigen Positionen

20 substituiert sein, mit der Maßgabe, daß die jeweilige Verbindung ausreichend stabil und für den gewünschten Zweck wie die Verwendung als Arzneistoff geeignet ist. Die Voraussetzung, daß eine spezifische Gruppe und eine Verbindung der Formel I ausreichend stabil und für den gewünschten Zweck wie die Verwendung als Arzneistoff geeignet sind, gilt allgemein in bezug auf die Definitionen aller Gruppen in den

25 Verbindungen der Formel I.

Soweit anwendbar, gelten die vorstehenden Erklärungen bezüglich Alkyl-, Alkenyl- und Alkynylgruppen entsprechend für zweiwertige Alkylgruppen wie die Gruppen Alkandiyl C_uH_{2u} , C_vH_{2v} , C_wH_{2w} und C_zH_{2z} und zweiwertige Alkenylgruppen und Alkynylgruppen,

30 wie die Gruppen Alkendiyl und Alkindiyl, die somit ebenfalls linear und verzweigt sein können. Die Doppelbindungen und Dreifachbindungen in Alkendiyl- und Alkindiylgruppen können in beliebigen Positionen vorliegen. In einer Ausführungsform

der Erfindung enthalten Alkendiylgruppen eine Doppelbindung und Alkindiylgruppen eine Dreifachbindung. Beispiele für zweiwertige Alkylgruppen sind $-\text{CH}_2-$ (= Methylen), $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$, Beispiele für

5 zweiwertige Alkenylgruppen sind $-\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)-$, und Beispiele für zweiwertige Alkynylgruppen sind $-\text{C}\equiv\text{C}-$, $-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-$, $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{C}\equiv\text{C}-$, $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$, $-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-$. Wenn eine Zahl in einer zweiwertigen Gruppe, wie beispielsweise die Zahl z in der Gruppe C_zH_{2z} , für 0

10 (= null) steht, sind die beiden Gruppen, die an die in Rede stehende Gruppe, wie C_zH_{2z} , gebunden sind, über eine Einfachbindung direkt miteinander verbunden.

Die Zahl der Ringkohlenstoffatome in einer Cycloalkylgruppe kann 3, 4, 5, 6 oder 7 betragen. In einer Ausführungsform der Erfindung beträgt die Zahl der

15 Ringkohlenstoffatome in einer Cycloalkylgruppe unabhängig von der Zahl der Ringkohlenstoffatome in einer anderen Cycloalkylgruppe 3, 4, 5 oder 6, in einer anderen Ausführungsform 3, 4 oder 5, in einer anderen Ausführungsform 3 oder 4, in einer anderen Ausführungsform 3, in einer anderen Ausführungsform 5, 6 oder 7, in einer anderen Ausführungsform 5 oder 6, in einer anderen Ausführungsform 6 oder 7, in

20 einer anderen Ausführungsform 6. Dies gilt entsprechend für zweiwertige Cycloalkylgruppen, d.h. Cycloalkandiylgruppen, die über ein oder zwei beliebige Ringkohlenstoffatome an die benachbarten Gruppen gebunden sein können. Beispiele für Cycloalkylgruppen sind Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl und Cycloheptyl. Beispiele für zweiwertige Cycloalkylgruppen sind Cyclopropan-1,1-diyl,

25 Cyclopropan-1,2-diyl, Cyclobutan-1,3-diyl, Cyclopentan-1,1-diyl, Cyclopentan-1,2-diyl, Cyclopentan-1,3-diyl, Cyclohexan-1,1-diyl, Cyclohexan-1,2-diyl, Cyclohexan-1,3-diyl, Cyclohexan-1,4-diyl, Cycloheptan-1,4-diyl. Unabhängig voneinander und unabhängig von anderen Substituenten sind Cycloalkylgruppen und Cycloalkandiylgruppen gegebenenfalls durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene (C_1-C_4)-

30 Alkylsubstituenten substituiert, die in beliebigen Positionen stehen können, d.h. Cycloalkylgruppen können durch Alkylsubstituenten unsubstituiert oder durch Alkylsubstituenten, beispielsweise 1, 2, 3 oder 4 oder 1 oder 2 (C_1-C_4)-

Alkylsubstituenten, beispielsweise Methylgruppen, substituiert sein. Beispiele für alkylsubstituierte Cycloalkylgruppen und Cycloalkandiylgruppen sind

4-Methylcyclohexyl, 4-tert.-Butylcyclohexyl oder 2,3-Dimethylcyclopentyl, 2,2-Dimethylcyclopropan-1,1-diyl, 2,2-Dimethylcyclopropan-1,2-diyl, 2,2-

- 5 Dimethylcyclopentan-1,3-diyl, 6,6-Dimethylcycloheptan-1,4-diyl. Beispiele für Cycloalkylalkylgruppen, die beispielsweise Gruppen wie (C₃-C₅)-Cycloalkyl-C₂H₂₂-repräsentieren können, sind Cyclopropylmethyl, Cyclobutylmethyl, Cyclopentylmethyl, Cyclohexylmethyl, Cycloheptylmethyl, 1-Cyclopropylethyl, 2-Cyclopropylethyl, 1-Cyclobutylethyl, 2-Cyclobutylethyl, 2-Cyclopentylethyl, 2-Cyclohexylethyl, 2-
- 10 Cycloheptylethyl.

Unabhängig voneinander und unabhängig von anderen Substituenten können Alkylgruppen, zweiwertige Alkylgruppen, Alkenylgruppen, zweiwertige Alkenylgruppen, Alkinylgruppen, zweiwertige Alkinylgruppen, Cycloalkylgruppen und zweiwertige

- 15 Cycloalkylgruppen gegebenenfalls durch einen oder mehrere Fluorsubstituenten substituiert sein, die in beliebigen Positionen stehen können, d.h. diese Gruppen können durch Fluorsubstituenten unsubstituiert oder durch Fluorsubstituenten, beispielsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oder 13 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 oder 1, 2, 3, 4 oder 5 oder 1, 2 oder 3 oder 1 oder
- 20 2 Fluorsubstituenten, substituiert sein. Beispiele für fluorsubstituierte derartige Gruppen sind Trifluormethyl, 2-Fluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, Pentafluorethyl, 3,3,3-Trifluorpropyl, 2,2,3,3,3-Pentafluorpropyl, 4,4,4-Trifluorbutyl, Heptafluorisopropyl, -CHF-, -CF₂-, -CF₂-CH₂-, -CH₂-CF₂-, -CF₂-CF₂-, -CF(CH₃)-, -C(CF₃)₂-, 1-Fluorcyclopropyl, 2,2-Difluorcyclopropyl, 3,3-Difluorcyclobutyl,
- 25 1-Fluorcyclohexyl, 4,4-Difluorcyclohexyl, 3,3,4,4,5,5-Hexafluorcyclohexyl, 2,2-Difluorcyclopropan-1,2-diyl. Beispiele für Alkyloxygruppen, in denen die Alkylgruppierung fluorsubstituiert ist, sind Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Pentafluorethoxy und 3,3,3-Trifluorpropoxy. In einer Ausführungsform der Erfindung beträgt die Gesamtzahl der Fluorsubstituenten und (C₁-C₄)-Alkylsubstituenten, die
- 30 unabhängig von anderen Substituenten gegebenenfalls an Cycloalkylgruppen und Cycloalkandiylgruppen in den Verbindungen der Formel I vorliegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder 11, in einer anderen Ausführungsform 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9, in einer

anderen Ausführungsform 1, 2, 3, 4 oder 5, in einer anderen Ausführungsform 1, 2, 3 oder 4.

Gruppen wie Phenyl, Naphthyl (= Naphthalinyl) und Reste von aromatischen Heterocyclen, die gegebenenfalls durch einen oder mehrere Substituenten substituiert sind, können unsubstituiert oder substituiert sein, beispielsweise durch 1, 2, 3, 4 oder 5 oder 1, 2, 3 oder 4 oder 1, 2 oder 3 oder 1 oder 2 oder 1 gleiche oder verschiedene Substituenten, die in beliebigen Positionen stehen können. In einer Ausführungsform der Erfindung ist die Gesamtzahl der Nitrosubstituenten in einer Verbindung der Formel I nicht größer als zwei. Aromatische Stickstoffheterocyclen, die in dem zugrundeliegenden Ringsystem ein Wasserstoffatom an einem Ringstickstoffatom in einem 5-gliedrigen Ring, wie beispielsweise einem Pyrrol-, Imidazol-, Indol- oder Benzoimidazolring, tragen, können an den Kohlenstoffatomen und/oder an derartigen Ringstickstoffatomen substituiert sein. In einer Ausführungsform der Erfindung sind Substituenten an derartigen Ringstickstoffatomen aus (C₁-C₄)-Alkylgruppen ausgewählt, d.h. derartige Ringstickstoffatome in aromatischen Heterocyclen tragen ein Wasserstoffatom oder einen (C₁-C₄)-Alkylsubstituenten. Wenn bezüglich Ringstickstoffatomen in aromatischen Heterocyclen und anderen Heterocyclen angegeben ist, daß sie ein Wasserstoffatom oder einen Substituenten tragen können, so tragen derartige Ringstickstoffatome entweder ein Wasserstoffatom oder einen Substituenten oder nicht. Ringstickstoffatome, die ein Wasserstoffatom oder einen Substituenten tragen, kommen in einem stickstoffhaltigen aromatischen 5-gliedrigen Ring, wie er beispielsweise in Pyrrol, Imidazol, Indol oder Benzoimidazol vorliegt, und in einem nichtaromatischen Ring einschließlich eines gesättigten Rings vor. Ringstickstoffatome, die kein Wasserstoffatom oder keinen Substituenten tragen, sofern sie nicht in positiv geladener Form vorliegen, einschließlich weiterer Ringstickstoffatome neben den Ringstickstoffatomen, die ein Wasserstoffatom oder einen Substituenten tragen, kommen in einem aromatischen Ring, wie er beispielsweise in Thiazol, Imidazol, Pyridin oder Benzoimidazol vorliegt, und in einem nichtaromatischen Ring, in dem sie Brückenkopf- oder Teil einer Doppelbindung sind, und als Ringstickstoffatome, über die ein Ring gebunden ist, vor. Geeignete Ringstickstoffatome in aromatischen Heterocyclen in den Verbindungen der Formel I, wie das Ringstickstoffatom in einem

Pyridinring, spezifisch ein Ringstickstoffatom in einem aromatischen Heterocyclus, der R^2 repräsentiert, können auch einen Oxysubstituenten $-O^-$ tragen und als N-Oxid vorliegen, und derartige Ringstickstoffatome können auch als quartäres Salz, beispielsweise als N-(C₁-C₄)-Alkylsalz wie N-Methylsalz, vorliegen, wobei in einer

5 Ausführungsform der Erfindung das Gegenanion in einem derartigen quartären Salz ein physiologisch akzeptables Anion ist, das sich von einer Säure, die ein physiologisch akzeptables Salz bildet, ableitet. In monosubstituierten Phenylgruppen kann der Substituent in der 2-Position, der 3-Position oder der 4-Position stehen. In

10 disubstituierten Phenylgruppen können die Substituenten in 2,3-Position, 2,4-Position, 2,5-Position, 2,6-Position, 3,4-Position oder 3,5-Position stehen. In trisubstituierten Phenylgruppen können die Substituenten in 2,3,4-Position, 2,3,5-Position, 2,3,6-Position, 2,4,5-Position, 2,4,6-Position oder 3,4,5-Position stehen. Naphthyl kann 1-Naphthyl (= Naphthalin-1-yl) oder 2-Naphthyl (= Naphthalin-2-yl) sein. In

15 monosubstituierten 1-Naphthylgruppen kann der Substituent in der 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- oder 8-Position stehen. In monosubstituierten 2-Naphthylgruppen kann der Substituent in der 1-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- oder 8-Position stehen. In disubstituierten Naphthylgruppen können die Substituenten ebenfalls in beliebigen Positionen sowohl in dem Ring, über den die Naphthylgruppe gebunden ist, und/oder in dem anderen Ring stehen. Diese

20 Aussage bezüglich der einwertigen Reste gilt entsprechend für die jeweiligen zweiwertigen Reste, wie beispielsweise Phenylengruppen, die R^2 repräsentieren, die somit ebenfalls unsubstituiert oder substituiert sein können, beispielsweise durch 1, 2, 3 oder 4 oder durch 1, 2 oder 3 oder durch 1 oder 2 oder durch 1 gleiche oder verschiedene Substituenten, die in beliebigen Positionen stehen können.

25 In aromatischen Heterocyclen, die als Heteroaryl- und Heteroarylengruppen bezeichnet sein können, sowie in allen anderen heterocyclischen Ringen und den nichtaromatischen heterocyclischen Gruppen, sind die Ringheteroatome im allgemeinen aus N, O und S ausgewählt, wobei N Ringstickstoffatome, die ein Wasserstoffatom oder einen Substituenten tragen, sowie Ringstickstoffatome, die kein

30 Wasserstoffatom und keinen Substituenten tragen, einschließt. Ringheteroatome können in beliebigen Positionen stehen, vorausgesetzt, daß das heterocyclische System in der Technik bekannt und stabil und als Untergruppe für den gewünschten

Zweck der Verbindung der Formel I wie die Verwendung als Arzneistoff geeignet ist. In einer Ausführungsform der Erfindung können zwei Ringsauerstoffatome nicht in benachbarten Ringpositionen eines Heterocyclus stehen, in einer anderen Ausführungsform können zwei Ringheteroatome, die aus Sauerstoff und Schwefel ausgewählt sind, nicht in benachbarten Ringpositionen eines beliebigen Heterocyclus stehen. Gesättigte Ringe enthalten keine Doppelbindung im Ring. Ungesättigte Ringsysteme können aromatisch oder teilweise ungesättigt einschließlich teilweise aromatisch sein, wobei in letzterem Fall ein Ring in einem bicyclischen Ringsystem aromatisch ist und das Ringsystem über ein Atom im nichtaromatischen Ring gebunden ist. Je nach der jeweiligen Gruppe können ungesättigte Ringe eine, zwei, drei, vier oder fünf Doppelbindungen im Ring enthalten. Aromatische Gruppen enthalten ein cyclisches System von sechs oder zehn delokalisierten pi-Elektronen im Ring. Je nach der jeweiligen Gruppe können gesättigte und nichtaromatisch ungesättigte heterocyclische Ringe einschließlich Het und nichtaromatischen Gruppen, die R^3 repräsentieren, 3-gliedrig, 4-gliedrig, 5-gliedrig, 6-gliedrig, 7-gliedrig, 8-gliedrig, 9-gliedrig oder 10-gliedrig sein. In einer Ausführungsform der Erfindung sind aromatische heterocyclische Ringe 5-gliedrige oder 6-gliedrige monocyclische Ringe oder 8-gliedrige, 9-gliedrige oder 10-gliedrige bicyclische Ringe, in einer anderen Ausführungsform 5-gliedrige oder 6-gliedrige monocyclische Ringe oder 9-gliedrige oder 10-gliedrige bicyclische Ringe, in einer anderen Ausführungsform 5-gliedrige oder 6-gliedrige monocyclische Ringe, wobei die 8-gliedrigen, 9-gliedrigen oder 10-gliedrigen bicyclischen Ringe aus zwei anellierten 5-gliedrigen Ringen, einem 5-gliedrigen Ring und einem 6-gliedrigen Ring, die miteinander anelliert sind, bzw. zwei anellierten 6-gliedrigen Ringen zusammengesetzt sind. In bicyclischen aromatischen heterocyclischen Gruppen können ein oder beide Ringe Heteroringglieder enthalten, und ein oder beide Ringe können aromatisch sein. Im allgemeinen werden bicyclische Ringsysteme mit einem aromatischen Ring und einem nichtaromatischen Ring als aromatisch erachtet, wenn sie über ein Kohlenstoffatom im aromatischen Ring gebunden sind, und als nichtaromatisch, wenn sie über ein Kohlenstoffatom im nichtaromatischen Ring gebunden sind. Sofern nicht anders angegeben, können heterocyclische Gruppen einschließlich aromatischer heterocyclischer Gruppen über ein beliebiges geeignetes Ringkohlenstoffatom und im Fall von Stickstoffheterocyclen über ein beliebiges

geeignetes Ringstickstoffatom gebunden sein. In einer Ausführungsform der Erfindung ist eine aromatische heterocyclische Gruppe in einer Verbindung der Formel I unabhängig von jeder anderen aromatischen heterocyclischen Gruppe über ein Ringkohlenstoffatom gebunden, in einer anderen Ausführungsformen über ein Ringstickstoffatom. Je nach der Definition der jeweiligen heterocyclischen Gruppe beträgt in einer Ausführungsform der Erfindung die Zahl der Ringheteroatome, die in einer heterocyclischen Gruppe unabhängig von der Zahl von Ringheteroatomen in einer anderen heterocyclischen Gruppe vorliegen kann, 1, 2, 3 oder 4, in einer anderen Ausführungsform 1,2 oder 3, in einer anderen Ausführungsform 1 oder 2, in einer anderen Ausführungsform 1, wobei die Ringheteroatome gleich oder verschieden sein können. Heterocyclische Gruppen, die gegebenenfalls substituiert sind, können unabhängig von jeder anderen heterocyclischen Gruppe unsubstituiert oder durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten, beispielsweise 1, 2, 3, 4 oder 5 oder 1, 2, 3 oder 4 oder 1, 2 oder 3 oder 1 oder 2 oder 1 Substituenten, die bei der Definition der jeweiligen Gruppe angegeben sind, substituiert sein. Substituenten an heterocyclischen Gruppen können in beliebigen Positionen stehen. So können Substituenten in einer Pyridin-2-ylgruppe beispielsweise in der 3-Position und/oder 4-Position und/oder 5-Position und/oder 6-Position stehen, in einer Pyridin-3-ylgruppe in der 2-Position und/oder 4-Position und/oder 5-Position und/oder 6-Position stehen und in einer Pyridin-4-ylgruppe in der 2-Position und/oder 3-Position und/oder 5-Position und/oder 6-Position stehen.

Beispiele für Grundkörper von Heterocyclen, von denen sich heterocyclische Gruppen einschließlich aromatischer heterocyclischer Gruppen, gesättigter heterocyclischer Gruppen und nichtaromatischer ungesättigter heterocyclischer Gruppen ableiten können, sind Azet, Oxet, Pyrrol, Furan, Thiophen, Imidazol, Pyrazol, [1,3]Dioxol, Oxazol (= [1,3]Oxazol), Isoxazol (= [1,2]Oxazol), Thiazol (= [1,3]Thiazol), Isothiazol (= [1,2]Thiazol), [1,2,3]Triazol, [1,2,4]Triazol, [1,2,4]Oxadiazol, [1,3,4]Oxadiazol, [1,2,4]Thiadiazol, [1,3,4]Thiadiazol, Tetrazol, Pyridin, Pyran, Thiopyran, Pyridazin, Pyrimidin, Pyrazin, [1,3]Oxazin, [1,4]Oxazin, [1,3]Thiazin, [1,4]Thiazin, [1,2,3]Triazin, [1,3]Dithiin, [1,4]Dithiin, [1,2,4]Triazin, [1,3,5]Triazin, [1,2,4,5]Tetrazin, Azepin, [1,3]Diazepin, [1,4]Diazepin, [1,3]Oxazepin, [1,4]Oxazepin, [1,3]Thiazepin,

[1,4]Thiazepin, Azocin, Azecin, Cyclopenta[b]pyrrol, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexan, 3-Azabicyclo[3.1.0]hexan, 2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptan, Indol, Isoindol, Benzothiophen, Benzofuran, [1,3]Benzodioxol (= 1,2-Methylenedioxybenzol), [1,3]Benzoxazol, [1,3]Benzothiazol, Benzoimidazol, Thieno[3,2-c]pyridin, Chromen, Isochromen, [1,4]Benzodioxin, [1,4]Benzoxazin, [1,4]Benzothiazin, Chinolin, Isochinolin, Cinnolin, Chinazolin, Chinoxalin, Phthalazin, Thienothiophen, [1,8]Naphthyridin und andere Naphtyridine, Pteridin und die jeweiligen gesättigten und teilweise ungesättigten Heterocyclen, in denen eine oder mehrere, beispielsweise eine, zwei, drei, vier oder alle Doppelbindungen im Ringsystem einschließlich der Doppelbindungen im aromatischen Ring durch Einfachbindungen ersetzt sind, wie beispielsweise Azetidin, Oxetan, Pyrrolidin, Tetrahydrofuran, Tetrahydrothiophen, Imidazolidin, Oxazolidin, Thiazolidin, Dihydropyridin, Piperidin, Tetrahydropyran, Piperazin, Morpholin, Thiomorpholin, Azepan, Chroman, Isochroman, [1,4]Benzodioxan (= 1,2-Ethylenedioxybenzol), 2,3-Dihydrobenzofuran, 1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin.

Beispiele für Reste von aromatischen Heterocyclen, die in den Verbindungen der Formel I vorkommen können, sind Thiophenyl (= Thienyl) einschließlich Thiophen-2-yl und Thiophen-3-yl, Pyridinyl (= Pyridyl) einschließlich Pyridin-2-yl (= 2-Pyridyl), Pyridin-3-yl (= 3-Pyridyl) und Pyridin-4-yl (= 4-Pyridyl), Imidazolyl einschließlich beispielsweise 1H-Imidazol-1-yl, 1H-Imidazol-2-yl, 1H-Imidazol-4-yl und 1H-Imidazol-5-yl, [1,2,4]Triazolyl einschließlich 1H-[1,2,4]-Triazol-1-yl und 4H-[1,2,4]-Triazol-3-yl, Tetrazolyl einschließlich 1H-Tetrazol-1-yl und 1H-Tetrazol-5-yl, Chinolinyl (= Chinolyl) einschließlich Chinolin-2-yl, Chinolin-3-yl, Chinolin-4-yl, Chinolin-5-yl, Chinolin-6-yl, Chinolin-7-yl und Chinolin-8-yl, die alle gegebenenfalls wie in der Definition der jeweiligen Gruppe angegeben substituiert sind. Beispiele für Reste von gesättigten und teilweise ungesättigten Heterocyclen, die in den Verbindungen der Formel I vorkommen können, sind Azetidiny, Pyrrolidinyl einschließlich Pyrrolidin-1-yl, Pyrrolidin-2-yl und Pyrrolidin-3-yl, 2,5-Dihydro-1H-pyrrolyl, Piperidinyl einschließlich Piperidin-1-yl, Piperidin-2-yl, Piperidin-3-yl und Piperidin-4-yl, 1,2,3,4-Tetrahydropyridinyl, 1,2,5,6-Tetrahydropyridinyl, 1,2-Dihydropyridinyl, Azepanyl, Azocanyl, Azecanyl, Octahydrocyclopenta[b]pyrrolyl, 2,3-Dihydrobenzofuranyl einschließlich 2,3-Dihydrobenzofuran-7-yl, 2,3-Dihydro-1H-indolyl, Octahydro-1H-indolyl, 2,3-Dihydro-1H-

isoindolyl, Octahydro-1H-isoindolyl, 1,2-Dihydrochinoliny, 1,2,3,4-Tetrahydrochinoliny,
 Decahydrochinoliny, 1,2-Dihydroisochinoliny, 1,2,3,4-Tetrahydroisochinoliny, 1,2,3,4-
 Tetrahydroisochinoliny, Decahydroisochinoliny, Decahydroisochinoliny, 4,5,6,7-
 Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridiny, Pyrazolidiny, Imidazolidiny, Hexahydropyrimidiny,
 5 1,2-Dihydropyrimidiny, Piperaziny, [1,3]Diazepany, [1,4]Diazepany, Oxazolidiny,
 [1,3]Oxazinany, [1,3]Oxazepany, Morpholiny einschließlich Morpholin-2-yl, Morpholin-
 3-yl und Morpholin-4-yl, [1,4]Oxazepany, Thiazolidiny, [1,3]Thiazinany,
 Thiomorpholiny einschließlich Thiomorpholin-2-yl, Thiomorpholin-3-yl und
 Thiomorpholin-4-yl, 3,4-Dihydro-2H-[1,4]thiaziny, [1,3]Thiazepany, [1,4]Thiazepany,
 10 [1,4]Thiazepany, Oxetany, Tetrahydrofurany, Tetrahydrothieny, Isoxazolidiny,
 Isothiazolidiny, Oxazolidiny, [1,2,4]-Oxadiazolidiny, [1,2,4]-Thiadiazolidiny,
 [1,2,4]Triazolidiny, [1,3,4]Oxadiazolidiny, [1,3,4]Thiadiazolidiny, [1,3,4]Triazolidiny,
 2,3-Dihydrofurany, 2,5-Dihydrofurany, 2,3-Dihydrothieny, 2,5-Dihydrothieny,
 2,3-Dihydropyrroly, 2,3-Dihydroisoxazolyl, 4,5-Dihydroisoxazolyl, 2,5-Dihydroisoxazolyl,
 15 2,3-Dihydroisothiazolyl, 4,5-Dihydroisothiazolyl, 2,5-Dihydroisothiazolyl, 2,3-
 Dihydropyrazolyl, 4,5-Dihydropyrazolyl, 2,5-Dihydropyrazolyl, 2,3-Dihydrooxazolyl, 4,5-
 Dihydrooxazolyl, 2,5-Dihydrooxazolyl, 2,3-Dihydrothiazolyl, 4,5-Dihydrothiazolyl, 2,5-
 Dihydrothiazolyl, 2,3-Dihydroimidazolyl, 4,5-Dihydroimidazolyl, 2,5-Dihydroimidazolyl,
 Tetrahydropyridaziny, Tetrahydropyrimidiny, Tetrahydropyraziny,
 20 Tetrahydro[1,3,5]triaziny, [1,3]Dithiany, Tetrahydropyrany, Tetrahydrothiopyrany,
 [1,3]Dioxolany, 3,4,5,6-Tetrahydropyridiny, 4H-[1,3]Thiaziny, 1,1-Dioxo-2,3,4,5-
 tetrahydrothieny, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexyl einschließlich 2-Azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl, 3-
 Azabicyclo[3.1.0]hexyl einschließlich 3-Azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl, 2-Oxa-5-
 azabicyclo[2.2.1]heptyl einschließlich 2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]hept-5-yl, die alle über
 25 ein geeignetes Ringkohlenstoffatom oder Ringstickstoffatom gebunden sind und
 gegebenenfalls wie in der Definition der jeweiligen Gruppe angegebenen substituiert
 sind.

Halogen steht für Fluor, Chlor, Brom oder Iod. In einer Ausführungsform der Erfindung
 ist jedes Halogen in einer Verbindung der Formel I unabhängig von jedem anderen
 30 Halogen aus Fluor, Chlor und Brom ausgewählt, in einer anderen Ausführungsform aus
 Fluor und Chlor.

Wenn eine Oxogruppe an ein Kohlenstoffatom gebunden ist, ersetzt sie zwei Wasserstoffatome an einem Kohlenstoffatom des zugrundeliegenden Systems. Somit wird eine CH_2 -Gruppe in einer Kette oder einem Ring dann, wenn sie durch Oxo, d.h. durch ein doppelt gebundenes Sauerstoffatom, substituiert ist, zu einer $\text{C}(\text{O})$ -Gruppe (= $\text{C}(\text{=O})$ -Gruppe). Offensichtlich kann eine Oxogruppe nicht als Substituent an einem Kohlenstoffatom in einem aromatischen Ring wie beispielsweise in einer Phenylgruppe vorkommen. Wenn ein Ringschwefelatom in einer heterocyclischen Gruppe eine oder zwei Oxogruppen tragen kann, handelt es sich in dem Fall, daß es keine Oxogruppe trägt, um ein nichtoxidiertes Schwefelatom S, oder in dem Fall, daß es eine Oxogruppe trägt, um eine $\text{S}(\text{O})$ -Gruppe (Sulfoxidgruppe, S-Oxid-Gruppe) oder in dem Fall, daß es zwei Oxogruppen trägt, um eine $\text{S}(\text{O})_2$ -Gruppe (= Sulfongruppe, S,S-Dioxid-Gruppe).

Die vorliegende Erfindung schließt alle stereoisomeren Formen der Verbindungen der Formel I und ihre Salze und Solvate ein. Bezüglich jedes chiralen Zentrums können die Verbindungen der Formel I unabhängig von jedem anderen chiralen Zentrum in S-Konfiguration oder weitgehend S-Konfiguration oder in R-Konfiguration oder weitgehend R-Konfiguration oder als Mischung des S-Isomers und des R-Isomers in beliebigen Verhältnissen vorliegen. Die Erfindung schließt alle möglichen Enantiomere und Diastereomere und Mischungen von zwei oder mehr Stereoisomeren, zum Beispiel Gemische von Enantiomeren und/oder Diastereomeren, in allen Verhältnissen ein. Somit können erfindungsgemäße Verbindungen, die als Enantiomere existieren können, in enantiomerenreiner Form sowohl als linksdrehende als auch rechtsdrehende Antipoden und in Form von Mischungen der beiden Enantiomere in allen Verhältnissen einschließlich Racematen vorliegen. Im Fall einer E/Z-Isomerie bzw. cis/trans-Isomerie, beispielsweise an Doppelbindungen oder Ringen wie Cycloalkylringen, schließt die Erfindung sowohl die E-Form als auch die Z-Form bzw. die cis-Form und die trans-Form sowie Mischungen dieser Formen in allen Verhältnissen ein. In einer Ausführungsform der Erfindung handelt es sich bei einer Verbindung, die in zwei oder mehr stereoisomeren Formen vorkommen kann, um ein reines oder weitgehend reines einzelnes Stereoisomer. Die Herstellung von einzelnen Stereoisomeren kann beispielsweise durch Trennung einer Mischung von Isomeren nach üblichen Methoden, beispielsweise durch Chromatographie oder Kristallisation, durch Verwendung von

stereochemisch einheitlichen Ausgangsstoffen bei der Synthese oder durch stereoselektive Synthese erfolgen. Gegebenenfalls kann vor einer Trennung von Stereoisomeren eine Derivatisierung durchgeführt werden. Die Trennung einer Mischung von Stereoisomeren kann auf der Stufe der Verbindung der Formel I oder auf der Stufe eines Ausgangsstoffs oder eines Zwischenprodukts im Verlauf der Synthese durchgeführt werden. Die vorliegende Erfindung schließt auch alle tautomeren Formen der Verbindungen der Formel I und ihre Salze und Solvate ein.

Wenn die Verbindungen der Formel I eine oder mehrere saure und/oder basische Gruppen, d.h. salzbildende Gruppen, enthalten, schließt die Erfindung auch ihre entsprechenden physiologisch oder toxikologisch akzeptablen Salze, d.h. nichttoxischen Salze, insbesondere ihre pharmazeutisch akzeptablen Salze, ein.

Die vorliegende Erfindung schließt alle Solvate von Verbindungen der Formel I, beispielsweise Hydrate oder Addukte mit Alkoholen wie (C₁-C₄)-Alkanolen, aktive Metaboliten der Verbindungen der Formel I und auch Prodrugs und Derivate der Verbindungen der Formel I, die in vitro nicht unbedingt pharmakologische Wirkung zeigen, aber in vivo in pharmakologisch wirksame Verbindungen umgewandelt werden, beispielsweise Ester oder Amide von Carbonsäuregruppen, ein.

Die Alkandiy-, Alkendiyl- und Alkindiygruppen, die in der Gruppe X vorkommen, können linear oder verzweigt sein, wie bereits bezüglich derartiger Gruppen im allgemeinen angegeben, und diese Gruppen sowie Cycloalkandiygruppen, die X repräsentieren, können über beliebige Positionen an die benachbarten Gruppen, d.h. die Gruppe R¹O-C(O) und die Gruppe Y oder im Fall der Gruppe Alkandiyloxy an das Sauerstoffatom der Alkandiyloxygruppe, gebunden sein. Die benachbarten Gruppen können an das gleiche Kohlenstoffatom oder verschiedene Kohlenstoffatome in der Gruppe X gebunden sein. In einer Ausführungsform besteht die Kette von Kohlenstoffatomen in einer Alkandiy-, Alkendiyl- und Alkindiygruppe, die in der Gruppe X vorkommt, die die Gruppe R¹O-C(O) direkt mit der Gruppe Y oder im Fall der Gruppe Alkandiyloxy mit dem Sauerstoffatom der Alkandiyloxygruppe verbindet, aus 1, 2, 3 oder 4 Kohlenstoffatomen, in einer anderen Ausführungsform aus 1, 2 oder

3 Kohlenstoffatomen, in einer anderen Ausführungsform aus 1 oder
2 Kohlenstoffatomen, in einer anderen Ausführungsform aus 1 Kohlenstoffatom. Im Fall
einer X repräsentierenden Cycloalkandiylgruppe sind in einer Ausführungsform die
Gruppen $R^1O-C(O)$ und Y an zwei Ringkohlenstoffatome gebunden, die in 1,2-Position,
5 1,3-Position oder 1,4-Position zueinander stehen, in einer anderen Ausführungsform in
1,2-Position oder 1,3-Position zueinander, in einer anderen Ausführungsform in 1,2-
Position zueinander, in einer anderen Ausführungsform in 1,4-Position zueinander. In
einer Ausführungsform ist X ausgewählt aus (C_1-C_6) -Alkandiyl, (C_2-C_6) -Alkendiyl, $(C_3-$
 $C_7)$ -Cycloalkandiyl und (C_1-C_6) -Alkandiyoxy, in einer anderen Ausführungsform aus
10 (C_1-C_6) -Alkandiyl, (C_2-C_6) -Alkendiyl und (C_1-C_6) -Alkandiyoxy, in einer anderen
Ausführungsform aus (C_1-C_6) -Alkandiyl, (C_3-C_7) -Cycloalkandiyl und (C_1-C_6) -
Alkandiyoxy, in einer Ausführungsform aus (C_1-C_6) -Alkandiyl und (C_1-C_6) -Alkandiyoxy,
in einer anderen Ausführungsform aus (C_1-C_6) -Alkandiyl, (C_2-C_6) -Alkendiyl, (C_2-C_6) -
Alkendiyl und (C_3-C_7) -Cycloalkandiyl, in einer anderen Ausführungsform aus (C_1-C_6) -
15 Alkandiyl, (C_2-C_6) -Alkendiyl und (C_3-C_7) -Cycloalkandiyl, in einer anderen
Ausführungsform aus (C_1-C_6) -Alkandiyl und (C_2-C_6) -Alkendiyl, in einer anderen
Ausführungsform steht X für (C_1-C_6) -Alkandiyl, in einer anderen Ausführungsform steht
X für (C_2-C_6) -Alkendiyl, in einer anderen Ausführungsform steht X für (C_3-C_7) -
Cycloalkandiyl, und in einer anderen Ausführungsform steht X für (C_1-C_6) -Alkandiyoxy,
20 die alle gegebenenfalls wie angegeben substituiert sind. In einer Ausführungsform ist
eine (C_1-C_6) -Alkandiylgruppe, die in X vorkommt, eine
 (C_1-C_4) -Alkandiylgruppe, in einer anderen Ausführungsform eine (C_1-C_3) -Alkandiyl-
gruppe, in einer anderen Ausführungsform eine (C_1-C_2) -Alkandiylgruppe. In einer
Ausführungsform sind die (C_2-C_6) -Alkendiyl- und (C_2-C_6) -Alkendiylgruppen, die X
25 repräsentieren, (C_2-C_4) -Alkendiyl- und (C_2-C_4) -Alkendiylgruppen, in einer anderen
Ausführungsform (C_2-C_3) -Alkendiyl- und (C_2-C_3) -Alkendiylgruppen. In einer
Ausführungsform ist eine (C_3-C_7) -Cycloalkandiylgruppe, die X repräsentiert, eine
 (C_3-C_6) -Cycloalkandiylgruppe, in einer anderen Ausführungsform eine (C_3-C_4) -
Cycloalkandiylgruppe, in einer anderen Ausführungsform eine Cyclopropandiylgruppe,
30 in einer anderen Ausführungsform eine Cyclohexandiylgruppe. Beispiele für Gruppen X,
aus denen die jeweilige X repräsentierende Gruppe in den oben aufgeführten
Ausführungsformen gewählt sein kann oder aus denen in einer anderen

Ausführungsform der Erfindung X ausgewählt sein kann, sind Methylen, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$ (Ethan-1,1-diyl), $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ (Ethan-1,2-diyl, 1,2-Ethylen), $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ (1-Methylethan-1,1-diyl), $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ (Propan-1,3-diyl, 1,3-Propylen), $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-$ und $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2-$ (Propan-1,2-diyl, 1,2-Propylen), die die Gruppe $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkandiyl exemplifizieren, $-\text{CH}=\text{CH}-$ (Ethen-1,2-diyl), $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$ und $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-$ (Prop-1-en-1,3-diyl und Prop-2-en-1,3-diyl) und $-\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)-$ und $-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}-$ (Prop-1-en-1,2-diyl), die die Gruppe $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkendiyl exemplifizieren, $-\text{C}\equiv\text{C}-$ (Ethindiyl) und $-\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{C}-$ und $-\text{C}\equiv\text{CCH}_2-$ (Prop-1-in-1,3-diyl und Prop-2-in-1,3-diyl), die die Gruppe $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkindiyl exemplifizieren, Cyclopropan-1,1-diyl, Cyclopropan-1,2-diyl und Cyclohexan-1,4-diyl, die die Gruppe $(\text{C}_3\text{-C}_7)$ -Cycloalkandiyl exemplifizieren, $-\text{CH}_2\text{-O-}$ (Methylenoxy), $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-O-}$ (Ethan-1,2-dyloxy), $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{-O-}$ (Ethan-1,1-dyloxy), $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{-O-}$ (1-Methylethan-1,1-dyloxy), $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-O-}$ (Propan-1,3-dyloxy) und $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-O-}$ (Butan-1,4-dyloxy), die die Gruppe $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkandiyloxy exemplifizieren, wobei alle diese Gruppen gegebenenfalls wie angegeben substituiert sind. So ist in einer Ausführungsform X ausgewählt aus $-\text{CH}_2\text{-O-}$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-O-}$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{-O-}$ und $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{-O-}$, in einer anderen Ausführungsform aus $-\text{CH}_2\text{-O-}$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-O-}$ und $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{-O-}$, in einer anderen Ausführungsform aus $-\text{CH}_2\text{-O-}$ und $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{-O-}$, und in einer anderen Ausführungsform steht X für $-\text{CH}_2\text{-O-}$, wobei alle diese Gruppen gegebenenfalls wie angegeben substituiert sind und wobei das Sauerstoffatom an die Gruppe Y gebunden ist. In einer Ausführungsform ist die Zahl der Substituenten, die gegebenenfalls in X vorliegen, 1, 2, 3 oder 4, in einer anderen Ausführungsform 1, 2 oder 3, in einer anderen Ausführungsform 1 oder 2, in einer anderen Ausführungsform 1, und in einer anderen Ausführungsform ist die Gruppe X nicht durch aus Fluor und Hydroxy ausgewählte Substituenten substituiert. In einer Ausführungsform ist die Zahl der Hydroxysubstituenten in X nicht größer als 2, in einer anderen Ausführungsform nicht größer als 1. In einer Ausführungsform liegt an einem einzelnen Kohlenstoffatom in X nicht mehr als ein Hydroxysubstituent vor. In einer Ausführungsform liegen an Kohlenstoffatomen, die Teil einer Doppelbindung in der Gruppe $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkendiyl sind, keine Hydroxysubstituenten vor. In einer Ausführungsform liegen an dem Kohlenstoffatom in der Gruppe $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkandiyloxy, das an das Sauerstoffatom gebunden ist, keine Hydroxysubstituenten vor, in einer anderen Ausführungsform liegen an dem Kohlenstoffatom in der Gruppe $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -

Alkandiyloxy, das an das Sauerstoffatom gebunden ist, keine Substituenten vor, d.h. in dieser letztgenannten Ausführungsform sind alle Kohlenstoffatome, die nicht an das Sauerstoffatom gebunden sind, gegebenenfalls durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten substituiert, die aus Fluor und Hydroxy ausgewählt sind.

- 5 Die Doppelbindung in der Gruppe (C₂-C₆)-Alkendiyl kann E-Konfiguration oder Z-Konfiguration haben. In einer Ausführungsform hat sie E-Konfiguration, in einer anderen Ausführungsform hat sie Z-Konfiguration.

- 10 In einer Ausführungsform der Erfindung ist die Gruppe R¹ aus Wasserstoff und (C₁-C₄)-Alkyl ausgewählt, in einer anderen Ausführungsform ist R¹ aus Wasserstoff, Methyl, Ethyl, n-Propyl, n-Butyl und Isopropyl ausgewählt, in einer anderen Ausführungsform aus Wasserstoff, Methyl und Ethyl, in einer anderen Ausführungsform steht R¹ für Wasserstoff, in einer anderen Ausführungsform steht R¹ für (C₁-C₄)-Alkyl, in einer anderen Ausführungsform steht R¹ für Methyl.

- 15 In einer Ausführungsform der Erfindung ist die Zahl der Ringheteroatome in einem aromatischen Heterocyclus, der Y repräsentiert, 1 oder 2, in einer anderen Ausführungsform 1. In einer Ausführungsform der Erfindung ist Y aus Phenylen und einem zweiwertigen Rest eines aromatischen, 6-gliedrigen monocyclischen
- 20 Heterocyclus, der 1, 2 oder 3 Ringstickstoffatome, in einer anderen Ausführungsform 1 oder 2 Ringstickstoffatome, in einer anderen Ausführungsform 1 Ringstickstoffatom enthält, ausgewählt, wobei eines der Ringstickstoffatome einen Substituenten R⁴ tragen kann, der Oxy ist, d.h. wobei eines der Ringstickstoffatome zum N-Oxid oxidiert sein kann, und wobei das Phenylen und der zweiwertige Rest eines aromatischen
- 25 Heterocyclus gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringkohlenstoffatomen durch gleiche oder verschiedene Substituenten R⁵ substituiert sind. In einer anderen Ausführungsform steht Y für Phenylen, wobei das Phenylen gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringatomen durch gleiche oder verschiedene Substituenten R⁵ substituiert ist, und in einer anderen Ausführungsform steht Y für Pyridindiyl, wobei das
- 30 Ringstickstoffatom einen Substituenten R⁴, der Oxy ist, tragen kann, d.h. wobei das Ringstickstoffatom zum N-Oxid oxidiert sein kann, und wobei das Pyridindiyl gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringkohlenstoffatomen durch gleiche oder

verschiedene Substituenten R^5 substituiert ist. In einer anderen Ausführungsform steht Y für einen zweiwertigen Rest eines aromatischen 5-gliedrigen Heterocyclus, der 1, 2 oder 3 gleiche oder verschiedene Ringheteroatome, die aus N, O und S ausgewählt sind, enthält, wobei eines der Ringstickstoffatome ein Wasserstoffatom oder einen Substituenten R^4 tragen kann und wobei der zweiwertige Rest eines aromatischen Heterocyclus gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringkohlenstoffatomen durch gleiche oder verschiedene Substituenten R^5 substituiert ist. In einer Ausführungsform ist ein zweiwertiger Rest einer aromatischen heterocyclischen Gruppe, die Y repräsentiert, aus Furandiyl, Thiophendiyl, Oxazoldiyl, Thiazoldiyl, Pyridindiyl, Pyridazindiyl, Pyrimidindiyl und Pyrazindiyl ausgewählt, in einer anderen Ausführungsform aus Furandiyl, Thiophendiyl, Thiazoldiyl, Pyridindiyl, Pyridazindiyl, Pyrimidindiyl und Pyrazindiyl, in einer anderen Ausführungsform aus Furandiyl, Thiophendiyl, Pyridindiyl, Pyridazindiyl, Pyrimidindiyl und Pyrazindiyl, in einer anderen Ausführungsform aus Furandiyl, Thiophendiyl, Pyridindiyl und Pyrimidindiyl, in einer anderen Ausführungsform aus Furandiyl, Thiophendiyl und Pyridindiyl, die alle gegebenenfalls wie in bezug auf Y angegeben substituiert sind.

Die Ringkohlenstoffatome, über die die Phenylengruppe und der zweiwertige Rest eines aromatischen Heterocyclus, die bzw. der Y repräsentieren, an den Oxazolopyrimidinring und die Gruppe X gebunden sind, können in beliebigen Positionen vorliegen. Eine Y repräsentierende Phenylengruppe kann 1,2-Phenylen sein, d.h. der Oxazolopyrimidinring und die Gruppe X können in 1,2-Position oder ortho-Position zueinander gebunden sein, sie kann 1,3-Phenylen sein, d.h. der Oxazolopyrimidinring und die Gruppe X können in 1,3-Position oder meta-Position zueinander gebunden sein, und sie kann 1,4-Phenylen sein, d.h. der Oxazolopyrimidinring und die Gruppe X können in 1,4-Position oder para-Position zueinander gebunden sein. In einer Ausführungsform ist eine Y repräsentierende Phenylengruppe ausgewählt aus 1,3-Phenylen und 1,4-Phenylen, in einer anderen Ausführungsform ist sie 1,3-Phenylen, und in einer anderen Ausführungsform ist sie 1,4-Phenylen, wobei alle diese Gruppen gegebenenfalls wie in bezug auf Y angegeben substituiert sind. In einer Ausführungsform ist Y ausgewählt aus einer oder mehreren der Gruppen Phenylen, Furan-2,5-diyl, Thiophen-2,4-diyl, Thiophen-2,5-diyl, Pyridin-2,4-diyl, Pyridin-2,5-diyl,

Pyridin-3,5-diyl, Pyridin-2,6-diyl und Pyrimidin-2,5-diyl, in einer anderen Ausführungsform aus den Gruppen Furan-2,5-diyl, Thiophen-2,4-diyl, Thiophen-2,5-diyl, Pyridin-2,4-diyl, Pyridin-2,5-diyl, Pyridin-3,5-diyl, Pyridin-2,6-diyl und Pyrimidin-2,5-diyl, in einer anderen Ausführungsform aus Pyridin-2,4-diyl, Pyridin-2,5-diyl, Pyridin-3,5-diyl und Pyridin-2,6-diyl, in einer anderen Ausführungsform aus Phenylen, Pyridin-2,4-diyl, Pyridin-2,5-diyl, Pyridin-3,5-diyl und Pyridin-2,6-diyl, die alle gegebenenfalls wie in bezug auf Y angegeben substituiert sind. In einer Ausführungsform ist die Zahl der Substituenten R^5 , die gegebenenfalls an Ringkohlenstoffatomen in Y vorliegen können, 1, 2, 3, 4 oder 5, in einer anderen Ausführungsform 1, 2, 3 oder 4, in einer anderen Ausführungsform 1, 2 oder 3, in einer anderen Ausführungsform 1 oder 2, in einer anderen Ausführungsform 1. Ringkohlenstoffatome in Y, die keinen Substituenten R^5 tragen, tragen ein Wasserstoffatom.

In einer Ausführungsform der Erfindung sind die Substituenten R^5 , die gegebenenfalls an der Gruppe Y vorliegen, aus Halogen, Hydroxy, (C_1-C_4) -Alkyl-, (C_3-C_5) -Cycloalkyl- C_zH_{2z-} , (C_1-C_4) -Alkyloxy-, (C_1-C_4) -Alkyl-S(O) $_m$ -, Amino, Nitro und Cyano ausgewählt, in einer anderen Ausführungsform aus Halogen, Hydroxy, (C_1-C_4) -Alkyl-, (C_3-C_5) -Cycloalkyl- C_zH_{2z-} , (C_1-C_4) -Alkyloxy-, Amino und Cyano, in einer anderen Ausführungsform aus Halogen, Hydroxy, (C_1-C_4) -Alkyl-, (C_3-C_5) -Cycloalkyl- C_zH_{2z-} und (C_1-C_4) -Alkyloxy-, in einer anderen Ausführungsform aus Fluor, Chlor, Hydroxy, (C_1-C_4) -Alkyl- und (C_1-C_4) -Alkyloxy-, in einer anderen Ausführungsform aus Fluor, Chlor und (C_1-C_4) -Alkyl-, und in einer anderen Ausführungsform sind sie (C_1-C_4) -Alkylsubstituenten, wobei z aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist.

In einer Ausführungsform sind 1, 2 oder 3 der Substituenten R^5 , in einer anderen Ausführungsform 1 oder 2 der Substituenten R^5 und in einer anderen Ausführungsform 1 der Substituenten R^5 , die gegebenenfalls an der Gruppe Y vorliegen, wie in der allgemeinen Definition von R^5 definiert und somit aus Halogen, Hydroxy, (C_1-C_4) -Alkyl-, (C_3-C_5) -Cycloalkyl- C_zH_{2z-} , (C_1-C_4) -Alkyloxy-, (C_1-C_4) -Alkyl-S(O) $_m$ -, Amino, Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, (C_1-C_4) -Alkyloxycarbonyl, Aminocarbonyl und Aminosulfonyl ausgewählt, und jegliche weiteren Substituenten R^5 , die gegebenenfalls an der Gruppe Y vorliegen, beispielsweise 1, 2 oder 3 weitere Substituenten R^5 , oder 1 oder 2 weitere

Substituenten R^5 oder 1 weiterer Substituent R^5 , sind aus Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl-, (C₁-C₄)-Alkyloxy-, (C₁-C₄)-Alkyl-S(O)_m-, Amino, Nitro und Cyano ausgewählt, wobei alle Alkylgruppen unabhängig voneinander gegebenenfalls durch einen oder mehrere Fluorsubstituenten substituiert sind, wie es allgemein für Alkylgruppen gilt. In einer Ausführungsform sind die Substituenten R^5 , die gegebenenfalls an der Gruppe Y vorliegen und in der oben aufgeführten Ausführungsform wie in der allgemeinen Definition von R^5 definiert sind, beispielsweise 1 oder 2 derartige Substituenten R^5 oder 1 derartiger Substituent R^5 , aus Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl-, (C₃-C₅)-Cycloalkyl-C_zH_{2z}-, (C₁-C₄)-Alkyloxy-, (C₁-C₄)-Alkyl-S(O)_m-, Amino und Cyano ausgewählt. In einer Ausführungsform befinden sich die Substituenten R^5 , die gegebenenfalls an der Gruppe Y vorliegen und in der oben aufgeführten Ausführungsform wie in der allgemeinen Definition von R^5 definiert sind, beispielsweise 1 oder 2 derartige Substituenten R^5 oder 1 derartiger Substituent R^5 , nicht an Ringkohlenstoffatomen in der Gruppe Y, die dem Atom, über das die Gruppe Y an den in Formel I dargestellten Oxazolopyrimidinring gebunden ist, benachbart ist. In einer Ausführungsform sind die weiteren Substituenten R^5 , die gegebenenfalls an der Gruppe Y vorliegen, beispielsweise 1, 2 oder 3 weitere Substituenten R^5 oder 1 oder 2 weitere Substituenten R^5 oder 1 weiterer Substituent R^5 , aus Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl-, (C₃-C₅)-Cycloalkyl-C_zH_{2z}-, (C₁-C₄)-Alkyloxy-, Amino, Cyano ausgewählt, in einer anderen Ausführungsform aus Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl-, (C₁-C₄)-Alkyloxy-, in einer anderen Ausführungsform aus Halogen, (C₁-C₄)-Alkyl- und (C₁-C₄)-Alkyloxy-, in einer anderen Ausführungsform aus Halogen und (C₁-C₄)-Alkyl-, wobei in allen diesen Ausführungsformen alle Alkylgruppen unabhängig voneinander gegebenenfalls durch einen oder mehrere Fluorsubstituenten substituiert sind.

In einer Ausführungsform der Erfindung ist die Zahl z aus 0 und 1 ausgewählt, in einer anderen Ausführungsform steht sie für 0, in einer anderen Ausführungsform steht sie für 1.

Gegenstand der Erfindung sind alle Verbindungen der Formel I, worin ein oder mehrere Strukturelemente wie Gruppen, Substituenten und Zahlen wie in einer der angegebenen Ausführungsformen oder Definitionen der Elemente definiert sind oder eine oder

- mehrere der spezifischen Bedeutungen, die hier als Beispiele für Elemente angegeben sind, besitzen, wobei alle Kombinationen einer oder mehrerer angegebener Ausführungsformen und/oder Definitionen und/oder spezifischer Bedeutungen der Elemente Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind. Auch in bezug auf alle
- 5 derartigen Verbindungen der Formel I sind alle ihre stereoisomeren Formen und Mischungen von stereoisomeren Formen in beliebigem Verhältnis und ihre physiologisch annehmbaren Salze und die physiologisch annehmbaren Solvate davon Gegenstand der vorliegenden Erfindung.
- 10 Eine weitere Ausführungsform betrifft Verbindungen der Formel I, worin ein oder mehrere Reste die folgenden Bedeutungen haben:
- X (C₁-C₆)-Alkandiyloxy, wobei das Sauerstoffatom der (C₁-C₆)-Alkandiyloxygruppe an die Gruppe Y gebunden ist;
- 15 Y Phenylen, wobei das Phenylen gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringkohlenstoffatomen durch gleiche oder verschiedene Substituenten R⁵ substituiert ist;
- 20 R¹ Wasserstoff oder (C₁-C₄)-Alkyl;
- R² und R³ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl-, (C₁-C₄)-Alkyloxy, (C₁-C₄)-Alkyl-S(O)_m-, Amino, Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, (C₁-C₄)-Alkyloxycarbonyl, Aminocarbonyl und Aminosulfonyl, (C₃-C₇)-
- 25 Cycloalkyl-C_wH_{2w}- und Oxy, wobei w aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist;
- R⁵ ausgewählt ist aus Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl-, (C₃-C₅)-Cycloalkyl-C_zH_{2z}-, (C₁-C₄)-Alkyloxy, (C₁-C₄)-Alkyl-S(O)_m-, Amino, Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, (C₁-C₄)-Alkyloxycarbonyl, Aminocarbonyl und Aminosulfonyl, wobei z aus 0, 1 und 2 ausgewählt
- 30 ist;
- m aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist.

Eine weitere Ausführungsform betrifft Verbindungen der Formel I, worin ein oder mehrere Reste die folgenden Bedeutungen haben:

5

X (C₁-C₆)-Alkandiyloxy, wobei das Sauerstoffatom der (C₁-C₆)-Alkandiyloxygruppe an die Gruppe Y gebunden ist;

Y Phenylen, wobei das Phenylen gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringkohlenstoffatomen durch gleiche oder verschiedene Substituenten R⁵ substituiert ist;

R¹ Wasserstoff oder (C₁-C₄)-Alkyl;

15 R² und R³ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl-, (C₁-C₄)-Alkyloxy, (C₁-C₄)-Alkyl-S(O)_m-, Amino, Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, (C₁-C₄)-Alkyloxycarbonyl, Aminocarbonyl und Aminosulfonyl, (C₃-C₇)-Cycloalkyl-C_wH_{2w}- und Oxy, wobei w aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist;

20 R⁵ (C₁-C₄)-Alkyl;

m aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist.

25 Eine weitere Ausführungsform betrifft Verbindungen der Formel I, worin ein oder mehrere Reste die folgenden Bedeutungen haben:

X -(CH₂)-O-, wobei -O- an die Gruppe Y gebunden ist;

30 Y Phenylen, wobei das Phenylen gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringkohlenstoffatomen durch gleiche oder verschiedene Substituenten R⁵ substituiert ist;

R¹ Wasserstoff;

R² und R³ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, Halogen;


5

R⁵ (C₁-C₄)-Alkyl.

Ebenso gilt auch in bezug auf alle hier offenbarten spezifischen Verbindungen, wie die Beispiolverbindungen, die Ausführungsformen der Erfindung repräsentieren, in denen die verschiedenen Gruppen und Zahlen in der allgemeinen Definition der Verbindungen der Formel I die in der jeweiligen spezifischen Verbindung vorliegenden spezifischen Bedeutungen besitzen, daß sie in einer beliebigen ihrer stereoisomeren Formen und/oder einer Mischung von stereoisomeren Formen in beliebigem Verhältnis und in Form ihrer physiologisch akzeptablen Salze und in Form der physiologisch akzeptablen Solvate derartiger Verbindungen oder derartiger Salze Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind. Unabhängig davon, ob eine spezifische Verbindung hier als freie Verbindung und/oder als spezifisches Salz offenbart wird, ist sie sowohl in Form der freien Verbindung als auch in Form aller ihrer physiologisch akzeptablen Salze und bei Offenbarung eines spezifischen Salzes zusätzlich in Form dieses spezifischen Salzes und in Form der physiologisch akzeptablen Solvate einer derartigen Verbindung oder derartiger Salze Gegenstand der Erfindung. Gegenstand der Erfindung ist somit auch eine Verbindung der Formel I, die aus einer oder mehreren der hier offenbarten spezifischen Verbindungen der Formel I einschließlich der nachstehend angeführten Beispiolverbindungen ausgewählt ist, und die physiologisch akzeptablen Salze davon und die physiologisch akzeptablen Solvate einer derartigen Verbindung oder derartiger Salze, wobei die Verbindung der Formel I in einer beliebigen ihrer stereoisomeren Formen oder als Mischung von stereoisomeren Formen in beliebigem Verhältnis, sofern anwendbar, Gegenstand der Erfindung ist. Als Beispiel genannt ist eine Verbindung der Formel I oder ein physiologisch akzeptables Solvat davon, z.B. {4-[6-(2-Fluorophenoxy)-oxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl]-2,6-dimethyl-phenoxy}-essigsäure.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I und ihrer Salze und Solvate, nach denen die Verbindungen erhältlich sind und die im Folgenden umrissen werden.

- 5 Bei einem Verfahren setzt man eine Verbindung der Formel II mit einer Verbindung der Formel III zu einer Verbindung der Formel I um,



- 10 worin die Gruppen X, Y, R¹, R² und R³ in den Verbindungen der Formeln II und III wie in den Verbindungen der Formel I definiert sind und zusätzlich funktionelle Gruppen in geschützter Form oder in Form einer Vorläufergruppe, die später in die endgültige Gruppe umgewandelt wird, vorliegen können. Die Gruppe L¹ in den Verbindungen der Formel II ist eine Abgangsgruppe, die in einer, ggf. katalysierten, nukleophilen
- 15 aromatischen Substitutionsreaktion ausgetauscht werden kann, wie ein Halogenatom, beispielsweise Fluor, Chlor oder Brom, oder eine Sulfongruppe, beispielsweise eine Gruppe der Formel -S(O)₂-Alk, worin Alk eine (C₁-C₄)-Alkylgruppe, beispielsweise Methyl oder Ethyl, ist.
- 20 Die Reaktion der Verbindungen der Formeln II und III ist eine, ggf. katalysierte, nukleophile aromatische Substitutionsreaktion an dem Kohlenstoffatom in der 6-Position des Oxazolo[4,5-c]pyridinrings, d.h. in der Pyridingruppierung, und kann unter Standardbedingungen für derartige Reaktionen, die dem Fachmann gut bekannt sind, durchgeführt werden. Die Reaktion kann auch in Gegenwart von Katalysatorsystemen,
- 25 z.B. Natriumtolylsulfonat oder Kupfer- oder Palladium-salzen oder -komplexen, durchgeführt werden. Im allgemeinen wird die Reaktion in einem inerten Lösungsmittel,

beispielsweise einem Kohlenwasserstoff oder chlorierten Kohlenwasserstoff wie Benzol, Toluol, Xylol, Chlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform oder Dichlorethan, einem Ether wie Tetrahydrofuran (THF), Dioxan, Dibutylether, Diisopropylether oder 1,2-Dimethoxyethan (DME), einem Keton wie Aceton oder Butan-2-on, einem Ester wie Essigsäureethylester oder Essigsäurebutylester, einem Nitril wie Acetonitril, einem Amin wie N,N-Dimethylformamid (DMF), N,N-Dimethylacetamid (DMA) oder N-Methylpyrrolidin-2-on (NMP) oder einer Lösungsmittelmischung bei Temperaturen von etwa 20°C bis etwa 250°C, beispielsweise bei Temperaturen von etwa 40°C bis etwa 200°C, je nach den Besonderheiten des jeweiligen Falls, durchgeführt. Im allgemeinen ist es

5 günstig, zur Erhöhung der Reaktivität eine Base zuzusetzen, beispielsweise ein tertiäres Amin, wie Triethylamin, Ethyldiisopropylamin oder N-Methylmorpholin, oder eine anorganische Base wie ein Erdalkalimetallhydrid, -hydroxid, -carbonat oder – hydrogencarbonat wie Natriumhydrid, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Cäsiumcarbonat oder Natriumhydrogencarbonat

15 oder ein Alkoxid oder Amid wie Natriummethoxid, Natriumethoxid, Kaliummethoxid, Kalium-tert.-butoxid, Natriumamid oder Lithiumdiisopropylamid. Eine Verbindung der Formel III kann auch vor der Reaktion mit der Verbindung der Formel II separat mit einer Base behandelt und in ein Salz umgewandelt werden. Wenn die Reaktion in Gegenwart eines Katalysatorsystems durchgeführt wird, können hierbei Katalysatoren

20 zu Einsatz kommen, die ein Metallion oder ein Metall in der Oxidationstufe 0 enthalten können, hierbei kommen bevorzugt Edelmetalle oder Edelmetallsalze zum Einsatz, hierunter wiederum bevorzugt sind Palladium und Kupfer. Die Katalyse erfordert häufig die Gegenwart bestimmter metall-komplexierender Liganden, die die Bildung einer katalytisch aktiven Spezies erst ermöglichen oder sie stabilisieren. Metall-Ligand-

25 Komplexe können der Reaktion zugegeben werden oder in situ gebildet werden. Beispielsweise können solche Katalysatorsysteme Kupfer oder Kupfer(i)salze, besonders Kupfer(I)halogenide oder Kupfer(I)carboxylate, insbesondere Kupfer(i)iodid oder Kupfer(I)thiophencarboxylat, oder auch vorgebildete Kupfer(I)-Komplexe, z.B. Tetrakis(aceotnitril)kupfer(I)hexafluorophosphat, allein oder in Gegenwart von Liganden,


30 z.B. Diaminliganden oder 1,10-Phenanthrolin, enthalten. Des weiteren können solche Katalysatorsysteme zum Beispiel aus Palladium-komplexen oder Palladiumsalzen in Gegenwart von Liganden, z.B. aus Palladium(0)komplexen, insbesondere

Tris(dibenzylidenaceton)dipalladium(O), oder Palladiumacetat, Palladiumtrifluoracetat oder Palladiumhalogeniden, insbesondere Palladiumchlorid, in Gegenwart von Liganden, insbesondere Diphosphinliganden wie z.B. 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1-1'-binaphthyl oder 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthen oder vorgebildeten Komplexen wie Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(O) bestehen oder gebildet werden. Des weiteren können auch einfache Katalysatoren zum Einsatz kommen, z. B. kann die nucleophile aromatische Substitution von 2-Pyridinhalogeniden, insbesondere -chloriden durch substituierte Alkali- oder Erdalkali-Benzolsulfinate, insbesondere durch Natriumtolylsulfinat, katalysiert werden.

10

Die Ausgangsverbindungen der Formeln II und III sind nach in der Literatur beschriebenen Verfahrensweisen oder in Anlehnung daran erhältlich und in vielen Fällen im Handel erhältlich. Die Verbindungen der Formel II sind beispielsweise durch Umsetzung eines 3-Amino-pyridinderivats der Formel IV mit einem aktivierten Carbonsäurederivat der Formel V zu einer Verbindung der Formel VI, Cyclisierung der letzteren Verbindung unter Bildung des Oxazolo[4,5-c]pyridinringsystems zu einer Verbindung der Formel VII, und Einführung der Gruppierung $R^1O-C(O)-X-$ in die Verbindung der Formel VII durch Umsetzung mit einer Verbindung der Formel VIII zu einer Verbindung der Formel IX, die in Abhängigkeit der Bedeutung von R' und L^1 schon eine Verbindung der Formel II sein kann, und gegebenenfalls Modifizieren der Gruppe R' in der Verbindung der Formel IX unter Erhalt von Verbindungen der Formel II, erhältlich.

20



- Die Gruppen X, Y und R¹ in den Verbindungen der Formeln II, V, VI, VII, VIII und IX sind wie in den Verbindungen der Formel I definiert, und zusätzlich können funktionelle
- 5 Gruppen in geschützter Form oder in Form einer Vorläufergruppe, die später in die endgültige Gruppe umgewandelt wird, vorliegen. Die Gruppe X^a in den Verbindungen der Formel VIII ist wie die Gruppe X in den Verbindungen der Formel I definiert oder umfaßt einen Teil der Gruppe X in der gewünschten Verbindung der Formel II, so daß nach der Umsetzung der Verbindungen der Formeln VII und VIII die Gruppe X^a und
- 10 jegliche in der Verbindung der Formel IX verbleibende Teile der Gruppen FG¹ und FG² zusammen die gewünschte Gruppe X bilden. So kann beispielsweise in dem Fall, daß die Gruppe X für eine Alkandiyloxygruppe steht, die Gruppe X^a in der Verbindung der Formel VIII die gewünschte Alkandiyloxygruppe sein und die Gruppe FG² kann ein an das Sauerstoffatom gebundenes Wasserstoffatom sein, oder die Gruppe X^a kann der
- 15 Alkandiynteil sein, die Gruppe FG² ist eine Abgangsgruppe, und die Gruppe FG¹ in der Verbindung der Formel VII ist eine Hydroxygruppe, deren Sauerstoffatom zusammen mit dem Alkandiynteil dann nach Alkylierung der Verbindung der Formel VII mit der Verbindung der Formel VIII die gewünschte Alkandiyloxygruppe bildet.

Die Gruppen FG^1 und FG^2 in den Verbindungen der Formeln V, VI, VII und VIII sind funktionelle Gruppen, die für den zur Bildung der gewünschten Gruppe X aus der Gruppe X^a und jeglichem in der Verbindung der Formel IX verbleibenden Teil der Gruppen FG^1 und FG^2 verwendeten Kupplungstyp geeignet sind. Beispielsweise kann es sich dann, wenn die Gruppe X^a über eine nukleophile Substitutionsreaktion an die Gruppe Y oder an ein Atom in der Gruppe FG^1 , wie ein Sauerstoffatom in einer Hydroxygruppe, die FG^1 repräsentiert, wie oben erwähnt, gebunden wird, bei FG^2 um eine Abgangsgruppe wie ein Halogenatom wie Chlor, Brom oder Iod oder eine Sulfonyloxygruppe wie Methansulfonyloxy, Trifluormethansulfonyloxy oder Toluolsulfonyloxy handeln. Im Allgemeinen liegt die Gruppe FG^1 an dem Kohlenstoffatom in der Phenylengruppe oder heterocyclischen Gruppe, die Y repräsentiert, die in den Verbindungen der Formeln IX, II und I die Gruppe X trägt, vor. Die Gruppe FG^1 in den Verbindungen der Formeln V, VI und VII kann auch in geschützter Form oder in Form einer Vorläufergruppe, die später in die Gruppe umgewandelt wird, die in der Verbindung der Formel VII mit der Verbindung der Formel VIII reagiert, vorliegen. So kann beispielsweise eine Hydroxygruppe, die in der Verbindung der Formel VII FG^1 repräsentiert, in den Verbindungen der Formeln V und VI in geschützter Form vorliegen, beispielsweise in Form einer veretherten Hydroxygruppe wie eines Benzylethers oder eines Alkylethers wie eines Methylethers. Derartige Ether können nach dem Fachmann gutbekannten Methoden gespalten werden. Eine Zusammenfassung von Methoden zur Abspaltung von Schutzgruppen findet sich in der Literatur, beispielsweise in P. J. Kocienski, *Protecting Groups* (Thieme Verlag, 1994), oder T. W. Greene und P. G. M. Wuts, *Protective Groups in Organic Synthesis* (John Wiley & Sons, 1999).

Die Gruppe L^1 in der Verbindung II ist wie oben beschrieben definiert.

Die Gruppe L^2 in den Verbindungen der Formel V ist eine nukleophil substituierbare Abgangsgruppe und kann insbesondere ein Halogenatom, wie Chlor oder Brom, sein, und die Verbindung der Formel V kann somit ein Carbonsäurehalogenid sein. L^2 kann

auch eine Gruppe der Formel $FG^1-Y-C(O)-O$ sein, und die Verbindung der Formel V kann somit beispielsweise ein Carbonsäureanhydrid sein.

Die Gruppe R' in den Verbindungen der Formeln IV, VI, VII und IX kann eine

5 Hydroxygruppe oder ein Halogenatom, wie Chlor oder Brom, sein.

Verbindungen, die bei der Synthese der Verbindungen der Formel I vorkommen, wie die Verbindung der Formel IV, können auch in einer anderen tautomeren Form vorliegen, beispielsweise in der Ketoform, wenn die Gruppen R' in der Verbindung der Formel IV

10 Hydroxygruppen sind. Verbindungen, die bei der Synthese der Verbindungen der Formel I vorkommen, einschließlich Ausgangsverbindungen, Zwischenprodukten und Produkten, können auch in Form eines Salzes eingesetzt bzw. erhalten werden.

Die Umsetzung der Verbindungen der Formeln IV und V kann unter

15 Standardbedingungen für die Acylierung eines Amins mit einem aktivierten Carbonsäurederivat wie einem Säurehalogenid oder -anhydrid durchgeführt werden. Im allgemeinen wird die Umsetzung in einem inerten Lösungsmittel, beispielsweise einem Kohlenwasserstoff oder chlorierten Kohlenwasserstoff wie Benzol, Toluol, Xylol, Chlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform oder Dichlorethan, einem Ether wie THF,

20 Dioxan, Dibutylether, Diisopropylether oder DME, einem Keton wie Aceton oder Butan-2-on, einem Ester wie Essigsäureethylester oder Essigsäurebutylester oder Wasser, oder einer Mischung von Lösungsmitteln, bei Temperaturen von etwa -10°C bis etwa 40°C , beispielsweise bei Temperaturen von etwa 0°C bis etwa 30°C durchgeführt. Im allgemeinen wird die Umsetzung unter Zugabe einer Base, beispielsweise eines

25 tertiären Amins, wie Triethylamin, Ethyldiisopropylamin oder N-Methylmorpholin oder einer anorganischen Base wie eines Alkalimetall-hydroxids, -carbonats oder -hydrogencarbonats wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat oder Natriumhydrogencarbonat durchgeführt. Die Umsetzung der Verbindungen der Formeln VI und VII wird im allgemeinen in einem inerten

30 Lösungsmittel, beispielsweise einem Alkohol, wie Methanol, Ethanol oder Isopropanol, oder einem Ether wie THF, Dioxan oder DME oder einer Mischung von Lösungsmitteln bei Temperaturen von etwa 20°C bis etwa 80°C , beispielsweise Temperaturen von

etwa 40°C bis etwa 80°C, in Gegenwart einer Base, beispielsweise eines Alkoxids wie Natriummethoxid, Natriumethoxid, Kaliummethoxid oder Kalium-tert.-butoxid, durchgeführt.


- 5 Wenn die Gruppe R' in der Verbindung der Formel VI für Hydroxy steht, kann die Cyclisierung der Verbindung der Formel VI zu der Verbindung der Formel VII günstigerweise in Gegenwart eines Halogenierungsmittels wie eines Phosphorhalogenids, wie Phosphorpentachlorid oder Phosphoroxidchlorid oder einer Mischung davon, in einem inerten Lösungsmittel, beispielsweise einem
- 10 Kohlenwasserstoff oder chlorierten Kohlenwasserstoff wie Benzol, Toluol, Xylol, Chlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform oder Dichlorethan, bei Temperaturen von etwa 20°C bis etwa 100°C, beispielsweise Temperaturen von etwa 50°C bis etwa 80°C, durchgeführt werden. Wenn die Gruppe R' in der Verbindung der Formel VI für Halogen wie Chlor steht, kann die Cyclisierung der Verbindung der Formel VI zu der Verbindung
- 15 der Formel VII thermisch durchgeführt werden, beispielsweise durch Erhitzen der Verbindung der Formel VI in einem inerten Lösungsmittel wie einem Kohlenwasserstoff oder chlorierten Kohlenwasserstoff, beispielsweise Toluol, Xylol oder Chlorbenzol oder einem Amid, beispielsweise DMF, DMA oder NMP, oder einem Nitril, beispielsweise Acetonitril, auf Temperaturen von etwa 100°C bis etwa 200°C, beispielsweise auf
- 20 Temperaturen von etwa 120°C bis etwa 180°C, gegebenenfalls unter Druck und gegebenenfalls in Gegenwart einer Base, wie eines tertiären Amins, beispielsweise Triethylamin, Ethyldiisopropylamin oder N-Methylmorpholin, oder einer anorganischen Base, beispielsweise eines Alkalimetallhydroxids, -carbonats oder -hydrogencarbonats wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid oder Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat oder
- 25 Natriumhydrogencarbonat. Die thermische Cyclisierung kann günstigerweise in einem Mikrowellenreaktor durchgeführt werden. Diese Cyclisierung kann auch in Gegenwart von Katalysatoren durchgeführt werden. Wenn die Reaktion in Gegenwart eines Katalysatorsystems durchgeführt wird, können hierbei Katalysatoren zum Einsatz kommen, die ein Metallion oder ein Metall in der Oxidationstufe 0 enthalten können,
- 30 hierbei kommen bevorzugt Edelmetalle oder Edelmetallsalze zum Einsatz, hierunter wiederum bevorzugt sind Palladium und Kupfer. Die Katalyse erfordert häufig die Gegenwart bestimmter metall-komplexierender Liganden, die die Bildung einer

- katalytisch aktiven Spezies erst ermöglichen oder sie stabilisieren. Metall-Ligand-Komplexe können der Reaktion zugegeben werden oder in situ gebildet werden. Beispielsweise können solche Katalyssatorsysteme Kupfer oder Kupfer(I)salze, besonders Kupfer(I)halogenide oder Kupfer(I)carboxylate, insbesondere Kupfer(I)iodid
5 oder Kupfer(I)thiophencarboxylat, oder auch vorgebildete Kupfer(I)-Komplexe, z.B. Tetrakis(acetonitril)kupfer(I)hexafluorophosphat, allein oder in Gegenwart von Liganden, z.B. Diaminliganden oder 1,10-Phenanthrolin, enthalten. Des Weiteren können solche Katalyssatorsysteme zum Beispiel aus Palladium-komplexen oder Palladiumsalzen in Gegenwart von Liganden, z.B. aus Palladium(0)komplexen, insbesondere
10 Tris(dibenzylidenaceton)dipalladium(O), oder Palladiumacetat, Palladiumtrifluoracetat oder Palladiumhalogeniden, insbesondere Palladiumchlorid, in Gegenwart von Liganden, insbesondere Diphosphinliganden wie z.B. 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl oder 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthen oder vorgebildeten Komplexen wie Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(O) bestehen oder gebildet werden. Des
15 weiteren können auch einfache Katalysatoren zum Einsatz kommen, z. B. kann die nucleophile aromatische Substitution von 2-Pyridinhalogeniden, insbesondere -chloriden durch substituierte Alkali- oder Erdalkali-Benzolsulfinate, insbesondere durch Natriumtolylsulfinat, katalysiert werden.
- 20 Die Kupplung von Verbindungen der Formel VIII mit Verbindungen der Formel VII kann durch Reaktionen verschiedener Typen durchgeführt werden, wie oben bereits angegeben, beispielsweise über eine Alkylierungsreaktion. So kann die Gruppe Y beispielsweise dann, wenn sie eine Hydroxygruppe, die FG¹ repräsentiert, trägt, unter Verwendung einer Verbindung der Formel VIII, in der FG² für eine für nukleophile
25 Substitutionsreaktionen geeignete Abgangsgruppe wie ein Halogenatom wie Chlor, Brom oder Iod oder eine Sulfonyloxygruppe wie Methansulfonyloxy oder Toluolsulfonyloxy steht, alkyliert werden. Die nukleophile Substitutionsreaktion an dem Kohlenstoffatom der Verbindung der Formel VIII, die die Gruppe FG² trägt, kann unter Standardbedingungen für derartige Reaktionen, die dem Fachmann gut bekannt sind,
30 durchgeführt werden. Im Allgemeinen wird die Umsetzung je nach den Besonderheiten des jeweiligen Falls in einem inerten Lösungsmittel, beispielsweise einem Kohlenwasserstoff oder chlorierten Kohlenwasserstoff wie Benzol, Toluol, Xylol,

Chlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform oder Dichlorethan, einem Ether wie THF, Dioxan, Dibutylether, Diisopropylether oder DME, einem Alkohol wie Methanol, Ethanol oder Isopropanol, einem Keton wie Aceton oder Butan-2-on, einem Ester wie Essigsäureethylester oder Essigsäurebutylester, einem Nitril wie Acetonitril, einem Amid wie N,N-Dimethylformamid oder N-Methylpyrrolidin-2-on, oder einer Mischung von Lösungsmitteln bei Temperaturen von etwa 20°C bis etwa 100°C, beispielsweise bei Temperaturen von etwa 40°C bis etwa 80°C durchgeführt. Im Allgemeinen ist es günstig, zur Erhöhung der Nukleophilie der Verbindung der Formel XIII und/oder zur Bindung einer Säure, die bei der Umsetzung freigesetzt wird, eine Base, beispielsweise ein tertiäres Amin, wie Triethylamin, Ethyldiisopropylamin oder N-Methylmorpholin, oder eine anorganische Base wie Alkalimetallhydrid, -hydroxid, -carbonat oder – hydrogencarbonat wie Natriumhydrid, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Cäsiumcarbonat oder Natriumhydrogencarbonat oder ein Alkoxid oder Amid wie Natriummethoxid, Natriumethoxid, Kaliummethoxid, Kalium-tert.-butoxid, Natriumamid oder Lithiumdiisopropylamid zuzusetzen. Eine Verbindung der Formel VII, worin FG^1 für Hydroxy steht, kann auch vor der Umsetzung mit der Verbindung der Formel VIII separat mit einer Base behandelt und in ein Salz umgewandelt werden. Eine Verbindung der Formel VII, worin FG^1 für Hydroxy steht, kann nicht nur durch Umsetzung mit einer Verbindung der Formel VIII, worin FG^2 für eine Abgangsgruppe wie angegeben steht, in eine Verbindung der Formel IX umgewandelt werden, sondern auch durch Umsetzung mit dem entsprechenden Alkohol, d.h. mit einer Verbindung der Formel VIII, worin FG^2 für Hydroxy steht, unter den Bedingungen der Mitsunobu-Reaktion in Gegenwart eines Azodicarboxylats wie Diethylazodicarboxylat oder Diisopropylazodicarboxylat und eines Phosphins wie Triphenylphosphin oder Tributylphosphin in einem inerten aprotischen Lösungsmittel, beispielsweise einem Ether wie THF oder Dioxan (s. O. Mitsunobu, Synthesis (1981), 1-28). Die Kupplung von Verbindungen der Formel VIII mit Verbindungen der Formel VII über eine übergangsmetallkatalysierte Reaktion kann auch unter den Bedingungen von palladiumkatalysierten Kreuzkupplungsreaktionen wie der Heck-, Stille- oder Suzuki-Kupplungsreaktion durchgeführt werden (siehe A. de Meijere und F. Diederich (Hrsg.), Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions (Wiley-VCH, 2004)).

Die Verbindung der Formel IX kann bereits eine Verbindung der Formel II sein und bei der Umsetzung mit der Verbindung der Formel III eingesetzt werden, wenn sie aus einer Verbindung der Formel VI, worin R' für Halogen, wie Chlor, steht, erhalten worden ist und das Halogenatom im Cyclisierungsprodukt im Verlauf der Synthese nicht ersetzt
5 worden ist, beispielsweise durch eine Hydroxygruppe während der Aufarbeitung, oder wenn sie aus einer Verbindung der Formel VI, worin R' für Hydroxy steht, erhalten worden ist und gleichzeitig mit der Cyclisierung die zweite Hydroxygruppe in der Verbindung der Formel VI bzw. VII halogeniert wird, also beispielsweise durch ein Chloratom ersetzt wird, wie es bei der Cyclisierung mit Hilfe eines Phosphorhalogenids
10 oder Phosphoroxyhalogenids vorkommen kann. Wenn in der Verbindung der Formel IX R' für eine Hydroxygruppe steht, kann eine Verbindung der Formel IX unter Standardbedingungen in eine Verbindung der Formel II überführt werden, in der L¹ für ein Halogenatom, wie z.B. für ein Chlor, steht, beispielsweise durch Behandlung mit einem Halogenierungsmittel wie einem Phosphorhalogenid oder einem Phosphoroxy-
15 halogenid. Je nach den Besonderheiten des speziellen Falls, wie der Reaktivität der spezifischen Verbindung der Formel III, die mit der Verbindung der Formel II umzusetzen ist, kann es auch vorteilhaft sein, die Gruppe R' in einer Verbindung der Formel IX zu modifizieren, selbst wenn es sich dabei bereits um eine Abgangsgruppe handelt. So kann man beispielsweise eine Verbindung der Formel IX, worin R' für
20 Halogen, wie z.B. Chlor, steht, durch Behandlung mit einer Alkansulfinsäure der Formel Alk-S(O)-OH, worin Alk für (C₁-C₄)-Alkyl steht, in eine Verbindung der Formel II, worin L¹ für die Gruppe -S(O)₂-Alk steht, umwandeln. Eine derartige Umwandlung wird im allgemeinen in Gegenwart einer Base, wie eines Alkalimetallhydrids, -hydroxids, -carbonats oder -hydrogencarbonats wie Natriumhydrid, Natriumhydroxid,
25 Kaliumhydroxid, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Cäsiumcarbonat oder Natriumhydrogencarbonat, in einem inerten Lösungsmittel, wie einem Kohlenwasserstoff wie Benzol, Toluol, Xylol oder Chlorbenzol, einem Ether wie THF, Dioxan, Dibutylether, Diisopropylether oder DME, einem Amid wie DMF oder NMP, oder einer Mischung von Lösungsmitteln bei Temperaturen von etwa 20°C bis etwa 250°C, beispielsweise bei
30 Temperaturen von etwa 80°C bis etwa 200°C, durchgeführt. Eine Alkansulfinsäure kann auch vor der Umsetzung mit der Verbindung der Formel IX separat mit einer Base behandelt und in ein Salz umgewandelt werden.

Man kann auch die Reihenfolge der Schritte bei der Herstellung der Verbindungen der Formel I ändern und beispielsweise eine Verbindung der Formel VIIa mit einer Verbindung der Formel III zu einer Verbindung der Formel X umsetzen, und das erhaltene Produkt X mit einer Verbindung der Formel VIII zu einer Verbindung der Formel I umsetzen,



worin die Gruppen X, Y, R^1 , R^2 und R^3 in den Verbindungen der Formeln III, VIIa, VIII und X wie in den Verbindungen der Formel I definiert sind und zusätzlich funktionelle Gruppen in geschützter Form oder in Form einer Vorläufergruppe, die später in die endgültige Gruppe umgewandelt wird, vorliegen können, worin die Gruppe R' für ein Halogen, wie z.B. Chlor oder Brom steht, und worin die Gruppen X^a , FG^1 und FG^2 in den Verbindungen der Formeln VIIa, VIII und X wie oben definiert sind.

Die obigen Ausführungen zur Umsetzung der Verbindung der Formeln II und III und die Umsetzung der Verbindungen der Formeln VII und VIII gelten entsprechend für entsprechende Reaktionsschritte bei einer derartigen Synthese der Verbindungen der Formel I.

Weitere Verbindungen der Formel I sind aus geeigneten, nach den oben beschriebenen Verfahren hergestellten Verbindungen durch Funktionalisierung oder Modifizierung von enthaltenen funktionellen Gruppen nach Standardverfahrensweisen erhältlich, beispielsweise durch Veresterung, Amidierung, Hydrolyse, Veretherung, Alkylierung, 5 Acylierung, Sulfonylierung, Reduktion, Oxidation, Umwandlung in Salze u.a. So kann beispielsweise eine Hydroxygruppe, die aus einer Ethergruppe durch Etherspaltung, beispielsweise mit Hilfe von Bortribromid, oder aus einer geschützten Hydroxygruppe durch Entschützung freigesetzt werden kann, zu einem Carbonsäureester oder einem Sulfonsäureester verestert oder verethert werden. Veretherungen von Hydroxygruppen 10 können günstigerweise durch Alkylierung mit der jeweiligen Halogenverbindung, beispielsweise einem Bromid oder Iodid, in Gegenwart einer Base, beispielsweise eines Alkalimetallcarbonats wie Kaliumcarbonat oder Cäsiumcarbonat, in einem inerten Lösungsmittel, beispielsweise einem Amid wie DMF oder NMP oder einem Keton wie Aceton oder Butan-2-on oder mit dem jeweiligen Alkohol unter den oben 15 angesprochenen Bedingungen der Mitsunobu-Reaktion durchgeführt werden. Eine Hydroxygruppe kann durch Behandlung mit einem Halogenierungsmittel in ein Halogenid umgewandelt werden. Ein Halogenatom kann in einer Substitutionsreaktion, bei der es sich auch um eine übergangsmetallkatalysierte Reaktion handeln kann, durch verschiedene Gruppen ersetzt werden. Eine Nitrogruppe kann zu einer 20 Aminogruppe reduziert werden, beispielsweise durch katalytische Hydrierung. Eine Aminogruppe kann unter Standardbedingungen für die Alkylierung, beispielsweise durch Umsetzung mit einer Halogenverbindung oder durch reduktive Aminierung einer Carbonylverbindung, oder für die Acylierung oder Sulfonylierung, beispielsweise durch Umsetzung mit einem reaktiven Carbonsäurederivat wie einem Säurechlorid oder 25 Anhydrid oder einem Sulfonsäurechlorid oder mit einer aktivierten Carbonsäure, die aus der Carbonsäure beispielsweise durch Behandlung mit einem Kupplungsmittel wie N,N'-Carbonyldiimidazol (CDI), einem Carbodiimid wie 1,3-Dicyclohexylcarbodiimid (DCC) oder 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-hydrochlorid (EDC), O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat (HATU), O- 30 (Cyano(ethoxycarbonyl)methylenamino)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat (TOTU) oder [(Benzotriazol-1-yloxy)dimethylaminomethylen]di-methylammoniumtetrafluoroborat (TBTU) erhältlich ist, modifiziert werden. Eine

Carbonsäureestergruppe kann unter sauren oder basischen Bedingungen zu einer Carbonsäure hydrolysiert werden. Eine Carbonsäuregruppe kann wie oben erwähnt aktiviert oder in ein reaktives Derivat umgewandelt und mit einem Alkohol oder einem Amin oder Ammoniak zu einem Ester oder Amid umgesetzt werden. Ein primäres Amid
5 kann zu einem Nitril dehydratisiert werden. Ein Schwefelatom, beispielsweise in einer Alkyl-S-Gruppe oder in einem heterocyclischen Ring, kann mit einem Peroxid wie Wasserstoffperoxid oder einer Persäure zu einer Sulfoxidgruppierung S(O) oder einer Sulfongruppierung S(O)₂ oxidiert werden. Eine Carbonsäuregruppe, eine Carbonsäureestergruppe und eine Ketongruppe können zu einem Alkohol reduziert
10 werden, beispielsweise mit Hilfe eines komplexen Hydrids wie Lithiumaluminiumhydrid, Lithiumborhydrid oder Natriumborhydrid. Eine Verbindung der Formel I oder ein Zwischenprodukt wie eine Verbindung der Formel II oder IX, die bzw. das eine Doppelbindung oder eine Dreifachbindung in der Gruppe X enthält, die über eine übergangsmetallkatalysierte Kupplungsreaktion leicht aus einer Verbindung der
15 Formel VIII mit einer Doppel- oder Dreifachbindung in der Gruppe X^a und einer Verbindung der Formel VII wie oben beschrieben erhältlich ist, kann durch Hydrierung in Gegenwart von Hydrierkatalysator wie einem Palladiumkatalysator in eine Verbindung überführt werden, in der X für eine gesättigte Gruppe steht.

20 Alle bei den oben beschriebenen Synthesen der Verbindungen der Formel I verwendeten Reaktionen sind dem Fachmann an sich gut bekannt und können unter Standardbedingungen gemäß oder in Analogie zu in der Literatur, beispielsweise in Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie (Methods of Organic Chemistry), Thieme-Verlag, Stuttgart, oder Organic Reactions, John Wiley & Sons, New York,
25 beschriebenen Verfahrensweisen durchgeführt werden. Falls gewünscht, können die erhaltenen Verbindungen der Formel I sowie etwaige Zwischenverbindungen nach herkömmlichen Reinigungsverfahrensweisen gereinigt werden, beispielsweise durch Umkristallisieren oder Chromatographie. Wie bereits erwähnt, können alle bei den oben beschriebenen Synthesen eingesetzten Ausgangsverbindungen und Zwischenprodukte,
30 die eine saure oder basische Gruppe enthalten, auch in Form von Salzen eingesetzt werden und alle Zwischenprodukte und entgültigen Zielverbindungen können auch in Form von Salzen erhalten werden. Wie ebenfalls oben erwähnt, kann es je nach den

Umständen des jeweiligen Falls zur Vermeidung eines unerwünschten Verlaufs einer Reaktion oder von Nebenreaktionen im Lauf der Synthese einer Verbindung im allgemeinen erforderlich oder vorteilhaft sein, funktionelle Gruppen durch die Einführung von Schutzgruppen zeitweilig zu blockieren und sie in einer späteren Stufe der

5 Synthese wieder zu entschützen oder funktionelle Gruppen in Form von Vorläufergruppen, die später in die gewünschten funktionellen Gruppen umgewandelt werden, einzuführen. Als Beispiele für Schutzgruppen seien Aminoschutzgruppen genannt, bei denen es sich um Acylgruppen oder Alkyloxycarbonylgruppen, beispielsweise eine tert.-Butyloxycarbonylgruppe (=Boc), die durch Behandlung mit

10 Trifluoressigsäure (=TFA) abgespalten werden kann, eine Benzyloxycarbonylgruppe, die durch katalytische Hydrierung abgespalten werden kann, oder eine Fluoren-9-ylmethoxycarbonylgruppe, die durch Behandlung mit Piperidin abgespalten werden kann, handeln kann, und Schutzgruppen von Carbonsäuregruppen, die als Estergruppen, wie tert.-Butylester, die durch Behandlung mit Trifluoressigsäure

15 entschützt werden können, oder Benzylester, die durch katalytische Hydrierung entschützt werden können, geschützt werden können. Als Beispiel für eine Vorläufergruppe sei die Nitrogruppe genannt, die durch Reduktion, beispielsweise durch katalytische Hydrierung, in eine Aminogruppe umgewandelt werden kann. Derartige Synthesestrategien und Schutzgruppen und Vorläufergruppen, die in einem bestimmten

20 Fall geeignet sind, sind dem Fachmann bekannt.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind die neuen Ausgangsverbindungen und Zwischenprodukte, die bei der Synthese der Verbindungen der Formel I vorkommen, einschließlich der Verbindungen der Formeln II, III, IV, V, VI,

25 VII, VIII, IX und X, worin X, X^a, Y, R¹, R², R³, R', FG¹, FG², L¹ und L² wie oben definiert sind, in einer beliebigen ihrer stereoisomeren Formen oder einer Mischung von stereoisomeren Formen in beliebigem Verhältnis und ihre Salze und Solvate derartiger Verbindungen oder derartiger Salze und ihre Verwendung als Zwischenprodukte. Die Erfindung schließt auch alle tautomeren Formen der Zwischenprodukte und

30 Ausgangsverbindungen ein. Alle oben bezüglich der Verbindungen der Formel I angegebenen Erklärungen und Ausführungsformen gelten entsprechend auch für die Zwischenprodukte und Ausgangsverbindungen. Gegenstand der Erfindung sind

insbesondere die hier offenbarten neuen spezifischen Ausgangsverbindungen und Zwischenprodukte. Unabhängig davon, ob sie als freie Verbindung und/oder als spezifisches Salz offenbart sind, sind sie sowohl in Form der freien Verbindungen als auch in Form ihrer Salze und im Fall der Offenbarung eines spezifischen Salzes

5 zusätzlich in Form dieses spezifischen Salzes und in Form von Solvaten derartiger Verbindungen oder derartiger Salze Gegenstand der Erfindung.

Die Verbindungen der Formel I, gegebenenfalls in Kombination mit anderen pharmakologisch wirksamen Verbindungen, können Tieren, vorzugsweise Säugetieren

10 einschließlich Menschen, als Pharmazeutika für sich alleine, in Mischungen miteinander oder in Form pharmazeutischer Zusammensetzungen verabreicht werden. Die Verabreichung kann oral, beispielsweise in Form von Tabletten, Filmtabletten, Dragees, Granulaten, Hart- und Weichgelatinekapselfn, Lösungen einschließlich wäßriger, alkoholischer und ölicher Lösungen, Säften, Tropfen, Sirupen, Emulsionen oder

15 Suspensionen, rektal, beispielsweise in Form von Suppositorien, oder parenteral, beispielsweise in Form von Lösungen zur subkutanen, intramuskulären oder intravenösen Injektion oder Infusion, insbesondere wäßrigen Lösungen, durchgeführt werden. Die Verbindungen der Formel I können des weiteren in Modi der lokalen Arzneistoffzufuhr verwendet werden, beispielsweise in beschichteten Stents zur

20 Verhinderung oder Verringerung der In-Stent-Restenose oder durch lokale Anwendung mit Hilfe eines Katheters. Die geeignete Verabreichungsform hängt u.a. von der zu behandelnden Erkrankung und ihrer Schwere ab.

Die Verabreichung der Verbindungen der Formel I, kann auch topisch erfolgen.

25 Geeignete pharmazeutische Zusammensetzungen für die topische Anwendung auf der Haut liegen als Salbe, Creme, Lotion, Paste, Gel, Hydrogel, Spray, Aerosol oder Öl vor. Als Träger können Vaseline, Lanolin, Polyethylenglykole, Alkohole und Kombinationen von zwei oder mehreren dieser Substanzen verwendet werden. Der Wirkstoff ist im allgemeinen in einer Konzentration von 0,0001 bis 15 Gew.-% der Zusammensetzung

30 vorhanden, beispielsweise von 0,0005 bis 2%.

In einer Ausführungsform liegt die topische Zubereitung als Gel vor.

In einer weiteren Ausführungsform liegt die topische Formulierung als Hydrogel vor.

Unter einem Hydrogel wird ein Wasser enthaltendes, aber wasserunlösliches Polymer, dessen Moleküle chemisch, z. B. durch kovalente oder ionische Bindungen, oder

- 5 physikalisch, z. B. durch Verschlaufen der Polymerketten, zu einem dreidimensionalen Netzwerk verknüpft sind verstanden. Durch eingebaute hydrophile Polymerkomponenten quellen sie in Wasser unter beträchtlicher Volumenzunahme, ohne aber ihren stofflichen Zusammenhalt zu verlieren. Ein Hydrogel besteht beispielsweise aus einem hydrophilen Lösungsmittel (z.B. Wasser), einem
- 10 Feuchthaltemittel (z.B. Glycerol) und einem Gelbildner (z.B. Croscarmellose-Natrium).

Die folgenden Beispiele zeigen geeignete Gelzubereitungen:

Zubereitungsbeispiel 1

15

Verbindung aus Beispiel 1	0.0004%
Glycerol 85%	10%
Methylparaben	0.2%
Propylparaben	0.03%
20 Croscarmellose-Natrium	4%
HCl / NaOH	qs (zum Einstellen auf pH 7.5)
Wasser	ad 100%

Zubereitungsbeispiel 2

25

Verbindung aus Beispiel 1	0.04%
Glycerol 85%	10%
Methylparaben	0.2%
Propylparaben	0.03%
30 Croscarmellose-Natrium	4%
HCl / NaOH	qs (zum Einstellen auf pH 7.5)

Wasser ad 100%

5 Zubereitungsbeispiel 3

	Verbindung aus Beispiel 1	0.0004%
	PEG400	10%
	Methylparaben	0.2%
10	Propylparaben	0.03%
	Croscarmellose-Natrium	4%
	HCl / NaOH	qs (zum Einstellen auf pH 7.5)
	Wasser	ad 100%

15 Zubereitungsbeispiel 4

	Verbindung aus Beispiel 1	0.04%
	PEG400	10%
	Methylparaben	0.2%
20	Propylparaben	0.03%
	Croscarmellose-Natrium	4%
	HCl / NaOH	qs (zum Einstellen auf pH 7.5)
	Wasser	ad 100%

25 Die Hydrogele sind Zubereitung zur dermalen Anwendung. Die Hydrogele können auf offene Wundareale aufgetragen werden. Die Hydrogele enthalten den Arzneistoff in gelöster Form, wodurch eine schnelle Haut- und Gewebepetration gewährleistet ist. Durch einen aseptischen Herstellprozess wird gewährleistet, dass durch die Applikation des Arzneimittels keine zusätzlichen mikrobiologischen Verunreinigungen in die Wunde

30 gelangen. In einer Ausführungsform werden zusätzlich in das Hydrogel Konservierungsmittel (Methyl- und Propylparabene) eingearbeitet, um die Keimbelastung gering zu halten.

In einer Ausführungsform enthält das Hydrogel die Verbindungen der Formel I, in Konzentrationen von 0.04 – 0.0004% (m/m).

- 5 Das aseptische Hydrogel wird in geeigneten sterilen Behältern gelagert. In einer Ausführungsform wird das Hydrogel in sterilen Behältern aus Polypropylen gelagert.

Die Menge einer Verbindung der Formel I und/oder ihrer physiologisch akzeptablen Salze und/oder Solvate in den pharmazeutischen Zusammensetzungen liegt
10 normalerweise im Bereich von etwa 0,2 bis etwa 800 mg, beispielsweise von etwa 0,5 bis etwa 500 mg, beispielsweise von etwa 1 bis etwa 200 mg, pro Einheitsdosis, kann aber je nach Art der pharmazeutischen Zusammensetzung auch höher sein. Die pharmazeutischen Zusammensetzungen enthalten in der Regel etwa 0,5 bis etwa
15 90 Gew.-% der Verbindung der Formel I und/oder ihrer physiologisch akzeptablen Salze und/oder Solvate. Die pharmazeutischen Zusammensetzungen können auf an sich bekannte Art und Weise hergestellt werden. Hierzu bringt man eine oder mehrere Verbindungen der Formel I und/oder ihre physiologisch akzeptablen Salze und/oder Solvate zusammen mit einer oder mehreren festen oder flüssigen pharmazeutischen Trägersubstanzen oder Vehikeln und/oder Additiven oder Hilfssubstanzen und dann,
20 wenn ein Kombinationsmedikament gewünscht ist, anderen pharmakologisch wirksamen Verbindungen mit therapeutischer oder prophylaktischer Wirkung in eine für die Verabreichung und Dosierung geeignete Form, die dann in der Human- oder Tiermedizin verwendet werden kann. Als Trägersubstanzen und Additive können geeignete organische und anorganische Substanzen verwendet werden, die mit den
25 Verbindungen der Formel I oder ihren physiologisch akzeptablen Salzen oder Solvaten nicht in unerwünschter Weise reagieren. Als Beispiele für Additivtypen, die in den pharmazeutischen Zusammensetzungen und Medikamenten enthalten sein können, seien Gleitmittel, Konservierungsstoffe, Verdicker, Stabilisatoren, Sprengmittel, Netzmittel, Mittel zur Erzielung eines Depoteffekts, Emulgatoren, Salze, beispielsweise
30 zur Beeinflussung des osmotischen Drucks, Puffersubstanzen, Farbmittel, Geschmacksstoffe und aromatische Substanzen genannt. Beispiele für Trägersubstanzen und Additive sind Wasser, physiologische Natriumchloridlösung,

Pflanzenöle, Wachse, Alkohole wie Ethanol, Isopropanol, 1,2-Propandiol, Benzylalkohole oder Glycerin, Polyole, Mannit, Polyethylenglykole, Polypropylenglykole, Glycerintriacetat, Polyvinylpyrrolidon, Gelatine, Cellulose, Kohlenhydrate wie Lactose, Glucose, Saccharose oder Stärke wie Maisstärke, Stearinsäure und Stearinsäuresalze wie Magnesiumstearat, Talk, Lanolin, Vaseline oder Mischungen davon, beispielsweise Mischungen von Wasser mit einem oder mehreren organischen Lösungsmitteln wie Mischungen von Wasser mit Alkoholen. Man kann die Verbindungen der Formel I und ihre physiologisch akzeptablen Salze und Solvate auch lyophilisieren und die erhaltenen Lyophilisate beispielsweise zur Herstellung von

Injektionszusammensetzungen verwenden.

Die Dosierung einer zu verabreichenden Verbindung der Formel I und/oder eines physiologisch akzeptablen Salzes und/oder Solvats davon hängt vom Einzelfall ab und ist wie üblich zur Erzielung einer optimalen Wirkung vom Arzt nach den üblichen Regeln und Verfahrensweisen den individuellen Gegebenheiten anzupassen. So hängt sie

beispielsweise ab von der Art und Schwere der zu behandelnden Störung, von Geschlecht, Alter, Gewicht und individueller Ansprechbarkeit des zu behandelnden Menschen oder Tiers, von der Effizienz und Wirkdauer der verwendeten Verbindung, davon, ob die Behandlung für die Therapie einer akuten oder chronischen Erkrankung oder prophylaktisch ist, oder davon, ob neben einer Verbindung der Formel I weitere Wirkstoffe verabreicht werden. Im allgemeinen ist eine Tagesdosis von beispielsweise etwa 0,01 mg/kg bis etwa 100 mg/kg oder von etwa 0,1 mg/kg bis etwa 10 mg/kg oder von etwa 0,3 mg/kg bis etwa 5 mg/kg (jeweils mg pro kg Körpergewicht) zur

Verabreichung an einen 75 kg schweren Erwachsenen zur Erzielung der gewünschten Ergebnisse angemessen. Die Tagesdosis kann dabei als Einzeldosis verabreicht oder, insbesondere bei Verabreichung größerer Mengen, in mehrere, beispielsweise zwei, drei oder vier, Einzeldosen aufgeteilt werden. Die Verabreichung kann auch kontinuierlich durchgeführt werden, beispielsweise durch kontinuierliche Infusion oder Injektion. Im Einzelfall kann es je nach dem individuellen Verhalten erforderlich sein, von den angegebenen Dosierungen nach oben oder nach unten abzuweichen.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung.

Wenn Beispielsverbindungen mit einer basischen Gruppe durch präparative Hochdruck-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) an Umkehrphasen-Säulenmaterial (RP-Säulenmaterial) gereinigt wurden und es sich bei dem Elutionsmittel wie üblich um eine Gradientenmischung von Wasser und Acetonitril mit Trifluoressigsäure (TFA) handelte, wurden sie je nach den Einzelheiten der Aufarbeitung wie Verdampfungs- oder Lyophilisierungsbedingungen zum Teil in Form ihres Säureadditionssalzes mit Trifluoressigsäure erhalten. In den Namen der Beispielsverbindungen und ihren Strukturformeln ist jegliche derartige enthaltene Trifluoressigsäure nicht angegeben.

Die hergestellten Verbindungen wurden im allgemeinen durch spektroskopische Daten und chromatografische Daten, insbesondere Massenspektrum (MS) und HPLC-Retentionszeiten (R_t ; in min), die durch kombinierte analytische HPLC/MS-Charakterisierung (LC/MS) erhalten wurden, und/oder NMR-Spektren (NMR=kernmagnetische Resonanz), charakterisiert. Bei der NMR-Charakterisierung sind die chemische Verschiebung δ (in ppm), die Zahl der Wasserstoffatome und die Multiplizität (s = Singulett, d = Dublett, dd = doppeltes Dublett, t = Triplett, dt = doppeltes Triplett, q = Quartett, m = Multiplett; br = breit) der Signale angegeben. Bei der MS-Charakterisierung ist im allgemeinen die Massenzahl (m/z) des Peaks des Molekülions M, z.B. M^+ , oder eines verwandten Ions wie des Ions $M+1$, z.B. $[M+1]^+$, d.h. des protonierten Molekülions $[M+H]^+$, das je nach der verwendeten Ionisierungsmethode gebildet wurde, angegeben. Bei der Ionisierungsmethode handelte es sich im allgemeinen um Elektrospray-Ionisierung (ESI). Es wurden die folgenden LC/MS-Bedingungen verwendet.

Methode LC1

Säule: Phenomenex, 4 μ M, 10 x 2 mm, 1,7 μ m; Durchfluß: 1,1 ml/min; Elutionsmittel A: Wasser + 0,05% Trifluoressigsäure; Elutionsmittel B: Acetonitril; Gradient: von 93% A + 7% B bis 5% A + 95% B in 1,2 min, dann 5% A + 95% B für 0,2 min; MS-Ionisationsmethode: ESI⁺

Methode LC2

Säule: UPLC BEH C18, 50 x 2,1 mm, 1,7 μ m; Durchfluß: 0,9 ml/min; Elutionsmittel A: Wasser + 0,1 % Ameisensäure; Elutionsmittel B: Acetonitril + 0,08% Ameisensäure; Gradient: von 95% A + 5% B bis 5% A + 95% B in 1,1 min, dann 5% A + 95% B für 0,6 min; MS-Ionisationsmethode: ESI⁺

5


Methode LC3

Säule: UPLC BEH C18, 50 x 2,1 mm, 1,7 μ m; Durchfluß: 0,9 ml/min; Elutionsmittel A: Wasser + 0,05% Ameisensäure; Elutionsmittel B: Acetonitril + 0,035 % Ameisensäure; Gradient: von 95% A + 5% B bis 5% A + 95% B in 1,1 min, dann 5% A + 95% B für 0,6 min; MS-Ionisationsmethode: ESI⁺


10

Beispiel 1

{4-[6-(2-Fluoro-phenoxy)-oxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl]-2,6-dimethyl-phenoxy}-essigsäure



15 (a) N-(4,6-Dichloro-pyridin-3-yl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-benzamid




Zu einer Lösung von 0,82 g 4,6-Dichlor-pyridin-3-yl-amin in 8 ml trockenem Dichlormethan wurde unter Eiskühlung zunächst 1,20 g 4-Methoxy-3,5-dimethyl-benzoylchlorid, gelöst in 1 ml trockenem Dichlormethan zugetropft. Anschließend wurde eine Lösung von 0,4 ml absolutiertem Pyridin in 1 ml trockenem Dichlormethan zugegeben und die Reaktion für 2 h bei 0 °C gerührt, wobei das Produkt z.T. langsam ausfiel. Zur dieser Mischung wurden dann ca. 10 ml 10 %ige wässrige Natriumhydrogensulfatlösung gegeben und fünf Minuten lang gerührt. Anschließend wurde die wässrige Phase abdekantiert und die Feststoff enthaltende organische Phase im Vakuum

20

eingengt und gefriergetrocknet. Man erhielt 1,63 g (100 %) des Produktes, das ohne weitere Aufreinigung im nächsten Schritt eingesetzt wurde.

LC/MS (Methode LC1): $R_t = 0,92$ min; $m/z = 325,05$ $[M+H]^+$


5 (b) 6-Chlor-2-(4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl)-oxazolo[4,5-c]pyridin



In einem Mikrowellengefäß wurden 0,98 g N-(4,6-Dichloro-pyridin-3-yl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-benzamid in 15 ml trockenem Tetrahydrofuran gelöst und mit 29 mg Kupfer(I)iodid, 54 mg 1,10-Phenanthrolin und 1,47 g Cäsiumcarbonat versetzt. Das Reaktionsgemisch wurde dann in einem Mikrowellensynthesizer für 3 h auf 180 °C erhitzt. Zur Aufarbeitung wurde die Mischung auf 12 ml einer 0,5 M wässrigen Salzsäurelösung gegeben. Der ausgefallene Feststoff wurde abgesaugt und die Mutterlauge wurde zweimal mit Ethylacetat extrahiert. Die gesammelten organischen Phasen wurden mit dem abgesaugten Feststoff vereinigt und das Lösungsmittel wurde im Vakuum entfernt. Man erhielt 0,79 g (91 %) des Produktes, das ohne weitere Aufreinigung weiter umgesetzt wurde.

LC/MS (Methode LC1): $R_t = 1,04$ min; $m/z = 289,05$ $[M+H]^+$

(c) 6-(2-Fluoro-phenoxy)-2-(4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl)-oxazolo[4,5-c]pyridin




In einem Mikrowellengefäß wurden 0,65 g 6-Chlor-2-(4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl)-oxazolo[4,5-c]pyridin in 12 ml absolutiertem N,N-Dimethylformamid gelöst und mit 0,25 g 2-Fluorphenol, 0,88 g Cäsiumcarbonat, 21 mg Kupfer(I)iodid und 40 mg 1,10-Phenanthrolin versetzt. Die Reaktion wurde in einem Mikrowellenreaktor für 1 h auf 200 °C erhitzt. Zur Aufarbeitung wurde die Mischung auf gesättigte wässrige Natrium-

hydrogencarbonatlösung gegeben und dreimal mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden mit gesättigter wässriger Natriumhydrogensulfatlösung gewaschen, über Natriumsulphat getrocknet, filtriert und eingeengt. Das Rohprodukt wurde mittels präparativer HPLC gereinigt und man erhielt 86 mg (10%) des Produkts.

LC/MS (Methode LC2): $R_t = 1,46$ min; $m/z = 365,13$ $[M+H]^+$

(d) 4-[6-(2-Fluoro-phenoxy)-oxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl]-2,6-dimethyl-phenol




- 10 Eine Lösung von 60 mg 6-(2-Fluoro-phenoxy)-2-(4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl)-oxazolo[4,5-c]pyridin in 2 ml Dichlormethan wurde auf 0°C abgekühlt und über einen Zeitraum von 10 min mit 0,4 ml einer 1 M Lösung von Bortribromid in Dichlormethan versetzt. Die Mischung wurde 1 h bei 0°C gerührt und dann mit weiteren 0,2 ml einer 1 M Lösung von Bortribromid in Dichlormethan versetzt. Die Reaktion rührte dann 16 h bei Raumtemperatur. Zur Aufarbeitung wurde die Reaktionsmischung langsam mit gesättigter wässriger Natriumhydrogencarbonatlösung versetzt. Der Niederschlag wurde abfiltriert, mit Wasser gewaschen und im Vakuum getrocknet. Man erhielt 41 mg (71 %) der Titelverbindung.

LC/MS (Methode LC2): $R_t = 1,35$ min; $m/z = 351,13$ $[M+H]^+$

20


(e) {4-[6-(2-Fluoro-phenoxy)-oxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl]-2,6-dimethyl-phenoxy}-essigsäure tert-butyl ester



Eine Lösung von 70 mg 4-[6-(2-Fluoro-phenoxy)-oxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl]-2,6-dimethyl-phenol in 1 ml Dimethylformamid wurde mit 110 mg Kaliumcarbonat versetzt, und dann wurden 51 mg Bromessigsäure-tert.-butylester zugegeben. Die Mischung wurde 16 h bei Raumtemperatur gerührt. Dann wurde Reaktionsansatz auf Wasser gegeben und zweimal mit Ethylacetat extrahiert. Die gesammelten organischen Phasen wurden getrocknet und eingeeengt. Man erhielt 93 mg (100 %) der Titelverbindung, die ohne weitere Aufreinigung weiter umgesetzt wurde.

LC/MS (Methode LC2): $R_t = 1,48$ min; $m/z = 465,20$ $[M+H]^+$

- 10 (f) {4-[6-(2-Fluoro-phenoxy)-oxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl]-2,6-dimethyl-phenoxy}-essigsäure



Eine Lösung von 90 mg {4-[6-(2-Fluoro-phenoxy)-oxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl]-2,6-dimethyl-phenoxy}-essigsäure tert-butyl ester in 2 ml Dichlormethan wurde mit 0,8 ml Trifluoressigsäure versetzt und 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Dann wurde der Ansatz im Vakuum eingeeengt und gefriergetrocknet. Man erhielt 101 mg (100%) der Titelverbindung.

LC/MS (Methode LC3): $R_t = 1,17$ min; $m/z = 409,18$ $[M+H]^+$

Bestimmung der pharmakologischen Wirkung

A) GTP- γ -S-Assay mit humanen Edg-1-Rezeptoren

5

Zur Bestimmung der Edg-1-Rezeptor-Aktivierung durch die erfindungsgemäßen Verbindungen wurde ein GTP- γ -S-Assay (GTP- γ -S = Guanosin-5'-[thio]triphosphat) auf die Bindung an G-Protein gekoppeltem Rezeptor auf Basis des Szintillationsproximitätsassay-Prinzips verwendet, wobei ein Zellmembranpräparat einer
10 CHO-Flp-In-Zelllinie, die den humanen Edg-1-Rezeptor konstitutiv überexprimiert, eingesetzt wurde.

(a) Erzeugung der Zelllinie

Das Flp-InTM-Expressionssystem (Invitrogen, Kat.-Nr. K6010-01) erlaubt die Erzeugung
15 von stabilen Säugetierzelllinien, in die das interessierende Gen durch homologe Rekombination an einem spezifischen Genomort, der als FRT-Ort (FRT = Flp Recombination Target) bezeichnet wird, mit Hilfe einer durch das pOG44-Expressionsplasmid codierten Flp-Rekombinase integriert worden ist. Die Integration des pcDNA5/FRT-Expressionskonstrukts in das Flp-In-Wirtszellliniengenom führt zur
20 Transkription des interessierenden Gens. Die stabil transfizierten Zellen werden hygromycinresistent.

Einen Tag vor der Transfektion wurden 200 000 Flp-In-CHO-Zellen in Ham-F-12-Medium (Invitrogen, Kat.-Nr. 31765) mit 10% fötalem Kälberserum (FCS; Perbio
25 Science, Kat.-Nr. SH30068.03) in einer Platte mit 6 Vertiefungen ausgesät und über Nacht bei 37°C/5 % CO₂ inkubiert. Unter Verwendung von FuGENE[®]-6-Transfektionsreagens (Roche, Kat.-Nr. 11988387001) wurden Zellen mit dem Flp-Rekombinase-Expressionsplasmid pOG44 und einem modifizierten Plasmid, das zusätzlich das edg-1-Gen (Zugangsnummer NM_001400) enthält und als pcDNA5-FRT-
30 TO_nFLAG_DEST-EDG-1 bezeichnet wird, mit einem Verhältnis von 9:1 kotransfiziert. Zum Erhalt des modifizierten pcDNA5-FRT-TO_nFLAG_DEST-Plasmids wurde das Invitrogen-Plasmid pcDNA5/FRT/TO (Invitrogen, Kat.-Nr. V6520-20) durch Insertierung

einer Gateway-Kassette mit ein ccdB-Gen und ein Chloramphenicolresistenzgen flankierenden attR-Rekombinationsstellen (Gateway Conversion System, Invitrogen, Kat.-Nr. 11828-029) auf das Gateway®-Kloniersystem (Invitrogen) angepasst. Außerdem wurde vor der 5'-att-Rekombinationsstelle ein FLAG-Tag-Epitop hinzugefügt, um eine rekombinante Expression von Proteinen mit N-terminalem FLAG-Tag zu ermöglichen.

Für die Transfektion einer Vertiefung wurden 1,08 µg pOG44 und 0,12 µg pcDNA5-FRT-TO_nFLAG_DEST-EDG-1 mit 100 µl serumfreiem Ham-F-12-Medium mit 6 µl FuGENE®-6-Transfektionsreagens gemischt. Nach 20 min Inkubation wurde der Transfektionsreagens/DNA-Komplex tropfenweise auf den Zellen verteilt. Die Zellen wurden 24 h bei 37°C inkubiert. Dann wurden die Zellen aus drei Vertiefungen in eine T75-Flasche (Greiner Cellstar®, Kat.-Nr. 658175) mit Ham-F-12-Medium mit 10% FCS, aber ohne Antibiotikum, überführt und noch 24 h inkubiert. 48 h nach der Transfektion wurde das Medium durch Selektionsmedium (Ham F-12 mit 10 % FCS und 300 µg/ml Hygromycin B (Invitrogen, Kat.-Nr. 10687-010)) ersetzt. Das Medium wurde alle 2 bis 3 Tage ausgetauscht, bis eine resistente Population von Zellen herangewachsen war. Zellen wurden mehrmals aufgeteilt und in eine neue Flasche ausgesät, so daß die Zellen nicht mehr als 25% Konfluenz erreichten. Nach 2 Wochen Selektion wurden die Zellen in T175-Flaschen (Greiner Cellstar®, Kat.-Nr. 660175) überführt und für die Batchproduktion kultiviert. Die Zellen wurden durch kurze Behandlung (2 bis 5 min) mit Accutase (PAA, Kat.-Nr. L11-007) aus den Kulturflaschen geerntet, in Selektionsmedium (siehe oben) resuspendiert und 5 min bei 200 x g zentrifugiert. Die Zellen wurden in einer Mischung von 90% FCS und 10% Dimethylsulfoxid resuspendiert und in flüssigem Stickstoff gefroren gelagert.

(b) Membranpräparat

Aus der obenbeschriebenen CHO-Flp-In-Zelllinie, die den humanen Edg-1-Rezeptor konstitutiv überexprimiert, wurde nach Standardmethoden ein Membranpräparat erhalten. Kurz gesagt, wurden die kryokonservierten Zellen in Kultur genommen und in T175-Zellkulturflaschen (Becton Dickinson, Kat.-Nr. 35 5001) bis zur Konfluenz angezogen. Die Zellkultur wurde durch Waschen mit calciumfreier phosphatgepufferter

Kochsalzlösung (PBS; Gibco, Kat.-Nr. 14190) gestoppt, und die Zellen wurden mit einem Gummischaber in 4°C kaltem und calciumfreiem PBS mit einem Proteaseinhibitorcocktail (Complete Protease Inhibitor; Roche, Kat.-Nr. 1697498; 1 Tablette pro 50 ml) geerntet und danach bei 4°C 15 min bei 1100 x g zentrifugiert (Heraeus Minifuge T). Zur Zelllyse wurde das Pellett in 4°C kaltem hypotonischem Puffer aus 5 mM HEPES (Sigma-Aldrich, Kat.-Nr. H-0981), 1 mM EDTA (Dinatriumsalz; Merck, Kat.-Nr. 8418) mit Proteaseinhibitorcocktail (wie oben) resuspendiert, in dem die Zellen noch 15 min auf Eis gelagert wurden. Nach der Lyse wurden die Zellen bei 4°C 10 min bei 400 x g zentrifugiert (Heraeus Minifuge T). Das Pellet wurde in einem Dounce-Homogenisator auseinandergebrochen, mit dem Überstand der vorhergehenden Zentrifugation verdünnt und danach bei 4°C 10 min bei 500 x g zentrifugiert (Heraeus Minifuge T), um Nuklei und noch intakte Zellen von den hauptsächlich im Überstand vorliegenden Membranen abzutrennen. Der Überstand wurde dann in hypotonischem Puffer verdünnt und bei 4°C bei ungefähr 18600 x g 2 h zentrifugiert (Beckmann, Avanti J251). Danach wurde das Membranpellet in einem Lagerpuffer aus 20 mM HEPES; 150 mM NaCl (Merck, Kat.-Nr. 6400), 1 mM EDTA (wie oben) mit Proteaseinhibitorcocktail (wie oben) resuspendiert. Das Membranpräparat wurde aliquotiert und bei -80°C gelagert. Die Proteinkonzentration des Membranpräparats wurde in einer Probe mit Hilfe eines kommerziellen Proteinassays (Bio-Rad, DC Protein Assay, Kat.-Nr. 500-0113, 500-0114, 500-0115) bestimmt.

(c) GTP- γ -S-Assay

Das in (b) erhaltene Edg-1-Membranpräparat wurde in einem kommerziell erhältlichen Szintillationsproximitätsassay-Kit (SPA-Kit) auf die Bindung am G-Protein-gekoppelten Rezeptor von Amersham Biosciences/GE Healthcare (Code RPNQ0210) eingesetzt, indem die ligandeninduzierte Bindung von ³⁵S-radiomarkiertem GTP- γ -S an die rezeptorhaltige Membran, die an Szintillationsperlen gebunden ist, die Emission von Licht induziert und die Quantifizierung der in-vitro-Wirkung der Edg-1-agonistischen Verbindung erlaubt. Der Assay wurde auf einer Platte mit 96 Vertiefungen weitgehend nach den Anweisungen des Herstellers durchgeführt. Vor dem Beginn der Experimente wurden Szintillationsperlen in einem Rekonstitutionspuffer aus Tris-HCl (pH 7,4) mit 0,1% (w/v) Natriumazid suspendiert und dann auf Eis mit Assaypuffer (aus 20 mM

HEPES, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA (wie oben), 1 mM Dithiothreitol (DTT), auf pH 7,4 eingestellt) auf eine Perlenendkonzentration von 30 mg/ml verdünnt.

Die Vertiefungen wurden mit 10 µl des angegebenen Assaypuffers, 10 µl 100 µM
5 Guanosindiphosphat-Lösung (GDP-Lösung) und 10 µl einer Lösung der Testverbindung
in Assaypuffer/Dimethylsulfoxid versetzt, was eine Endkonzentration der
Testverbindung von 10 µM ergibt. Anstelle der Lösung der Testverbindung wurden für
die hohen Kontrollen 10 µl einer Lösung von Sphingosin-1-phosphat (S1P; Sigma, Kat.-
Nr. S-9666), was eine S1P-Endkonzentration von 10 µM ergab, und für die niedrigen
10 Kontrollen 10 µl Assaypuffer in die jeweiligen Vertiefungen gegeben. Alle Vertiefungen
enthielten äquivalente Mengen von Dimethylsulfoxid. Dann wurden in jede Vertiefung
10 µl einer [³⁵S]GTP-γ-S-Lösung (4 nM) und das in (b) erhaltene Edg-1-
Membranpräparat (15 µg Membranprotein in 100 µl Assaypuffer) gegeben. Nach
Inkubation der Platten bei Raumtemperatur über einen Zeitraum von 5 min wurden 50
15 µl der angegebenen Szintillationsperlensuspension (30 mg/ml) zugegeben. Nach einem
weiteren Inkubationszeitraum von 45 min bei Raumtemperatur wurden die Platten 10
min bei 500 x g zentrifugiert. Die Quantifizierung der [³⁵S]GTP-γ-S-Bindung und somit
der Rezeptoraktivierung wurde mit Hilfe eines Beta-Zählers (MicroBeta, Wallac) über
einen Zeitraum von 1 min gemessen. Die Werte wurden durch Subtraktion der
20 jeweiligen niedrigen Kontrolle hintergrundkorrigiert. Alle Messungen wurden dreifach
durchgeführt. Die Rezeptoraktivierung durch die Testverbindung wird in % der
jeweiligen hohen Kontrolle (10 µM S1P; wird als 100% Aktivierung erachtet)
ausgedrückt. Die mit der Beispielverbindung 1 bei 10 µM beobachtete Aktivierung
betrug 86%.


25

Aus den Messdaten ist ersichtlich, dass die Verbindungen gut zur Wundheilung und
insbesondere zur Behandlung von Wundheilungsstörungen von Diabetes Patienten
geeignet sind.

30

Patentansprüche

1. Verbindung der Formel I in einer beliebigen ihrer stereoisomeren Formen oder einer Mischung von stereoisomeren Formen in beliebigem Verhältnis oder physiologisch
 5 akzeptables Salz davon oder physiologisch akzeptables Solvat einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes,



10 worin

X ausgewählt ist aus (C₁-C₆)-Alkandiyl, (C₂-C₆)-Alkendiyl, (C₂-C₆)-Alkindiyl, (C₃-C₇)-Cycloalkandiyl, (C₁-C₆)-Alkandiyloxy und (C₃-C₇)-Cycloalkandiyloxy, die alle
 gegebenenfalls durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten
 15 substituiert sind, die aus Fluor und Hydroxy ausgewählt sind, wobei das Sauerstoffatom der (C₁-C₆)-Alkandiyloxy- und (C₃-C₇)-Cycloalkandiyloxygruppen an die Gruppe Y gebunden ist;

Y ausgewählt ist aus Phenylen und einem zweiwertigen Rest eines aromatischen,
 20 5-gliedrigen bis 6-gliedrigen monocyclischen Heterocyclus, der 1, 2 oder 3 gleiche oder verschiedene Ringheteroatome enthält, die aus N, O und S ausgewählt sind, wobei eines der Ringstickstoffatome ein Wasserstoffatom oder einen Substituenten R⁴ tragen kann und wobei das Phenylen und der zweiwertige Rest eines aromatischen Heterocyclus gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringkohlenstoffatomen durch
 25 gleiche oder verschiedene Substituenten R⁵ substituiert sind;

R¹ ausgewählt ist aus Wasserstoff und (C₁-C₄)-Alkyl;

R² und R³ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl-, (C₁-C₄)-Alkyloxy, (C₁-C₄)-Alkyl-S(O)_m-, Amino, Nitro, Cyano,

30

Hydroxycarbonyl, (C₁-C₄)-Alkyloxycarbonyl, Aminocarbonyl und Aminosulfonyl, (C₃-C₇)-Cycloalkyl-C_wH_{2w}- und Oxy, wobei w aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist;

5 R⁴ ausgewählt ist aus (C₁-C₄)-Alkyl, (C₃-C₇)-Cycloalkyl-C_wH_{2w}- und Oxy, wobei w aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist;

10 R⁵ ausgewählt ist aus Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl-, (C₃-C₅)-Cycloalkyl-C_zH_{2z}-, (C₁-C₄)-Alkyloxy, (C₁-C₄)-Alkyl-S(O)_m-, Amino, Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, (C₁-C₄)-Alkyloxycarbonyl, Aminocarbonyl und Aminosulfonyl, wobei z aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist;

m aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist.

15 2. Verbindung der Formel I in einer beliebigen ihrer stereoisomeren Formen oder einer Mischung von stereoisomeren Formen in beliebigem Verhältnis oder physiologisch akzeptables Salz davon oder physiologisch akzeptables Solvat einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß darin bedeuten

20 X (C₁-C₆)-Alkandiyloxy, wobei das Sauerstoffatom der (C₁-C₆)-Alkandiyloxygruppe an die Gruppe Y gebunden ist;

25 Y Phenylen, wobei das Phenylen gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringkohlenstoffatomen durch gleiche oder verschiedene Substituenten R⁵ substituiert ist;

R¹ Wasserstoff oder (C₁-C₄)-Alkyl;

30 R² und R³ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, Halogen, Hydroxy, (C₁-C₄)-Alkyl-, (C₁-C₄)-Alkyloxy, (C₁-C₄)-Alkyl-S(O)_m-, Amino, Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, (C₁-C₄)-Alkyloxycarbonyl, Aminocarbonyl und Aminosulfonyl, (C₃-C₇)-Cycloalkyl-C_wH_{2w}- und Oxy, wobei w aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist;

R^5 ausgewählt ist aus Halogen, Hydroxy, (C_1-C_4) -Alkyl-, (C_3-C_5) -Cycloalkyl- C_zH_{2z-} , (C_1-C_4) -Alkyloxy, (C_1-C_4) -Alkyl-S(O) $_m$ -, Amino, Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, (C_1-C_4) -Alkyloxycarbonyl, Aminocarbonyl und Aminosulfonyl, wobei z aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist;

m aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist.

3. Verbindung der Formel I in einer beliebigen ihrer stereoisomeren Formen oder einer Mischung von stereoisomeren Formen in beliebigem Verhältnis oder physiologisch akzeptables Salz davon oder physiologisch akzeptables Solvat einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß darin bedeuten

X (C_1-C_6) -Alkandiyloxy, wobei das Sauerstoffatom der (C_1-C_6) -Alkandiyloxygruppe an die Gruppe Y gebunden ist;

Y Phenylen, wobei das Phenylen gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringkohlenstoffatomen durch gleiche oder verschiedene Substituenten R^5 substituiert ist;

R^1 Wasserstoff oder (C_1-C_4) -Alkyl;

R^2 und R^3 unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, Halogen, Hydroxy, (C_1-C_4) -Alkyl-, (C_1-C_4) -Alkyloxy, (C_1-C_4) -Alkyl-S(O) $_m$ -, Amino, Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, (C_1-C_4) -Alkyloxycarbonyl, Aminocarbonyl und Aminosulfonyl, (C_3-C_7) -Cycloalkyl- C_wH_{2w-} und Oxy, wobei w aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist;

R^5 (C_1-C_4) -Alkyl;

m aus 0, 1 und 2 ausgewählt ist.

4. Verbindung der Formel I in einer beliebigen ihrer stereoisomeren Formen oder einer Mischung von stereoisomeren Formen in beliebigem Verhältnis oder
5 physiologisch akzeptables Salz davon oder physiologisch akzeptables Solvat einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß darin bedeuten

X $-(CH_2)-O-$, wobei $-O-$ an die Gruppe Y gebunden ist;

10

Y Phenylen, wobei das Phenylen gegebenenfalls an einem oder mehreren Ringkohlenstoffatomen durch gleiche oder verschiedene Substituenten R^5 substituiert ist;

15 R^1 Wasserstoff;

R^2 und R^3 unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, Halogen;

R^5 (C_1-C_4) -Alkyl.

20

5. Pharmazeutische Zusammensetzung, enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel I nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder ein physiologisch akzeptables Salz davon oder ein physiologisch akzeptables Solvat einer derartigen Verbindung oder
25 eines derartigen Salzes und einen pharmazeutisch akzeptablen Träger.

6. Pharmazeutische Zusammensetzung, nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um eine Hydrogelzubereitung handelt.

30 7. Verbindung der Formel I nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder physiologisch akzeptables Salz davon oder physiologisch akzeptables Solvat einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes zur Verwendung als Arzneimittel.

8. Verbindung der Formel I nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder eines physiologisch akzeptablen Salzes davon oder eines physiologisch akzeptablen Solvats einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes zur Behandlung von Wundheilungsstörungen.

9. Verbindung der Formel I nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder eines physiologisch akzeptablen Salzes davon oder eines physiologisch akzeptablen Solvats einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes zur Wundheilung.

10. Verbindung der Formel I nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder eines physiologisch akzeptablen Salzes davon oder eines physiologisch akzeptablen Solvats einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes zur Wundheilung bei Diabetikern.

11. Verbindung der Formel I nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder eines physiologisch akzeptablen Salzes davon oder eines physiologisch akzeptablen Solvats einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

12. Verbindung der Formel I nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder eines physiologisch akzeptablen Salzes davon oder eines physiologisch akzeptablen Solvats einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes zur Cardioprotektion.

13. Verbindung der Formel I nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder eines physiologisch akzeptablen Salzes davon oder eines physiologisch akzeptablen Solvats einer derartigen Verbindung oder eines derartigen Salzes zur Behandlung des Diabetischen Fußsyndroms.