




[図1]




[図2]




[図3]




[図4]




[図5]




[図6]



[図7]




[図8]




[図9]


A




B




[図10]




[図11]




[図12]




[図13]



[図14]



[図15]




[図16]

判定	判定用スコア (MCIリスク値)	説明
A	0.0-0.5	血漿から見た認知症リスクは低いです。
B	0.5-1.0	早期の認知障害に特徴的な血漿の兆候が認められます。
C	1.0-1.5	認知機能障害に特徴的な血漿の兆候が認められます。
D	1.5-2.0	進んだ認知機能障害に特徴的な血漿の兆候が認められます。


【図17】

判定	判定用スコア (MCIリスク値)	説明
A	0.0-0.5	MCIリスクはほぼありません。
B	0.5-1.0	MCIリスクは低めです。
C	1.0-1.5	MCIリスクは中程度です。
D	1.5-2.0	MCIリスクは高めです。

【図18】



【図19】



[図20]


栄養・脂質

バイオマーカー		量 (mg/dL)	標準範囲 (mg/dL)	判定結果
栄養	ALB	2910	3151-3674	やや低値です。 リスクがやや高い状態です。
	TTR	7.8	10-13	やや低値です。 リスクがやや高い状態です。
脂質代謝	APOA1	98.2	102-141	やや低値です。 リスクがやや高い状態です。
	APOC1	2.4	3.2-4.6	低値です。


免疫・凝固線溶

バイオマーカー		量 (mg/dL)	標準範囲 (mg/dL)	判定結果
免疫	C3	57.4	41-57	やや高値です。
	C4G	2.3	1.7-2.6	異常なし。
	A1BG	16.7	13-20	異常なし。
	HPX	56.5	50-67	異常なし。
凝固線溶	A2M	81.7	82-120	やや低値です。
	A2AP	3.3	3.4-4.4	やや低値です。 リスクがやや高い状態です。


[図21]




[図22A]




[図22B]



[図23A]



[図23B]




[図24]

栄養状態	脂質代謝状態	炎症状態	血管状態
良好 (2, 7)	注意が必要 (4, 1)	良好 (2, 4)	特に注意が必要 (6, 8)

[図25]


良好	注意が必要	特に注意が必要
0 ~ 3, 2	3, 3 ~ 6, 5	6, 5 ~ 10, 0

[図26A]



[図26B]

リスク評価 B (0.51~1.00)



[図26C]

リスク評価 C/D (1.01~2.00)

