

Description

La présente invention concerne un procédé de préparation d'acides hexènedioïques-1,6. Par acide hexènedioïque-1,6 on entend plus particulièrement l'acide hexène-3 dioïque-1,6. L'acide hexène-3 dioïque-1,6 peut être hydrogéné en acide adipique.

L'acide adipique, l'une des matières premières du nylon 66 est produit avec de forts tonnages et de ce seul fait, toute nouvelle voie d'accès à ce diacide et/ou à ses dérivés présente un intérêt de principe immédiatement perceptible.

La présente invention a plus spécifiquement pour objet un procédé de préparation de l'acide hexène-3 dioïque-1,6 par réaction du monoxyde de carbone et de l'eau sur au moins un butène disubstitué par des groupes acyloxy en présence d'un catalyseur à base de palladium.

Il est indiqué dans le brevet américain n° 4,611,082 que la carbonylation d'une solution du diacétoxy-1,4 butène-2 dans un solvant aprotique, polaire et non basique choisi dans le groupe constitué par les nitriles, le bis(méthoxy-2) butène-2, le bis(méthoxy-2 éthyl)éther et le chlorure de méthylène à 80 - 140°C en présence d'un halogénure d'un métal de transition n'est pratiquement pas observée et qu'en présence d'un alcool les vitesses augmentent et sont comparables à celles constatées pour la carbonylation du butène-2 diol-1,4. A propos de ce dernier substrat mentionné il est également indiqué qu'il ne permet pas d'atteindre dans les conditions précitées des rendements satisfaisants en produits linéaires de carbonylation et, dans ce contexte, préférence est donnée aux substrats substitués en position 1,4 par des groupements alcoxy.


Dans ce contexte il apparaît donc que le diacétoxy-1,4 butène-2 ne peut être considéré comme un substrat prometteur pour former des produits linéaires dicarboxylés.

Or le diacétoxy-1,4 butène-2 est aisément accessible par acétoxylation du butadiène. Il serait donc hautement souhaitable de pouvoir disposer d'un procédé permettant d'obtenir avec une efficacité élevée des produits linéaires dicarboxylés à partir du diacétoxy-1,4 butène-2, par exemple, et plus généralement de butènes disubstitués par des groupes acyloxy.

La présente invention a donc pour objet un procédé de préparation d'acides hexènedioïques-1,6 par réaction du monoxyde de carbone et de l'eau sur au moins un butène disubstitué par des groupes acyloxy en présence d'un catalyseur à base de palladium et d'un chlorure d'onium quaternaire d'un élément du groupe VB choisi parmi l'azote et le phosphore, ledit élément étant tétracoordonné à des atomes de carbone, l'azote pouvant être coordonné à deux atomes de phosphore pentavalents.

Il a en effet été trouvé de manière tout à fait surprenante qu'un tel procédé permet de réaliser la dicarbonylation dans des conditions de pression et de température acceptables à l'échelle industrielle, avec une sélectivité appréciable en produit dicarboxylé linéaire.

Le procédé en cause peut être représenté par le schéma réactionnel suivant, lorsqu'on part d'un butène-2 disubstitué en 1,4 par des groupes acyloxy,



dans lequel R représente :

un radical alkyle linéaire ou ramifié, contenant de 1 à 12 atomes de carbone, éventuellement substitué par un groupe phényle ;

ou

un radical aryle contenant de 6 à 10 atomes de carbone, éventuellement substitué par un ou deux radicaux alkyles contenant de 1 à 4 atomes de carbone ;
et peut comporter de 1 à 3 substituants choisis parmi les atomes de fluor et de chlore et les groupements dialkylamino et N,N-dialkylamido dont les radicaux alkyles renferment au plus 4 atomes de carbone.

Le procédé, selon la présente invention, requiert la mise en oeuvre d'au moins un butène disubstitué par des groupes acyloxy. Par groupe acyloxy, on entend des groupes de formule RCOO- dans laquelle R a la signification donnée précédemment ; par butènes disubstitués on entend les composés du butène-2 substitués en positions 1 et 4 et les composés du butène-1 substitués en positions 3 et 4. Bien entendu des mélanges de butène-2 disubstitués par des groupes acyloxy de nature distincte, des mélanges de butène-1 disubstitués par des groupes acyloxy de nature distincte ou des mélanges de butène-2 et de butène-1 disubstitués peuvent être mis en oeuvre dans le cadre du présent procédé.

Il a en effet été constaté par la Demanderesse que la sélectivité en acide linéaire est sensiblement la même que l'on parte d'un butène-2 disubstitué par des groupes acyloxy en positions 1,4 ou d'un butène-1 disubstitué

par des groupes acyloxy en positions 3 et 4.

A titre d'exemples de butènes disubstitués par des groupes acyloxy on peut citer : les diacétoxybutènes, les dipropionyloxybutènes, les dibutyryloxybutènes et les dibenzoyloxybutènes.

Le diacétoxy-1,4 butène-2, le diacétoxy-3,4 butène-1 et leurs mélanges conviennent plus particulièrement bien à la mise en oeuvre de la présente invention.

Le procédé selon la présente invention requiert également la présence d'eau.

La quantité d'eau à mettre en oeuvre dans le cadre du présent procédé n'est pas critique et peut varier dans de larges limites.

Pour une bonne mise en oeuvre de la réaction le rapport molaire de l'eau au butène disubstitué sera compris entre 1 et 100 et, de préférence entre 1 et 50.

Le procédé selon la présente invention est conduit en présence d'un catalyseur à base de palladium.

Bien que la nature précise de l'espèce (ou des espèces) catalytiquement active(s) dans la réaction en cause ne soit pas totalement élucidée, la Demanderesse a constaté que divers composés du palladium et le palladium métallique sont susceptibles d'être des précurseurs utiles dans la mise en oeuvre du présent procédé.

Parmi les sources de palladium pouvant être mises en oeuvre pour réaliser le procédé faisant l'objet de l'invention, on peut citer :

- le palladium métallique déposé le cas échéant sur un support, tel que le charbon, l'alumine, ou la silice,
- PdCl_2 , $\text{Pd}(\text{OAc})_2$, $\text{PBu}_4\text{PdCl}_3$ (Bu = n-butyle)
- les sels ou les complexes π -allyliques de palladium, dont l'anion coordonné au cation Pd est choisi parmi les anions suivants : carboxylates tels que formiate, acétate, propionate, benzoate ; acétylacétonate, halogénures tels que Cl^- et Br^- et de préférence Cl^- ;


La quantité précise de catalyseur à mettre en oeuvre, qui peut varier dans de larges limites, dépendra avant tout d'un compromis entre l'efficacité souhaitée et la dépense en catalyseur et des autres conditions choisies pour la réaction. En général, de bons résultats peuvent être obtenus avec une concentration de palladium dans le milieu réactionnel, comprise entre 10^{-3} et 1 mol/l. De préférence, cette concentration est comprise entre $2 \cdot 10^{-3}$ et $5 \cdot 10^{-2}$ Mol/l.

L'une des caractéristiques essentielles du présent procédé réside dans le fait que la réaction est conduite également en présence d'un chlorure d'onium quaternaire d'un élément du groupe VB choisi parmi l'azote et le phosphore, ledit élément étant tétracoordonné à des atomes de carbone, l'azote pouvant en outre être coordonné à deux atomes de phosphore pentavalents.


Par cation onium quaternaire dont l'élément du groupe VB est tétracoordonné à des atomes de carbone, on entend des cations formés à partir d'azote ou de phosphore et de quatre groupements hydrocarbonés monovalents, identiques ou différents, dont la valence libre est portée par un atome de carbone, chaque groupement étant relié à l'élément précité par ladite valence libre, deux quelconques de ces groupements pouvant par ailleurs former ensemble un radical divalent.

Pour une bonne réalisation du procédé de l'invention, le chlorure d'onium quaternaire présente un cation onium quaternaire répondant à l'une des formules I à IV ci-après :


I)




II)



III)



IV)



dans lesquelles :

- A représente de l'azote ou du phosphore
 - $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4$ sont identiques ou différents et représentent :
 - . un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 16 atomes de carbone, éventuellement substitué par un groupe phényle, hydroxy, halogéno, nitro, alcoxy ou alcoxycarbonylé ;
 - . un radical alcényle linéaire ou ramifié contenant de 2 à 12 atomes de carbone, de préférence de 4 à 8 atomes de carbone,
 - . un radical aryle contenant de 6 à 10 atomes de carbone, éventuellement substitué par un ou des radicaux alkyles contenant de 1 à 4 atomes de carbone, alcoxy, alcoxycarbonylé ou halogéno ;
 - . deux desdits radicaux R_1 à R_4 pouvant former ensemble un radical alkylène, alcénylène ou alcadiénylène, linéaire ou ramifié et contenant de 3 à 6 atomes de carbone ;
 - $\text{R}_5, \text{R}_6, \text{R}_7, \text{R}_8$ sont identiques ou différents et représentent :
 - . un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 4 atomes de carbone ;
 - . les radicaux R_7 et R_8 pouvant former ensemble un radical alkylène, contenant de 3 à 6 atomes de carbone ;
 - . les radicaux R_6 et R_7 ou R_6 et R_8 pouvant former ensemble un radical alkylène, alcénylène ou alcadiénylène, contenant 4 atomes de carbone et constituant avec N un hétérocycle azoté ;
 - R_9 représente un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 4 atomes de carbone ou un radical phényle ;
 - R_{10} représente :
 - . un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 4 atomes de carbone, semblable ou différent de R_9 ;
 - . un radical alcényle linéaire ou ramifié, contenant de 2 à 12 atomes de carbone, de préférence de 4 à 8 atomes de carbone ;
 - n représente un nombre entier supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 10 et de préférence inférieur ou égal à 6 ;
 - R_{11} représente un radical aryle contenant de 6 à 10 atomes de carbone, éventuellement substitué par un ou des groupes alkyle contenant de 1 à 4 atomes de carbone, alcoxy, alcoxycarbonylé ou halogéno.
- A titre d'exemple de cations onium quaternaire répondant à la formule I on peut citer les cations :
- . tétraméthylammonium,
 - . triéthylméthylammonium
 - . tributylméthylammonium
 - . triméthyl(n-propyl)ammonium
 - . tétraéthylammonium
 - . tétrabutylammonium
 - . dodécyltriméthylammonium
 - . méthyltrioctylammonium
 - . heptyltributylammonium
 - . tétrapropylammonium
 - . tétrapentylammonium
 - . tétrahexylammonium
 - . tétraheptylammonium
 - . tétraoctylammonium
 - . tétradécylammonium
 - . butyltripropylammonium
 - . méthyltributylammonium
 - . pentyltributylammonium

- . méthyl-diéthyl-propylammonium
- . éthyl-diméthyl-propylammonium
- . tétradodécylammonium
- . tétraoctadécylammonium
- 5 . hexadécyltriméthylammonium
- . benzyltriméthylammonium
- . benzyl-diméthyl-propylammonium
- . benzyl-diméthyl-octylammonium
- . benzyltributylammonium
- 10 . benzyltriéthylammonium
- . phényltriméthylammonium
- . benzyl-diméthyl-tétradécylammonium
- . benzyl-diméthyl-hexadécylammonium
- . diméthyl-diphénylammonium
- 15 . méthyltriphénylammonium
- . butène-2 yltriéthylammonium
- . N,N-diméthyl-tétraméthylènammonium
- . N,N-diéthyl-tétraméthylènammonium
- . tétraméthylphosphonium
- 20 . tétrabutylphosphonium
- . éthyltriméthylphosphonium
- . triméthylpentylphosphonium
- . octyltriméthylphosphonium
- . dodécyltriméthylphosphonium
- 25 . triméthylphénylphosphonium
- . diéthyl-diméthylphosphonium
- . dicyclohexyl-diméthylphosphonium
- . diméthyl-diphénylphosphonium
- . cyclohexyltriméthylphosphonium
- 30 . triéthylméthylphosphonium
- . méthyl-tri(isopropyl)phosphonium
- . méthyl-tri(n-propyl)phosphonium
- . méthyl-tri(n-butyl)phosphonium
- . méthyl-tri(méthyl-2 propyl)phosphonium
- 35 . méthyltricyclohexylphosphonium
- . méthyltriphénylphosphonium
- . méthyltribenzylphosphonium
- . méthyl-tri(méthyl-4 phényl)phosphonium
- . méthyltrixylylphosphonium
- 40 . diéthylméthylphénylphosphonium
- . dibenzylméthylphénylphosphonium
- . éthyltriphénylphosphonium
- . tétraéthylphosphonium
- . éthyl-tri(n-propyl)phosphonium
- 45 . triéthylpentylphosphonium
- . hexadécyltributylphosphonium
- . éthyltriphénylphosphonium
- . n-butyl-tri(n-propyl)phosphonium
- . butyltriphénylphosphonium
- 50 . benzyltriphénylphosphonium
- . (β-phényléthyl)diméthylphénylphosphonium
- . tétraphénylphosphonium
- . triphényl(méthyl-4 phényl)phosphonium
- . tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium
- 55 . tétrakis(hydroxy-2 éthyl)phosphonium

Parmi les cations répondant à la formule II, on peut citer les cations :

- . N-méthylpyridinium
- . N-éthylpyridinium

- . N-hexadécylpyridinium
- . N-méthylpicolinium

Parmi les cations répondant à la formule III, on peut citer les cations :

- . bis(triméthylammonium)-1,2 éthane
- 5 . bis(triméthylammonium)-1,3 propane
- . bis(triméthylammonium)-1,4 butane
- . bis(triméthylammonium)-1,3 butane

Parmi les cations répondant à la formule IV, on peut citer les cations :

- bis(triphénylphosphine)iminium
- 10 bis(tritolylphosphine)iminium.

On recourt avantageusement à ceux des cations onium répondant à la formule (I) ci-avant dans laquelle :

- A représente du phosphore et,
- R₁, R₂, R₃ et R₄ sont identiques ou différents et représentent un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 8 atomes de carbone, un radical phényle ou méthyl-4 phényle.

15 On utilise de préférence un chlorure de tétralkylphosphonium.

Le chlorure de tétrabutylphosphonium disponible et particulièrement efficace est plus spécialement recommandé.

On notera que certains composés du palladium, tel P Bu₄ Pd Cl₃ mentionné précédemment et résultant de la réaction entre des quantités molaires équivalentes de P Bu₄ Cl et de Pd Cl₂, peuvent constituer à la fois une

20 source de palladium et un moyen d'introduction d'un chlorure d'onium quaternaire au sens indiqué ci-avant. Il a été constaté que l'effet bénéfique apporté par la présence dans le milieu de carbonylation d'un chlorure d'onium quaternaire correspondant à la définition donnée ci-dessus est sensible à partir d'un rapport molaire cation onium/palladium de 0,5 ; notamment un effet particulièrement intéressant a été constaté lorsque ledit rapport est compris entre 1 et 50, un rapport plus élevé pouvant même être choisi sans préjudice pour la réaction. En effet, le chlorure d'onium quaternaire peut être utilisé en quantité relativement importante et jouer en

25 quelque sorte le rôle supplémentaire de diluant du milieu réactionnel. La réaction pourra être généralement conduite en phase liquide à une température comprise entre 50 et 150°C, de préférence entre 80 et 130°C, sous une pression d'oxyde de carbone comprise entre 10 et 250 bar (1000 et 25 000 KPa), de préférence entre 15 et 180 bar (1500 et 18 000 KPa).

30 Des gaz inertes, tels l'azote, l'argon ou le gaz carbonique, peuvent être présents à côté de l'oxyde de carbone.

Bien entendu la réaction peut être conduite en présence de solvants ou diluants exogènes au milieu réactionnel tels les hydrocarbures aromatiques, les esters, les cétones, les nitriles ou les amides d'acides carboxyliques.

35 Selon une variante avantageuse du procédé selon la présente invention la réaction est conduite dans la N-méthylpyrrolidone.

La concentration du butène disubstitué peut varier dans de larges limites.

En fin de réaction ou du temps de réaction voulu, on récupère le diacide recherché par tout moyen approprié, par exemple par extraction.

Les exemples ci-après illustrent l'invention.

40 Dans ces exemples, le taux de transformation est de 100 % et on observe la formation des divers acides suivants :

- HD : mélange d'acides hexène-3 et hexène-2 dioïques dans lequel l'acide hexène-3 dioïque est majoritaire.
- Ac.C₅ : mélange d'acides valérique, méthyl-2 butyrique, pentène-3 oïque, pentène-2 oïque et pentène-4 oïque dans lequel l'acide-pentène-3 oïque est majoritaire.
- 45 - C₆sat. : mélange d'acides éthylsuccinique, méthylglutarique et adipique dans lequel l'acide méthylglutarique est majoritaire.
- PDO : acide pentadiénoïque

50 dont on indique pour chaque groupe le nombre de moles formées pour 100 moles de diacétoxybutène chargées.

EXEMPLES 1 A 11 ; Essais témoins (a) et (b) :

55 Dans un autoclave en acier inoxydable (HastelloyB2) de 125 cm³, préalablement purgé à l'argon, on introduit :

- 8,6 g (50 mmol) de diacétoxy-1,4 butène-2
- 1,8 g (100 mmol) d'eau
- 1 mat-g de palladium sous la forme indiquée dans le tableau I ci-après :

- 5 g (17 mmol) de PBU_4Cl
- 25 cm³ de solvant dont la nature figure au tableau I ci-après :

L'autoclave est fermé hermétiquement, placé dans un four agité et raccordé à l'alimentation de gaz sous pression. On purge le réacteur à froid avec de l'oxyde de carbone et on le porte à 100°C. On régule ensuite la pression à 120 bar. Après 6 heures de réaction (sauf indication contraire), l'autoclave est refroidi et dégazé.

Le mélange réactionnel résultant est dilué à 100 cm³ par le solvant.

Une partie aliquote est estérifiée par le méthanol puis analysée par chromatographie en phase gazeuse.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

TABLEAU I

Ex n°	Pd	Solvant	t(h)	Résultats (%)			
				HD	Ac.C ₅	C sat. ₆	PDO
1	PdCl ₂	CH ₃ CN		34	35	17	0
(a)	"	"		6	16	5	4
(b)	"	"		2	33	11	1
2	Pd(OAc) ₂	"	2	38	2	1	15
3 *	Id+HBF ₄	"		22	32	17	0
4	PdCl ₂	NMP	3	68	2	0	12
5	Pd(OAc) ₂	"		22	1	0	41
6	Pd(dba) ₃	"		20	0,5	0	40
7	Me ₃ PO PdCl ₂	"		60	1	0	12
8 *	Pd/C	"		17	3	-	54
9	PdCl ₂	PBu ₄ Cl	3	80	4	1	1
10	"	DMF		33	0	0	11
11	"	Sulfolane		38	20	0	0,5

(a) : absence de PBu₄Cl

(b) : remplacement de PBu₄Cl par PBu₄Br

3 (*) catalyseur : Pd(OAc)₂ + 2mmolHBF₄

8 (*) catalyseur : Pd/C (10 % en palladium) ; 1 mmol Pd.

t(h) : durée d'absorption si elle est inférieure à 6 heures.

EXEMPLE 12:

On reproduit l'exemple 4 ci-avant en n'utilisant que 0,5 mat-g de palladium sous forme de PdCl₂. En 12 heures de réaction on obtient les résultats suivants :

- HD : 80 %
- Ac.C₅ : 0,5 %
- C₆sat. : 0 %
- PDO : 14 %

5

EXEMPLE 13 :

On reproduit l'exemple 4 ci-avant en n'utilisant que 0,25 mat-g de palladium sous forme de PdCl₂. En 12 heures de réaction on obtient les résultats suivants :

10

- HD : 65 %
- Ac.C₅ : 2 %
- C₆sat. : 0 %
- PDO : 12 %

15

EXEMPLES 14 ET 15 :

On reproduit l'exemple 4 ci-avant en n'utilisant respectivement 2,5 g et 15 g de PBU₄Cl et en ajustant à chaque essai le volume de N-méthylpyrrolidone de telle sorte que le volume total de la charge soit constant.

20

Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau II ci-après dans lequel on a rappelé les résultats et les conditions particulières des exemples 4 et 9 ci-avant.

TABLEAU II

25

30

35

40

				Résultats (%)			
Ex N°	PBU Cl(g)	t(h)	HD	Ac.C ₅	C sat.	PDO	
	4			5	6		
14	2,5	6	55	1	0	13	
4	5	3	68	2	0	12	
15	15	3	80	3	0	3	
9	30	3	78	4	1	1	

EXEMPLE 16 :

45

On reproduit l'exemple 4 ci-avant en remplaçant dans la charge le diacétoxy-1,4 butène-2 par une quantité équivalente de diacétoxy-1,2 butène-3.

Après 6 heures de réaction, les résultats obtenus sont les suivants :

50

- HD : 65 %
- Ac.C₅ : 1 %
- C₆sat. : 0 %
- PDO : 10 %

EXEMPLE 17 :

55

On reproduit l'exemple 4 ci-avant à 130°C.

Après 3 heures de réaction, les résultats obtenus sont les suivants :

- HD : 45 %

- Ac.C₆ : 7 %
- C₆sat. : 0 %
- PDO : 0 %

5 **EXEMPLE 18 :**

On reproduit l'exemple 4 ci-avant à 70°C.

Après 6 heures de réaction, les résultats obtenus sont les suivants :

- HD : 30 %
- 10 - Ac.C₆ : 2 %
- C₆sat. : 0 %
- PDO : 33 %

15 **EXEMPLE 19 :**

On reproduit l'exemple 4 ci-avant sous une pression de 180 bars.

On obtient sensiblement les mêmes résultats.

20 **EXEMPLE 20 :**

On reproduit l'exemple 4 ci-avant sous une pression de 15 bars.

Après 6 heures de réaction les résultats obtenus sont les suivants :

- HD : 40 %
- Ac.C₆ : 30 %
- 25 - C₆sat : 0 %
- PDO : 2 %

EXEMPLE 21 :

30 On reproduit l'exemple 4 ci-avant sous une pression de 60 bars.

Après 6 heures de réaction les résultats obtenus sont les suivants :

- HD : 75 %
- Ac.C₆ : 3 %
- C₆sat : 0 %
- 35 - PDO : 9 %

EXEMPLES 22 A 24 :

40 On reproduit 2 fois l'exemple 4 ci-avant avec respectivement 25 mmol et 100 mmol de diacétoxy-1,4 butène-2 (DAB) en maintenant dans chaque essai un rapport molaire diacétoxy-1,4 butène-2/H₂O de 1/2 et le volume de la charge constant en jouant sur la quantité de NMP (Exemples 22 et 23).

On reproduit l'exemple 1 ci-avant avec 25 mmol de diacétoxy-1,4 butène-2 en maintenant le rapport molaire de ce dernier avec l'eau à 1/2 et le volume de la charge constant en jouant sur la quantité de CH₃CN (exemple 24).

45 Les résultats obtenus figurent dans le tableau III ci-après :

50

55

TABLEAU III

5

10

15

20

25

				Résultats (%)			
Ex n°	Solvant	DAB mmol	t(h)	HD	Ac.C 5	C sat. 6	PDO
22	NMP	25	3	80	1	7	7
4	"	50	3	68	2	0	12
23	"	100		60	2	0	15
24	CH CN 3	25		68	23	22	0
1	"	50		45	35	17	0

t(h) : durée d'absorption si elle est inférieure à 6 heures

30 EXEMPLES 25 ET 26 :

On reproduit l'exemple 1 ci-avant en faisant varier la quantité d'eau chargée.
Les conditions particulières et les résultats obtenus figurent dans le tableau IV ci-après :

35

TABLEAU IV

40

45

50


55

				Résultats (%)		
Ex N°	H O mmol 2	t(h)	HD	Ac.C 5	C sat. 6	PDO
1	100	6	45	35	17	0
25	200	2,5	48	27	9	0
26	500	3	45	4	5	5


Revendications

1. Procédé de préparation d'acides hexènedioïques-1,6 par réaction de l'oxyde de carbone et de l'eau sur au moins un butène disubstitué par des groupes acyloxy en présence d'un catalyseur à base de palladium et d'au moins un chlorure d'onium quaternaire d'un élément du groupe VB choisi parmi l'azote et le phosphore, ledit élément étant tétracoordonné à des atomes de carbone, l'azote pouvant être coordonné à deux atomes de phosphore pentavalents.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le chlorure d'onium quaternaire d'un élément du groupe VB choisi parmi l'azote et le phosphore présente un cation onium quaternaire répondant à l'une des formules (I) à (IV) suivantes :


I)



II)



III)



(IV)



Dans lesquelles :


- A représente de l'azote ou du phosphore
- R_1, R_2, R_3, R_4 sont identiques ou différents et représentent :
 - . un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 16 atomes de carbone, éventuellement substitué par un groupe phényle, hydroxy, halogéno, nitro, alcoxy ou alcoxycarbonylé ;
 - . un radical alcényle linéaire ou ramifié contenant de 2 à 12 atomes de carbone, de préférence de 4 à 8 atomes de carbone,
 - . un radical aryle contenant de 6 à 10 atomes de carbone, éventuellement substitué par un ou des radicaux alkyles contenant de 1 à 4 atomes de carbone, alcoxy, alcoxycarbonylé ou halogéno ;
 - . deux desdits radicaux R_1 à R_4 pouvant former ensemble un radical alkylène, alcénylène ou alca-diénylène, linéaire ou ramifié et contenant de 3 à 6 atomes de carbone ;
- R_5, R_6, R_7, R_8 sont identiques ou différents et représentent :
 - . un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 4 atomes de carbone ;

- les radicaux R_7 et R_8 pouvant former ensemble un radical alkylène, contenant de 3 à 6 atomes de carbone ;
- les radicaux R_6 et R_7 ou R_6 et R_8 pouvant former ensemble un radical alkylène, alcénylène ou alcadiénylène, contenant 4 atomes de carbone et constituant avec N un hétérocycle azoté ;
- 5 - R_9 représente un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 4 atomes de carbone ou un radical phényle ;
- R_{10} représente :
 - un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 4 atomes de carbone, semblable ou différent de R_9 ;
 - un radical alcényle linéaire ou ramifié, contenant de 2 à 12 atomes de carbone, de préférence de 4 à 8 atomes de carbone ;
- 10 - n représente un nombre entier supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 10 et de préférence inférieur ou égal à 6 ;
- R_{11} représente un radical aryle contenant de 6 à 10 atomes de carbone, éventuellement substitué par un ou des groupes alkyle contenant de 1 à 4 atomes de carbone, alcoxy, alcoxycarbonylé ou halogéno.
- 15 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le cation onium quaternaire répond à la formule (I) donnée dans la revendication 2, dans laquelle :
 - A représente du phosphore et,
 - R_1 , R_2 , R_3 et R_4 sont identiques ou différents et représentent un radical alkyle linéaire ou ramifié
 - 20 contenant de 1 à 8 atomes de carbone, un radical phényle ou méthyl-4 phényle.
- 4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le chlorure d'onium quaternaire est le chlorure de tétrabutylphosphonium.
- 25 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le rapport molaire du cation onium au palladium est supérieur ou égal à 1.
- 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la concentration du palladium dans le milieu réactionnel est comprise entre 10^{-3} et 1 mol/l.
- 30 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le rapport molaire de l'eau au butène disubstitué est compris entre 1 et 100 et, de préférence, entre 1 et 50.
- 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la température de réaction est comprise entre 50 et 150°C et, de préférence, entre 80 et 130°C.
- 35 9. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la pression est comprise entre 10 et 250 bar (1000 et 25 000 KPa) et, de préférence, entre 15 et 180 bar (1500 et 18 000 KPa).
- 10. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le butène disubstitué est choisi parmi le diacétoxy-1,4 butène-2 et le diacétoxy-3,4 butène-1 et leurs mélanges.
- 40 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la réaction est conduite en présence d'un solvant ou diluant organique.
- 12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que le solvant est la N-méthylpyrrolidone.
- 45


Patentansprüche

- 50 1. Verfahren zur Herstellung von Hexen-1,6-disäuren durch Umsetzung von Kohlenmonoxid und Wasser mit zumindest einem durch Acyloxygruppen disubstituierten Buten in Gegenwart eines Katalysators auf Basis von Palladium und zumindest einem quaternären Oniumchlorid eines Elements der Gruppe VB, ausgewählt unter Stickstoff und Phosphor, wobei dieses Element mit Kohlenstoffatomen tetrakoordiniert ist, wobei der Stickstoff mit zwei fünfwertigen Phosphoratomen koordiniert sein kann.
- 55 2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das quaternäre Oniumchlorid eines Elements der Gruppe VB, ausgewählt unter Stickstoff und Phosphor, ein quaternäres Oniumkation einer der folgenden Formeln (I) bis (IV) darstellt:


I)




II)



III)



IV)



worin:

- A für den Stickstoff oder den Phosphor steht,
- R_1, R_2, R_3, R_4 identisch oder verschieden sind und bedeuten:
 - einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 16 Kohlenstoffatomen, der gegebenenfalls durch eine Phenyl-, Hydroxy-, Halogen-, Nitro-, Alkoxy- oder Alkoxycarbonylgruppe substituiert ist;
 - einen linearen oder verzweigten Alkenylrest mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 4 bis 8 Kohlenstoffatomen,
 - einen Arylrest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, der gegebenenfalls durch einen oder mehrere Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Alkoxy, Alkoxycarbonyl oder Halogen substituiert ist,
 - wobei zwei dieser Reste R_1 bis R_4 gemeinsam einen linearen oder verzweigten Alkyl-, Alkenyl- oder Alkadienylrest mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen bilden können,
- R_5, R_6, R_7, R_8 identisch oder voneinander verschieden sind und bedeuten:
 - einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen,
 - wobei die Reste R_7 und R_8 gemeinsam einen Alkylrest mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen bilden können,
 - wobei die Reste R_6 und R_7 oder R_6 und R_8 gemeinsam einen Alkyl-, Alkenyl- oder Alkadienylrest bilden können, der 4 Kohlenstoffatome enthält und mit N einen Stickstoffheterocyclus bildet,
- R_9 einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder einen Phenylrest bedeutet,
- R_{10} bedeutet:
 - einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, entsprechend R_9 oder von R_9 verschieden,
 - einen linearen oder verzweigten Alkenylrest mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 4 bis 8 Kohlenstoffatomen,
- n eine ganze Zahl von höher als oder gleich 1 und niedriger als oder gleich 10 und vorzugsweise niedriger als oder gleich 6 bedeutet,
- R_{11} einen Arylrest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls substituiert durch eine oder meh-


rere Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Alkoxy, Alkoxycarbonyl oder Halogen bedeutet.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das quaternäre Oniumkation der Formel (I) gemäß Anspruch 2 entspricht, worin
 - A für Phosphor steht und
 - R₁, R₂, R₃ und R₄ identisch oder voneinander verschieden sind und einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, einen Phenylrest oder einen 4-Methylphenylrest bedeuten.
4. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das quaternäre Oniumchlorid das Tetrabutylphosphoniumchlorid ist.
5. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Molverhältnis des Oniumkations zu dem Palladium höher als oder gleich 1 beträgt.
6. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des Palladiums in dem Reaktionsmilieu zwischen 10⁻³ und 1 Mol/l liegt.
7. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Molverhältnis von Wasser zu disubstituiertem Buten zwischen 1 und 100 und vorzugsweise zwischen 1 und 50 beträgt.
8. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktionstemperatur zwischen 50 und 150°C und vorzugsweise zwischen 80 und 130°C beträgt.
9. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Druck zwischen 10 und 250 bar (1 000 und 25 000 kPa) und vorzugsweise zwischen 15 und 180 bar (1 500 und 18 000 kPa) beträgt.
10. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das disubstituierte Buten unter 1,4-Diacetoxybut-2-en und 3,4-Diacetoxybut-1-en und deren Mischungen ausgewählt wird.
11. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzung in Gegenwart eines organischen Lösungs- oder Verdünnungsmittels durchgeführt wird.
12. Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Lösungsmittel N-Methylpyrrolidon ist.

Claims

1. Process for the preparation of hexene-1,6-dioic acids by reaction of carbon monoxide and water on at least one butene disubstituted by acyloxy groups in the presence of a catalyst based on palladium and at least one quaternary onium chloride of a group VB element chosen from nitrogen and phosphorus, the said element being tetracoordinated to carbon atoms and it being possible for nitrogen to be coordinated to two pentavalent phosphorus atoms.
2. Process according to claim 1, characterized in that the quaternary onium chloride of a group VB element chosen from nitrogen and phosphorus has a quaternary onium cation corresponding to one of the formulae (I) to (IV) below:

I)




rere Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Alkoxy, Alkoxycarbonyl oder Halogen bedeutet.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das quaternäre Oniumkation der Formel (I) gemäß Anspruch 2 entspricht, worin
 - A für Phosphor steht und
 - R₁, R₂, R₃ und R₄ identisch oder voneinander verschieden sind und einen linearen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, einen Phenylrest oder einen 4-Methylphenylrest bedeuten.
4. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das quaternäre Oniumchlorid das Tetrabutylphosphoniumchlorid ist.
5. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Molverhältnis des Oniumkations zu dem Palladium höher als oder gleich 1 beträgt.
6. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des Palladiums in dem Reaktionsmilieu zwischen 10⁻³ und 1 Mol/l liegt.
7. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Molverhältnis von Wasser zu disubstituiertem Buten zwischen 1 und 100 und vorzugsweise zwischen 1 und 50 beträgt.
8. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktionstemperatur zwischen 50 und 150°C und vorzugsweise zwischen 80 und 130°C beträgt.
9. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Druck zwischen 10 und 250 bar (1 000 und 25 000 kPa) und vorzugsweise zwischen 15 und 180 bar (1 500 und 18 000 kPa) beträgt.
10. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das disubstituierte Buten unter 1,4-Diacetoxybut-2-en und 3,4-Diacetoxybut-1-en und deren Mischungen ausgewählt wird.
11. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzung in Gegenwart eines organischen Lösungs- oder Verdünnungsmittels durchgeführt wird.
12. Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Lösungsmittel N-Methylpyrrolidon ist.

Claims


1. Process for the preparation of hexene-1,6-dioic acids by reaction of carbon monoxide and water on at least one butene disubstituted by acyloxy groups in the presence of a catalyst based on palladium and at least one quaternary onium chloride of a group VB element chosen from nitrogen and phosphorus, the said element being tetracoordinated to carbon atoms and it being possible for nitrogen to be coordinated to two pentavalent phosphorus atoms.
2. Process according to claim 1, characterized in that the quaternary onium chloride of a group VB element chosen from nitrogen and phosphorus has a quaternary onium cation corresponding to one of the formulae (I) to (IV) below:

I)






II)



III)



IV)



in which formulae:

- A represents nitrogen or phosphorus
- $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3$ and R_4 are identical or different and represent:
 - a straight-chain or branched alkyl radical containing 1 to 16 carbon atoms, optionally substituted by a phenyl, hydroxyl, halogeno, nitro, alkoxy or alkoxycarbonyl group;
 - a straight-chain or branched alkenyl radical containing 2 to 12 carbon atoms, preferably 4 to 8 carbon atoms,
 - an aryl radical containing 6 to 10 carbon atoms, optionally substituted by one or more alkyl radicals containing 1 to 4 carbon atoms, alkoxy, alkoxycarbonyl or halogeno;
 - it being possible for two of the said radicals R_1 to R_4 to form together a straight-chain or branched alkylene, alkenylene or alkadienylene radical containing 3 to 6 carbon atoms;
- $\text{R}_5, \text{R}_6, \text{R}_7$ and R_8 are identical or different and represent:
 - a straight-chain or branched alkyl radical containing 1 to 4 carbon atoms;
 - it being possible for the radicals R_7 and R_8 to form together an alkylene radical containing 3 to 6 carbon atoms;
 - it being possible for the radicals R_6 and R_7 or R_6 and R_8 to form together an alkylene, alkenylene or alkadienylene radical containing 4 carbon atoms and forming, with N, a nitrogen-containing heterocyclic radical;
- R_9 represents a straight-chain or branched alkyl radical containing 1 to 4 carbon atoms or a phenyl radical;
- R_{10} represents:
 - a straight-chain or branched alkyl radical containing 1 to 4 carbon atoms, similar to or different from R_9 ;
 - a straight-chain or branched alkenyl radical containing 2 to 12 carbon atoms, preferably 4 to 8 carbon atoms;
- n represents an integer greater than or equal to 1 and less than or equal to 10 and preferably less than or equal to 6;
- R_{11} represents an aryl radical containing 6 to 10 carbon atoms, optionally substituted by one or more alkyl groups containing 1 to 4 carbon atoms, alkoxy, alkoxycarbonyl or halogeno.

3. Process according to claim 1 or 2, characterized in that the quaternary onium cation corresponds to the formula (I) given in claim 2, in which:

- A represents phosphorus, and
- $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3$ and R_4 are identical or different and represent a straight-chain or branched alkyl radical containing 1 to 8 carbon atoms or a phenyl or 4-methylphenyl radical.



4. Process according to any one of the preceding claims, characterized in that the quaternary onium chloride is tetrabutylphosphonium chloride.
5. Process according to any one of the preceding claims, characterized in that the molar ratio of the onium cation to palladium is greater than or equal to 1.
6. Process according to any one of the preceding claims, characterized in that the concentration of palladium in the reaction mixture is between 10^{-3} and 1 mol/l.
7. Process according to any one of the preceding claims, characterized in that the molar ratio of water to disubstituted butene is between 1 and 100 and preferably between 1 and 50.
8. Process according to any one of the preceding claims, characterized in that the reaction temperature is between 50 and 150°C and preferably between 80 and 130°C.
9. Process according to any one of the preceding claims, characterized in that the pressure is between 10 and 250 bar (1000 and 25,000 KPa) and preferably between 15 and 180 bar (1500 and 18,000 KPa).
10. Process according to any one of the preceding claims, characterized in that the disubstituted butene is chosen from 1,4-diacetoxy-but-2-ene and 3,4-diacetoxybut-1-ene and their mixtures.
11. Process according to any one of the preceding claims, characterized in that the reaction is carried out in the presence of an organic solvent or diluent.
12. Process according to claim 11, characterized in that the solvent is N-methylpyrrolidone.