

明 細 書

発明の名称： フェニルピロール誘導体

技術分野

[0001] 本発明は、新規なフェニルピロール誘導体及びその医薬用途、特に、ヒスタミンH₃受容体関連疾患の予防または治療薬に関する。

背景技術

[0002] ヒスタミンは肥満細胞、肺、肝臓、及び胃粘膜などで普段は細胞内の顆粒に貯蔵されており、細胞表面の抗体に抗原が結合するなどの外部刺激を受けて細胞外へ放出される。例えば、肥満細胞が外部から進入した抗原で刺激されると、ヒスタミンは肥満細胞から放出され、血管や平滑筋上に存在するヒスタミンH₁（H₁）受容体を刺激することによりアレルギー反応を引き起こす。また、胃粘膜上のECL細胞（enterochromaffin-like cell）から放出されたヒスタミンは壁細胞上のヒスタミンH₂（H₂）受容体を刺激し、胃酸分泌を促進する。これらの事実に基づき、アレルギー疾患治療薬、又は胃潰瘍治療薬としてH₁受容体拮抗物質、又はH₂受容体拮抗物質の開発が行われ、現在は医薬品として広く使用されている。

[0003] さらに、ヒスタミンは神経伝達物質として中枢神経及び末梢神経に存在するヒスタミン受容体（ヒスタミンH₃（H₃）受容体）に作用し、種々の生理機能を発揮することが明らかになった。この受容体は1999年にクローニングされ、その遺伝子配列およびアミノ酸配列が明らかになったが、H₁受容体及びH₂受容体とのアミノ酸配列相同性は、それぞれ22%、及び21.4%と低いものであった（非特許文献1参照）。H₃受容体はシナプス前膜に存在し、ヒスタミンの合成と遊離を制御するオートレセプターとして機能することが示された（非特許文献2参照）。また、H₃受容体は、ヒスタミンの放出を制御するとともに、アセチルコリン、セロトニン、ドパミン、ノルアドレナリンといった他の神経伝達物質の放出をも制御することが明

らかとなった（非特許文献 3 参照）。さらに、H 3 受容体は、アゴニストの不在下で活性であることが示唆されており、この活性は、逆作動物質として作用する化合物により阻害されることができる。これらの事実は、H 3 受容体拮抗物質、又は逆作動物質が、H 3 受容体により制御される神経伝達物質の放出を増大し、放出異常に関連した各種疾患の治療薬になりうることを示唆している。

[0004] 実際、動物モデルを用いた実験結果は、H 3 受容体拮抗物質、又は逆作動物質が、認知症、アルツハイマー病（非特許文献 4 及び 5 参照）、注意欠陥・多動性症（非特許文献 6 参照）、統合失調症（非特許文献 7 参照）、てんかん、中枢性痙攣などの治療薬として利用できる可能性を示している。

[0005] また、H 3 受容体が摂食行動に関与することが示されており（非特許文献 8 参照）、H 3 受容体拮抗物質、又は逆作動物質の適応疾患として肥満、糖尿病、高脂血症などの代謝系疾患も想定される。

[0006] また、ヒスタミンは脳内の日周リズムを調節し、覚醒と睡眠のバランスを保つ役割があることが示されており（非特許文献 9 及び 10 参照）、H 3 受容体拮抗物質、又は逆作動物質の適応疾患としてナルコレプシー、特発性過眠症、行動誘発性睡眠不足症候群、睡眠時無呼吸症候群、概日リズム障害、睡眠時随伴症、睡眠関連運動障害、不眠症、うつ病など睡眠障害に伴う疾患も想定される。

[0007] さらに、H 3 受容体は鼻粘膜の交感神経に存在していることが示され、H 3 受容体拮抗物質と H 1 受容体拮抗物質の併用により鼻閉が顕著に改善されることが報告されている（非特許文献 11 参照）。このことは、H 3 受容体拮抗物質、又は逆作動物質は単独で、又は H 1 受容体拮抗物質との併用でアレルギー性鼻炎等の治療に有用である可能性を示している。

[0008] H 3 受容体拮抗物質、又は逆作動物質については、複数のレビューにまとめられており（非特許文献 12～15 参照）、これらを参照することができる。初期にはヒスタミン自身をリード化合物としたイミダゾール系化合物が数多く報告されたが、薬物代謝酵素チトクロム P 4 5 0（CYP）の阻害作

用等の懸念が示され、医薬品として開発されるには至っていない。

[0009] 最近になって、非イミダゾール系のH₃受容体拮抗物質あるいは逆作動物質の文献及び特許が数多く報告されている（特許文献1～10参照）。

[0010] また、ピラゾール環等の5員芳香環を有するヒスタミンH₃受容体拮抗物質が報告されている（特許文献11～14参照）。更に、アリールオキシペリジン骨格を有するヒスタミンH₃受容体拮抗物質の中で、置換基として非置換ピロールを有する化合物が報告されている（特許文献15参照）。しかし、本発明に開示された構造を有する化合物についての報告はない。

先行技術文献

特許文献

- [0011] 特許文献1：WO2005097751 国際公開公報
特許文献2：WO2005097778 国際公開公報
特許文献3：WO2005118547 国際公開公報
特許文献4：WO2006014136 国際公開公報
特許文献5：WO2006045416 国際公開公報
特許文献6：WO2006046131 国際公開公報
特許文献7：WO2006059778 国際公開公報
特許文献8：WO2006061193 国際公開公報
特許文献9：WO2006107661 国際公開公報
特許文献10：WO2006103057 国際公開公報
特許文献11：WO2006103045 国際公開公報
特許文献12：WO2007094962 国際公開公報
特許文献13：WO2008072724 国際公開公報
特許文献14：WO2009063953 国際公開公報
特許文献15：WO2002012190 国際公開公報

非特許文献

- [0012] 非特許文献1：Lovenberg T.W. ら、Molecular pharmacology, 55, 1101-1107, 1999

非特許文献2 : Arrang J-M. ら、Nature, 302, 832-837, 1983

非特許文献3 : Brown R.E. ら、Progress in Neurobiology, 63, 637-672, 2001

非特許文献4 : Huang Y-W. ら、Behavioural Brain Research, 151, 287-293, 2004

非特許文献5 : Komater V.A. ら、Behavioural Brain Research, 159, 295-300, 2005

非特許文献6 : Passani M.B. ら、Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 24, 107-113, 2000

非特許文献7 : Fox G.B. ら、J. Pharmacol. Exp. Ther., 313, 176-190, 2005

非特許文献8 : Hancock A.A. ら、Curr. Opin. Investig. Drug, 4, 1190-1197

非特許文献9 : Huang Z-L. ら、Prog. Natr. Acad. Sci., 103, 4687-4692, 2006

非特許文献10 : Babier A.J. ら、Br. J. Pharmacol., 143, 649-661, 2004

非特許文献11 : McLeod R.L. ら、Am. J. Rhinol., 13, 391-399, 1999

非特許文献12 : Schwartz J.C. ら、Trends in Pharmacol. Sci., 7, 24-28, 1986

非特許文献13 : Passani M.B. ら、Trends in Pharmacol. Sci., 25, 618-625, 2004

非特許文献14 : Leurs R. ら、Nature Drug Discovery, 4, 107-122, 2005

非特許文献15 : Leurs R. ら、Drug Discovery Today, 10, 1613-1627, 2005

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0013] 本発明は、ヒスタミンH₃受容体へのヒスタミンの結合に対し強力な阻害作用を有し、ヒスタミンH₃受容体に起因する障害、例えば、認知症、アルツハイマー病、注意欠陥・多動性症、統合失調症、てんかん、中枢性痙攣、肥満、糖尿病、高脂血症、ナルコレプシー、特発性過眠症、行動誘発性睡眠

不足症候群、睡眠時無呼吸症候群、概日リズム障害、睡眠時随伴症、睡眠関連運動障害、不眠症、うつ病、若しくはアレルギー性鼻炎等の疾患の予防又は治療に有用な新規な化合物又はその医薬上許容される塩を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段


[0014] 本発明者らは上記目的のため鋭意研究を行った結果、ピロールの3位がカルボニルを有する基で置換されているフェニルピロール誘導体が、ヒスタミンH₃受容体へのヒスタミンの結合に対して強力な阻害活性を有することを見出し、本発明を完成した。

[0015] 以下、本発明を詳細に説明する。本発明の態様（以下、化合物の態様を「本発明化合物」という）は以下に示すものである。

[0016] すなわち、本発明は、


(1) 式 (I)

[0017] [化1]



[0018] [式 (I) 中、Qは、下記式 (A) 又は (B) で表される基を示し、

[0019] [化2]



[0020] R¹は、ヒドロキシ、C₁～C₆アルコキシ又はNR^{1A}R^{1B}を示し、

R^{1A}及びR^{1B}は、同一又は異なって、水素原子、C₁～C₆アルキル又はC₃～C₇シクロアルキルを示し、

又はR^{1A}及びR^{1B}は、隣接する窒素原子と一緒に互いに結合した3～7員の飽和複素環（該飽和複素環は1又は2個のC₁～C₆アルキルで置換され

てもよい。)を形成してもよく、

R^2 は、水素原子、ハロゲン原子又は $C_1 \sim C_6$ アルキルを示し、

n は、1又は2を示し、

R^3 は、水素原子、ハロゲン原子又は $C_1 \sim C_6$ アルキルを示し、

R^4 は、 $C_1 \sim C_6$ アルキル（該 $C_1 \sim C_6$ アルキルは1又は2個の $C_3 \sim C_7$ シクロアルキルで置換されてもよい。）又は $C_3 \sim C_7$ シクロアルキル（該 $C_3 \sim C_7$ シクロアルキルは1又は2個の $C_1 \sim C_6$ アルキルで置換されてもよい。）を示し、


R^5 及び R^6 は、同一又は異なって、 $C_1 \sim C_6$ アルキル又は $C_3 \sim C_7$ シクロアルキルを示し、

又は R^5 及び R^6 は、隣接する窒素原子と一緒に互いに結合した3～7員の飽和複素環（該飽和複素環は1又は2個の $C_1 \sim C_6$ アルキルで置換されてもよい。）を形成してもよい。]

で表される化合物、又はその医薬上許容される塩、

(2) Q が式(A)

[0021] [化3]



[0022] (式中、 R^4 は、(1)で定義された通りである)

である、(1)に記載の化合物、又はその医薬上許容される塩、

(3) R^1 が $NR^{1A}R^{1B}$ （式中、 R^{1A} 及び R^{1B} は、(1)で定義された通りである）である、(1)又は(2)に記載の化合物、又はその医薬上許容される塩、

(4) R^2 及び R^3 が水素原子であり、 n が1である、(1)～(3)のいずれかに記載の化合物、又はその医薬上許容される塩、

(5) R^4 が $C_3 \sim C_7$ シクロアルキルである、(1)～(4)のいずれかに記載の化合物、又はその医薬上許容される塩、

(6) (1) ~ (5) のいずれかに記載の化合物、又はその医薬上許容される塩を有効成分として含有する医薬、

(7) ヒスタミンH₃受容体拮抗剤又は逆作動剤である、(6)に記載の医薬、又は

(8) 認知症、アルツハイマー病、注意欠陥・多動性症、統合失調症、てんかん、中枢性痙攣、肥満、糖尿病、高脂血症、ナルコレプシー、特発性過眠症、行動誘発性睡眠不足症候群、睡眠時無呼吸症候群、概日リズム障害、睡眠時随伴症、睡眠関連運動障害、不眠症、うつ病、若しくはアレルギー性鼻炎の予防剤又は治療剤である、(6)又は(7)に記載の医薬である。

発明の効果

[0023] 本発明の化合物は、優れたヒスタミンH₃受容体拮抗作用を有する。

発明を実施するための形態

[0024] 本明細書で用いられる用語は、以下に定義される通りである。

[0025] 本発明において、「ハロゲン原子」とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子を示す。

[0026] 「C₁~C₆アルキル」とは、炭素数1~6個の直鎖状又は分枝状のアルキル基を示し、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、n-ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル又はn-ヘキシル等の基を示す。

[0027] 「C₃~C₇シクロアルキル」とは、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル又はシクロヘプチルの基を示す。

[0028] 「C₁~C₆アルコキシ」とは、炭素数1~6個の直鎖状又は分枝状のアルコキシ基を示し、例えば、メトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-ブトキシ、イソブトキシ、sec-ブトキシ、tert-ブトキシ、n-ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ネオペンチルオキシ又はn-ヘキシルオキシ等の基を示す。


「隣接する窒素原子と一緒に互いに結合した3~7員の飽和複素環」とは、前記窒素原子を含み、さらにO、N、およびSから選択される1個の

ヘテロ原子を含んでもよい、3～7個の環構成原子から構成される飽和の単環若しくはスピロ環を示し、例えば、1-アジリジニル、1-アゼチジニル、1-ピロリジニル、ピペリジノ、1-アゼパニル、モルホリノ又は2-オキサー6-アザスピロ[3, 3]ヘプタン-6-イル等の基があげられる。

[0029] 本発明化合物の好ましい態様を以下に示す。

[0030] 本発明の式(1)の化合物の好ましい1つの態様は、Qが式(A)である。

[0031] [化4]



[0032] (式中、 R^4 は、 $C_1 \sim C_6$ アルキル(該 $C_1 \sim C_6$ アルキルは1又は2個の $C_3 \sim C_7$ シクロアルキルで置換されてもよい。)又は $C_3 \sim C_7$ シクロアルキル(該 $C_3 \sim C_7$ シクロアルキルは1又は2個の $C_1 \sim C_6$ アルキルで置換されてもよい。))を示す。)

式(A)における R^4 は好ましくは、 $C_3 \sim C_7$ シクロアルキルであり、さらに好ましくは、シクロブチルである。

[0033] 本発明の式(1)の化合物の好ましい1つの態様は、 R^1 が $N R^{1A} R^{1B}$ である(式中、 R^{1A} 及び R^{1B} は、同一又は異なって、水素原子、 $C_1 \sim C_6$ アルキル又は $C_3 \sim C_7$ シクロアルキルを示し、又は R^{1A} 及び R^{1B} は、隣接する窒素原子と一緒に互いに結合した3～7員の飽和複素環(該飽和複素環は1又は2個の $C_1 \sim C_6$ アルキルで置換されてもよい。))を形成してもよい)。

[0034] 本発明の式(1)の化合物の好ましい1つの態様は、 R^2 及び R^3 が水素原子であり、 n が1である。

[0035] 本発明の化合物における望ましいプロファイルとしては、薬効が優れていること、体内動態が優れていること(経口吸収性が良い・特定の組織に蓄積性を有さない)、医薬品として優れた物性を示すこと、低毒性であること、等が挙げられる。本発明の好ましい化合物は、薬物の脳移行性を制御してい

る排出トランスポーターであるP-糖タンパク質の基質としての認識性が低いため、優れた脳内移行性を有することが期待される。

[0036] 本発明において、医薬上許容される塩とは、例えば、硫酸、塩酸、臭化水素酸、リン酸、硝酸などの無機酸との塩、酢酸、シュウ酸、コハク酸、乳酸、酒石酸、フマル酸、マレイン酸、クエン酸、ベンゼンスルホン酸、メタンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸、安息香酸、カンファースルホン酸、エタンスルホン酸、グルコヘプトン酸、グルコン酸、グルタミン酸、グリコール酸、リンゴ酸、マロン酸、マンデル酸、ガラクトール酸、ナフタレン-2-スルホン酸などの有機酸との塩、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、亜鉛イオン、アルミニウムイオンなどの1種又は複数の金属イオンとの塩、アンモニア、アルギニン、リシン、ピペラジン、コリン、ジエチルアミン、4-フェニルシクロヘキシルアミン、2-アミノエタノール、ベンザチンなどのアミンとの塩が含まれる。

[0037] 本発明の化合物は、各種溶媒和物としても存在し得る。また、医薬としての適用性の面から水和物の場合もある。

[0038] 本発明の化合物は、エナンチオマー、ジアステレオマー、平衡化合物、これらの任意の割合の混合物、ラセミ体等の全ての形態を包含する。個々の異性体は公知の方法、例えば光学活性な出発物質若しくは中間体の使用、中間体若しくは最終生成物の製造における光学選択的な反応又はジアステレオ選択的な反応、或いは中間体又は最終生成物の製造におけるクロマトグラフィーを用いた分離等により得ることが可能である。

[0039] 本発明の化合物には、一つ以上の水素原子、炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫黄原子が放射性同位元素や安定同位元素と置換された化合物も含まれる。これらの標識化合物は、例えば代謝や薬物動態研究、受容体のリガンドとして生物学的分析等に有用である。

[0040] 本発明の化合物、又はその医薬上許容される塩は、一つ又は二つ以上の医薬的に許容される担体、賦形剤又は希釈剤と組み合わせて医薬的製剤とするこ

とができる。上記担体、賦形剤及び希釈剤として、例えば水、乳糖、デキストロース、フラクトース、ショ糖、ソルビトール、マンニトール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、デンプン、ガム、ゼラチン、アルギネート、ケイ酸カルシウム、リン酸カルシウム、セルロース、水シロップ、メチルセルロース、ポリビニルピロリドン、アルキルパラヒドロキシベンゾソルベート、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、グリセリン、ゴマ油、オリーブ油、大豆油等の各種油等が含まれる。

[0041] また、上記の担体、賦形剤又は希釈剤に必要な応じて一般に使用される増量剤、結合剤、崩壊剤、pH調整剤、溶解剤等の添加剤を混合し、常用の製剤技術によって錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、粉剤、液剤、乳剤、懸濁剤、軟膏剤、注射剤、皮膚貼付剤等の経口又は非経口用医薬として調製することができる。本発明の化合物は、成人患者に対して1回の投与量として0.001～500mgを1日1回又は数回に分けて経口又は非経口で投与することが可能である。なお、この投与量は治療対象となる疾病の種類、患者の年齢、体重、症状等により適宜増減することが可能である。

[0042] 本発明の化合物、又はその医薬上許容される塩を有効成分として含有する医薬は、ヒスタミンH₃受容体拮抗剤又は逆作動剤として有用である。

[0043] また、本発明の化合物、又はその医薬上許容される塩を有効成分として含有する医薬は、認知症、アルツハイマー病、注意欠陥・多動性症、統合失調症、てんかん、中枢性痙攣、肥満、糖尿病、高脂血症、ナルコレプシー、特発性過眠症、行動誘発性睡眠不足症候群、睡眠時無呼吸症候群、概日リズム障害、睡眠時随伴症、睡眠関連運動障害、不眠症、うつ病、若しくはアレルギー性鼻炎の予防剤又は治療剤として有用である。


[0044] 本発明の化合物は、公知の有機化学的手法によって製造することができる。以下の反応式による方法は、本発明の化合物の製造法の例示であり、これに限定されるものではない。下記反応式1～4において、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶及びnは前記と同義である。また、X、Y¹及びY²は、同一又は異なって、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子又はメタン

ルホニルオキシ基、ベンゼンスルホニルオキシ基、p-トルエンスルホニルオキシ基、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基等の有機スルホニルオキシ基等の脱離基を示す。

[0045] 以下、反応式1で示される本発明の化合物の製造方法について説明する。
この製造工程は、化合物(1)から本発明の化合物(1A)を製造するための工程である。

(反応式1)

[0046] [化5]



[0047] (工程1a)

工程1aは、化合物(1)と化合物(2)とをカップリング反応により縮合して化合物(3)を得るための工程である。化合物(1)及び(2)は、公知化合物であるか、公知化合物から容易に合成できる化合物である。

[0048] Y¹がハロゲン原子又は有機スルホニルオキシ基等の脱離基である場合、該カップリング反応は、塩基の存在下又は非存在下、溶媒中又は無溶媒でフェノールのヒドロキシル基のアルキル化を行う一般的な方法により実施できる。また、必要に応じて、例えば、ヨウ化カリウム、臭化ナトリウム等の添加物を加えることができる。本反応で用いられる塩基としては、例えば、ピリジン、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等の有機塩基類；tert-ブトキシカリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水素化ナトリウム等の無機塩基類が挙げられる。本反応で用いられる溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類；テトラヒドロフラン、1,2-ジメトキシエタン、1,4-ジオキサン等のエーテル類；トルエン、ベンゼン等の炭化水素類；クロロホルム、ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素類；N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド

、N-メチル-2-ピロリドン等のアミド類；アセトン、2-ブタノン等のケトン類；ジメチルスルホキシド；アセトニトリル；水又はこれらの混合溶媒が挙げられる。本反応における反応温度は、通常0℃～200℃、好ましくは、15℃～150℃であり、反応時間は、通常1～48時間、好ましくは、1～16時間である。

[0049] Y¹が水酸基である場合、該カップリング反応としてはミツノブ反応が挙げられ、例えば、トリフェニルホスフィン、トリブチルホスフィン等の有機リン化合物とアゾジカルボン酸ジエチル、アゾジカルボン酸ジイソプロピル、アゾジカルボン酸ジtertブチル等のアゾ化合物とを組み合わせた試薬、或いはシアノメチルトリブチルホスホラン等のリンイリド試薬の存在下溶媒中で行う方法が挙げられる。本反応で用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、1,2-ジメトキシエタン、1,4-ジオキサン等のエーテル類；トルエン、ベンゼン等の炭化水素類；クロロホルム、ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素類；N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン等のアミド類；アセトン、2-ブタノン等のケトン類；ジメチルスルホキシド；アセトニトリル又はこれらの混合溶媒が挙げられる。本反応における反応温度は、通常0℃～150℃、好ましくは、15℃～100℃であり、反応時間は、通常1～48時間、好ましくは、1～16時間である。

(工程2a)


工程2aは、化合物(3)と化合物(4)とをクロスカップリング反応により縮合して本発明の化合物(IA)を得るための工程である。化合物(4)は、公知化合物であるか、公知化合物から容易に合成できる化合物である。該クロスカップリング反応は、触媒及びそのリガンドの存在下溶媒中で反応を行う一般的な方法により実施でき、例えば、Kunzら, Synlett, 2003年, 15巻, 2428-2439頁に記載の方法又はそれに準じた方法に従って実施できる。また、本反応は塩基の存在下行うことが好ましい。本反応で用いられる触媒としては、銅、ニッケル又はパラジウム等の

クロスカップリング反応に一般的に用いられる遷移金属触媒が挙げられ、より具体的には、銅(0)、ヨウ化銅(Ⅰ)、塩化銅(Ⅰ)、酸化銅(Ⅰ)、臭化銅(Ⅰ) トリストリフェニルホスフィン錯体、トリフルオロメタンスルホン酸銅(Ⅰ) ベンゼン錯体、硫酸銅(Ⅱ)、酢酸パラジウム(Ⅱ)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)、ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(Ⅱ)クロリド、[1, 1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]パラジウム(Ⅱ)ジクロリド、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)、ビス(アセチルアセトナト)ニッケル(Ⅱ)等が挙げられる。本反応で用いられるリガンドとしては、金属触媒を用いる縮合反応に一般的に用いられるリガンド、例えば、N, N'-ジメチルエチレンジアミン、N, N'-ジメチルシクロヘキサン-1, 2-ジアミン、2-アミノピリジン、1, 10-フェナンスロリン、3, 4, 7, 8-テトラメチル-1, 10-フェナンスロリン、2-ヒドロキシベンズアルデヒドオキシム、エチレングリコール、トリフェニルホスフィン、トリ-tert-ブチルホスフィン等が挙げられる。本反応で用いられる塩基としては、例えば、炭酸カリウム、リン酸カリウム、水酸化カリウム、tert-ブトキシカリウム、tert-ブトキシナトリウム、炭酸セシウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、酢酸ナトリウム、ナトリウムメトキシド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド等が挙げられる。本反応で用いられる溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類；テトラヒドロフラン、1, 2-ジメトキシエタン、1, 4-ジオキサン等のエーテル類；トルエン、ベンゼン等の炭化水素類；クロロホルム、ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素類；N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン等のアミド類；アセトン、2-ブタノン等のケトン類；ジメチルスルホキシド；アセトニトリル；水又はこれらの混合溶媒が挙げられる。本反応における反応温度は、通常0℃～200℃、好ましくは、40℃～150℃であり、反応時間は、通常1～48時間、好ましくは、1～16時間である。

[0050] また、化合物（I A）は、反応式 2 に示す方法に従って製造することもできる。

（反応式 2）

[0051] [化6]



[0052] （工程 3 a）

工程 3 a は、本発明の化合物（I A）のうち R^1 = メトキシ基である化合物（5）のメトキシカルボニル基を加水分解によりカルボン酸に変換して R^1 = ヒドロキシ基である本発明の化合物（6）を得るための工程である。該加水分解反応は、一般的なエステルの加水分解反応により実施することができ、例えば、強酸存在下溶媒中又は無溶媒で反応させる方法、塩基存在下溶媒中で反応させる方法等、T. W. Greene and P. G. M. Wuts 著 *Protective Groups in Organic Synthesis*、第4版、John Wiley and Sons 社に記載の方法又はそれに準じた方法に従って実施できる。本反応における反応温度は、通常 0°C ~ 120°C 、好ましくは、 15°C ~ 80°C であり、反応時間は、通常 1 ~ 48 時間、好ましくは、1 ~ 12 時間である。

（工程 4 a）


工程 4 a は、化合物（6）とアミン誘導体（7）とをカップリング反応により縮合し、本発明の化合物（I A）を得るための工程である。アミン誘導体（7）は、公知化合物であるか、公知化合物から容易に合成できる化合物

である。該カップリング反応は、一般的なカルボン酸のアミド化の方法により実施でき、例えば、カルボン酸をカルボン酸クロリドやカルボン酸ブロミド等のカルボン酸ハライドに導いた後にアミンと反応させる方法、カルボン酸とクロル炭酸エステル等から得られる混合酸無水物をアミンと反応させる方法、カルボン酸を1-ベンゾトリアゾリルエステルやスクシンイミジルエステル等の活性エステルに導いた後にアミンと反応させる方法、カルボン酸を脱水縮合剤存在下アミンと反応させる方法等が挙げられる。これらの反応は、全て塩基の存在下又は非存在下、溶媒中で行うことができる。本反応で用いられる脱水縮合剤としては、例えば、3-(3-ジメチルアミノプロピル)-1-エチルカルボジイミド塩酸塩、ジシクロヘキシルカルボジイミド、ジフェニルホスホリルアジド、カルボニルジイミダゾール等が挙げられ、必要に応じて1-ヒドロキシベンゾトリアゾール、ヒドロキシスクシンイミド等の活性化剤を用いることができる。本反応で用いられる塩基としては、例えば、ピリジン、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム等が挙げられる。本反応で用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等のエーテル類；トルエン、ベンゼン等の炭化水素類；クロロホルム、ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素類；N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン等のアミド類；アセトン、2-ブタノン等のケトン類；ジメチルスルホキシド；アセトニトリル；水又はこれらの混合溶媒が挙げられ、これらのうち、トルエン、テトラヒドロフラン又はN,N-ジメチルホルムアミドが好ましい。本反応における反応温度は、通常0℃～120℃、好ましくは、15℃～40℃であり、反応時間は、通常1～48時間、好ましくは、1～12時間である。

[0053] 以下、反応式3で示される本発明の化合物の製造方法について説明する。この製造工程は、化合物(1)から本発明の化合物(1B)を製造するための工程である。

(反応式3)

[0054] [化7]



[0055] (工程 1 b)

工程 1 b は、化合物 (1) と化合物 (8) とのカップリング反応により化合物 (9) を得るための工程である。化合物 (8) は、公知化合物であるか、公知化合物から容易に合成できる化合物である。該カップリング反応は、工程 1 a と同様の方法により実施できる。

(工程 2 b)


工程 2 b は、化合物 (9) と化合物 (4) とをクロスカップリング反応により縮合して本発明の化合物 (I B) を得るための工程である。該カップリング反応は、工程 2 a と同様の方法により実施できる。

[0056] また、化合物 (I B) は、反応式 4 に示す方法に従って製造することもできる。

(反応式 4)

[0057]

[化8]



[0058] (工程 3 b)

工程 3 b は、本発明の化合物 (I B) のうち R^1 = メトキシ基である化合物 (9) のメトキシカルボニル基を加水分解によりカルボン酸に変換して R^1 = ヒドロキシ基である本発明の化合物 (10) を得るための工程である。該加水分解反応は、工程 3 a と同様の方法により実施できる。

(工程 4 b)

工程 4 b は、化合物 (10) とアミン誘導体 (7) とをカップリング反応により縮合し、本発明の化合物 (I B) を得るための工程である。該カップリング反応は、工程 4 a と同様の方法により実施できる。

実施例

[0059] 以下に実施例及び試験例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0060] 実施例中記載の各機器データは以下の測定機器で測定した。

MS スペクトル: micromass Platform LC 又は micromass GCT


NMR スペクトル: [^1H -NMR] 600 MHz: JNM-ECA600 (日本電子)

(実施例 1)

メチル 1- {4- [(1-シクロブチルピペリジン-4-イル) オキシ]

フェニル} - 1 H - ピロール - 3 - カルボキシラート (化合物番号 1) の製造

[0061] [化9]



[0062] 1 - シクロブチル - 4 - (4 - ヨードフェノキシ) ピペリジン (3 g、WO 2008072703に記載の方法に従って合成できる)、メチル 1 H - ピロール - 3 - カルボン酸 (1.75 g)、N, N' - ジメチルエチレンジアミン (0.592 g)、ヨウ化銅 (0.32 g) 及び炭酸セシウム (2.32 g) のトルエン (8.4 mL) 懸濁液を 110℃にて4時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、クロロホルムを加え、セライト (登録商標) 濾過した。濾液を減圧下濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (NH型シリカゲル、展開溶媒: n - ヘキサン / 酢酸エチル = 88 / 12 ~ 0 / 100) にて精製して無色固体の表題化合物 (1.42 g) を得た。

¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.61 - 1.74 (m, 2 H) 1.78 - 1.92 (m, 4 H) 1.95 - 2.08 (m, 4 H) 2.10 - 2.27 (m, 2 H) 2.62 (br. s., 2 H) 2.73 (t, J=8.05 Hz, 1 H) 3.82 (s, 3 H) 4.32 (br. s., 1 H) 6.71 (dd, J=2.89, 1.65 Hz, 1 H) 6.88 - 6.92 (m, 1 H) 6.93 - 6.99 (m, 2 H) 7.26 - 7.31 (m, 2 H) 7.58 (t, J=1.86 Hz, 1 H)


MS (ESI/APCI Dual) (Positive) m/z; (M+H)⁺ 355

(実施例 2)

1 - {4 - [(1 - シクロブチルピペリジン - 4 - イル) オキシ] フェニル} - 1 H - ピロール - 3 - カルボン酸 (化合物番号 2) の製造

[0063]

[化10]



[0064] 実施例1で合成したメチル 1- {4- [(1-シクロブチルピペリジン-4-イル) オキシ] フェニル} -1H-ピロール-3-カルボキシレート (1.4 g) のエタノール (8 mL) 溶液に6規定水酸化ナトリウム水溶液 (1.32 mL) を加え、60℃にて4時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え、クロロホルムで抽出した。水層を塩酸で中和し、クロロホルムで抽出した。有機層を併せて硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下濃縮して無色非晶質の表題化合物 (1.22 g) を得た。


¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.52 - 3.32 (m, 15 H) 4.13 - 4.87 (m, 1 H) 6.76 (dd, J=2.89, 1.65 Hz, 1 H) 6.86 - 7.03 (m, 3 H) 7.31 (d, J=8.67 Hz, 2 H) 7.58 - 7.68 (m, 1 H)

MS (ESI/APCI Dual) (Positive) m/z; (M+H)⁺ 341

(実施例3)

アゼチジン-1-イル (1- {4- [(1-シクロブチルピペリジン-4-イル) オキシ] フェニル} -1H-ピロール-3-イル) メタノン (化合物番号3) の製造

[0065] [化11]



[0066] 実施例2で合成した1- {4- [(1-シクロブチルピペリジン-4-イル) オキシ] フェニル} -1H-ピロール-3-カルボン酸 (0.1 g)、1- {3- (ジメチルアミノ) プロピル} -3-エチルカルボジイミド塩酸塩 (0.085 g)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物 (0.067


g) 及びアジリジン (0.034 g) を N, N-ジメチルホルムアミド (0.1 ml) に加えて懸濁液とし、室温にて 16 時間攪拌した。反応混合物に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を減圧下濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (NH 型シリカゲル、展開溶媒: n-ヘキサン/酢酸エチル = 88/12 ~ 0/100) にて精製して無色固体の表題化合物 (0.056 g) を得た。

¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.60 - 1.73 (m, 2 H) 1.76 - 1.93 (m, 4 H) 1.95 - 2.08 (m, 4 H) 2.10 - 2.22 (m, 2 H) 2.34 (t, J=7.64 Hz, 2 H) 2.54 - 2.68 (m, 2 H) 2.70 - 2.82 (m, 1 H) 4.11 - 4.23 (m, 2 H) 4.28 - 4.35 (m, 1 H) 4.37 - 4.55 (m, 2 H) 6.53 (dd, J=2.89, 1.65 Hz, 1 H) 6.83 - 7.00 (m, 3 H) 7.25 - 7.33 (m, 2 H) 7.44 (t, J=1.86 Hz, 1 H)

MS (ESI/APCI Dual) (Positive) m/z; (M+H)⁺ 380

実施例 3 に示した方法と同様の方法で以下の表 1-1 及び 1-2 に示す化合物 (化合物番号 4 ~ 13) を製造した。

[0067] [化12]






[0068]

[表1-1]

化合物 番号	R ¹	名前	MS ESI/APCI observe MH ⁺	NMR
4		(1-[4-[(1-シクロブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル]-1H-ピロール-3-イル)(ピロリジン-1-イル)メタノン	394	¹ H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.60 - 1.74 (m, 2 H) 1.79 - 2.08 (m, 12 H) 2.08 - 2.27 (m, 2 H) 2.50 - 2.68 (m, 2 H) 2.69 - 2.83 (m, 1 H) 3.54 - 3.68 (m, 2 H) 3.69 - 3.85 (m, 2 H) 4.17 - 4.46 (m, 1 H) 6.59 - 6.67 (m, 1 H) 6.91 (s, 1 H) 6.94 (d, J=8.67 Hz, 2 H) 7.28 (d, J=8.67 Hz, 2 H) 7.44 - 7.49 (m, 1 H)
5		(1-[4-[(1-シクロブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル]-1H-ピロール-3-イル)(ピペリジン-1-イル)メタノン	408	¹ H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.57 - 1.74 (m, 8 H) 1.78 - 1.94 (m, 4 H) 1.95 - 2.08 (m, 4 H) 2.09 - 2.22 (m, 2 H) 2.57 - 2.66 (m, 2 H) 2.69 - 2.81 (m, 1 H) 3.59 - 3.76 (m, 4 H) 4.23 - 4.38 (m, 1 H) 6.41 (br. s, 1 H) 6.85 - 6.92 (m, 1 H) 6.94 (d, J=8.67 Hz, 2 H) 7.23 - 7.32 (m, 3 H)
6		1-[4-[(1-シクロブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル]-N, N-ジメチル-1H-ピロール-3-カルボキサミド	388	¹ H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.62 - 1.75 (m, 2 H) 1.78 - 1.94 (m, 4 H) 1.96 - 2.08 (m, 4 H) 2.10 - 2.22 (m, 2 H) 2.55 - 2.66 (m, 2 H) 2.68 - 2.81 (m, 1 H) 3.00 - 3.38 (m, 6 H) 4.19 - 4.43 (m, 1 H) 6.46 - 6.54 (m, 1 H) 6.86 - 6.91 (m, 1 H) 6.94 (d, J=9.08 Hz, 2 H) 7.27 (d, J=8.67 Hz, 2 H) 7.36 (br. s, 1 H)
7		1-[4-[(1-シクロブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル]-N-メチル-1H-ピロール-3-カルボキサミド	354	¹ H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.62 - 1.74 (m, 2 H) 1.79 - 1.92 (m, 4 H) 1.96 - 2.07 (m, 4 H) 2.10 - 2.24 (m, 2 H) 2.53 - 2.67 (m, 2 H) 2.69 - 2.79 (m, 1 H) 2.96 (d, J=4.95 Hz, 3 H) 4.19 - 4.38 (m, 1 H) 5.63 - 5.84 (m, 1 H) 6.40 - 6.53 (m, 1 H) 6.87 - 6.92 (m, 1 H) 6.95 (d, J=9.08 Hz, 2 H) 7.23 - 7.31 (m, 2 H) 7.49 - 7.55 (m, 1 H)
8		1-[4-[(1-シクロブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル]-1H-ピロール-3-カルボキサミド	340	¹ H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.62 - 1.74 (m, 2 H) 1.76 - 1.92 (m, 4 H) 1.96 - 2.08 (m, 4 H) 2.11 - 2.24 (m, 2 H) 2.55 - 2.67 (m, 2 H) 2.69 - 2.80 (m, 1 H) 4.25 - 4.41 (m, 1 H) 5.14 - 5.69 (m, 2 H) 6.51 (dd, J=2.89, 1.65 Hz, 1 H) 6.90 - 6.98 (m, 3 H) 7.26 - 7.31 (m, 2 H) 7.55 (t, J=2.06 Hz, 1 H)

[0069]

[表1-2]


化合物 番号	R ¹	名前	MS ESI/APCI observe MH ⁺	NMR
9		(1-[4-[(1-シクロブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル]-1H-ピロール-3-イル)(モルホリン-4-イル)メタン	410	¹ H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.52 - 1.65 (m, 2 H) 1.69 - 1.85 (m, 4 H) 1.87 - 2.00 (m, 4 H) 2.03 - 2.15 (m, 2 H) 2.43 - 2.59 (m, 2 H) 2.61 - 2.72 (m, 1 H) 3.56 - 3.75 (m, 8 H) 4.15 - 4.31 (m, 1 H) 6.33 (dd, J=2.89, 1.65 Hz, 1 H) 6.83 (t, J=2.68 Hz, 1 H) 6.87 (d, J=9.08 Hz, 2 H) 7.18 - 7.21 (m, 2 H) 7.25 (t, J=2.06 Hz, 1 H)
10		(1-[4-[(1-シクロブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル]-1H-ピロール-3-イル)[(2R, 6S)-2, 6-ジメチルモルホリン-4-イル]メタン	438	¹ H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) d ppm 1.20 (d, J=5.78 Hz, 6 H) 1.60 - 1.75 (m, 2 H) 1.79 - 1.93 (m, 4 H) 1.95 - 2.08 (m, 4 H) 2.10 - 2.24 (m, 2 H) 2.42 - 2.97 (m, 5 H) 3.52 - 3.72 (m, 2 H) 4.15 - 4.58 (m, 3 H) 6.34 - 6.46 (m, 1 H) 6.91 (d, J=2.48 Hz, 1 H) 6.95 (d, J=9.08 Hz, 2 H) 7.27 (d, J=9.08 Hz, 2 H) 7.32 (d, J=1.65 Hz, 1 H)
11		(1-[4-[(1-シクロブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル]-1H-ピロール-3-イル)(2-オキサ-6-アザスピロ[3.3]ヘプタ-6-イル)メタン	422	¹ H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.61 - 1.76 (m, 2 H) 1.78 - 1.93 (m, 4 H) 1.96 - 2.08 (m, 4 H) 2.12 - 2.22 (m, 2 H) 2.53 - 2.68 (m, 2 H) 2.69 - 2.78 (m, 1 H) 4.18 - 4.67 (m, 5 H) 4.76 - 4.87 (m, 4 H) 6.48 - 6.53 (m, 1 H) 6.89 - 6.93 (m, 1 H) 6.95 (d, J=9.08 Hz, 2 H) 7.27 (d, J=8.67 Hz, 2 H) 7.40 - 7.45 (m, 1 H)
12		N-tert-ブチル-1-[4-[(1-シクロブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル]-1H-ピロール-3-カルボキサミド	396	¹ H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.45 (s, 9 H) 1.60 - 1.76 (m, 2 H) 1.78 - 1.93 (m, 4 H) 1.96 - 2.08 (m, 4 H) 2.10 - 2.23 (m, 2 H) 2.50 - 2.67 (m, 2 H) 2.70 - 2.80 (m, 1 H) 4.20 - 4.42 (m, 1 H) 5.57 - 5.65 (m, 1 H) 6.38 - 6.44 (m, 1 H) 6.85 - 6.91 (m, 1 H) 6.94 (d, J=9.08 Hz, 2 H) 7.24 - 7.28 (m, 2 H) 7.45 - 7.49 (m, 1 H)
13		N-シクロブチル-1-[4-[(1-シクロブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル]-1H-ピロール-3-カルボキサミド	394	¹ H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.59 - 1.77 (m, 4 H) 1.79 - 2.08 (m, 10 H) 2.10 - 2.21 (m, 2 H) 2.35 - 2.46 (m, 2 H) 2.51 - 2.66 (m, 2 H) 2.68 - 2.79 (m, 1 H) 4.22 - 4.39 (m, 1 H) 4.50 - 4.66 (m, 1 H) 5.78 - 5.92 (m, 1 H) 6.40 - 6.50 (m, 1 H) 6.86 - 6.92 (m, 1 H) 6.94 (d, J=8.67 Hz, 2 H) 7.27 (d, J=8.67 Hz, 2 H) 7.50 (br.s, 1 H)

[0070] (実施例4)

メチル 1 - {4 - [(1-シクロブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル} - 2, 5-ジメチル-1H-ピロール-3-カルボキシラート (化合物番号14) の製造

[0071]

[化13]



[0072] 実施例 1 と同様の手法により、メチル 1 H-ピロール-3-カルボン酸の代わりにメチル 2, 5-ジメチル-1 H-ピロール-3-カルボン酸を用いて無色非晶質の表題化合物を得た。


¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.60 – 1.73 (m, 2 H) 1.77 – 1.90 (m, 4 H) 1.93 (s, 3 H) 1.97 – 2.07 (m, 4 H) 2.08 – 2.20 (m, 2 H) 2.25 (s, 3 H) 2.53 – 2.78 (m, 3 H) 3.77 (s, 3 H) 4.33 (br. s., 1 H) 6.30 (d, J=1.24 Hz, 1 H) 6.88 – 6.96 (m, 2 H) 7.00 – 7.08 (m, 2 H)

MS (ESI/APCI Dual) (Positive) m/z; (M+H)⁺ 383

(実施例 5)

(1 – {4 – [(1-シクロブチルピペリジン-4-イル) オキシ] フェニル} – 2, 5-ジメチル-1 H-ピロール-3-イル) (ピロリジン-1-イル) メタノン (化合物番号 15) の製造

[0073] [化14]



[0074] 実施例 4 で合成したメチル 1 – {4 – [(1-シクロブチルピペリジン-4-イル) オキシ] フェニル} – 2, 5-ジメチル-1 H-ピロール-3-カルボキシラート (0.06 g) 及びピロリジン (0.112 g) の混合物を封管中 100℃ にて 16 時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (NH 型プレパラティブシリカゲルプレート、0.5 mm 厚、展開溶媒: n-ヘキサン/酢酸エチル = 50/50) にて精製して無色固体の表題化合物を得た。


¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.59 – 1.93 (m, 12 H) 1.95 (s, 3 H) 1.98 – 2.09 (m, 4 H) 2.17 (s, 3 H) 2.64 (br. s., 2 H) 2.74 (t, J = 8.05 Hz, 1 H) 3.62 (d, J = 9.91 Hz, 4 H) 4.34 (br. s., 1 H) 6.06 (s, 1 H) 6.88 – 6.98 (m, 2 H) 7.02 – 7.11 (m, 2 H)

MS (ESI/APCI Dual) (Positive) m/z; (M+H)⁺ 422

(実施例 6)

[1 – (4 – {3 – [(2R) – 2 – メチルピロリジン – 1 – イル] プロポキシ} フェニル) – 1 H – ピロール – 3 – イル] (ピロリジン – 1 – イル) メタノン (化合物番号 16) の製造

[0075] [化15]



[0076] 実施例 1 と同様の手法により、1 – シクロブチル – 4 – (4 – ヨードフェノキシ) ピペリジンの代わりに (2R) – 1 – [3 – (4 – ヨードフェノキシ) プロピル] – 2 – メチルピロリジン (WO 2009063953 に記載の方法に従って合成できる) を、メチル 1 H – ピロール – 3 – カルボン酸の代わりに 3 – (ピロリジン – 1 – イルカルボニル) – 1 H – ピロールを、それぞれ用いて無色非晶質の表題化合物を得た。


¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.08 (d, J = 5.78 Hz, 3 H) 1.35 – 1.48 (m, 1 H) 1.63 – 1.83 (m, 2 H) 1.85 – 2.04 (m, 3 H) 2.11 (d, J = 9.08 Hz, 1 H) 2.16 – 2.23 (m, 1 H) 2.25 – 2.33 (m, 1 H) 2.92 – 2.99 (m, 1 H) 3.17 (d, J = 2.48 Hz, 1 H) 3.65 (br. s., 4 H) 3.73 (br. s., 4 H) 3.96 – 4.15 (m, 2 H) 6.63 (dd, J = 3.10, 1.86 Hz, 1 H) 6.89 – 6.97 (m, 3 H) 7.27 – 7.32 (m, 2 H) 7.45 – 7.49 (m, 1 H)

MS (ESI/APCI Dual) (Positive) m/z; (M+H)⁺ 382

(実施例 7)

(1- {4- [(1-イソプロピルピペリジン-4-イル) オキシ] フェニル} -1H-ピロール-3-イル) (ピロリジン-1-イル) メタノン (化合物番号17) の製造

[0077] [化16]



[0078] 実施例1と同様の手法により、メチル 1H-ピロール-3-カルボン酸の代わりに (1H-ピロール-3-イル) (ピロリジン-1-イル) メタノンを、1-シクロブチル-4- (4-ヨードフェノキシ) ピペリジンの代わりに4- (4-ヨードフェノキシ) -1-イソプロピルピペリジン (WO 2004 089373に記載の方法に従って合成できる) を用いて無色非晶質の表題化合物を得た。


¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.05 (d, J=6.61 Hz, 6 H) 1.74 - 2.07 (m, 8 H) 2.39 (br. s., 2 H) 2.66 - 2.84 (m, 3 H) 3.60 - 3.81 (m, 4 H) 4.24 - 4.34 (m, 1 H) 6.63 (dd, J=3.10, 1.86 Hz, 1 H) 6.87 - 7.00 (m, 3 H) 7.22 - 7.32 (m, 2 H) 7.47 (t, J=2.06 Hz, 1 H)

MS (ESI/APCI Dual) (Positive) m/z; (M+H)⁺ 382

(実施例8)

1- {4- [(1-イソプロピルピペリジン-4-イル) オキシ] フェニル} -N-メチル-1H-ピロール-3-カルボキサミド (化合物番号18) の製造

[0079] [化17]



[0080] 実施例1と同様の手法により、メチル 1H-ピロール-3-カルボン酸の

代わりにN-メチル-1H-ピロール-3-カルボキサミドを、1-シクロブチル-4-(4-ヨードフェノキシ)ピペリジンの代わりに4-(4-ヨードフェノキシ)-1-イソプロピルピペリジンを用いて無色結晶の表題化合物を得た。


¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.06 (d, J=6.61 Hz, 6 H) 1.82 (d, J=9.08 Hz, 2 H) 1.95 - 2.09 (m, 2 H) 2.39 (br. s., 2 H) 2.79 (br. s., 3 H) 2.96 (d, J=4.95 Hz, 3 H) 4.19 - 4.39 (m, 1 H) 5.59 - 5.86 (m, 1 H) 6.45 (dd, J=2.89, 1.65 Hz, 1 H) 6.84 - 6.99 (m, 2 H) 7.17 - 7.32 (m, 2 H) 7.52 (t, J=2.06 Hz, 1 H)

MS (ESI/APCI Dual) (Positive) m/z; (M+H)⁺ 342

(実施例9)

(1-{4-[(1-tert-ブチルピペリジン-4-イル)オキシ]フェニル}-1H-ピロール-3-イル)(ピロリジン-1-イル)メタノン
(化合物番号19)の製造

[0081] [化18]



[0082] 実施例1と同様の手法により、メチル 1H-ピロール-3-カルボン酸の代わりに(1H-ピロール-3-イル)(ピロリジン-1-イル)メタノンを、1-シクロブチル-4-(4-ヨードフェノキシ)ピペリジンの代わりに1-tert-ブチル-4-(4-ヨードフェノキシ)ピペリジン(WO 2008072724に記載の方法に従って合成できる)を用いて無色結晶の表題化合物を得た。

¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.09 (s, 9 H) 1.81 (dd, J=8.46, 3.92 Hz, 2 H) 1.86 - 2.06 (m, 6 H) 2.41 (br. s., 2 H) 2.87 (br. s., 2 H) 3.56 - 3.80 (m, 4 H) 4.22 - 4.32 (m, 1 H) 6.63 (dd, J=3.10, 1.86 Hz, 1 H) 6.85 - 6.99 (m, 3 H) 7.23 - 7.31 (m, 2 H) 7.41 - 7.50 (m, 1


H)

MS (ESI/APCI Dual) (Positive) m/z; (M+H)⁺ 396

(実施例 10)

1- {4- [(1-tert-ブチルピペリジン-4-イル) オキシ] フェニル} -N-メチル-1H-ピロール-3-カルボキサミド (化合物番号 20) の製造

[0083] [化19]



[0084] 実施例 1 と同様の手法により、メチル 1H-ピロール-3-カルボン酸の代わりに N-メチル-1H-ピロール-3-カルボキサミドを、1-シクロブチル-4-(4-ヨードフェノキシ) ピペリジンの代わりに 1-tert-ブチル-4-(4-ヨードフェノキシ) ピペリジンを用いて無色結晶の表題化合物を得た。

¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.09 (s, 9 H) 1.81 (dd, J=8.46, 3.92 Hz, 2 H) 1.96 - 2.06 (m, 2 H) 2.41 (br. s., 2 H) 2.87 (br. s., 2 H) 2.96 (d, J=4.95 Hz, 3 H) 4.27 (br. s., 1 H) 5.69 - 5.82 (m, 1 H) 6.38 - 6.50 (m, 1 H) 6.86 - 7.00 (m, 3 H) 7.21 - 7.31 (m, 2 H) 7.52 (t, J=1.86 Hz, 1 H)

MS (ESI/APCI Dual) (Positive) m/z; (M+H)⁺ 356

(試験例 1 : ラット H3 受容体結合試験)

ラットより摘出した前頭皮質を、テフロンホモジナイザーを用いて、タンパク質分解酵素阻害剤 (Complete EDTA-free、ロシュ・ダイアグノスティックス) 及び 5 mM EDTA を含んだ 50 mM Tris-HCl 緩衝液 (pH 7.4) 中でホモジナイズした。このホモジネートを 48,000 × g で 15 分間遠心分離した。上清を除去し、ペレットを 5

mM EDTAを含んだ50 mM Tris-HCl緩衝液 (pH 7.4) に懸濁し、さらに48,000×gで15分間遠心分離した。この上清を除去し、ペレットを5 mM EDTAを含んだ50 mM Tris-HCl緩衝液 (pH 7.4) に懸濁し、膜分画とした。膜分画 (最終反応液中のタンパク質量75 μg)、N-α-メチル [³H] ヒスタミン (パーキンエルマー、終濃度0.75 nM)、及び試験薬物を混合し、室温にて1時間反応させた。反応終了後に、反応混合物を、0.3%ポリエチレンジイミンで処理した96 well GF/Cフィルタープレートに吸引濾過し、フィルターを、5 mM EDTAを含んだ50 mM Tris-HCl緩衝液 (pH 7.4) で5回洗浄した。洗浄後に、フィルターを乾燥し、シンチレーターを加え、フィルター上の残存放射活性をトップカウント (パーキンエルマー) で測定した。

[0085] 10 μMチオペラミドの存在下での残存放射活性を非特異的結合とし、チオペラミド非存在下での残存放射活性との差を、特異的結合とした。試験薬物はDMSOにて溶解及び希釈し、各濃度存在下での残存放射活性より得られた用量反応曲線より、特異的結合が50%阻害される試験薬物濃度 (IC₅₀) を求めた。実施例化合物のIC₅₀値を表2に示す。

[0086]

[表2]

化合物番号	IC ₅₀ (nM)
1	12
2	34
3	1.7
4	1.1
5	3.2
6	3.2
7	5.9
8	9.5
9	2.5
10	6.8
11	1.0
12	5.2
13	3.7
15	6.6
16	1.5
17	1.1
18	38
19	1.7
20	21

[0087] (試験例2: [³⁵S] GTP-γ-S結合試験)

ラットより摘出した前頭皮質を、テフロンホモジナイザーを用いて、2.5 mM 塩化カルシウム二水和物を含んだ30 mM Tris-HCl緩衝液(pH 7.4)中でホモジナイズした。このホモジネートを48,000×gで15分間遠心分離した。上清を除去し、ペレットを2.5 mM 塩化カルシウム二水和物を含んだ30 mM Tris-HCl緩衝液(pH 7.4)に懸濁し、さらに48,000×gで15分間遠心分離した。上清を除去し、ペレットを2.5 mM 塩化カルシウム二水和物を含んだ30 mM Tris-HCl緩衝液(pH 7.4)に懸濁し、37℃で30分間インキュベーションした後、48,000×gで15分間遠心分離した。この上清を除去し、ペレットを100 mM 塩化ナトリウム、10 mM 塩化マグネシウムを含んだ20 mM HEPES緩衝液(pH 7.4)に懸濁し、膜画

分とした。膜画分（最終反応液中のタンパク質量 $20 \mu\text{g}$ ）、GDP（終濃度 $300 \mu\text{M}$ ）、アデノシンデアミナーゼ（終濃度 1 U/mL ）、R（-）- α -メチルヒスタミン（終濃度 300 nM ）、及び試験化合物を混合し、 30°C にて20分間反応させた。反応終了後、さらに $[^{35}\text{S}] \text{GTP-}\gamma\text{-S}$ （終濃度 0.3 nM ）を添加し、引き続き90分間反応を続けた。反応終了後に、反応混合物を、96well GF/Cフィルタープレートに吸引濾過し、フィルターを 100 mM 塩化ナトリウム、 10 mM 塩化マグネシウムを含んだ 20 mM HEPES緩衝液（ $\text{pH} 7.4$ ）で3回洗浄した。洗浄後に、フィルターを乾燥し、シンチレーターを加え、フィルター上の残存放射活性をトップカウント（パーキンエルマー）で測定した。

[0088] R（-）- α -メチルヒスタミン非存在下での残存放射活性を非特異的結合とし、R（-）- α -メチルヒスタミン存在下での残存放射活性との差を、特異的結合とした。試験薬物はDMSOにて溶解及び希釈し、各濃度存在下での残存放射活性より得られた用量反応曲線より、特異的結合が50%阻害される試験薬物濃度（ IC_{50} ）を求めた。その結果、本発明の化合物3及び7は $\text{IC}_{50} 100 \text{ nM}$ 以下の活性を示した。

（試験例3：ラット体内動態試験）

SDラットを用い、化合物3、4及び化合物7を 3 mg/kg 単回経口投与し、投与1時間後の血漿・脳・脳脊髄液への組織分布を確認した。定量には高速液体クロマトグラフィ／タンデム質量分析計API4000（LC-MS/MS、ABサイエックス）を用いた。その結果、化合物3、4及び化合物7の脳／血漿移行比はそれぞれ4.5、2.9及び2.2と良好であり、その時の脳内濃度はそれぞれ 78.2 ng/g 、 7.06 ng/g 及び 408 ng/g であった。また化合物3及び化合物7の脳脊髄液／血漿移行比は両化合物とも0.3であり、その時の脳脊髄液濃度はそれぞれ、 5.75 ng/mL 及び 50.5 ng/mL であった。

（試験例4：P-糖タンパク基質認識性試験）

トランスウェル上にLLC-GA5-COL300細胞（ブタ腎由来培養腎

上皮細胞株 LLC-PK1 由来 Human MDR1 発現系) を培養した。試験直前には、Hank's balanced salt solution (HBSS) に置換して試験に供した。最終濃度 $10\text{ }\mu\text{M}$ に調整した評価化合物溶液を、LLC-GA5-COL300 細胞の Donor 側に添加し一定時間後、Acceptor 側から一定量を採取した。サンプル中化合物濃度は LC-MS/MS により測定した。Acceptor 側への化合物の蓄積透過量より、Apical $\rightarrow$ Basal 及び Basal $\rightarrow$ Apical それぞれの膜透過係数 ($\times 10^{-6}\text{ cm/sec}$) を算出し、その比 (Efflux Ratio) から P-糖タンパク基質認識性を評価した。実施例化合物の Efflux Ratio 値を表 3 に示す。

[0089] [表3]

化合物番号	Efflux ratio
3	1.4
4	1.3
6	1.2
7	1.0
8	1.6
9	1.6
16	3.1


産業上の利用可能性

[0090] 本発明により、ヒスタミン H3 受容体への強力な結合阻害作用を有し、ヒスタミン H3 受容体に起因する障害、例えば、認知症、アルツハイマー病、注意欠陥・多動性症、統合失調症、てんかん、中枢性痙攣、肥満、糖尿病、高脂血症、ナルコレプシー、特発性過眠症、行動誘発性睡眠不足症候群、睡眠時無呼吸症候群、概日リズム障害、睡眠時随伴症、睡眠関連運動障害、不眠症、うつ病、若しくはアレルギー性鼻炎等の疾患の予防又は治療に有用な医薬品を提供することが可能となり、医薬品産業の発達に大きく寄与することが考えられる。

請求の範囲


[請求項1] 式 (I)

[化1]



[式 (I) 中、Qは、下記式 (A) 又は (B) で表される基を示し、

[化2]



R¹は、ヒドロキシ、C₁～C₆アルコキシ又はNR¹ᴳR¹ᴴを示し、

R¹ᴳ及びR¹ᴴは、同一又は異なって、水素原子、C₁～C₆アルキル又はC₃～C₇シクロアルキルを示し、

又はR¹ᴳ及びR¹ᴴは、隣接する窒素原子と一緒に互いに結合した3～7員の飽和複素環（該飽和複素環は1又は2個のC₁～C₆アルキルで置換されてもよい。）を形成してもよく、

R²は、水素原子、ハロゲン原子又はC₁～C₆アルキルを示し、

nは、1又は2を示し、

R³は、水素原子、ハロゲン原子又はC₁～C₆アルキルを示し、

R⁴は、C₁～C₆アルキル（該C₁～C₆アルキルは1又は2個のC₃～C₇シクロアルキルで置換されてもよい。）又はC₃～C₇シクロアルキル（該C₃～C₇シクロアルキルは1又は2個のC₁～C₆アルキルで置換されてもよい。）を示し、

R⁵及びR⁶は、同一又は異なって、C₁～C₆アルキル又はC₃～C₇シクロアルキルを示し、


又はR⁵及びR⁶は、隣接する窒素原子と一緒に互いに結合した

3～7員の飽和複素環（該飽和複素環は1又は2個のC₁～C₆アルキルで置換されてもよい。）を形成してもよい。]

で表される化合物、又はその医薬上許容される塩。

[請求項2] Qが式（A）

[化3]



（式中、R⁴は、請求項1で定義された通りである）

である、請求項1に記載の化合物、又はその医薬上許容される塩。

[請求項3] R¹がNR^{1A}R^{1B}（式中、R^{1A}及びR^{1B}は、請求項1で定義された通りである）である、請求項1又は2に記載の化合物、又はその医薬上許容される塩。

[請求項4] R²及びR³が水素原子であり、nが1である、請求項1～3のいずれか1項に記載の化合物、又はその医薬上許容される塩。

[請求項5] R⁴がC₃～C₇シクロアルキルである、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物、又はその医薬上許容される塩。

[請求項6] 請求項1～5のいずれか1項に記載の化合物、又はその医薬上許容される塩を有効成分として含有する医薬。

[請求項7] ヒスタミンH₃受容体拮抗剤又は逆作動剤である、請求項6に記載の医薬。

[請求項8] 認知症、アルツハイマー病、注意欠陥・多動性症、統合失調症、てんかん、中枢性痙攣、肥満、糖尿病、高脂血症、ナルコレプシー、特発性過眠症、行動誘発性睡眠不足症候群、睡眠時無呼吸症候群、概日リズム障害、睡眠時随伴症、睡眠関連運動障害、不眠症、うつ病、若しくはアレルギー性鼻炎の予防剤又は治療剤である、請求項6又は7に記載の医薬。