


[図1]


80
60
40
20
0
PBS処理に対するC5 mRNA量(%)
*
008
008-34
008
008-34
008
008-34
5日後
14日後
21日後


[図2]


PBS処理に対するC5タンパク質濃度(%)
60
40
20
0
**
**
*
008
008-34
008
008-34
008
008-34
5日後
14日後
21日後


[図3]


160
140
120
100
80
60
40
20
0
補体活性(%)
0
5
10
15
20
25
30
日数(日)
PBS, single
0.3 mg/kg single
1 mg/kg single
3 mg/kg single


[図4]


160
140
120
100
80
60
40
20
0
補体活性(%)
0
5
10
15
20
25
30
日数(日)
PBS, Q2w
0.3 mg/kg, Q2w
1 mg/kg, Q2w
3 mg/kg, Q2w

[図5]


160
140
120
100
80
60
40
20
0
補体活性(%)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
日数(日)
PBS, Q2w
0.3 mg/kg Q2w
1 mg/kg Q2w
3 mg/kg Q2w

[図6]


160
140
120
100
80
60
40
20
0
補体活性(%)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
日数(日)
PBS, Q3w
0.3 mg/kg, Q3w
1 mg/kg, Q3w
3 mg/kg, Q3w