


[図1]



[図2]

サンプリング時期	乳酸菌 摂取群 AFM ₁ 量(ng/ml)	プラセボ 摂取群 AFM ₁ 量(ng/ml)	p値
摂取前	0.172	0.172	–
摂取2週後	0.164	0.165	0.95
摂取4週後	0.160	0.167	0.72
摂取6週後	0.145	0.167	0.31
摂取8週後	0.150	0.162	0.59
摂取10週後	0.162	0.183	0.33
摂取12週後	0.221	0.287	0.04
摂取終了2週後	0.188	0.221	0.18
摂取終了4週後	0.239	0.254	0.61

[図3]

サンプリング時期	乳酸菌 摂取群 AFB ₁ 量(pg/mg alb)	プラセボ 摂取群 AFB ₁ 量(pg/mg alb)	p値
摂取前	4.527	4.527	–
摂取4週後	3.975	4.437	0.34
摂取8週後	4.055	4.263	0.71
摂取12週後	4.137	4.306	0.79
摂取終了4週後	3.935	4.349	0.40

[図4]

食品の種類		AFM ₁ (ng/ml)		AFB ₁ -リジン (pg/mg alb)	
		相関係数 (rho)	p値	相関係数 (rho)	p値
食品摂取量	穀物	0.17	0.03	0.01	0.93
	肉	-0.08	0.30	-0.04	0.57
	魚	-0.11	0.15	0.08	0.28
	豆	0.07	0.34	0.02	0.80
	卵	-0.10	0.19	0.07	0.39
	乳製品	-0.02	0.75	0.02	0.75