

< 2.000
6.218
7.362
< 12.000
5.229
5.617
8.400
9.232
70
60
50
40
30
20
10
0
2
4
6
8
10
12
14
16

图1



OD（450-650）
3
2
1
0
0.01
0.1
1
10
100
1000
浓度 (ng/ml)

图2



OD（450-650）
4
3
2
1
0
1e-2
1e-1
1e0
1e1
1e2
1e3
1e4
1e5
1e6
浓度（ng/mL）

图3



OD（450-650）
1.5
1
0.5
0
1e-1
1e0
1e1
1e2
1e3
1e4
1e5
1e6
1e7
浓度（ng/ml）

图4



OD（450-650）
4
3
2
1
0
1e0
1e1
1e2
1e3
1e4
1e5
1e6
1e7
浓度（ng/ml）

图5



OD（450-650）
1
0.5
0
1e-1
1e0
1e1
1e2
1e3
1e4
1e5
1e6
浓度（ng/mL）

图6



2500
2000
1500
1000
500
0
肿瘤体积(mm³)
稀释缓冲液 IV Day1,5,9,13
BA03 5mg/kg IV Day1,5,9,13
MYK-3 1mg/kg IV Day1,5,9,13
MYK-3 5mg/kg IV Day1,5,9,13
非结合 ADC 5mg/kg IV Day1,5,9,13
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
给药后日期（天）

图7



25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
体重 (g)
稀释缓冲液 IV Day1,5,9,13
BA03 mAb 5mg/kg IV Day1,5,9,13
MYK-3 1mg/kg IV Day1,5,9,13
MYK-3 5mg/kg IV Day1,5,9,13
非结合 ADC 5mg/kg IV Day1,5,9,13
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
给药后日期（天）

图8





3000
2500
2000
1500
1000
500
0
肿瘤体积 (mm³)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
给药后日期
稀释缓冲液 IV Day1,5,9,13
Erbitux 3mg/kg IV Day1,5,9,13
MYK-3 0.3mg/kg IV Day1,5,9,13
MYK-3 1mg/kg IV Day1,5,9,13
MYK-3 3mg/kg IV Day1,5,9,13
非结合 ADC 3mg/kg IV Day1,5,9,13


图9


40度条件下不同pH处方高聚体变化趋势
高聚物（%）
时间（天）
pH6.0
pH6.3
pH6.5
pH6.7

a


40度条件下不同pH处方酸性峰变化趋势
酸性峰（%）
T（天）
pH6.0
pH6.3
pH6.5
pH6.7

b


40度条件下不同pH处方载药量变化趋势
载药量
时间(天)
pH6.0
pH6.3
pH6.5
pH6.7

c

图 10