

Human DMD Δ52 Myotubes
% Ex51 Skipping (Mean +/- SD)
80
60
40
20
0
**
** p < 0.01
Naked DMD exon skipping oligo
Anti-TfR1 Fab-Oligo complex

FIG. 1




FDC Concentration
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1
T0
T8 Flex (-20°C)
T8 Flex (2-8°C)
T8 Vials (-20°C)
T8 Vials (2-8°C)
T8 Vials (25°C)
T8 Vials (40°C)

FIG. 2



Material	Conc. (mg/mL)
Glass	21.7
EVA	23.3
PC	22.4
HDPE	22.6

FIG. 3

Injection Name	% HMWS 1	% Dimer	% Total HMWS	% Peak 1	% Peak 2	% Peak 3	% LMWS	% Free Oligo
10 mg/mL Glass Standard	n.a.	7.8	7.8	26	40	23.8	1.2	1.1
25 mg/mL Glass	n.a.	7.8	7.9	25.9	40.1	23.8	1.2	1.1
25 mg/mL EVA	n.a.	7.8	7.9	26	40.1	23.8	1.2	1.1
25 mg/mL HDPE	n.a.	7.8	7.8	26.1	39.9	23.9	1.2	1.1
25 mg/mL PC	n.a.	7.8	7.9	26.1	39.9	23.8	1.2	1.1

FIG. 4