


請求の範囲


- [請求項1] 粉末X線回析による回折角（ 2θ ）において、少なくとも11.5、14.6、18.2、24.0及び25.5度付近に特徴的なピークを有する3-（3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル）-1,1-ジオキソ-2,3-ジヒドロ-1,3-ベンゾチアゾールのI形結晶。
- [請求項2] 以下の図に示す粉末X線回折図により特徴付けられ、粉末X線回折の回折角（ 2θ ）の各特徴的ピークにおいては ± 0.2 の誤差が許容される、3-（3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル）-1,1-ジオキソ-2,3-ジヒドロ-1,3-ベンゾチアゾールのI形結晶。




- [請求項3] DSC分析において191℃付近に熱吸収ピークを有する3-（3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル）-1,1-ジオキソ-2,3-ジヒドロ-1,3-ベンゾチアゾールのI形結晶。
- [請求項4] DSC分析において191℃付近に熱吸収ピークを有することを特徴とする、請求項1又は請求項2のいずれかに記載のI形結晶。
- [請求項5] 粉末X線回析による回折角（ 2θ ）において、少なくとも15.1、18.1、22.8、23.7及び24.0度付近に特徴的なピークを有する3-（3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル）-1,1-ジオキソ-2,3-ジヒドロ-1,3-ベンゾチアゾールのII

形結晶。

- [請求項6] 以下の図に示す粉末X線回折図により特徴付けられ、粉末X線回折の回折角 (2θ) の各特徴的ピークにおいては ± 0.2 の誤差が許容される、3-(3, 5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル)-1, 1-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1, 3-ベンゾチアゾールのII形結晶。



- [請求項7] DSC分析において212℃付近に熱吸収ピークを有する3-(3, 5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル)-1, 1-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1, 3-ベンゾチアゾールのII形結晶。
- [請求項8] DSC分析において212℃付近に熱吸収ピークを有することを特徴とする、請求項5又は請求項6のいずれかに記載のII形結晶。
- [請求項9] 粉末X線回折による回折角 (2θ) において、少なくとも9.5、13.7、22.8、24.9及び25.3度付近に特徴的なピークを有する3-(3, 5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル)-1, 1-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1, 3-ベンゾチアゾールの水和物。
- [請求項10] 以下の図に示す粉末X線回折図により特徴付けられ、粉末X線回折の回折角 (2θ) の各特徴的ピークにおいては ± 0.2 の誤差が許容される、3-(3, 5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル)-1, 1-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1, 3-ベンゾチアゾールの水和物。



- [請求項11] DSC分析において105℃及び212℃付近に熱吸収ピークを有する3-(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル)-1,1-ジオキソ-2,3-ジヒドロ-1,3-ベンゾチアゾールの水和物。
- [請求項12] DSC分析において105℃及び212℃付近に熱吸収ピークを有することを特徴とする、請求項9又は請求項10のいずれかに記載の水和物。
- [請求項13] 3-(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル)-1,1-ジオキソ-2,3-ジヒドロ-1,3-ベンゾチアゾールのナトリウム塩。
- [請求項14] 請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の結晶、水和物、もしくはナトリウム塩、及び薬学的に許容される担体を含有する医薬組成物。
- [請求項15] 貧溶媒中冷却下、3-(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル)-1,1-ジオキソ-2,3-ジヒドロ-1,3-ベンゾチアゾール溶液を加えることにより得られる請求項1または請求項4記載のI形結晶の製造方法。
- [請求項16] 3-(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル)-1,1-ジオキソ-2,3-ジヒドロ-1,3-ベンゾチアゾールを有機溶媒から晶析により得ることができる請求項5または請求項8に記載のII形結晶の製造方法。
- [請求項17] 3-(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾイル)-1,1-ジ

オキソー 2, 3-ジヒドロ-1, 3-ベンゾチアゾールを水、若しくは水／有機溶媒の混合物に、弱塩基により溶解させ得ることができる請求項 9 または請求項 1 2 に記載の水和物の製造方法。