

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und Mittel zur artifiziellen Erzeugung von Abwehrmechanismen bei Pflanzen gegen den Befall durch Krankheiten, sowie Massnahmen und Stoffe zur Durchführung dieses Verfahrens.


Pflanzen sind vielfältigen mikrobiellen Einflüssen durch Bakterien, Viren und Pilzen ausgesetzt, die an der Pflanze parasitieren.

Die bisherigen Bemühungen im Pflanzenschutz beschränken sich in der Regel darauf, die Pflanze allgemein, z.B. durch Kultivierung und Düngung, zu stärken und drohenden oder erfolgten Krankheitsbefall durch Applikation von direkt einwirkenden Gegenmitteln (= Mikrobiziden) zu verhüten oder zu bekämpfen.

Die vorliegende Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, in schonender Weise die in einer Pflanze latent vorhandenen eigenen Abwehrmechanismen zu aktivieren, so dass die Pflanze aus sich selbst heraus den Angriff eines Krankheitserregers erkennen und bekämpfen kann. Dieser Vorgang lässt sich als Immunisierung bezeichnen.

Die vorliegende erfinderische Lösung des Problems der Krankheitsbekämpfung an Pflanzen besteht in der artifiziellen chemischen Aktivierung der pflanzeigenen Abwehrkräfte gegen pathogene mikrobiologische Einflüsse. Bereits eine einmalige chemische Applikation kann eine langanhaltende, mehrwöchige bis mehrmonatige Resistenz der Pflanze gegenüber bestimmten pathogenen Erregern bewirken. Der wesentliche Unterschied zur herkömmlichen Krankheitsbekämpfung besteht somit in der Verwendung von Substanzen, die selbst keine mikrobizide Wirkung entfalten, sondern die Abwehrbereitschaft der Pflanze gegen mikrobielle Infektionen anregen und aufgrund ihrer geringen Aufwandsmengen für diese selbst und ihren Lebensbereich keine Belastung darstellen.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Immunisierung von Pflanzen gegen Krankheitsbefall, welches gekennzeichnet ist durch Applikation geringer Mengen eines 7-Cyano-1,2,3-benzothiadiazol-Derivats bzw. eines Derivats der 1,2,3-Benzothiadiazol-7-carbonsäure der nachfolgend angegebenen Formel I auf die zu schützende Pflanze, auf Pflanzenteile oder ihren Lebensbereich.



(I)

In dieser Formel bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy, oder Amino, wobei M das Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions ist, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet wird; und

Z Cyano oder -CO-A, wobei

A entweder OH oder SH bedeutet, deren H auch durch das Moläquivalent eines anorganischen oder organischen kationischen Restes ersetzt sein kann.

Zu einem wesentlichen Teil stellen die X und Y enthaltende 1,2,3-Benzothiadiazol-7-carbonsäure der Formel I und ihre Salze das Wirkungsprinzip dar, das in der Pflanze die Abwehr gegen pathogene Krankheitserreger auslöst. Es gehören auch die von der Formel I umfassten 7-Cyano-Verbindungen dazu, die in metabolischer Wechselwirkung zur entsprechenden 7-Carbonsäure stehen können. Es ist daher verständlich, dass der Beitrag zur biologischen Aktivität, den der Substituent A der Formel I leistet, von geringerer Bedeutung sein wird. Es ist auch verständlich, dass trotz grösserer Strukturvariation im Substituenten A mit Verbindungen der Formel I weitgehend äquivalente biologische Wirkungen erzielt werden. Ein Substituent A sollte jedoch die 7-substituierte 1,2,3-Benzothiadiazol-Molekülstruktur nicht zu stark abschirmen.

Bevorzugt als Substituent A sind daher kationische oder sonstige organische Reste mit einem Molgewicht von weniger als 600, besonders bevorzugt weniger als 400.

Bevorzugt sind ferner Verbindungen der Formel I mit Z = CN und X Wasserstoff, Halogen oder Methyl und Y Wasserstoff oder Halogen.

Ein wichtiger Aspekt vorliegender Erfindung sind Verbindungen und entsprechende Pflanzenschutzmittel und Applikationsverfahren auf Basis der Formel I, worin bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO_3H , SO_3M , Nitro, Hydroxy, oder Amino, wobei M das Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions ist, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet wird; und Z Cyano oder $-\text{CO}-\text{A}$,



A UR, $\text{N}(\text{R}_1)\text{R}_2$ oder $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$;

- 5 M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

U' Sauerstoff oder $-\text{N}(\text{R}_5)-$;

- 10 R Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, U- C_1 - C_3 -Alkyl oder C_2 - C_4 -Dialkylamino substituiertes oder durch die CO-Gruppe unterbrochenes C_1 - C_8 -Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC C_1 - C_4 -Alkyl, C_3 - C_6 -Alkenyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Alkynyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -Alkynyl, (T) $_n$ - C_3 - C_8 -Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



25

X^a , X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC, MOOC, C_1 - C_3 -Alkyl-OOC, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_2 -Halogenalkyl mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder X^a C_1 - C_2 -Halogenalkoxy mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenylloxy,

- 30 Benzyloxy, Sulfamoyl und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder

X^a Phenyl, Phenylloxy oder Benzyloxy und

X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder

X^a , X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

Napht einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest;

- 35 W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano, C_1 - C_2 -Alkyl oder einen C_1 - C_2 -Alkoxy-carbonyl- C_2 - C_4 -alkylen-amino(imino)-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CCH}_3(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ oder $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

- 40 R_1 Wasserstoff, C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C_1 - C_5 -Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl-OOC substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl-OOC substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, C_3 - C_5 -Alkenyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkenyl, C_3 - C_5 -Alkynyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkynyl, (T) $_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes (T) $_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, (T) $_n$ -Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, CF_3 , Cyano, HOOC oder MOOC substituiertes (T) $_n$ -Phenyl;

R_2 Wasserstoff, Hydroxy, C_1 - C_3 -Alkyl, durch Cyano oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_3 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

- 50 R_1 und R_2 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R_3 Wasserstoff, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R_4 Wasserstoff, C_1 - C_6 -Alkyl, CONH_2 , $\text{CONH}-\text{CONH}-\text{C}_1$ - C_3 -Alkyl, C_1 - C_3 -Alkanoyl, durch Halogen oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_3 -Alkanoyl, C_3 - C_5 -Alkenoyl oder durch Halogen oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_3 - C_5 -Alkenoyl;

- 55 R_3 und R_4 zusammen einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R_5 Wasserstoff oder Methyl;

R_6 Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl; und
 n Null oder 1;

wobei in den Verbindungen der Formel I der organische Rest A ein Molgewicht von weniger als 900 besitzt; und umfassen im Falle von U als Sauerstoff oder Schwefel die Salze der pflanzenphysiologisch verträglichen 7-Carbonsäure mit primären, sekundären oder tertiären Aminen oder mit anorganischen Basen.

Eine besondere Gruppe von Wirkstoffen des erfindungsgemässen Verfahrens stellen folgende Verbindungen der Formel I dar; worin bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO_3H , SO_3M , Nitro, Hydroxy oder Amino;

10 Z Cyano oder COA;



A UR , $N(R_1)R_2$ oder $U^1N(=C)_n(R_3)R_4$;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

15 U^1 Sauerstoff oder $-N(R_5)-$;

R Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Alkoxy oder U - C_1 - C_3 -Alkyl substituiertes C_1 - C_8 -Alkyl, (T) -COOH oder (T) -COOC $_1$ - C_4 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Alkynyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -Alkynyl, $(T)_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano, C_1 - C_2 -Alkyl oder einen C_1 - C_2 -Alkoxy-carbonyl- C_2 - C_4 -alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH(CH_3)-$ oder $-CCH_3(CH_3)-$;

35 R_1 Wasserstoff, C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C_1 - C_5 -Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl-OOC substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl-OOC substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, C_3 - C_5 -Alkenyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkenyl, C_3 - C_5 -Alkynyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkynyl, $(T)_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes $(T)_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, $(T)_n$ -Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, CF_3 , Cyano, HOOC oder MOOC substituiertes $(T)_n$ -Phenyl;

40 R_2 Wasserstoff, Hydroxy, C_1 - C_3 -Alkyl, durch Cyano oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_3 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R_1 und R_2 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

45 R_3 Wasserstoff, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R_4 Wasserstoff, C_1 - C_6 -Alkyl, $CONH_2$, $CONH-CONH-C_1$ - C_3 -Alkyl, C_1 - C_3 -Alkanoyl, durch Halogen oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_3 -Alkanoyl, C_3 - C_5 -Alkenoyl oder durch Halogen oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_3 - C_5 -Alkenoyl;

50 R_3 und R_4 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R_5 Wasserstoff oder Methyl;

R_6 Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl; und

55 n Null oder 1;

und umfassen die pflanzenphysiologisch verträglichen Salze der 7-Carbonsäuren und 7-Thiocarbonsäuren mit primären, sekundären und tertiären Aminen.

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner Mittel gegen Pflanzenkrankheiten, die als Wirkstoffe Verbindun-

gen der Formel I enthalten. Die Erfindung betrifft weiter die Herstellung der genannten Mittel sowie die Herstellung derjenigen Wirkstoffe, die neu sind. Die Erfindung betrifft darüber hinaus die Verwendung der Wirkstoffe oder der Mittel zum Schutz von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen, beispielsweise Fungi, Bakterien und Viren.

Wie erwähnt, stellen Verbindungen der Formel I keine Mikrobizide im herkömmlichen Sinne einer Direktwirkung auf den Krankheitserreger dar, sondern sind, wie weiter unten gezeigt werden kann, im Prinzip gegen derartige Erreger bei Abwesenheit der Pflanze (= in vitro) wirkungslos. Wo solche direkte Mikrobizidwirkung zuweilen dennoch auftritt, wird sie in der Regel durch gewisse Strukturelemente im Molekül zusätzlich hervorgerufen, die mit einer solchen Sekundärwirkung den bestehenden Immunisierungseffekt überlagern, jedoch nicht ersetzen.

Das immunisierende Wirkungsprinzip beruht im wesentlichen auf der speziellen in 7-Stellung durch eine Säurefunktion substituierten 1,2,3-Benzothiadiazol-Grundstruktur der Formel I, während die Fähigkeit der 1,2,3-Benzothiadiazolderivate in die Pflanzen bzw. ihren Metabolismus einzudringen, von den unter A definierten Resten und den Salzen der 7-Säure abhängig ist (Vehikel-Funktion).

Bevorzugt sind daher hinsichtlich ihres Immunisierungspotentials Verbindungen der Formel I, bei denen der organische Rest A ein Molgewicht von weniger als 600 und besonders bevorzugt ein Molgewicht von weniger als 400 besitzen. Bevorzugt sind ferner Verbindungen mit $Z = CN$.

In einer speziellen Variante werden Verbindungen der Formel I zur Pflanzenimmunisierung bevorzugt, bei denen der Substituent Z Cyano oder aber einen Rest A bedeutet, dessen Molgewichtsanteil am Gesamtmolekül der Formel I zwischen 5,0 % und 85 % liegt, bevorzugt zwischen 7,8 % und 60 %.

Die Aufwandmenge solcher Immunisierungsagencien der Formel I liegt bei weniger als 1 kg AS/ha, bevorzugt bei weniger als 500 g AS/ha, besonders bevorzugt bei 50-300 g AS/ha.

Der Begriff Heteroatome schliesst auch andere Elemente als N, O oder S ein, z.B. Si oder P.

Als kationische Reste für eine M-OOC-Gruppe kommen Metalle und organische Basen in Frage. Als Metalle sind Alkali- und Erdalkali-Metalle zweckmässig, es kommen aber auch beliebige andere in Betracht. Als organische Basen gelten Amine, insbesondere mit aliphatischen, aromatischen, araliphatischen und/oder cycloaliphatischen Resten.

Halogen selbst oder als Bestandteil eines anderen Substituenten bedeutet Fluor, Chlor, Brom oder Jod, vorzugsweise Fluor, Chlor oder Brom. Unter Alkyl selbst oder als Bestandteil eines anderen Substituenten sind gerad- oder verzweigt-kettige Alkyle zu verstehen. Sie stellen je nach Zahl der angegebenen Kohlenstoffatome beispielsweise folgende Gruppen dar: Methyl, Ethyl sowie die Isomeren von Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl oder Octyl wie z.B. Isopropyl, Isobutyl, tert.-Butyl, sek.-Butyl oder Isopentyl. Cycloalkyl bedeutet z.B. Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl.

Alkenyl bedeutet z.B. Propenyl-(1), Allyl, Butenyl-(1), Butenyl-(2) oder Butenyl-(3) sowie Ketten mit mehreren Doppelbindungen. Alkynyl bedeutet z.B. Propinyl-(2), Butinyl-(1), Butinyl-(2), Pentinyl-(4) usw., vorzugsweise Propargyl.

Als Basen oder Verbindungen basischen Charakters kommen anorganische Basen oder Basenbildner in Betracht, wie z.B. Hydroxide, Carbonate und Hydrogencarbonate der Alkali- und Erdalkalimetalle, vorzugsweise LiOH, NaOH, KOH, $Mg(OH)_2$ oder $Ca(OH)_2$; und ferner $NaHCO_3$, $KHCO_3$, Na_2CO_3 und K_2CO_3 .

Unter Heterocyclen sind zu verstehen z.B.: Furan, Tetrahydrofuran, Thiophen, Tetrahydropyran, Pyrrol, Pyrrolidin, Imidazol, 1,2,4-Triazol, Piperidin, Pyridin, Pyrimidin, Morpholin oder Azacycloheptan. Insbesondere stellen sie dar: Furan-2-yl, Tetrahydrofuran-2-yl, Tetrahydrofuran-3-yl, Tetrahydropyran-2-yl, 1,3-Dioxolan-5-yl, Pyrrol-1-yl, Pyrrol-2-yl, Pyrrolidin-1-yl, Isoxazol-3-yl, Isoxazol-4-yl, 1,2-Dithiazolin-5-yl, Imidazol-1-yl, 1,2,4-Triazol-1-yl, 1,3,4-Triazol-1-yl, Thiophen-2-yl, Piperidin-1-yl, Piperidin-4-yl, Pyridin-2-yl, Pyridin-3-yl, Pyridin-4-yl, Pyrimidin-2-yl, Pyrimidin-4-yl, Pyrimidin-5-yl, Morpholin-1-yl, Azacycloheptan-1-yl oder Benzo-1,2,3-thiadiazol-7'-yl.

Als salzbildende Amine sind z.B. anzusehen:

Trimethylamin, Triethylamin, Tributylamin, Tribenzylamin, Tricyclohexylamin, Triamylamin, Trihexylamin, N,N-Dimethylanilin, N,N-Dimethyltoluidin, N,N-Dimethyl-p-amino-pyridin, N-Methylpyrrolidin, N-Methylpiperidin, N-Methylpyrrolidin, N-Methylimidazol, N-Methylpyrrol, N-Methylmorpholin, N-Methylhexamethylenimin, Pyridin, Chinolin, alpha-Picolin, beta-Picolin, Isochinolin, Pyrimidin, Acridin, N,N,N',N'-Tetra-methylethylendiamin, N,N,N',N'-Tetraethylethylendiamin, Chinoxalin, N-Propyldiisopropylamin, N,N-Dimethylcyclohexylamin, 2,6-Lutidin, 2,4-Lutidin, Triethylendiamin sowie heterocyclische Amine vom Morpholintyp.

Unter einem Monosaccharid-Rest sind beispielsweise zu verstehen Glucofuranosyl, Galaktopyranosyl, Allofuranosyl oder Mannityl, wobei die OH-Gruppen frei oder acetyliert oder mit Methyl, Benzyl oder Isopropylidenyl verethert sind. Unter den genannten Resten sind die Diisopropylidenyl-Derivate bevorzugt, während von diesen wiederum besonders bevorzugte Reste sind: Diaceton-D-glucosidyl, 1,2,3,4-Di-O-isopropyliden-D-galactopyranos-6-yl, 1,2,5,6-Di-O-isopropyliden-D-mannit-3-yl, 1,2,5,6-Di-O-isopropyliden- α -

D-allofuranos-3-yl, D-Glucufuranos-3-yl, D-Galactopyranos-6-yl, D-Mannit-3-yl, D-Allofuranos-4-yl, Mannopyranos-1-yl, 2-Methyl-D-glucosid-6-yl, 1,2,5,6-Tetraacetyl-D-galactopyranos-3-yl und 2,3,5-Tribenzyltribofuranos-1-yl.

Aufgrund ihrer ausgeprägten gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen schützenden Eigenschaften sind diejenigen Wirksubstanzen bevorzugt, deren Strukturen folgende Substituenten oder Kombinationen dieser Substituenten untereinander aufweisen:

X und Y für Wasserstoff;

Z für Cyano oder COA;

A für UR oder $U^1N(=C)_n(R_3)R_4$;

10 U für Sauerstoff;

U^1 für Sauerstoff oder $-N(R_5)-$;

R für Wasserstoff, C_1-C_8 -Alkyl, durch Halogen oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiertes C_1-C_8 -Alkyl, C_3-C_6 -Alkenyl, durch Halogen substituiertes C_3-C_6 -Alkenyl, C_3-C_6 -Alkynyl, durch Halogen substituiertes C_3-C_6 -Alkynyl, $(T)_n-C_3-C_8$ -Cycloalkyl, Benzyl, halogeniertes Benzyl, Methoxybenzyl, $(T)_n-Si(CH_3)_3$, $(T)-P(O)(C_1-C_4-Alkyl)CH_3$,
 15 $(T)-P(O)(OC_1-C_4-Alkyl)_2$ oder die Gruppe $(T)_n-W$;

W für einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie für Diaceton-D-glucosidyl;

T für die Brückenglieder $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH(CH_3)-$, $-CCH_3(CH_3)-$ oder $-CH_2CH_2CH_2-$;

R_3 für Wasserstoff, Cyano, C_1-C_6 -Alkyl, Phenyl oder W;


20 R_4 für Wasserstoff, C_1-C_6 -Alkyl, $CONH_2$, $CONH-CONH-C_1-C_3$ -Alkyl, C_1-C_3 -Alkanoyl oder C_3-C_5 -Alkenoyl;

R_3 und R_4 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, W oder W';

W für einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S;

W' für einen Rest aus der Gruppe

25



30

n für Null oder 1.

Eine besondere Gruppe von Wirkstoffen mit bevorzugter mikrobizider Wirkung gegen phytopathogene Mikroorganismen stellen Verbindungen mit folgenden Substituenten oder Kombinationen dieser Substituenten untereinander dar:

35 X und Y Wasserstoff;

Z Cyano oder COA;

A UR oder $U^1N(=C)_n(R_3)R_4$;

U Sauerstoff;

40 U^1 Sauerstoff oder $-N(R_5)-$;

R Wasserstoff, C_1-C_8 -Alkyl, durch Halogen oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiertes C_1-C_8 -Alkyl, C_3-C_6 -Alkenyl, durch Halogen substituiertes C_3-C_6 -Alkenyl, C_3-C_6 -Alkynyl, durch Halogen substituiertes C_3-C_6 -Alkynyl, $(T)_n-C_3-C_8$ -Cycloalkyl, Benzyl, halogeniertes Benzyl, $(T)_n-Si(CH_3)_3$, $(T)-P(O)(C_1-C_4-Alkyl)CH_3$, $(T)-P(O)(OC_1-C_4-Alkyl)_2$ oder die Gruppe $(T)_n-W$;

45 W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie für Diaceton-D-glucosidyl;

T die Brückenglieder $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH(CH_3)-$ oder $-CCH_3(CH_3)-$

R_3 Wasserstoff, Cyano, C_1-C_6 -Alkyl, Phenyl oder W;


R_4 Wasserstoff, C_1-C_6 -Alkyl, $CONH_2$, $CONH-CONH-C_1-C_3$ -Alkyl, C_1-C_3 -Alkanoyl oder C_3-C_5 -Alkenoyl;

50 R_3 und R_4 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, W oder W';

W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S;

W' einen Rest aus der Gruppe

55



n Null oder 1.

Die unter die Formel I fallenden Verbindungen sind überwiegend neu; die übrigen sind bekannt. So sind in der Deutschen Offenlegungsschrift Nr. 1 695 786 und in der französischen Patentschrift No. 1 541 415 einige Verbindungen in allgemeiner Form als biozide Wirkstoffe zur Anwendung in herbiziden, insektiziden und fungiziden Mitteln offenbart. Für keine dieser unter die Formel I der vorliegenden Erfindung fallenden bekannten Einzelverbindungen ist jedoch speziell eine fungizide Aktivität beschrieben. Darüber hinaus ist die Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure ohne Angabe biologischer Eigenschaften aus J. Chem. Soc. (C) 1971, 3997 bekannt.

Die neuen Verbindungen der vorliegenden Erfindung sind in folgenden Gruppen definiert:
Verbindungen der Formel I'



in welcher bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy oder Amino;

Z Cyano oder COA;



A UR, N(R₁)R₂ oder U'N(=C)_n(R₃)R₄;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

U' Sauerstoff oder -N(R₅)-;

R Wasserstoff, C₁-C₈-Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, oder U-C₁-C₃-Alkyl substituiertes C₁-C₈-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkenyl, C₃-C₆-Alkynyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₈-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



X^a, X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC, MOOC, C₁-C₃-Alkyl-OOC, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₂-Halogenalkyl mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder X^a C₁-C₂-Halogenalkoxy mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenyloxy, Benzyloxy, Sulfamoyloxy und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder

X^a Phenyl, Phenyloxy oder Benzyloxy und X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder

X^a, X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

Napht einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest;

W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder C₁-C₂-Alkyl oder einen C₁-C₂-Alkoxy-carbonyl-C₂-C₄-alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

5 T die Brückenglieder -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- oder -CH₂CH₂O-;

R₁ Wasserstoff, C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C₁-C₅-Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, C₃-C₅-Alkenyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkenyl, C₃-C₅-Alkynyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, (T)_n-Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF₃, Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes (T)_n-Phenyl;

10 R₂ Wasserstoff, Hydroxy, C₁-C₃-Alkyl, durch Cyano oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

15 R₁ und R₂ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R₃ Wasserstoff, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

20 R₄ Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₆-Alkanoyl, durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkanoyl, C₃-C₅-Alkenoyl oder durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₃-C₅-Alkenoyl;

R₃ und R₄ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

25 R₅ Wasserstoff oder Methyl;

R₆ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl; und

n Null oder 1;

1) mit Ausnahme der Verbindungen:

7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

30 4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester;

6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

35 6-Chlor-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure; oder

2) mit der Massgabe, dass falls

Z Cyano, HOOC oder Methoxycarbonyl bedeutet, X und Y unabhängig voneinander nicht Wasserstoff, Chlor oder Brom sind; oder

3) mit der Massgabe, dass falls

40 Z Cyano, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl oder HOOC bedeutet, X nicht Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl oder Methoxy und Y nicht Wasserstoff, Halogen, Nitro oder Amino sind; oder

4) mit der Massgabe, dass falls Z Cyano, C₁-C₄-Alkoxy-carbonyl oder HOOC bedeutet, X nicht Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl oder Methoxy und Y nicht Wasserstoff, Halogen, Nitro oder Amino sind.

45 Es sind auch solche Verbindungen der Formel I' neu, bei denen Z = COA ist und R eine andere Bedeutung hat als Wasserstoff und unsubstituiertes Alkyl. Die Erfindung betrifft auch solche Verbindungen sowie entsprechende Mittel und Verfahren zur Immunisierung.

Eine besondere Gruppe von neuen Wirkstoffen, stellen folgende Verbindungen der Formel I' dar, worin bedeuten:

50 X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy oder Amino;

Z Cyano oder COA;

A UR, N(R₁)R₂ oder U¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;


55 U Sauerstoff oder Schwefel;

U¹ Sauerstoff oder -N(R₅)-;


R Wasserstoff, C₁-C₈-Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Alkoxy oder U-C₁-C₃-Alkyl substituiertes

C₁-C₈-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC₁-C₄-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkenyl, C₃-C₆-Alkynyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₈-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe

5



10



15 W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder C₁-C₂-Alkyl oder einen C₁-C₂-Alkoxycarbonyl-C₂-C₄-alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder -CH₂-, -CH₂CH₂- oder -CH(CH₃)-;

20 R₁ Wasserstoff, C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C₁-C₅-Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, C₃-C₅-Alkenyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkenyl, C₃-C₅-Alkynyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, (T)_n-Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF₃, Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes (T)_n-Phenyl;

25 R₂ Wasserstoff, Hydroxy, C₁-C₃-Alkyl, durch Cyano oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

30 R₁ und R₂ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R₃ Wasserstoff, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R₄ Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₃-Alkanoyl, durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkanoyl, C₃-C₅-Alkenoyl oder durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₃-C₅-Alkenoyl;

35 R₃ und R₄ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R₅ Wasserstoff oder Methyl;

40 R₆ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl; und

n Null oder 1;

mit Ausnahme der Verbindungen:

7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

45 4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester.

6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

6-Chlor-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure.

50 Wegen ihrer hervorragenden biologischen Aktivität sind als Wirkstoffe folgende Verbindungen bevorzugt:

Gruppe A (bekannte Verbindungen)

55 7-Carbonsäure-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.1);

7-Methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.2.);

Gruppe B 1 (neue Verbindungen)

- 7-Ethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.3);
 7-n-Propoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.4);
 7-iso-Propoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.5);
 7-n-Butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.6);
 5 7-sek.Butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.7);
 7-tert.Butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.8);
 7-Cyclopropylmethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.28);
 7-(2'-Phenethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.33);
 7-Benzoyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.34);
 10 7-Allyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.44);
 7-Propin-2-yloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.46);
 2-(7-Benzo-1,2,3-thiadiazoyloxy-imino)-2-cyano-N-(ethylaminocarbonyl)-acetamid (Verb. 1.78);
 Na-Salz der Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure (Verb. 1.112);
 K-Salz der Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure (Verb. 1.113);
 15 Triethylammoniumsalz der Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure (Verb. 1.114);
 7-(1-Phenethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.119);
 7-(1-Naphthylmethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.116);
 7-(Methylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 2.1);
 7-(Ethylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 2.2);
 20 7-(Benzylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 2.5);
 7-[(Di-cyanomethyl)-amino-carbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 3.13);
 3-[(N-Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamino]-2-methyl-
 propencarbonsäuremethylester (Verb. 3.28);
 3-[(N-Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamino]-2-ethyl-propencarbonsäuremethylester
 25 (Verb. 3.29);
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(α -methylpropyliden)-hydrazin (Verb. 4.2);
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclobutyliden)-hydrazin (Verb. 4.8);
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclopentyliden)-hydrazin (Verb. 4.9);
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclohexyliden)-hydrazin (Verb. 4.10);
 30 2-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-1-(2'-sec-butyl)-hydrazin (Verb. 5.2);
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclopentyl)-hydrazin (Verb. 5.7);
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclohexyl)-hydrazin (Verb. 5.8);
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cycloheptyl)-hydrazin (Verb. 5.9);
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-1,2-diacetyl-hydrazin (Verb. 6.7);
 35 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-phenyl-hydrazin (Verb. 6.8)
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-pyridin-2'-yl-hydrazin (Verb. 6.9).

Gruppe B2 (neue Verbindungen)

- 40 7-n-Pentoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.9);
 7-(4-Methoxy-benzoyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.39);
 7-(Cycloheximino-oxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.72);
 7-(3-Hydroxy-n-propoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.79);
 1,2,5,6-Di-O-isopropyliden-3-(7-benzo-1,2,3-thiadiazoyl)-D-glucofuranose (Verb. 1.86);
 45 7-Furfuryloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.96);
 7-(1,2,4-Triazol-1-yl)-methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.100);
 7-(2-Pyridylmethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.101);
 7-Trimethylsilyl-methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.103);
 7-[2-(Trimethylsilyl)-ethoxycarbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.104);
 50 7-Dimethylphosphono-ethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.108);
 7-Cyclohexyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.135);
 7-(1-Phenethyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.140);
 7-(3-Methoxybenzyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 1.144);
 7-(Ethylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 2.2);
 55 7-(n-Propylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 2.3);
 7-(Benzylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 2.5);
 7-(Carbamoyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 3.1);
 7-N-Phenylcarbamoyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 3.6);

N-(7-Benzo-1,2,3-thiadiazoyl)-glycin (Verb. 3.9);
 7-(N-Diallylcarbamoyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 3.26);
 6-Fluor-7-methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 7.6);
 6-Fluor-7-carboxy-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 7.8);
 5-Fluor-7-benzoyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 7.52);
 5-Fluor-7-carboxy-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 7.59);
 5-Fluor-7-ethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol (Verb. 7.61);

Untersuchungen über die Immunisierung von Pflanzen zum Schutz gegen Krankheiten sind in jüngerer Zeit in der Literatur publiziert worden (z.B. T. Kosuge et al., *Plant-Microbe Interactions*, S. Gianinazzi, Chapter 13, MacMillan, New York 1984; *Pesticides*, March 1985, Seiten 14, 15, A.N. Mukhopadhyay et al.).

Es wurde nun überraschenderweise gefunden, dass die Verbindungen der Formel I durch ihre erfindungsgemässe Verwendung den Befall von gesunden Pflanzen durch schädliche Mikroorganismen von vornherein verhindern und damit den befallsbedingten Schädigungen an Pflanzen vorbeugen. Der grosse Vorteil des erfindungsgemässen Verfahrens zur Behandlung von Pflanzen besteht darin, dass anstelle der direkten Einwirkung von chemischen Substanzen auf die pflanzenschädigenden Mikroorganismen eine Aktivierung und Stimulierung des pflanzeigenen biologischen Abwehrsystems vor dem Befall der Pflanzen eintritt, so dass eine Gesunderhaltung der behandelten Pflanzen aus eigener Kraft ohne weiteren direkten Einsatz mikrobizider Substanzen während der Vegetationsperiode gewährleistet werden kann. Für die Wirkstoffe der Formel I ist somit vor allem charakteristisch, dass sie bei Anwendung umweltschonender Aufwandmengen keine direkte Wirkung auf die Schadorganismen ausüben, sondern stattdessen eine immunisierende Wirkung auf gesunde Pflanzen gegen Pflanzenkrankheiten besitzen. Direkte Wirkungen gegen Vertreter der wichtigsten Pilzgruppen (z.B. Fungi Imperfecti, Oomyceten) konnten in diesem Zusammenhang nicht nachgewiesen werden. Demzufolge werden durch die erfindungsgemässe Verwendung der Verbindungen der Formel I nachteilige Nebeneffekte, wie sie sonst bei der direkten Parasitenbekämpfung auf Pflanzen durch chemische Substanzen mehr oder weniger zu beobachten sind, vermieden, was vorteilhafterweise ein völlig ungestörtes Wachstum der Pflanzen zur Folge hat. Darüber hinaus kann bei einzelnen der unter die Formel I fallenden neuen Verbindungen sowohl zusätzlich zu der pflanzenimmunisierenden Wirksamkeit als auch unabhängig davon eine mikrobizide, insbesondere pflanzenfungizide, Aktivität auftreten.

Die der Erfindung zugrundeliegende Wirkungsweise der Verbindungen der Formel I ist gleichzeitig auf eine allgemeine Erhöhung der Abwehrbereitschaft der behandelten Pflanzen gerichtet, so dass dadurch eine generelle antimikrobielle Resistenz gegen ein breites Spektrum von schädlichen Mikroorganismen erzielt wird. Das erfindungsgemässe Verfahren ist deshalb besonders für praktische Anwendungen geeignet. Die den Verbindungen der Formel I eigene systemische Aktivität bewirkt, dass sich der Schutzeffekt auch auf zuwachsende Pflanzenteile der behandelten Pflanzen erstreckt.

Das erfindungsgemässe immunisierende Verfahren ist gegen die den folgenden Klassen angehörenden phytopathogenen Pilze wirksam: Fungi imperfecti (z.B. *Botrytis*, *Helminthosporium*, *Fusarium*, *Septoria*, *Cercospora* und *Alternaria*); Basidiomyceten (z.B. die Gattungen *Hemileia*, *Rhizocotonia*, *Puccinia*); Ascomyceten (z.B. *Venturia*, *Podosphaera*, *Erysiphe*, *Monilinia*, *Uncinula*).

Besonders vorteilhaft kann das Verfahren zur Immunisierung gegen folgende Schadorganismen eingesetzt werden:

Pilze, wie z.B. Oomyceten (z.B. *Plasmopara viticola*, *Phytophthora infestans*), Fungi imperfecti (z.B. *Colletotrichum lagenarium*, *Pyricularia oryzae*, *Cercospora nicotinae*), Ascomyceten (z.B. *Venturia inaequalis*); Bakterien, wie z.B. Pseudomonaden (*Pseudomonas lachrymans*, *Pseudomonas tomato*, *Pseudomonas tabaci*); Xanthomonaden (z.B. *Xanthomonas oryzae*, *Xanthomonas vesicatoria*; *Erwinia* (z.B. *Erwinia amylovora*); und Viren, wie z.B. das Tabakmosaikvirus.

Das erfindungsgemässe Verfahren kann zum Schutz von Pflanzen aus unterschiedlichen Nutzkulturen eingesetzt werden.

Für die hierin offenbarten Indikationsgebiete gelten im Rahmen dieser Erfindung z.B. folgende Pflanzenarten:

Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Reis, Sorghum und Verwandte); Rüben (Zucker- und Futterrüben); Kern-, Stein- und Beerenobst (Äpfel, Birnen, Pflaumen, Pfirsiche, Mandeln, Kirschen, Erd-, Him- und Brombeeren); Hülsenfrüchte (Bohnen, Linsen, Erbsen, Soja); Oelkulturen (Raps, Senf, Mohn, Oliven, Sonnenblumen, Kokos, Rizinus, Kakao, Erdnüsse); Gurkengewächse (Kürbis, Gurken, Melonen); Faserge-
 wächse (Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute); Citrusfrüchte (Orangen, Zitronen, Grapefruit, Mandarinen); Gemü-
 sesorten (Spinat, Kopfsalat, Spargel, Kohlrarten, Möhren, Zwiebeln, Tomaten, Kartoffeln, Paprika); Lorbeer-
 gewächse (Avocado, Cinnamonum, Kampfer) oder Pflanzen wie Mais, Tabak, Nüsse, Kaffee, Zuckerrohr, Tee, Weinreben, Hopfen, Bananen- und Naturkautschukgewächse sowie Zierpflanzen (Blumen, Sträucher, Laub-

bäume und Nadelbäume wie Koniferen)


Diese Aufzählung stellt keine Limitierung dar.

Als besonders geeignete Zielkulturen für die Anwendung des erfindungsgemässen Verfahrens sind folgende Pflanzen anzusehen: Gurke, Tabak, Reben, Reis, Getreide (z.B. Weizen), Birne, Pfeffer, Kartoffeln,

5 Tomate und Apfel.

Die Verbindungen der Formel I sind nach folgenden Verfahren herstellbar:

1. Verbindungen der Formel Ia



15 in welcher R, X, Y und U die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, werden hergestellt, indem man umsetzt:

1.1 Verbindungen der Formel II



25 worin L' eine Abgangsgruppe, z.B. Halogen, O-Acyl, wie z.B. der zum symmetrischen Anhydrid der Säure Ib gehörende Acylrest, oder 1-Imidazolyl bedeutet, mit Verbindungen der Formel III

30 RUH (III)

a) im Ueberschuss des Reaktanden RUH oder

35 b) in Gegenwart einer organischen Base entweder mit oder ohne 4-Dialkylaminopyridin als Katalysator in inerten Lösungsmitteln oder


c) in Gegenwart anorganischer Basen, wobei jeweils im Temperaturbereich von -10° bis 180° C, vorzugsweise 0° bis 100° C, gearbeitet wird; und

1.2 Verbindungen der Formel Ib



45 mit Verbindungen der Formel III im Ueberschuss oder in einem inerten Lösungsmittel in Gegenwart einer Säure, wie Schwefelsäure, Salzsäure, p-Toluolsulfonsäure oder Bortrifluorid-Diethylether-Komplex, oder von Dicyclohexylcarbodiimid bei Temperaturen von -10° bis 180° C, vorzugsweise 0° bis 140° C; und

50 2. Verbindungen der Formel Ic



(Ic)

in welcher die Symbole R_1 , R_2 , X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, werden hergestellt, indem man umsetzt:

2.1 Verbindungen der Formel II mit Verbindungen der Formel IV




(IV)

a) im Ueberschuss des Reaktanden $\text{HN}(\text{R}_1)\text{R}_2$ oder

b) in Gegenwart einer organischen Base entweder mit oder ohne 4-Dialkylaminopyridin als Katalysator in inerten Lösungsmitteln oder

c) in Gegenwart anorganischer Basen, wobei jeweils im Temperaturbereich von -10° bis 160°C , vorzugsweise 0° bis 100°C , gearbeitet wird; und


3. Verbindungen der Formel Id



(Id)


worin A' den Rest $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$ darstellt und X, Y, R_3 , R_4 , R_5 und n die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, werden hergestellt, indem man

3.1 Verbindungen der Formel Ie




(Ie)

in welcher Z' die Gruppe COOH , COCl , COOAlk^1 oder einen Acyloxycarbonylrest, wie z.B.




Benzoyloxycarbonyl oder Acetyloxycarbonyl darstellt, worin Alk^1 C_1 - C_4 -Alkyl bedeutet, in Gegenwart einer Base mit Hydrazin-Derivaten der Formeln V oder VI



(V)

oder



(VI)

in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von -10° bis 180°C , bevorzugt 0° bis 100°C ; oder
3.2 Verbindungen der Formel Ie schrittweise zuerst mit Hydrazin umgesetzt und dann die erhaltenen Hydrazinverbindungen

3.2.1 mit dem Alkylierungsmittel $R_3\text{-L}$ oder $R_4\text{-L}$, worin L eine Abgangsgruppe darstellt, in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von 0° bis 160°C , bevorzugt 20° bis 120°C ; oder

3.2.2 mit einem Aldehyd oder Keton der Formel $R_3(R_4)\text{C=O}$, worin R_3 und R_4 die unter Formel I angegebenen Bedeutungen haben, mit oder ohne Zusatz einer organischen oder anorganischen Säure bei Temperaturen von -10° bis 150°C , vorzugsweise bei 20° bis 100°C , und anschließend gewünschtenfalls


3.2.3 mit einem Alkylierungsmittel L-R_5 , worin L eine Abgangsgruppe darstellt, in Gegenwart einer starken Base in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von -80° bis 120°C , vorzugsweise -40° bis 80°C ; oder gewünschtenfalls

3.2.4 die unter (3.2.1) hergestellten Hydrazonderivate

a) mit Wasserstoff unter einem Druck von 1 bis $30 \cdot 10^5$ Pa in Gegenwart eines Katalysators im Gemisch mit Aktivkohle in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von 0° bis 100°C hydriert oder

b) mit einem komplexen Metallhydrid, wie z.B. Na-Cyanoborhydrid, in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von -10° bis 80° , vorzugsweise 0° bis 50°C , behandelt; und


4. Verbindungen der Formel If



(If)

in welcher die Symbole X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, werden hergestellt, indem man

Verbindungen der Formel Ig [hergestellt nach Verfahren (2)]



(Ig)


mit einem Dehydratisierungsmittel in einem inerten Lösungsmittel oder ohne Lösungsmittel bei Temperaturen von -10° bis 250°C behandelt, wobei als Dehydratisierungsmittel in Frage kommt:

a) Trifluoressigsäureanhydrid in Gegenwart einer Base, wie z.B. Pyridin, in einem inerten Lösungsmittel, wie z.B. Tetrahydrofuran oder Dioxan, bei Temperaturen von -10° bis 40°C ; oder


b) Chlorsulfonylisocyanat in einem inerten Lösungsmittel, wie z.B. Tetrahydrofuran, bei Temperaturen von 0° bis 85°C und anschließender Behandlung mit Dimethylformamid (vgl. Org. Synth. 50, 18 oder Chem. Ber. 100, 2719); oder

c) Phosphorpentoxid mit oder ohne inerten Lösungsmittel, wie z.B. 1,2-Dichlorethan, Xylol oder Chlorbenzol, gegebenenfalls im Bombenrohr unter erhöhtem Druck, bei 50° bis 250°C (vgl. Fieser, Reagents for Organic Synthesis 1, 871);


5.1 Verbindungen der Formel IL¹

(IL¹),

in welcher R₃, R₄, X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, werden hergestellt, indem man Oximderivate der Formel




mit aktivierten Säurederivaten der Formel




worin AKS ein Halogen, ein O-Acyl, wie z.B. der O-Acylrest der freien Säure vorstehender Formel, Acetoxy oder Benzoyloxy, oder 1-Imidazolyl darstellt, in einem inerten Lösungsmittel und einer Base bei -20°C bis 120°C, bevorzugt bei 0°C bis 50°C, oder die freie Säure (= Ib) in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid unter den gleichen Bedingungen umsetzt (Lit. Ber. 83, 186 (1950); Houben-Weyl E5, S. 773).

5.2 Verbindungen der Formel IL²

(IL²)

in welcher R₃, R₄, X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, werden hergestellt durch Reduktion von Verbindungen der Formel IL¹

(IL¹)

a) mit einem Silan, wie z.B. Triethylsilan, in Gegenwart einer Säure, wie z.B. Trifluoressigsäure, bei 0°C bis 80°C, oder

b) mit Natriumcyanoborhydrid in Gegenwart einer organischen Säure, wie z.B. Essigsäure, bei 0°C bis 80°C, oder

c) auf katalytischen Wege, z.B. mit Pt/H₂.


In einem speziellen Syntheseverfahren werden Verbindungen der Formel IL², worin R₃ und R₄ Wasserstoff bedeuten, hergestellt, indem man ein Säurehalogenid oder ein Säureanhydrid einer Säure der Formel Ib



mit N,O-Bis-trimethylsilylhydroxylamin in Gegenwart einer Base, wie z.B. Butyllithium, in einem inerten Lösungsmittel bei -80° bis 60°C , bevorzugt -50° bis 50°C , umgesetzt.

Die in den vorstehenden Formeln beschriebenen 7-Carbonsäureester, worin U Sauerstoff bedeutet und R die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen soweit sie keine Reste darstellen, die OH-Gruppen, Silizium- oder Phosphor-haltige Gruppen umfassen, können nach in der Literatur beschriebenen Umesterungsmethoden ineinander überführt werden.

Die Vorstufen-Verbindungen der Formeln Ib, Ie, und II lassen sich nach bekannten Methoden, z.B. im Rahmen der folgenden Synthese herstellen:



worin bedeuten:

Y' Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M oder Hydroxy;

X' Wasserstoff, Halogen, Methyl, Methoxy oder COOH;


E^a eine leicht abspaltbare Gruppe wie z.B. Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl, z.B. Methyl, Ethyl oder Isopropyl, oder Benzyl;

L Halogen oder Nitro;

Z^a die Gruppe COOH oder COOC₁-C₄-Alkyl.


Falls Z^a eine freie Säuregruppe (-COOH) bedeutet, kann diese mit den üblichen Methoden in eine Estergruppe, z.B. den Methylester, in ein Säurehalogenid, z.B. das Säurechlorid, oder in das symmetrische oder ein gemischtes Säureanhydrid, z.B. mit dem Acetyl- oder Benzoylrest, umgewandelt werden.

Auf einem parallelen Syntheseweg werden diejenigen Verbindungen der Formel I hergestellt, die durch die Formel I'^b




dargestellt werden, worin

Z^b die unter Formel I angegebenen Bedeutungen von Z besitzt soweit sie keine Reste darstellen, die primäre oder sekundäre Aminogruppen, OH- oder Nitro-Gruppen, $\text{Si}(\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkyl})_3$ oder Phosphor-haltige Gruppen enthalten und X' und Y' die vorstehend unter Formel II^a angegebenen Bedeutungen besitzen.




worin E^b eine leicht abspaltbare Gruppe wie z.B. Wasserstoff, $\text{C}_1\text{-C}_{16}\text{-Alkyl}$, z.B. Methyl, Ethyl, Isopropyl, n-Dodecyl, oder Benzyl oder Acyl, z.B. Acetyl oder den Sulfonsäure-Rest ($-\text{SO}_3\text{H}$) oder Cyano oder darüber hinaus als Teil einer Disulfid-Brücke einen zweiten Rest




bedeutet, und L die unter Formel VIII^a angegebene Bedeutung besitzt.

Darüber hinaus können Verbindungen der Formel Ik




nach einem speziellen Verfahren (C) hergestellt werden, indem man eine Verbindung der Formel XI'




in welcher X' , E^b und Z^b die vorstehend unter Formel XI' angegebenen Bedeutungen besitzen, in saurem Medium mit einer Nitritverbindung bei -40° bis 30°C diazotiert und im gleichen oder einem zweiten Reaktionsgefäß mit einem Reduktionsmittel bei -40° bis 80°C , vorzugsweise bei -30° bis 30°C , behandelt, wobei das Reduktionsmittel vor, nach oder gleichzeitig mit der Nitritverbindung hinzugefügt werden kann.

In einer besonderen Ausführungsform des Verfahrens (C) stellt Z^b in den vorstehenden Formeln XI' und Ik einen Säureester (COOR^a) dar, X' bedeutet Wasserstoff und R^a in seinen Bedeutungen R entspricht mit Ausnahme von Resten mit UH- oder Nitro-Gruppen sowie von Silizium- oder Phosphor-haltigen Resten, wobei Verbindungen der Formel




hergestellt werden, indem man eine Verbindung der Formel




in saurem Medium mit einer Nitritverbindung bei Temperaturen von -20° bis 30°C diazotiert und im gleichen Reaktionsgefäß bei Temperaturen von -20° bis 80°C , vorzugsweise 20° bis 30°C reduziert, wobei das Reduktionsmittel vor, nach oder gleichzeitig mit der Nitritverbindung hinzugefügt werden kann.

Mit einem weiteren speziellen Verfahren können Verbindungen der Formel Ik'



(Ik')

hergestellt werden, indem man eine Verbindung der Formel XI'



(XI')

in welcher X' , E^b und Z^b die vorstehend unter Formel XI' angegebenen Bedeutungen besitzen, in saurem Medium mit einer Nitritverbindung bei -40° bis 30°C diazotiert und das Diazoniumsalz

a) mit einem Kupfer-Halogenid bei Temperaturen von -30° bis 180°C umgesetzt oder


b) falls Hal Fluor bedeutet, mit Flusssäure oder Tetrafluoroborsäure, gegebenenfalls in Gegenwart von Kupferfluoridsalzen, behandelt (Lit. Houben-Weyl 5/3, 216).

Im vorstehend beschriebenen Verfahren (C) finden als saures Reaktionsmedium wässrige Verdünnungen von anorganischen Säuren, wie z.B. Halogenwasserstoffsäuren, Phosphorsäure, Schwefelsäure oder Borfluorwasserstoffsäure, Anwendung; jedoch können auch geeignete organische Säuren verwendet wer-




den, wobei den Säuren inerte organische Lösungsmittel, wie z.B. Tetrahydrofuran oder Dioxan, zugesetzt werden können. Als Nitrite sind sowohl anorganische Nitrit-Verbindungen, wie z.B. die Alkali- und Erdalkalisalze, wie auch organische Nitrit-Verbindungen, wie z.B. Alkylnitrite, geeignet. Als Reduktionsmittel können beispielsweise Alkohole, wie z.B. Ethanol, oder Unterphosphorige Säure, metallisches Kupfer oder Trialkylsilane, wie z.B. Triethylsilan, sowie Ferrocyanide oder Ferrocene, wie z.B. Decamethylferrocen dienen. Der Reduktionsschnitt kann falls erwünscht auch in Gegenwart weiterer Zusätze wie z.B. Kronenether oder Polyethylenglykol durchgeführt werden.

Die beschriebene Methode (C) stellt ein neues chemisch eigenartiges Verfahren dar, mit welchem annellierte Thiadiazolverbindungen in vorteilhafter Weise zugänglich sind.

Die Synthese der Vorstufen der Verbindung XI'



wird durchgeführt, indem man Verbindungen der Formeln VIII', VIII'' und IX




wobei in den vorstehenden Formeln die Substituenten folgende Bedeutungen besitzen:

X' Wasserstoff, Halogen, Methyl, Methoxy oder COOH;

E^a eine leicht abspaltbare Gruppe wie z.B. Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl, z.B. Methyl, Ethyl oder Isopropyl, oder Benzyl;

E^b eine leicht abspaltbare Gruppe wie z.B. Wasserstoff, C₁-C₁₆-Alkyl, z.B. Methyl, Ethyl, Isopropyl, n-Dodecyl, oder Benzyl oder Acyl, z.B. Acetyl oder den Sulfonsäure-Rest (-SO₃H-) oder Cyano oder darüber hinaus als Teil einer Disulfid-Brücke einen zweiten Rest



L Halogen oder Nitro;


L' eine Abgangsgruppe, z.B. Halogen, O-Acyl, wie z.B. der zum symmetrischen Anhydrid der Säure I_b gehörenden Acylrest, oder 1-Imidazolyl

Z^a die Gruppe COOH oder COOC₁-C₄-Alkyl;


Z^b die unter Formel I angegebenen Bedeutungen von Z besitzt soweit sie keine Reste darstellen, die primäre oder sekundäre Aminogruppen, Nitro- oder UH-Gruppen, Si(C₁-C₈-Alkyl)₃ oder Phosphor-haltige Gruppen enthalten;

mit Verbindungen der Formeln HS-E^a oder HS-E^b in Gegenwart einer Base, wie z.B. Alkalicarbonat (z.B. Na₂CO₃ oder K₂CO₃) oder Erdalkalicarbonat (z.B. MgCO₃), Alkoxiden (z.B. Na-Alkoholaten oder K-tert. Butylat), oder Alkalihydriden (z.B. Na-Hydrid) in einem inerten, vorzugsweise dipolar aprotischen Lösungsmittel (z.B. Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, Hexamethylphosphorsäuretriamid, N-Methylpyrrol-

don, Acetonitril, Dioxan oder Tetrahydrofuran) bei Temperaturen von -10° bis 120°C, vorzugsweise 0° bis 60°C, zu Verbindungen der Formel X'



umsetzt, welche entweder durch katalytische oder metallische Reduktion in die Verbindungen der Formel XI'



übergeführt werden.

Für die katalytischen Reduktion können beispielsweise Raney-Nickel sowie Palladium-, Platin- oder Rhodium-Katalysatoren verwendet werden; die Reduktion kann bei Normaldruck oder leicht erhöhtem Druck bei Temperaturen von 0° bis 150°C durchgeführt werden. Als Lösungsmittel kommen z.B. Tetrahydrofuran oder Dioxan in Frage.

Für die metallische Reduktion können z.B. Eisen/Salzsäure, Eisen/Essigsäure, Zinn/Salzsäure, Zink/Salzsäure, Zink/Essigsäure, Kupfer/Ameisensäure verwendet werden.

Ferner kommen Zinn(II)chlorid/Salzsäure, Nickel/Hydrazin, Titantrichlorid, Alkalisulfide oder Na-Dithionit als reduzierende Agentien in Frage. Die Reduktion kann bei Temperaturen von 0° bis 120°C durchgeführt werden. Dabei können als Lösungsmittel Wasser oder Alkohole, wie z.B. Methanol, Ethanol, n-Propanol oder iso-Propanol eingesetzt werden.

Darüber hinaus lassen sich, falls Z^a die Säurefunktion (-COOH) darstellt, spezielle Derivate der Formel IX, in denen Z^b die Reste -COUR', -CON(R₁)R₂ und -CON(R₅)N(R₃)R₄ bedeuten, herstellen, indem man


a) in bekannter Weise das vorerst synthetisierte Derivat der Formel VIII^a (Y' = NO₂) mit einem Alkohol der Formel HUR' oder einem Amin der Formel HN(R₁)R₂ oder einem Hydrazid der Formel HN(R₅)N(R₃)R₄ in Gegenwart einer geeigneten Base, gegebenenfalls katalysiert durch Zusatz von Dimethylaminopyridin, in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von -20° bis 170°C, bevorzugt 0° bis 110°C umsetzt, oder

b) eine Verbindung der Formel VIII' (Z^a = COOH) in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid mit einem Alkohol der Formel HUR' oder einem Amin der Formel HN(R₁)R₂ oder einem Hydrazid der Formel HN(R₅)N(R₃)R₄ in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von 0° bis 120°C, bevorzugt 10° bis 80°C, umsetzt.


Die Bedeutungen der Reste R₁ bis R₅ und das Symbol U sind im vorstehenden Text bereits beschrieben und R' hat die Bedeutung von R mit Ausnahme der Reste (T)-P(O)(OR₆)-(C₁-C₄-Alkyl), (T)-PO(OR₆)₂ und (T)_n-Si(C₁-C₈-Alkyl)₃.

Die Verbindungen der Formel X' sind bekannt oder lassen sich mit in der Literatur bekannten Verfahren herstellen. Nach einem speziellen Verfahren sind einige dieser Derivate wie folgt herstellbar:

Verbindungen der Formel



werden zuerst in Gegenwart von 2 Äquivalenten einer Base, wie beispielsweise einem Alkalicarbonat (z.B. Na_2CO_3 oder K_2CO_3) oder einem Erdalkalicarbonat (z.B. MgCO_3) oder einem Metallhydrid (z.B. NaH oder LiH) mit einer Verbindung der Formel HS-E^a oder HS-E^b , in einem inerten, vorzugsweise dipolar aprotischen Lösungsmittel, wie z.B. Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, Hexamethylphosphorsäuretriamid oder N-Methylpyrrolidon, umgesetzt und das gebildete Derivat mit einem Alkylierungsmittel $\text{R}^a\text{-L}''$, worin L'' eine Abgangsgruppe, wie z.B. Halogen, vorzugsweise Jod, oder $-\text{OSO}_2\text{R}^a$, bedeutet, wobei $\text{R}^a\text{-L}''$ z.B. Dimethylsulfat sein kann, verestert:



In den vorstehenden Formeln bedeuten R^a ein unter R für Formel I definierter aliphatischer oder araliphatischer Rest und die Reste L, S-E^a , S-E^b und X' die unter den Formeln VIII', VIII'' und IX angegebenen Bedeutungen.

In den vorstehend beschriebenen Verfahren sind unter Basen, wenn nicht speziell angegeben, sowohl anorganische als auch organische Basen zu verstehen. Dazu zählen als anorganische Basen beispielsweise Hydroxide, Hydrogencarbonate, Carbonate und Hydride des Lithiums, Natriums, Kaliums, Calciums und Bariums, sowie Alkaliamide, wie z.B. NaNH_2 oder Alkylolithiumverbindungen, wie z.B. n-Butyllithium. Als organische Basen sind beispielsweise zu nennen: Amine, insbesondere tertiäre Amine wie z.B. Trimethylamin, Triethylamin, Tripropylamin, Tributylamin, Tribenzylamin, Tricyclohexylamin, Triamylamin, Trihexylamin, N,N-Dimethylanilin, N,N-Dimethyltoluidin, N,N-Dimethyl-p-amino-pyridin, N-Methylpyrrolidin, N-Methylpiperidin, N-Methylpyrrolidin, N-Methylimidazol, N-Methylpyrrol, N-Methylmorpholin, N-Methylhexamethylenimin, Pyridin, Chinolin, alpha-Picolin, beta-Picolin, Isochinolin, Pyrimidin, Acridin, N,N,N',N'-Tetra-methylethylendiamin, N,N,N',N'-Tetraethylethylendiamin, Chinoxalin, N-Propyldiisopropylamin, N,N-Dimethylcyclohexylamin, 2,6-Lutidin, 2,4-Lutidin oder Triethyldiamin.

Als inerte Lösungsmittel sind in Anpassung an die jeweiligen Reaktionsbedingungen beispielsweise zu nennen:

Halogenkohlenwasserstoffe, insbesondere Chlorkohlenwasserstoffe, wie z.B. Tetrachlorethylen, Tetrachlorethan, Dichlorpropan, Methylenchlorid, Dichlorbutan, Chloroform, Chlornaphthalin, Dichlornaphthalin, Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorethan, Trichlorethylen, Pentachlorethan, Difluorbenzol, 1,2-Dichlorethan, 1,1-Dichlorethan, 1,2-cis-Dichlorethylen, Chlorbenzol, Fluorbenzol, Brombenzol, Jodbenzol, Dichlorbenzol, Dibrombenzol, Chlortoluol, Trichlorbenzol; Ether, wie z.B. Ethylpropylether, Methyl-tert.-butylether, n-Butylethylether, Di-n-butylether, Di-isobutylether, Diisoamylether, Diisopropylether, Anisol, Phenetol, Cyclohexylmethylether, Diethylether, Ethylenglykoldimethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan, Thioanisol, Dichlordiethylether, Methylcellosolve; Alkohole; wie z.B. Methanol, Ethanol, n-Propanol, iso-Propanol, n-Butanol; iso-Butanol; Nitrokohlenwasserstoffe wie z.B. Nitromethan, Nitroethan, Nitrobenzol, Chlornitrobenzol, o-Nitrotoluol; Nitrile wie z.B. Acetonitril, Butyronitril, Isobutyronitril, Benzonitril, m-Chlorbenzonitril; aliphatische oder cycloaliphatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Heptan, Pinan, Nonan, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedepunkintervalls von 70° bis 190°C , Cyclohexan, Methylcyclohexan, Dekalin, Petrolether, Hexan, Ligroin, Trimethylpentan, Trimethylpentan, 2,3,3-Trimethylpentan, Octan; Ester wie z.B. Ethylacetat, Acetessigester, Isobutylacetat; Amide, wie z.B. Formamid, Methylformamid, Dimethylformamid; Ketone, wie Aceton, Methylethylketon, gegebenenfalls auch Wasser. Auch Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel kommen in Betracht.

Die vorstehend beschriebenen Herstellungsverfahren basieren, soweit nicht neu, auf bekannten Synthesemethoden, die der folgenden Literatur entnommen werden können:

The Chemistry of Heterocyclic Compounds with Nitrogen and Sulfur or Nitrogen, Sulfur and Oxygen, Interscience Publ., New York 1952; P. Kirby et al. J. Chem. Soc. (C) 321 (1967) und 2250 (1970) und 3994 (1971); FR-PS 1 541 415; J. Org. Chem. 27, 4675 (1962); Deutsche Offenlegungsschriften 2 400 887 und 2 504 383; SU-PS 400 574 [Chem. Abstr. 80(9)47661 h]; Org. Synth. Coll. Vol. I, 125; Tetrahedr. 21, 663 (1965).

Bei den Verbindungen der Formeln X, X', XI und XI' handelt es sich um neue Stoffe, während die Verbindungen der Formeln VIII, VIII' und IX teilweise neu sind. Die neuen Verbindungen stellen einen Teil der vorliegenden Erfindung dar.

Die im Rahmen der Erfindung zur Anwendung gelangenden pflanzenschützenden Mittel, welche die Verbindungen der Formel I als Aktivstoffe enthalten, sind ebenfalls als Teil der Erfindung zu betrachten.

Wirkstoffe der Formel I werden üblicherweise in Form von Zusammensetzungen verwendet und können gleichzeitig oder nacheinander mit weiteren Wirkstoffen auf die Pflanze oder deren Umgebung gegeben werden. Diese weiteren Wirkstoffe können sowohl Düngemittel, Spurenelement-Vermittler oder andere das Pflanzenwachstum beeinflussende Präparate sein. Es können aber auch selektive Herbizide, Insektizide, Fungizide, Bakterizide, Nematizide, Molluskizide oder Gemische mehrerer dieser Präparate sein, zusammen mit gegebenenfalls weiteren in der Formulierungstechnik üblichen Trägerstoffen, Tensiden oder anderen applikationsfördernden Zusätzen.

Geeignete Träger und Zusätze können fest oder flüssig sein und entsprechen den in der Formulierungstechnik zweckdienlichen Stoffen, wie z.B. natürlichen oder regenerierten mineralischen Stoffen, Lösungs-, Dispergier-, Netz-, Haft-, Verdickungs-, Binde- oder Düngemitteln.

Ein bevorzugtes Verfahren zum Aufbringen eines Wirkstoffes der Formel I bzw. eines agrochemischen Mittels, das mindestens einen dieser Wirkstoffe enthält, ist das Aufbringen auf das Blattwerk (Blattapplikation). Die Wirkstoffe der Formel I können aber auch über den Erdboden durch das Wurzelwerk in die Pflanze gelangen (systemische Wirkung), indem man den Standort der Pflanze mit einer flüssigen Zubereitung trinkt oder die Substanzen in fester Form in den Boden einbringt z.B. in Form von Granulat (Bodenapplikation). Die Verbindungen der Formel I können aber auch auf Samenkörner aufgebracht werden (Coating), indem man die Körner entweder in einer flüssigen Zubereitung des Wirkstoffs trinkt oder sie mit einer festen Zubereitung beschichtet (Beizapplikation). Darüber hinaus sind in besonderen Fällen weitere Applikationsarten möglich, so z.B. die gezielte Behandlung der Pflanzenstengel oder der Knospen.

Die Verbindungen der Formel I werden dabei in unveränderter Form oder vorzugsweise zusammen mit den in der Formulierungstechnik üblichen Hilfsmitteln eingesetzt. Zu diesem Zweck werden sie z.B. zu Emulsionskonzentraten, streichfähigen Pasten, direkt versprühbaren oder verdünnbaren Lösungen, verdünnten Emulsionen, Spritzpulvern, löslichen Pulvern, Stäubemitteln, Granulaten, durch Verkapselungen in z.B. polymeren Stoffen in bekannter Weise verarbeitet. Die Anwendungsverfahren wie Versprühen, Vernebeln, Verstäuben, Verstreuen, Bestreichen oder Giessen werden gleich wie die Art der Mittel den angestrebten Zielen und den gegebenen Verhältnissen entsprechend gewählt. Günstige Aufwandmengen liegen im allgemeinen bei 50 g bis 5 kg Aktivsubstanz (AS) je ha; bevorzugt 100 g bis 2 kg AS/ha, insbesondere bei 100 g bis 600 g AS/ha.

Die Formulierungen, d.h. die den Wirkstoff der Formel I und gegebenenfalls einen festen oder flüssigen Zusatzstoff enthaltenden Mittel, Zubereitungen oder Zusammensetzungen werden hergestellt durch inniges Vermischen und/oder Vermahlen der Wirkstoffe mit Streckmitteln, wie z.B. mit Lösungsmitteln, festen Trägerstoffen, und gegebenenfalls oberflächenaktiven Verbindungen (Tensiden).

Als Lösungsmittel können in Frage kommen: Aromatische Kohlenwasserstoffe, bevorzugt die Fraktionen C_8 bis C_{12} , wie z.B. Xylolgemische oder substituierte Naphthaline, Phthalsäureester wie Dibutyl- oder Dioctylphthalat, aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Cyclohexan oder Paraffine, Alkohole und Glykole sowie deren Ether und Ester, wie Ethanol, Ethylenglykol, Ethylenglykolmonomethyl- oder Ethylether, Ketone wie Cyclohexanon, stark polare Lösungsmittel wie N-Methyl-2-pyrrolidon, Dimethylsulfoxid oder Dimethylformamid, sowie gegebenenfalls epoxidierte Pflanzenöle wie epoxidiertes Kokosnussöl oder Sojaöl; oder Wasser.

Als feste Trägerstoffe, z.B. für Stäubemittel und dispergierbare Pulver, werden in der Regel natürliche Gesteinsmehle verwendet, wie Calcit, Talkum, Kaolin, Montmorillonit oder Attapulgit. Zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften können auch hochdisperse Kieselsäure oder hochdisperse saugfähige Polymerisate zugesetzt werden. Als gekörnte, adsorptive Granulaträger kommen poröse Typen wie z.B. Bimsstein, Ziegelbruch, Sepiolit oder Bentonit, als nicht sorptive Trägermaterialien z.B. Calcit oder Sand in Frage. Darüber hinaus kann eine Vielzahl von vorgranulierten Materialien anorganischer oder organischer Natur, wie insbesondere Dolomit oder zerkleinerte Pflanzenrückstände, verwendet werden. Besonders vorteilhafte applikationsfördernde Zuschlagstoffe sind ferner natürliche (tierische oder pflanzliche) oder synthetische Phospholipide aus der Reihe der Kephaline und Lecithine.

Als oberflächenaktive Verbindungen kommen je nach Art des zu formulierenden Wirkstoffes der Formel I nichtionogene, kation-und/oder anionaktive Tenside mit gutem Emulgier-, Dispergier- und Netzeigenschaften in Betracht. Unter Tensiden sind auch Tensidgemische zu verstehen.

Bei den kationischen Tensiden handelt es sich vor allem um quartäre Ammoniumsalze, welche als N-Substituenten mindestens einen Alkylrest mit 8 bis 22 C-Atomen enthalten und als weitere Substituenten niedrige, gegebenenfalls halogenierte Alkyl-, Benzyl- oder niedere Hydroxyalkylreste aufweisen.

Geeignete anionische Tenside können sowohl sog. wasserlösliche Seifen, als auch wasserlösliche synthetische oberflächenaktive Verbindungen sein.

Als Seifen seien die Alkali-, Erdalkali- oder gegebenenfalls substituierten Ammoniumsalze von höheren Fettsäuren (C₁₀-C₂₂), wie z.B. die Na- oder K-Salze der Oel- oder Stearinsäure oder von natürlichen Fettsäuregemischen, die z.B. aus Kokosnuss- oder Talgöl gewonnen werden können, genannt.

Als synthetische Tenside können insbesondere Fettalkoholsulfonate, Fettalkoholsulfate, sulfonierte Benzimidazolderivate oder Alkylsulfonate Verwendung finden. Die Fettalkoholsulfonate oder -sulfate liegen in der Regel als Alkali-, Erdalkali- oder gegebenenfalls substituierte Ammoniumsalze vor und weisen einen Alkalirest mit 8 bis 22 C-Atomen auf.

Als nichtionische Tenside kommen in erster Linie Polyglykoetherderivate von aliphatischen oder cycloaliphatischen Alkoholen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren und Alkylphenolen in Frage, die 3 bis 30 Glykoethergruppen und 8 bis 20 Kohlenstoffatome im (aliphatischen) Kohlenwasserstoffrest und 6 bis 18 Kohlenstoffatome im Alkylrest der Alkylphenole enthalten können.


Die Mittel können auch weitere Zusätze wie Stabilisatoren, Entschäumer, Viskositätsregulatoren, Bindemittel, Haftmittel sowie Dünger oder andere Wirkstoffe zur Erzielung spezieller Effekte enthalten.

Die agrochemischen Zubereitungen enthalten in der Regel 0,1 bis 99 Gew.-% insbesondere 0,1 bis 95 Gew.-%, Wirkstoff der Formel I, 99,9 bis 1 Gew.-%, insbesondere 99,8 bis 5 Gew.-%, eines festen oder flüssigen Zusatzstoffes und 0 bis 25 Gew.-%, insbesondere 0,1 bis 25 Gew.-%, eines Tensides.

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur näheren Erläuterung der Erfindung.


1. Herstellungsbeispiele

Beispiel 1.1: Herstellung von 2-Chlor-3-nitrobenzoesäuremethylester (Zwischenprodukt).




50,0 g (0,248 Mol) 2-Chlor-3-nitrobenzoesäure werden in 500 ml Methanol gelöst und mit 20 ml konzentrierter Schwefelsäure versetzt. Nach 24 Stunden Rückfluss wird das Gemisch auf Eis/Wasser gegossen und der weiße Niederschlag filtriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet. Ausbeute: 53 g (99 % d.Th.); Smp. 68° C.

Beispiel 1.2: Herstellung von 2-Benzylthio-3-nitrobenzoesäuremethylester (Zwischenprodukt)




45,4 g (0,21 Mol) 2-Chlor-3-nitrobenzoesäuremethylester und 24,8 ml (0,21 Mol) Benzylmercaptan werden in 420 ml Dimethylformamid gelöst, mit 29,2 g (0,21 Mol) Kaliumcarbonat versetzt und 8 Stunden bei 80° C gerührt. Dann wird auf Eis/Wasser gegossen, zweimal mit Essigsäureethylester extrahiert, die Extrakte mit Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und eingedampft. Ausbeute: 62,7 g (98,5 % d.Th.) Oel.

Beispiel 1.3: Herstellung von 3-Amino-2-benzylthiobenzoesäuremethylester (Zwischenprodukt)




62,7 g (0,207 Mol) 2-Benzylthio-3-nitrobenzoesäuremethylester werden in 700 ml Tetrahydrofuran gelöst, mit 14 g Raney-Nickel versetzt und bei 20-28° C hydriert.
Ausbeute: 54,5 g (96 % d.Th.)

Beispiel 1.4: Herstellung von 5-Brom-2-chlor-3-nitrobenzoesäuremethylester (Zwischenprodukt)




Zu 51,0 g (0,182 Mol) 5-Brom-2-chlor-3-nitrobenzoesäure und 500 ml Methanol werden 20 ml konzentrierte Schwefelsäure getropft. Das Gemisch wird dann 16 Stunden am Rückfluss gekocht. Anschliessend wird mit einem Eisbad gekühlt und der ausgefallene Niederschlag filtriert. Die Mutterlauge wird eingeeengt, mit Wasser versetzt und der ausgefallene Niederschlag filtriert.
Ausbeute: 50,2 g (94 % d.Th.). Smp. 69° C

Beispiel 1.5: Herstellung von 2-Benzylmercapto-5-brom-3-nitrobenzoesäuremethylester (Zwischenprodukt)



71,6 g (0,58 Mol) Benzylmercaptan werden in 2,9 l Methanol/Wasser (8:2) gelöst und 79,8 g (0,58 Mol) Kaliumcarbonat zugegeben. Bei 0-5° C werden unter Rühren 170 g (0,58 Mol) 5-Brom-2-chlor-3-nitrobenzoesäuremethylester portionenweise während 2,5 Stunden zugegeben. Dann noch zwei weitere Stunden gerührt und anschliessend die Innentemperatur auf 20° C steigen gelassen. Darauf wird der ausgefallene Niederschlag filtriert, mit etwas Wasser und anschliessend mit 500 ml Methanol/Wasser gewaschen. Nach Trocknung wurden 208 g (94 %) hellgelbes Produkt erhalten. Die Umkristallisation in 400 ml Methanol ergab 190 g (86 % d.Th.) Produkt mit einem Smp. von 65-66° C.


Beispiel 1.6: Herstellung von 3-Amino-2-benzylthio-benzoesäuremethylester (Zwischenprodukt)



156,25 g (0,408 Mol) 2-Benzylthio-5-brom-3-nitrobenzoesäuremethylester werden in 3 l Tetrahydrofuran in Gegenwart von 60 g Pd/C (5 %) hydriert. Nach Reduktion der Nitrogruppe werden weitere 30 g Pd/C (5


%) und 45,4 g (0,448 Mol) Triethylamin zugegeben und die Hydrierung fortgesetzt. Dann wird der Katalysator abfiltriert und die Lösung eingeeengt. Der ölige Rückstand wird in Essigsäureethylester aufgenommen, dreimal mit Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und die Lösung eingedampft. Das erhaltene Produkt (111 g) wurde direkt weiter verarbeitet.

Beispiel 1.7: Herstellung von 7-Methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazol



475 g (1,74 Mol) 3-Amino-2-benzylthiobenzoessäuremethylester werden bei 35°C langsam zu 1,18 l konzentrierter Salzsäure in 520 ml Wasser gegeben, wobei sich das Hydrochlorid bildet. Man rührt 15 Minuten bei der gleichen Temperatur weiter und kühlt dann auf -5°C ab. Darauf wird eine Lösung von 120 g Natriumnitrit in 520 ml Wasser während 2,5 Stunden zutropft. Nach Beendigung des Zutropfens wird 2 Stunden bei 0°C und weitere 2 Stunden bei 20°C gerührt. Das Reaktionsgut wird filtriert, mit Wasser ausgewaschen und abgepresst. Nach Umkristallisation in Essigsäureethylester/Hexan wurden 292 g (86 % d.Th) vom Smp. 134-135°C erhalten.


Beispiel 1.8: Herstellung von Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure



100 g (0,51 Mol) 7-Methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazol werden in 1000 ml Wasser suspendiert. Dann werden 310 ml 2 N Natronlauge und 5 ml Dioxan dazugegeben. Das Reaktionsgemisch wird auf 40°C erwärmt und 4 Stunden bei dieser Temperatur gerührt. Dann wird auf 10°C gekühlt, nochmals 1000 ml Wasser zugegeben und mit 310 ml 2N Salzsäure neutralisiert. Der erhaltene Niederschlag wird filtriert, leicht luftgetrocknet, in Tetrahydrofuran gelöst, die Lösung über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Die Kristalle werden in Hexan aufgeschlämmt, filtriert und getrocknet.


Ausbeute: 91 g (98 % d.Th.); Smp. 261-263°C.

Beispiel 1.9a: Herstellung von Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäurechlorid (Zwischenprodukt)




12,54 g (0,070 Mol) Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure werden mit 80 ml Thionylchlorid gemischt. Das Gemisch wird erwärmt und während 8 Stunden bei einer Badtemperatur von 90°C gehalten. Anschliessend wird das überschüssige Thionylchlorid am Rotavapor bei einer Badtemperatur von 40°C abdestilliert. Das erhaltene Öl wurde fest; Smp. 107°C.


Für die weiteren Umsetzungen wird das erhaltene Säurechlorid in Toluol gelöst und direkt weiter verwendet.

Beispiel 1.9b: Herstellung des symmetrischen Anhydrids der 1,2,3-Benzthiadiazol-7-carbonsäure

3 g 1,2,3-Benzthiadiazol-7-carbonsäure werden in 50 ml Acetanhydrid während 24 Stunden unter Rückfluss gekocht. Dann wird die dünne Suspension unter Vakuum eingedampft, der feste Rückstand mit Ether aufgeschlämmt und abfiltriert. Es resultieren 4,3 g Anhydrid vom Smp. 117-119° C. Die gleiche Verbindung wird z.B. auch durch Erwärmen der Carbonsäure mit Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid in trockenem Tetrahydrofuran erhalten (vgl. Synthesis 1981, 616).


Beispiel 1.10: Herstellung von 7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol

4,0 g (0,022 Mol) Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-yl-carbonsäureamid werden in 35 ml Tetrahydrofuran gelöst und mit 3,6 ml (0,045 Mol) Pyridin versetzt. Dann wird auf 3° gekühlt und eine Lösung von 3,9 ml (0,028 Mol) Trifluoressigsäureanhydrid in 12 ml Tetrahydrofuran zutropft. Darauf wird das Reaktionsgemisch 22 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Anschliessend wird auf Eis/Wasser gegossen, zweimal mit Essigsäureethylester extrahiert, die Extrakte mit Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, und durch eine Kieselgelschicht filtriert. Nach dem Eindampfen erhielt man 3,5 g (99 % d.Th.) kristallines Produkt mit einem Smp. von 119-122°.

Beispiel 1.11: Herstellung von Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäurehydrazid


9,7 g 7-Methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazol werden 19 Stunden mit 4,8 g Hydrazinhydrat in 30 ml Wasser bei 50° C und anschliessend weitere 6 Stunden bei 80-90° C umgesetzt. Die Suspension wird leicht abgekühlt, warm abfiltriert und mit Wasser gewaschen. Es verblieben 8,8 g weisse Kristalle vom Smp. 270-272°.

Beispiel 1.12: Herstellung von 2-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-1-(α-methylpropylen)-hydrazin




21,5 g Benzthiadiazol-7-carbonsäurehydrazid und 150 ml Methylethylketon werden in 150 ml Eisessig während 8 Stunden auf 70°C erwärmt. Anschliessend wird das Reaktionsgemisch am Vakuum eingedampft, der Rückstand in 1 l Dichlormethan aufgenommen und die Lösung zweimal mit 700 ml Eiswasser gewaschen. Dann wird über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingedampft, der Rückstand mit Essigester angeschlämmt, filtriert und getrocknet. Das oben angegebene Produkt schmilzt bei 159-162°C.

Beispiel 1.13: Herstellung von 2-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-1-(2'-n-butyl)-hydrazin




10,5 g 2-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-1-(α-methylpropylidenhydrazin werden in 150 ml Dimethylformamid und 100 ml Methylcellosolve gelöst und über 7 g Platin/Kohle bei Raumtemperatur und unter Normaldruck hydriert. Anschliessend wird vom Katalysator abfiltriert und das nach Eindampfen des Filtrats verbleibende Produkt mit Essigsäureethylester an Kieselgel chromatographiert. Das Produkt wurde in Form weisser Kristalle vom Smp. 148-150° erhalten.

Beispiel 1.14: Herstellung von 2-Benzylthio-3,5-dinitro-benzoessäuremethylester (Zwischenprodukt)



332 g (2,40 Mol) Kaliumcarbonat werden in 500 ml Dimethylformamid vorgelegt und auf -5°C gekühlt. Dann lässt man 375 g (1,14 Mol) 2-Chlor-3,5-dinitrobenzoesäure (75 %ig mit 25 % Wasser; Transport- und Lagerform) in 1,1 l Dimethylformamid während 30 Minuten zulaufen. Die Innentemperatur wird dabei auf -5°C bis 4°C gehalten. Anschliessend werden 142 g (1,14 Mol) Benzylmercaptan bei 0 bis 3°C während 2,5 Stunden zugetropft. Darauf lässt man die Temperatur während 16 Stunden auf 20°C steigen. Dann werden bei Raumtemperatur 170 g (1,2 Mol) Methyljodid während 5 Stunden zugetropft. Anschliessend wird das Reaktionsgemisch 16 Stunden bei Raumtemperatur gerührt und danach auf 3 l Eis/Wasser gegossen, gerührt und filtriert. Das abgesaugte Gut wird viermal mit je 700 ml Wasser gewaschen noch feucht in der nächsten Stufe (vgl. Beispiel 1.15) hydriert. Das getrocknete Produkt hat einen Smp. von 113-114°C.


Beispiel 1.15: Herstellung von 2-Benzylthio-3,5-diamino-benzoessäuremethylester (Zwischenprodukt)



Der in der vorhergehenden Stufe (vgl. Beispiel 1.14) erhaltene, noch feuchte 2-Benzylthio-3,5-dinitrobenzoesäuremethylester wird in 2 l Tetrahydrofuran gelöst und unter Zusatz von dreimal 40 g Raney-Nickel bei 30° bis 35° C hydriert. Darauf wird der Katalysator abfiltriert, das Filtrat eingengt und der Rückstand in Essigsäureethylester aufgenommen. Nach Trocknung über Magnesiumsulfat und Behandlung mit Aktivkohle und Bleicherde wird das Filtrat eingengt und das Produkt durch Zusatz von Diethylether zur Kristallisation gebracht.

Ausbeute: 253 g (77 % d.Th. über drei Stufen); Smp. 84-86° C.

Beispiel 1.16 Herstellung von 7-Methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazol



a) 100 g (0,35 Mol) 2-Benzylthio-3,5-diaminobenzoessäuremethylester werden portionsweise zu 250 ml konz. Salzsäure und 110 ml Wasser gegeben und 1,5 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Dann wird das Gemisch auf -5° C gekühlt und während 2,5 Stunden unter Rühren eine Lösung von 48,5 g (0,70 Mol) Natriumnitrit in 210 ml Wasser zugetropft. Der Rührvorgang wird weitere 2 Stunden bei 0° C fortgesetzt. Anschliessend werden 190 ml 50 %ige unterphosphorige Säure während 2 1/2 Stunden zugetropft. Darauf lässt man die Temperatur während 19 Stunden auf 20° C steigen. Das erhaltene Produkt wird abfiltriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet. Zur Reinigung wird das Produkt in Essigsäureethylester/Methylenchlorid gelöst, durch Kieselgel filtriert, evaporiert und durch Zugabe von Hexan kristallisiert. Ausbeute: 44,4 g (65 % d.Th.); Smp. 132° C.

b) 576 g (2 Mol) 3,5-Diamino-2-benzylthio-benzoesäure-methylester werden in 500 ml 1,4-Dioxan gelöst und unter Rühren und Kühlen bei 0° bis 5° C zu vorgelegter 5N Salzsäure (3 l) getropft. Anschliessend wird die feine Suspension auf -17° bis -20° C abgekühlt und innerhalb 1,25 Stunden unter Niveau tropfenweise mit 294 g Natriumnitrit in 500 ml Wasser versetzt. Unter weiterem Rühren wird die Innentemperatur innerhalb 1 Stunde auf -5° C ansteigen gelassen und während 2 Stunden gehalten. Dann wird auf -15° C abgekühlt und die Suspension unter Rühren portionenweise in auf -10° bis -15° C gekühlte Unterphosphorige Säure (1,1 l) eingetragen, wobei Stickstoff entweicht. Nach beendeter Zugabe wird die Innentemperatur innerhalb 5-6 Stunden auf Raumtemperatur ansteigen gelassen, der gebildete Niederschlag abfiltriert, diese mit 2,5 l Methylenchlorid verrührt, wieder vom nichtgelösten Teil abfiltriert und das Filtrat vom Wasser getrennt. Anschliessend wird die organische Phase über Natriumsulfat getrocknet, mit 300 g Kieselgel verrührt, erneut filtriert, mit Methylenchlorid nachgewaschen und das Filtrat eingedampft. Aus Methanol umkristallisiert resultieren insgesamt 244,8 g (63,1 % d. Th.) beige Kristalle vom Smp. 130° C-133° C.


c) 183 g (0,5 Mol) 3,5-Diamino-2-n-dodecylthio-benzoesäure-methylester, gelöst in 200 ml Dioxan, werden unter Kühlen und Rühren bei 0°-5° C zu vorgelegten 1,2 l 5N Salzsäure getropft. Zur Erzielung eines feinen Niederschlags wird noch ca. 1 Stunde weiter gerührt. Dann wird auf -15° bis -21° C abgekühlt und unter weiterem Rühren bei dieser Temperatur innerhalb 1 Stunde tropfenweise unter Niveau eine Lösung von 73,5 g Natriumnitrit in 130 ml Wasser zugefügt. Anschliessend wird die Innentemperatur innerhalb 1 Stunde auf -5° C ansteigen gelassen und bei dieser Temperatur noch 3 Stunden weitergerührt. Sodann wird die Suspension wieder auf -10° C gekühlt und innerhalb 1,5 Stunden portionenweise zu ebenfalls gekühlter Unterphosphoriger Säure (280 ml) gegeben, wobei Stickstoff entweicht. Schliesslich wird während 6 Stunden weitergerührt, wobei die Raumtemperatur erreicht ist, der Niederschlag dann abfiltriert und wie unter 1.16 b zum Rohprodukt aufgearbeitet. Dieses kann zur

weiteren Reinigung auch durch einen mit Kieselgel gefüllten Saugfilter filtriert werden, wobei mit Methylenchlorid/Hexan (10:1) nachgewaschen wird. Eindampfen und Verrühren des Rückstandes mit 300 ml Methanol liefert 46,3 g beige Kristalle. Aus dem Filtrat können nach Kristallisation aus Essigsäureethylester weitere 7,2 g Rohprodukt erhalten werden. Somit beträgt die Gesamtbeute 53,5 g (55,2 % d. Th.), Smp. 130°-133° C

d) 1,48 g 1,2,3-Benzthiazol-7-carbonsäure werden unter Stickstoffatmosphäre in 40 ml abs. Tetrahydrofuran vorgelegt und bei 0-3° C unter Kühlen tropfenweise mit 1,46 g 1-Chlor-N,N-2-trimethylpropenylamin versetzt. Ueber Nacht wird bei Raumtemperatur gerührt, anderntags wieder abgekühlt und eine Lösung von 1,18 g Pyridin und 0,64 g Methanol abs. zugegeben. Anschließend wird während 7 Stunden bei Raumtemperatur gerührt, mit Methylenchlorid verdünnt und mit Eiswasser versetzt. Die organische Phase wird abgetrennt, die wässrige Phase noch dreimal mit Methylenchlorid extrahiert, die Extrakte mit Wasser gewaschen, getrocknet und eingedampft. Der kristalline Rückstand wird am Hochvakuum bei 50° C getrocknet, mit etwas Hexan verrieben, filtriert und der Niederschlag mit Hexan gut gewaschen. Es resultieren 1,38 g (87 % d. Th.) reines Produkt vom Smp. 128-130° C.


e) Nach der gleichen Methode wie in Beispiel 1.16b beschrieben, wird 3,5-Diamino-2-methylthiobenzoessäure-methylester in die Titelverbindung umgewandelt.

Beispiel 1.17: Herstellung von 7-(2-Trimethylsilylethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol



1,99 g (0,01 Mol) 7-Benzothiadiazolcarbonsäurechlorid in 18 ml Toluol werden während 25 Minuten zu einer Lösung von 1,9 ml (0,013 Mol) 2-Trimethylsilyl-ethanol, 2,4 ml (0,017 Mol) Triethylamin und 18 ml Toluol getropft. Anschließend wird 16 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Dann wird das Reaktionsgemisch auf Eis/Wasser gegossen und zweimal mit Essigsäureethylester extrahiert. Die Extrakte werden vereinigt, mit Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert, eingeeengt, mit der gleichen Menge Hexan versetzt und durch Kieselgel filtriert. Nach dem Einengen werden 2,0 g (71 % d.Th.) Produkt erhalten; Smp. 37-39° C.


Beispiel 1.18: Herstellung von 7-(Carboxymethyl-O-ethyl-methylphosphinsäureester)-benzo-1,2,3-thiadiazol



2,6 g (0,013 Mol) Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäurechlorid in 26 ml Dioxan werden zu einer Lösung von 2,2 g Hydroxymethyl-methyl-phosphinsäureethylester, 3,2 ml (0,023 Mol) Triethylamin und 26 ml Dioxan getropft. Anschließend wird 16 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Dann wird das Reaktionsgemisch durch eine Kieselgelschicht filtriert und eingeeengt. Das Produkt wird in Essigsäureethylester/Hexan umkristallisiert.


Ausbeute: 2,2 g (56 %); Smp. 89-92° C.

Beispiel 1.19: Herstellung von 2-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl-1-(2'-butyl)-hydrazin




10,5 g 2-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-1-(α -methylpropylidenhydrazin werden in 150 ml Dimethylformamid und 100 ml Methylcellosolve gelöst und über 7 g Platin/Kohle bei Raumtemperatur und Normaldruck hydriert. Anschliessend wird die Lösung vom Katalysator abfiltriert und das nach Eindampfen des Filtrats verbleibende Produkt an Kieselgel (Essigester) chromatographiert. Das Produkt wurde in Form weisser Kristalle vom Smp. 148-150 °C erhalten.

Beispiel 1.20: Herstellung von 2-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-1-(2'-butyl)-hydrazin




4,8 g Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäurehydrazid werden in 300 ml Tetrahydrofuran gelöst und mit 9,3 g Methyläthylketon und 0,6 g 5%igem Platinkohle-Katalysators versetzt. Dann wird bei 20° bis 25° bei Normaldruck bis zum Stillstand der Reaktion hydriert, wobei 3 weitere Katalysator-Zusätze zu je 2 g gemacht wurden. Anschliessend wird vom Katalysator abfiltriert, eingedampft und aus Essigester umkristallisiert:
weisse Kristalle vom Smp. 147-150 °C.

Beispiel 1.21: Herstellung von 2-Benzylthio-3-nitrobenzoesäure (Zwischenprodukt)




6,85 g (0,055 Mol) Benzylmercaptan werden in 150 ml Dimethylformamid gelöst. Dann wird auf 0 °C gekühlt und 15,2 g (0,11 Mol) Kaliumcarbonat zugegeben. Bei 0° bis 5 °C werden 10,6 g (0,050 Mol) 2,3-Dinitrobenzoesäure portionenweise zugegeben. Anschliessend lässt man die Innentemperatur während 24 Stunden auf Raumtemperatur steigen. Darauf wird das Reaktionsgemisch auf Eis/Wasser gegeben und mit Salzsäure angesäuert. Das erhaltene Produkt wird filtriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet.
Ausbeute: 11,8 g (82 % d.Th.); Smp. 152-153 °C.

Beispiel 1.22: Herstellung von 3-Amino-2-benzylthiobenzoessäure




11,0 g (0,038 Mol) 2-Benzylthio-3-nitrobenzoesäure werden in 110 ml Tetrahydrofuran gelöst und bei 20° bis 25°C in Gegenwart von Raney-Nickel bei Normaldruck hydriert. Darauf wird der Katalysator abfiltriert, das Filtrat eingeeengt und das erhaltene Produkt direkt in der nächsten Stufe eingesetzt (Beispiel 1.23).

Beispiel 1.23: Herstellung von Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure




Das erhaltene Produkt aus Beispiel 1.22 wird analog Beispiel 1.7 mit Salzsäure und Natriumnitrit umgesetzt. Es wurde die Titelverbindung mit einem Smp. von 260-262°C erhalten.

Beispiel 1.24: Herstellung von 3,5-Dinitro-2-isopropylthio-benzoesäuremethylester




33,2 g (0,240 mol) Kaliumcarbonat werden in 100 ml Dimethylformamid vorgelegt und auf -5°C gekühlt. Dann lässt man 37,5 g (0,114 mol) 2-Chlor-3,5-dinitrobenzoesäure (75%ig mit 25 % Wasser) in 110 ml Dimethylformamid während 20 Minuten zulaufen. Die Innentemperatur wird dabei auf -7° bis -3°C gehalten. Anschliessend werden 11,0 ml (0,114 mol) Isopropyl-mercaptan (97%ig) in 20 ml Dimethylformamid bei -8° bis -1°C während 45 Minuten zugetropft. Darauf rührt man eine Stunde bei 0°C und lässt dann die Temperatur während 24 Stunden auf 25°C steigen. Dann werden bei Raumtemperatur 7,5 ml (0,12 mol) Methyljodid während 30 Minuten zugetropft. Anschliessend wird das Reaktionsgemisch 16 Stunden bei Raumtemperatur gerührt und danach auf 500 ml Eis/Wasser gegossen, gerührt und filtriert. Das abgesaugte Gut wird mit Wasser gewaschen und bei Raumtemperatur getrocknet. Ausbeute: 32,6 g (95 % d. Th.); Smp. 62-63°C.

Beispiel 1.25: Herstellung von 3,5-Diamino-2-isopropylthio-benzoesäure-methylester




26,6 g (0,0886 mol) 3,5-Dinitro-2-isopropylthio-benzoesäure-methylester werden in 270 ml Tetrahydrofuran gelöst und unter Zusatz von 10 g Raney-Nickel bei 30°C bis 35°C hydriert. Darauf wird der Katalysator abfiltriert, das Filtrat eingeeengt und der Rückstand aus Essigsäureethylester/Hexankristallisiert. Ausbeute: 20,1 g (94 % d. Th.); Smp. 109-111°C.

Beispiel 1.26: Herstellung von 7-Methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazol




17,0 g (0,0707 mol) 3,5-Diamino-2-isopropylthio-benzoesäure-methylester werden portionenweise zu 100 ml konzentrierter Salzsäure und 50 ml Wasser gegeben und eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Dann wird auf -5 °C gekühlt und während 2 Stunden unter Rühren eine Lösung von 9,80 g (0,142 mol) Natriumnitrit in 20 ml Wasser zugetropft. Anschliessend wird weitere 2 Stunden bei 0 °C gerührt. Darauf werden 23 ml (0,21 mol) 50%ige unterphosphorige Säure während 30 Minuten zugetropft. Dann lässt man die Temperatur während 24 Stunden auf 20 °C steigen. Zum Reaktionsgemisch werden 150 ml Wasser gegeben, das Produkt wird abfiltriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet. Zur Reinigung wird das Produkt in 300 ml Essigsäureethylester aufgenommen, am Rückfluss gekocht und heiss filtriert. Zum eingedampften Filtrat wird Hexan gegeben. Das erhaltene Produkt wird abfiltriert und getrocknet. Ausbeute: 7,5 g (55 % d. Th.); Smp. 130-131 °C.

Beispiel 1.27: Herstellung von 3,5-Dinitro-2-ethylthio-benzoesäureethylester




33,2 g (0,240 mol) Kaliumcarbonat werden in 100 ml Dimethylformamid vorgelegt und auf -5 °C gekühlt. Dann lässt man 37,5 g (0,114 mol) 2-Chlor-3,5-dinitrobenzoesäure (75%ig mit 25 % Wasser) gelöst in 120 ml Dimethylformamid während 20 Minuten zulaufen. Die Innentemperatur wird dabei auf -5 ° bis 0 °C gehalten. Anschliessend werden 8,9 ml (0,12 mol) Ethylmercaptan in 20 ml Dimethylformamid bei -8 °C während 20 Minuten zugetropft. Darauf rührt man eine Stunde bei gleicher Temperatur und lässt dann während 18 Stunden auf Raumtemperatur steigen. Dann werden 9,0 ml (0,12 mol) Ethylbromid in 20 ml Dimethylformamid während 10 Minuten zugetropft. Anschliessend wird das Reaktionsgemisch 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt und danach auf 500 ml Eis/Wasser gegossen, gerührt und filtriert. Das abgesaugte Gut wird mit Wasser gewaschen und darauf bei Raumtemperatur unter Vakuum und in Gegenwart von Phosphorpentoxid getrocknet. Ausbeute: 28,7 g (84 % d. Th.); Smp. 80-81 °C.

Beispiel 1.28: Herstellung von 3,5-Diamino-2-ethylthio-benzoesäureethylester




25,9 g (0,0862 mol) 3,5-Dinitro-2-ethylthio-benzoesäure-ethylester werden in 260 ml Tetrahydrofuran gelöst und in Gegenwart von 10 g Raney-Nickel bei 30 °-35 °C hydriert. Dann wird der Katalysator abfiltriert, der Rückstand in Essigsäureethylester aufgenommen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingedampft. Ausbeute: 19,3 g (93 % d. Th.).


Beispiel 1.29: Herstellung von 5-Fluor-1,2,3-benzothiadiazol-7-carbonsäure-ethylester

18,7 g (0,078 mol) 3,5-Diamino-2-ethylthio-benzoesäure-ethylester werden in 100 g wasserfreien Fluorwasserstoff bei 0 bis -12°C eingetragen. Dann werden bei 0 bis 5°C 12,9 g (0,187 mol) Natriumnitrit während zwei Stunden zudosiert und das Reaktionsgemisch zwei weitere Stunden gerührt. Anschliessend wird die Diazoniumlösung in einen mit Teflon beschichteten Autoklaven gezogen und darin auf 146°C erwärmt. Nach der Reaktion wird der Fluorwasserstoff abdestilliert und der Rückstand in Methylenchlorid aufgenommen. Nach dem Waschen mit Natriumbicarbonat-Lösung und Trocknen mit Magnesiumsulfat wird die Lösung filtriert und eingeeengt. Das erhaltene Rohprodukt wird über eine Kieselgelsäule gereinigt (Lösungsmittel: Petrolether/Diethylether 2:1).

Ausbeute: 1,5 g gelbe Kristalle vom Smp. 68-69°C.


Beispiel 1.30: Herstellung von 2-Benzylthio-3,5-diamino-benzoesäuremethylester

17,7 g Eisenspäne werden unter gutem Rühren in 80 ml Essigsäure (5%ig) auf 66°C erwärmt. Dann wird langsam eine Lösung von 12,0 g (0,034 mol) 2-Benzylthio-3,5-dinitro-benzoesäure-methylester in 20 ml Tetrahydrofuran zugetropft. Nach dem Abkühlen wird mit gesättigter Natriumbikarbonatlösung neutralisiert und dreimal mit Essigsäureethylester extrahiert. Die Extrakte werden mit Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Nach der Kristallisation aus Diethylether erhält man 8,1 g (82 % d. Th.) Produkt; Smp. 80-82°C.

Beispiel 1.31: Herstellung von 3,5-Diamino-2-methylthio-benzoesäure-methylester


Nach der in Beispiel 1.30 beschriebenen Methode wird 3,5-Dinitro-2-methylthio-benzoesäure-methylester mit Eisenspänen reduziert. Man erhält die Titelverbindung mit Smp. 102-104°C.

Wie in den vorstehenden Beispielen beschrieben lassen sich folgende Verbindungen herstellen. In den Verbindungstabellen werden für folgende Reste die dazugehörigen Symbole verwendet:



Die vorstehend beschriebenen Heterocyclen können durch niedermolekulare Reste, wie aliphatische Reste mit bis zu 6 C-Atomen, oder durch Halogenatome oder andere Reste substituiert sein.

Tabelle 1



Verb. Nr.	R	Physikal. Daten
1.1	H	Smp. 262°C
1.2	CH ₃	Smp. 134-135°C
1.3	C ₂ H ₅	Smp. 62-63°C
1.4	n-C ₃ H ₇	Smp. 36-38°C
1.5	i-C ₃ H ₇	Smp. 78-79°C
1.6	n-C ₄ H ₉	Oel
1.7	s-C ₄ H ₉	
1.8	t-C ₄ H ₉	
1.9	n-C ₅ H ₁₁	Smp. 35-37°C
1.10	n-C ₆ H ₁₃	
1.11	n-C ₈ H ₁₇	Smp. 41-44°C
1.12	2-Bromethyl	
1.13	2-Chlorethyl	
1.14	2-Fluorethyl	
1.15	2-Cyanoethyl	
1.16	2-Methoxyethyl	Smp. 30-32°C
1.17	2-n-Butoxyethyl	
1.18	2-Allyloxyethyl	
1.19	2,2,2-Trichlorethyl	
1.20	3-Aethoxypropyl	
1.21	3-Acetylpropyl	
1.22	3-Chlorpropyl(n)	
1.23	3-Brompropyl(n)	
1.24	1-Chlorprop-2-yl	
1.25	1-Bromprop-2-yl	
1.26	2,3-Dibrompropyl(n)	
1.27	2-Nitroethyl	
1.28	Cyclopropylmethyl	Smp. 46-48°C

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verb. Nr.	R	Physikal. Daten
1.29	1-Cyclopropyl-eth-1-yl	Smp. 57-60°C
1.30	Cyclohexylmethyl	Smp. 62-64°C
1.31	Cyclooctylmethyl	
1.32	3-Phenylpropyl	Sdp. 150°C/0,01 Torr
1.33	2-Phenylethyl	Smp. 77-79°C
1.34	Benzyl	Smp. 94-95°C
1.35	2-Chlorbenzyl	Smp. 126-127°C
1.36	3-Chlorbenzyl	
1.37	4-Chlorbenzyl	Smp. 106-108°C
1.38	4-Methylbenzyl	
1.39	4-Methoxybenzyl	Smp. 98-100°C
1.40	4-Nitrobenzyl	
1.41	2-(4-Methoxyphenyl)ethyl	
1.42	2-Phenoxyethyl	Smp. 60-62°C
1.43	2-(4-Chlorphenoxy)ethyl	
1.44	Allyl	Smp. 57-58°C
1.45	4-Pentenyl	
1.46	2-Propinyl	Smp. 129-130°C
1.47	3-Hexinyl	
1.48	3-Chlor-but-2-enyl	
1.49	Cyclopropyl	
1.50	Cyclopentyl	Smp. 62-64°C
1.51	Cyclooctyl	
1.52	Phenyl	
1.53	2-Chlorphenyl	Smp. 108-110°C
1.54	3-Bromphenyl	Smp. 121-123°C
1.55	3,4-Dichlorphenyl	
1.56	4-Chlor-2-methyl-phenyl	
1.57	4-t-Butylphenyl	Smp. 142-144°C
1.58	3-Nitrophenyl	
1.59	4-Nitrophenyl	Smp. 214-216°C
1.60	3-Cyanophenyl	Smp. 181-183°C

Tabelle 1 (Fortsetzung)



Verb. Nr.	R	Physikal. Daten
1.61	3-Trifluormethylphenyl	Smp. 107-109°C
1.62	3-N,N-Dimethylaminophenyl	
1.63	2-Methoxycarbonyl-phenyl	
1.64	3-Jod-prop-2-in-yl	
1.65	-CH ₂ -COOCH ₃	
1.66	-CH ₂ -COOC ₂ H ₅	
1.67	-CH(CH ₃)-COOCH ₃	
1.68	-CH(CH ₃)-COOC ₂ H ₅	Smp. 118-122°C (S)-Enantiomer
1.69	-CH ₂ CH ₂ N(CH ₃) ₂	
1.70	3-N,N-Dimethylaminopropyl	
1.71	-N=C(CH ₃) ₂	Smp. 127-130°C
1.72	-N= 	Smp. 125°C
1.73	-N=  -C(CH ₃) ₃	Smp. 112-114°C
1.74	-N=C(CH ₃)CH ₂ OCH ₃	
1.75	-N=C(CN)CONH ₂	
1.76	-N=C(CN)-C ₆ H ₅	
1.77	-N=C(CN)-CONHC ₂ H ₅	
1.78	-N=C(CN)-CONH-CONHC ₂ H ₅	
1.79	-CH ₂ CH ₂ CH ₂ OH	Smp. 26°C
1.80	-CH ₂ CH ₂ OH	Smp. 76-79°C
1.81	3-Fluorbenzyl	Smp. 100-102°C
1.82	4-Trifluormethylbenzyl	
1.83	CH ₂ CH ₂ Q ₂₁	
1.84	CH ₂ CH ₂ Q ₄₁	
1.85	CH ₂ CH ₂ Q ₂₄	
1.86	Diaceton-D-glucos-3-yl	Smp. 121-123°C
1.87	2-Fluorbenzyl	Smp. 113-115°C
1.88	4-Fluorbenzyl	Smp. 107-109°C
1.89	4-Methylphenyl	Smp. 141-143°C
1.90	2-Methoxycarbonylphenyl	Smp. 120-122°C

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verb. Nr.	R	Physikal. Daten
1.91	2-Carboxyphenyl	
1.92	CH ₂ Q ₁₁	
1.93	CH ₂ Q ₁₂	
1.94	CH ₂ Q ₁₃	
1.95	CH ₂ Q ₁₄	
1.96	CH ₂ Q ₂₁	Smp. 67°C
1.97	CH ₂ Q ₂₂	
1.98	CH ₂ Q ₂₃	
1.99	CH ₂ Q ₃₁	
1.100	CH ₂ Q ₃₂	Smp. 166-168°C
1.101	CH ₂ Q ₄₁	Smp. 91-93°C
1.102	CH ₂ Q ₄₂	Smp. 97-99°C
1.103	CH ₂ Si(CH ₃) ₃	Smp. 59-61°C
1.104	CH ₂ CH ₂ Si(CH ₃) ₃	Smp. 37-39°C
1.105	CH ₂ P(O)(CH ₃)OC ₂ H ₅	Smp. 92°C
1.106	CH ₂ P(O)(OCH ₃) ₂	
1.107	CH ₂ CH ₂ P(O)(OC ₂ H ₅) ₂	
1.108	CH ₂ CH ₂ P(O)(OCH ₃) ₂	Smp. 86-88°C
1.109	CH ₂ P(O)(CH ₃)OCH ₃	
1.110	CH(CH ₃)P(O)(OCH ₃) ₂	
1.111	Si(CH ₃) ₂ C(CH ₃) ₂ CH(CH ₃) ₂	
1.112	Na [⊕]	Smp. >250°C
1.113	K [⊕]	Smp. >250°C
1.114	(HN(C ₂ H ₅) ₃) [⊕]	Smp. 86-89°C
1.115	(H ₂ N(CH ₂ CH ₂ OH) ₂) [⊕]	Smp. 130°C
1.116	CH ₂ -Naphth-1-yl	Smp. 123-125°C
1.117	CH ₂ -Naphth-2-yl	Smp. 94-96°C
1.118	CH ₂ CH ₂ -Naphth-1-yl	
1.119	1-Phenethyl	Smp. 50-52°C
1.120	2-Phenyl-prop-2-yl	
1.121	CH ₂ CH ₂ CN	
1.122	(2-Sulfamoyl)-benzyl	Smp. 198-200°C
1.123	CH ₂ CH ₂ SCH ₃	


Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verb. Nr.	R	Physikal. Daten
1.124	1,2,3,4-Di-O-isopropyliden-D-galactopyranos-6-yl	
1.125	1,2,5,6-Di-O-isopropyliden-D-mannit-3-yl	
1.126	1,2,5,6-Di-O-isopropyliden- α -D-allofuranos-3-yl	
1.127	D-Glucofuranos-3-yl	
1.128	D-Galactopyranos-6-yl	
1.129	D-Mannit-3-yl	
1.130	D-Allofuranos-4-yl	
1.131	Mannopyranos-1-yl	
1.132	2-Methyl-D-glucosid-6-yl	
1.133	1,2,5,6-Tetraacetyl-D-galactopyranos-3-yl	
1.134	2,3,5-Tribenzylribofuranos-1-yl	
1.135	Cyclohexyl	Smp. 44-46°C
1.136	CH ₂ -Q ₄₆	Smp. 116-118°C
1.137	2,6-Difluorbenzyl	Smp. 117-119°C
1.138	CH ₂ -CCl ₂ CF ₃	Smp. 71-73°C
1.139	2-Nitrobenzyl	Smp. 196-198°C
1.140	2-Methylbenzyl	Smp. 95-97°C
1.141	-CH ₂ C(OCH ₃) ₂ CH ₃	
1.142	3-Methyl-2-nitrobenzyl	Smp. 143-145°C
1.143	Cycloheptyl	$n_D^{31} = 1,5787$
1.144	3-Methoxybenzyl	Smp. 73-75°C
1.145	2,4-Dichlorbenzyl	Smp. 118-120°C
1.146	Q ₁₉	Smp. 82-83°C
1.147	-CH ₂ -CH(OH)-CH ₂ OH	Smp. 75-77°C
1.148	-CH ₂ -CH(OH)-CH ₂ OCH ₃	
1.149	-CH ₂ COC ₄ H ₉ (n)	
1.150	Q ₂₀	Smp. 83-84°C
1.151	-CH ₂ -Q ₂₅	Smp. 113-116°C
1.152	-CH ₂ -CH(OCH ₃)-CH ₂ OCH ₃	
1.153	-CH ₂ -Q ₂₆	
1.154	-CH ₂ -COC(CH ₃) ₃	Smp. 98-100°C

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verb. Nr.	R	Physikal. Daten
1.155	-CH ₂ -CHOH-CH ₂ OC ₂ H ₅	
1.156	-1/2Mg ^{2⊕}	
1.157	-CH ₂ CH ₂ -Q ₁₆	
1.158	-CH ₂ CH ₂ -Q ₁₅	
1.159	-CH ₂ CH ₂ -Q ₄₂	
1.160	-CH ₂ CH ₂ -N(C ₂ H ₅) ₂	
1.161	-CH ₂ CH ₂ -Q ₄₆	
1.162	-CH ₂ CH ₂ -Q ₂₁	
1.163	-CH ₂ CH ₂ -Q ₁₁	
1.164	4'-Trifluormethoxy-benzyl	
1.165	-CH ₂ CH ₂ -Q ₂₂	
1.166	-CH(CH ₃)-Q ₄₂	
1.167	-CH ₂ CH ₂ CH ₂ -Si(CH ₃) ₃	
1.168	-4-Phenoxy-phenyl	Smp. 97-99°C
1.169	-3-Diphenyl	Smp. 108-110°C
1.170	-CH(CH ₃)-Q ₄₁	
1.171	-4-Benzyl-benzyl	Smp. 117-119°C
1.172	-CH ₂ -COCH ₃	
1.173	-CH ₂ COC ₅ H ₁₁ (n)	
1.174	-CH(CH ₃)-Q ₂₁	
1.175	-C(CH ₃) ₂ -Q ₄₆	
1.176	2-(OCF ₃)-phenyl	
1.177	3-(OCF ₂ CF ₃)-phenyl	
1.178	2-Naphthyl	Smp. 136-137°C

Tabelle 2



Verb. Nr.	R	Physikal. Daten
2.1	CH ₃	
2.2	C ₂ H ₅	Smp. 87°C
2.3	C ₃ H ₇ (n)	Oel
2.4	C ₄ H ₉ (n)	
2.5	Benzyl	Smp. 101-104°C
2.6	Phenyl	Smp. 137-140°C
2.7	4-Chlorphenyl	Smp. 53-55°C
2.8	CH ₂ COOCH ₃	Smp. 126-129°C
2.9	CH ₂ COOC ₂ H ₅	
2.10	4-Methylphenyl	
2.11	n-Hexyl	
2.12	Cyclohexyl	
2.13	Cyclopentyl	
2.14	H	
2.15	Na [⊕]	
2.16	K [⊕]	

Tabelle 3



Verb. Nr.	NR¹R²	Physikal. Daten
3.1	NH₂	Smp. >270°C
3.2	NHCH₃	Smp. 243-247°C
3.3	Piperidinyl	Smp. 91,5-93,5°C
3.4	Morpholinyl	Smp. 138-141°C
3.5	NHCH(CH₃)C₂H₅	Smp. 134°C
3.6	NH-C₆H₅	Smp. 180-183°C
3.7	NH-CH₂COOC₂H₅	Smp. 119-122°C
3.8	N(CH₃)₂	Smp. 83-85°C
3.9	NH-CH₂COOH	Smp. 207°C
3.10	Pyrrolidinyl	
3.11	Q₁₅	Smp. 150-153°C
3.12	Q₄₇	
3.13	N(CH₂CN)₂	Smp. 197-199°C
3.14	N(CH₂CH₂CN)₂	
3.15	NHCH₂CH₂OCH₃	
3.16	Q₂₄	
3.17	Q₃₁	Smp. 119-121°C
3.18	Q₃₂	
3.19	NH-Q₃₃	Smp. 225-227°C
3.20	NH-Q₃₄	Zers. 303°C
3.21	NH-Q₄₁	
3.22	NH-Q₄₃	
3.23	NH-Q₄₄	
3.24	NHCH₂C≡CH	Smp. 229-231°C
3.25	NH-CH(CH₃)COOCH₃	
3.26	N(CH₂CH=CH₂)₂	Smp. 119°C
3.27	NH(5-Aethyl-6-chlor-pyrimidin-4-yl)	Smp. 185-187°C

Tabelle 3 (Fortsetzung)






Verb. Nr.	N(R ₁)R ₂	Physikal. Daten
3.28		Smp. 140-142°C
3.29		Smp. 142-145°C
3.30		Smp. 203-206°C
3.31	N(CH ₃)OCH ₃	Smp. 115-117°C
3.32	N(CH ₃)OCH(CH ₃) ₂	
3.33	N(C ₂ H ₅)OCH ₃	
3.34	N(1-C ₄ H ₉)OCH ₃	
3.35	NHCH ₂ CN	
3.36	NH-Benzyl	Smp. 148-150°C
3.37	NH-4-Chlorbenzyl	
3.38	NH-3-Chlorbenzyl	
3.39	NH-2-Chlorbenzyl	Smp. 173-175°C
3.40	NH-2,4-Dichlorbenzyl	Smp. 171-174°C
3.41	NH-3,4-Dichlorbenzyl	Smp. 185-188°C
3.42	NH-2-Fluorbenzyl	Smp. 145-147°C
3.43	NH-4-Fluorbenzyl	
3.44	NH-2-Methylbenzyl	Smp. 164-165°C
3.45	NH-CH(Methyl)-Q ₂₁	Smp. 127-129°C
3.46	2-Methylpiperidine-1-yl	Smp. 94-96°C
3.47	NH-4-Methylbenzyl	
3.48	N(Methyl)-benzyl	Smp. 101-103°C
3.49	NH-CH ₂ -Q ₂₁	Smp. 141-143°C
3.50	NH-Q ₄₈	Smp. 278-281°C
3.51	NHOH	Zers. >87°C
3.52	Q ₁₈	

Tabelle 4




Verb. Nr.	R ₃	R ₄	Physikal. Daten
4.1	CH ₃	CH ₃	Smp. 166-168°C
4.2	CH ₃	C ₂ H ₅	Smp. 159-162°C
4.3	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	
4.4	C ₃ H _{7-n}	C ₃ H _{7-n}	
4.5	C ₄ H _{9-n}	C ₄ H _{9-n}	
4.6	C ₄ H _{9-s}	C ₄ H _{9-s}	
4.7	C ₆ H _{13-n}	C ₆ H _{13-n}	
4.8		-CH ₂ CH ₂ CH ₂ -	
4.9		-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -	Smp. 154-157°C
4.10		-CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -	
4.11		-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -CH ₂ -	Smp. 134-136°C
4.12	H	CH ₃	
4.13	H	C ₂ H ₅	
4.14	H	CH=CH ₂	
4.15	H	C ₆ H ₅	Smp. 266-268°C
4.16	H	C ₆ H ₄ Cl(2)	
4.17	H	C ₆ H ₄ Cl(4)	
4.18	CH ₃	C ₆ H ₅	
4.19	CH ₃	C ₆ H ₃ Cl ₂ (2,4)	Smp. 209-210°C
4.20	H	Q ₄₁	Smp. 226-228°C
4.21	H	Q ₄₂	
4.22	CH ₃	Q ₄₁	
4.23	H	Q ₂₁	Smp. 231-232°C
4.24	H	CCl ₃	Smp. 174-175°C
4.25	CH ₃	CH ₂ OCH ₃	

Tabelle 5



Verb. No.	R ₃	R ₄	Physikal. Daten
5.1	CH ₃	CH ₃	Smp. 145-147°C
5.2	CH ₃	C ₂ H ₅	Smp. 148-150°C
5.3	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	Smp. 148-150°C
5.4	C ₃ H _{7-n}	C ₃ H _{7-n}	
5.5	C ₄ H _{9-n}	C ₄ H _{9-n}	
5.6	C ₆ H _{13-n}	C ₆ H _{13-n}	
5.7		CH ₂ (CH ₂) ₂ CH ₂	
5.8		CH ₂ (CH ₂) ₃ CH ₂	Smp. 154-156°C
5.9		CH ₂ (CH ₂) ₄ CH ₂	Smp. 166-168°C
5.10	H	CH ₃	
5.11	H	C ₂ H ₅	
5.12	H	C ₆ H ₅	Smp. > 166°C
5.13	H	o-Cl-C ₆ H ₄	
5.14	CH ₃	C ₆ H ₅	
5.15	CH ₃	2,4-Di-Cl-C ₆ H ₃	
5.16	H	Q ₄₁	
5.17	H	Q ₄₂	
5.18	CH ₃	Q ₄₁	
5.19	H	Q ₂₁	
5.20	CH ₃	CH ₂ OCH ₃	
5.21	CH ₃	CH ₂ CH ₂ OCH ₃	
5.22	H	Q ₂₄	

Tabelle 6




Verb. Nr.	R ₅	R ₄	R ₃	Physikal. Daten
6.1	H	H	H	Smp. 270-272°C
6.2	H	CH ₃	H	
6.3	H	COCH ₃	H	
6.4	H	COC ₂ H ₅	H	
6.5	H	COCH=CH ₂	H	
6.6	H	COC=C(Cl) ₂	H	
6.7	COCH ₃	COCH ₃	H	
6.8	H	H	C ₆ H ₅	
6.9	H	H	Q ₄₁	
6.10	H	COCH ₃	Q ₂₁	
6.11	H	H	Q ₃₄	
6.12	CH ₃	COCH ₃	Q ₄₁	
6.13	H	COCH ₃	Q ₄₁	
6.14	H	COCH ₂ OCH ₃	H	
6.15	H	COCH ₂ OCH ₃	Q ₄₁	
6.16	H	COC=C(Cl) ₂	Q ₄₁	
6.17	COCH ₃	COCH ₃	Q ₄₁	
6.18	H	H	Q ₄₃	
6.19	H	COCH ₃	Q ₄₄	
6.20	H	COCH ₃	Q ₄₃	
6.21	H	H	Q ₄₄	
6.22	H	H	Q ₂₁	

Tabelle 6 (Fortsetzung)

Verb. Nr.	R ₅	R ₄	R ₃	Physikal. Daten
6.23	H	sec-Butyl	sec-Butyl	Smp. 92-95°C
6.24	H	COCH ₃	sec-Butyl	Smp. 100-102°C
6.25	H	CH ₃	CH ₃	
6.26	H	CH(CH ₃)CH ₂ OCH ₃	CH(CH ₃)CH ₂ OCH ₃	
6.27	H	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	
6.28	CH ₃	sec-Butyl	sec-Butyl	
6.29	H	COCH ₃	CH ₃	
6.30	H	COCH ₃	CH ₂ OCH ₃	
6.31	H	COCH ₃	C ₂ H ₅	
6.32	H	COC ₂ H ₅	sec-Butyl	
6.33	H	COCH ₂ OCH ₃	sec-Butyl	
6.34	H	COCH ₂ OCH ₃	C ₂ H ₅	
6.35	H	COCH ₃	n-Propyl	
6.36	H	COCH ₃	i-Propyl	
6.37	H	n-Propyl	n-Propyl	
6.38	H	i-Propyl	i-Propyl	Smp. 173-175°C

Tabelle 7



Verb. Nr.	Y	X	Z	Physikal. Daten
7.1	Br	H	COOCH ₃	Smp. 138-141°C
7.2	Cl	H	COOCH ₃	Smp. 142°C
7.3	Cl	H	COOH	
7.4	H	6-Cl	COOCH ₃	Smp. 111-114°C
7.5	H	6-Cl	COOH	Smp. 255-260°C
7.6	H	6-F	COOCH ₃	Smp. 122-125°C
7.7	Br	H	COOH	
7.8	H	6-F	COOH	
7.9	H	6-F	COOC ₂ H ₅	
7.10	H	6-F	COOC ₃ H ₇ (n)	
7.11	H	6-F	COOCH(CH ₃)COOC ₂ H ₅	
7.12	Cl	H	CN	
7.13	H	4-Br	CN	
7.14	H	4-Cl	CN	
7.15	H	6-F	CN	
7.16	F	H	CN	
7.17	H	4-F	CN	
7.18	H	4-COOH	COOH	
7.19	H	4-COOCH ₃	COOCH ₃	
7.20	H	6-OH	COOH	
7.21	H	6-OH	COOCH ₃	
7.22	H	6-OCH ₃	COOCH ₃	
7.23	H	4-CH ₃	COOCH ₃	
7.24	F	4-F	COOCH ₃	
7.25	F	6-F	COOCH ₃	
7.26	H	H	CN	Smp. 116-118°C
7.27	SO ₃ H	H	CN	
7.28	SO ₃ H	H	COOH	


Tabelle 7 (Fortsetzung)

Verb. Nr.	Y	X	Z	Physikal. Daten
7.29	SO ₃ H	H	COOCH ₃	Zers. 240°C
7.30	NO ₂	H	COOH	
7.31	NO ₂	H	COOCH ₃	
7.32	SO ₃ Na	H	COONa	
7.33	SO ₃ Na	H	CN	
7.34	NH ₂	H	CN	
7.35	NH ₂	H	COOH	
7.36	NH ₂	H	COOCH ₃	
7.37	SO ₃ H	6-F	COOCH ₃	
7.38	H	6-F	CONHOH	
7.39	H	6-F	CONHNH ₂	
7.40	H	6-Cl	CONHNH ₂	
7.41	H	6-Cl	CONHNH- 	
7.42	H	6-F	COOCH ₂ -Q ₂₁	
7.43	H	6-Cl	CONHQ ₃₄	
7.44	H	6-COOH	COOH	
7.45	H	6-Cl	CONH-N= 	
7.46	H	6-Cl	COO-N= 	
7.47	F	H	COO-N= 	
7.48	F	H	COOQ ₄₆	
7.49	H	6-Cl	COOCH ₂ -Q ₃₂	
7.50	NO ₂	H	COQ ₁₆	
7.51	H	6-Cl	CN	
7.52	F	H	COO-benzyl	
7.53	H	6-F	COO-benzyl	
7.54	H	4-F	COO-benzyl	
7.55	NH ₂	H	COO-benzyl	
7.56	NO ₂	H	COO-benzyl	
7.57	OH	H	COO-CH ₃	

Tabelle 7 (Fortsetzung)

Verb. Nr.	Y	X	Z	Physikal. Daten
7.58	F	H	CONH ₂	Smp. 68-69°C
7.59	F	H	COOH	
7.60	F	H	COOCH ₃	
7.61	F	H	COOC ₂ H ₅	
7.62	F	H	COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	
7.63	F	H	COOCH(CH ₃) ₂	
7.64	F	H	COOCH ₂ C ₆ H ₄ -o-Cl	
7.65	F	H	COOCH ₂ CH ₂ Si(CH ₃) ₃	
7.66	F	H	CON(OCH ₃)CH ₃	


Tabelle 8



Verb. Nr.	Y*	X*	Z*	Physikal. Daten
8.1	H	H	COCl	Smp. 107°C
8.2	H	H	COBr	
8.3	H	H	COF	
8.4	H	H	COJ	
8.5	H	H	CO-OCOCH ₃	
8.6	H	H	COO-CO-	Smp. 117-119°C
8.7	H	H	COOCO-Phenyl	
8.8	F	6-F	COCl	
8.9	H	6-F	COCl	
8.10	F	H	COCl	
8.11	H	6-F	COO-CO-	Smp. 117-119°C
8.12	F	H	COO-CO-	
8.13	H	H	COOSO ₂ -CH ₃	
8.14	H	H	COOSO ₂ -Phenyl	

In der folgenden Tabelle 9 werden beispielhaft Zwischenprodukte der Formel I aufgezählt, die Teil der vorliegenden Erfindung sind:

Tabelle 9






Verb. Nr.	X	Y	Z	E	Physikal. Daten
9.1	H	NH ₂	COOH	CH ₂ C ₆ H ₅	Smp. 124-125°C
9.2	H	NH ₂	COOCH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	Smp. 84-86°C
9.3	H	NH ₂	COOC ₂ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.4	H	NH ₂	COOCH(CH ₃) ₂	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.5	H	NH ₂	COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.6	H	NH ₂	COO(CH ₂) ₃ CH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.7	H	NH ₂	COOCH ₂ C ₆ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.8	H	H	COOH	CH ₂ C ₆ H ₅	Smp. 98°C
9.9	H	H	COOCH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.10	H	H	COOC ₂ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.11	H	H	COOCH(CH ₃) ₂	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.12	H	H	COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.13	H	H	COO(CH ₂) ₃ CH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.14	H	H	COOCH ₂ C ₆ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.15	H	NH ₂	COOH	CH(CH ₃) ₂	
9.16	H	NH ₂	COOCH ₃	CH(CH ₃) ₂	Smp. 109-110°C
9.17	H	NH ₂	COOC ₂ H ₅	CH(CH ₃) ₂	
9.18	H	NH ₂	COOCH(CH ₃) ₂	CH(CH ₃) ₂	
9.19	H	NH ₂	COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	CH(CH ₃) ₂	
9.20	H	NH ₂	COO(CH ₂) ₃ CH ₃	CH(CH ₃) ₂	
9.21	H	NH ₂	COOCH ₂ C ₆ H ₅	CH(CH ₃) ₂	
9.22	H	NH ₂	COOH	H	
9.23	H	NH ₂	COOCH ₃	H	
9.24	H	NH ₂	COOC ₂ H ₅	H	
9.25	H	NH ₂	COOCH(CH ₃) ₂	H	
9.26	H	NH ₂	COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	H	
9.27	H	NH ₂	COOCH ₂ C ₆ H ₅	H	
9.28	H	H	COOH	CH(CH ₃) ₂	

Tabelle 9 (Fortsetzung)

Verb. Nr.	X	Y	Z	E	Physikal. Daten
9.29	H	H	COOCH ₃	CH(CH ₃) ₂	
9.30	H	H	COOC ₂ H ₅	CH(CH ₃) ₂	
9.31	H	H	COOCH(CH ₃) ₂	CH(CH ₃) ₂	
9.32	H	H	COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	CH(CH ₃) ₂	
9.33	H	H	COOCH ₂ C ₆ H ₅	CH(CH ₃) ₂	
9.34	H	Br	COOH	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.35	H	Br	COOCH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.36	H	Br	COOC ₂ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.37	H	Br	COOCH(CH ₃) ₂	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.38	H	Br	COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.39	H	Br	COOCH ₂ C ₆ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.40	H	Cl	COOH	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.41	H	Cl	COOCH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.42	H	Cl	COOC ₂ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.43	H	Cl	COOCH(CH ₃) ₂	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.44	H	Cl	COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.45	H	Cl	COOCH ₂ C ₆ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.46	Cl	H	COOCH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.47	Cl	H	COOH	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.48	F	H	COOH	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.49	F	H	COOCH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.50	F	H	COOC ₂ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.51	F	H	COOCH(CH ₃) ₂	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.52	F	H	COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.53	F	H	COOCH ₂ C ₆ H ₅	CH ₂ C ₆ H ₅	
9.54	F	H	COOCH ₃	CH(CH ₃) ₂	
9.55	F	H	COOC ₂ H ₅	C ₂ H ₅	
9.56	F	H	COOCH ₃	CH ₃	

Tabelle 9 (Fortsetzung)

Verb. Nr.	X	Y	Z	E	Physikal. Daten
9.57	H	NH ₂	COOH	CH ₃	Smp. 102-104°C
9.58	H	NH ₂	COOCH ₃	CH ₃	
9.59	H	NH ₂	COOC ₂ H ₅	CH ₃	
9.60	H	NH ₂	COOCH(CH ₃) ₂	CH ₃	
9.61	H	NH ₂	COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	CH ₃	
9.62	H	NH ₂	COOCHC ₆ H ₅	CH ₃	
9.63	H	NH ₂	COOH	C ₂ H ₅	Oil
9.64	H	NH ₂	COOCH ₃	C ₂ H ₅	
9.65	H	NH ₂	COOC ₂ H ₅	C ₂ H ₅	
9.66	H	NH ₂	COOCH(CH ₃) ₂	C ₂ H ₅	
9.67	H	NH ₂	COOCH ₂ CH ₂ CH ₃	C ₂ H ₅	
9.68	H	NH ₂	COOCH ₂ C ₆ H ₅	C ₂ H ₅	
9.69	H	NH ₂	COOCH ₃		
9.70	H	NH ₂	COOCH ₂ C ₆ H ₅		
9.71	H	NH ₂	COO(CH ₂) ₂ CH ₃		
9.72	H	NH ₂	COOCH ₃	CH ₃ (CH ₂) ₁₁	
9.73	H	NH ₂	COOCH ₂ C ₆ H ₅	CH ₃ (CH ₂) ₁₁	

2. Formulierungsbeispiele für flüssige Wirkstoffe der Formel I (% = Gewichtsprozent)

2.1 Emulsions-Konzentrate	a)	b)	c)
Wirkstoff aus den Tabellen 1 bis 8	25 %	40 %	50 %
Ca-Dodecylbenzolsulfonat	5 %	8 %	6 %
Ricinusöl-polyethylenglykolether (36 Mol Ethylenoxid)	5 %	-	-
Tributylphenoyl-polyethylenglykolether (30 Mol Ethylenoxid)	-	12 %	4 %
Cyclohexanon	-	15 %	20 %
Xylolgemisch	65 %	25 %	20 %

Aus solchen Konzentraten können durch Verdünnen mit Wasser Emulsionen jeder gewünschten Konzentration hergestellt werden.

2.2 Lösungen	a)	b)	c)	d)
Wirkstoff aus den Tabellen 1 bis 8	80 %	10 %	5 %	95 %
Ethylenglykolmonomethylether	20 %	-	-	-
Polyethylenglykol MG 400	-	70 %	-	-
N-Methyl-2-pyrrolidon	-	20 %	-	-
Epoxydiertes Kokosnussöl	-	-	1 %	5 %
Benzin (Siedegrenzen 160-190 °C)	-	-	94 %	-
(MG = Molekulargewicht)				

Die Lösungen sind zur Anwendung in Form kleinster Tropfen geeignet.

2.3 Granulate	a)	b)
Wirkstoff aus den Tabellen 1 bis 8	5 %	10 %
Kaolin	94 %	-
Hochdisperse Kieselsäure	1 %	-
Attapulgit	-	90 %

Der Wirkstoff wird in Methylenchlorid gelöst, auf den Träger aufgesprüht und das Lösungsmittel anschliessend im Vakuum abgedampft.

2.4 Stäubemittel	a)	b)
Wirkstoff aus den Tabellen 1 bis 8	2 %	5 %
Hochdisperse Kieselsäure	1 %	5 %
Talkum	97 %	-
Kaolin	-	90 %

Durch inniges Vermischen der Trägerstoffe mit dem Wirkstoff erhält man gebrauchsfertige Stäubemittel.

Formulierungsbeispiele für feste Wirkstoffe der Formel I (% = Gewichtsprozent)

2.5 Spritzpulver	a)	b)	c)
Wirkstoff aus den Tabellen 1 bis 8	25 %	50 %	75 %
Na-Ligninsulfonat	5 %	5 %	-
Na-Laurylsulfat	3 %	-	5 %
Na-Diisobutyl-naphthalinsulfonat	-	6 %	10 %
Octylphenolpolyethylenglykolether (7-8 Mol Ethylenoxid)	-	2 %	-
Hochdisperse Kieselsäure	5 %	10 %	10 %
Kaolin	62 %	27 %	-

Der Wirkstoff wird mit den Zusatzstoffen vermischt und in einer geeigneten Mühle homogen vermahlen. Man erhält Spritzpulver, die sich mit Wasser zu Suspensionen jeder gewünschten Konzentration verdünnen lassen.

<u>2.6 Emulsions-Konzentrat</u>	
Wirkstoff aus den Tabellen 1 bis 8	10 %
Octylphenolpolyethylenglykolether (4-5 Mol Ethylenoxid)	3 %
Ca-Dodecylbenzolsulfonat	3 %
Ricinusölpolyglykolether (35 Mol Ethylenoxid)	4 %
Cyclohexanon	30 %
Xylolgemisch	50 %

Aus diesem Konzentrat können durch Verdünnen mit Wasser Emulsionen jeder gewünschten Konzentration hergestellt werden.

<u>2.7 Stäubemittel</u>	a)	b)
Wirkstoff aus den Tabellen 1 bis 8	5 %	8 %
Talkum	95 %	-
Kaolin	-	92 %

Man erhält anwendungsfertige Stäubemittel, indem der Wirkstoff mit den Trägerstoffen vermischt und auf einer geeigneten Mühle vermahlen wird.

<u>2.8 Extruder Granulat</u>	
Wirkstoff aus den Tabellen 1 bis 8	10 %
Na-Ligninsulfonat	2 %
Carboxymethylcellulose	1 %
Kaolin	87 %

Der Wirkstoff wird mit den Zusatzstoffen vermischt, vermahlen und mit Wasser angefeuchtet. Dieses Gemisch wird extrudiert und anschliessend im Luftstrom getrocknet.

<u>2.9 Umhüllungs-Granulat</u>	
Wirkstoff aus den Tabellen 1 bis 8	3 %
Polyethylenglykol (MG 200)	3 %
Kaolin	94 %
(MG = Molekulargewicht)	

Der fein gemahlene Wirkstoff wird in einem Mischer auf das mit Polyethylenglykol angefeuchtete Kaolin gleichmässig aufgetragen. Auf diese Weise erhält man staubfreie Umhüllungs-Granulate.

<u>2.10 Suspensions-Konzentrat</u>	
Wirkstoff aus den Tabellen 1 bis 8	40 %
Ethylenglykol	10 %
Nonylphenolpolyethylenglykolether (15 Mol Ethylenoxid)	6 %
N-Ligninsulfonat	10 %
Carboxymethylcellulose	1 %
37%ige wässrige Formaldehyd-Lösung	0,2 %
Silikonöl in Form einer 75%igen wässrigen Emulsion	0,8 %
Wasser	32 %

Der fein gemahlene Wirkstoff wird mit den Zusatzstoffen innig vermischt. Man erhält ein Suspensions-Konzentrat, aus welchem durch Verdünnen mit Wasser Suspensionen jeder gewünschten Konzentration hergestellt werden können.

3. Biologische Beispiele

Beispiel 3.1: Immunisierende Wirkung gegen *Colletotrichum lagenarium* an *Cucumis sativus* L.

5 (A) Blattapplikation

Gurkenpflanzen werden nach 2-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe besprüht (Konzentration: 0,02 % Aktivsubstanz).

10 Nach 1 Woche werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension $1.5 \cdot 10^5$ Sporen/ml) des Pilzes infiziert und für 36 Stunden bei hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 23°C im Dunkeln inkubiert. Die Inkubation wird dann bei normaler Luftfeuchtigkeit und bei 22° bis 23°C weitergeführt.

Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Pilzbefalls 7-8 Tage nach der Infektion.

15 B) Bodenapplikation

Gurkenpflanzen werden nach 2-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe durch Bodenapplikation behandelt (Konzentration: 0,002 % Aktivsubstanz bezogen auf das Bodenvolumen).

20 1 Woche später werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension ($1.5 \cdot 10^5$ Sporen/ml) des Pilzes infiziert und für 36 Stunden bei hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 23°C im Dunkeln inkubiert. Die Inkubation wird dann bei normaler Luftfeuchtigkeit und bei 22° - 23°C weitergeführt.

Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Pilzbefalls 7-8 Tage nach der Infektion.

25 C) Beizapplikation

Gurkensamen werden mit einer Lösung des Wirkstoffes gebeizt (Konzentration: 180 g Aktivsubstanz/100 kg Samen). Die Samen werden ausgesät. Nach 4 Wochen werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension $1.5 \cdot 10^5$ Sporen/ml) der Pilzes infiziert und für 36 Stunden bei hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 23°C inkubiert. Die Inkubation wird dann bei normaler Luftfeuchtigkeit und bei 22° bis 23°C weitergeführt. Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Pilzbefalls 7-8 Tage nach der Infektion.


Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in den Tests A und B sowie infizierte Pflanzen, deren Samen nicht behandelt waren, im Test C einen Pilzbefall von 100 % auf.

35 Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 7 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Colletotrichum lagenarium*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung Nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.34, 1.39, 1.46, 1.79, 1.81, 1.86, 1.101, 1.116, 1.136, 1.139, 1.140, 1.144, 2.5, 3.29, 7.6 oder 7.26 behandelt wurden, fast völlig frei von *Colletotrichum* (Befall 20 bis 0 %).

Beispiel 3.2: Vergleichstest: direkte Wirkung gegen *Colletotrichum lagenarium*

40 Der formulierte Wirkstoff wird in verschiedenen Konzentrationen (100, 10, 1, 0.1 ppm) mit autoklaviertem und abgekühltem Nährboden (Gemüsesaft), der 10^3 Sporen/ml enthält, gemischt und in Mikrotiterplatten gegossen. Die Inkubation erfolgt anschliessend bei 22°C im Dunkeln. Nach 2-3 Tagen wird das Pilzwachstum spektrophotometrisch gemessen und die EC_{50} -Werte bestimmt.

45 Bei z.B. der Verbindung 1.1, 1.2, 1.4, 1.34, 1.39, 1.79, 1.81, 1.86, 1.100, 1.101, 1.116, 1.135, 1.136, 1.139, 1.140, 1.144, 2.5, 3.26, 3.29 oder 7.6 wurde keine Hemmung des Pilzwachstums beobachtet. Dagegen trat bei Anwendung des Fungizids Benomyl (Handelsprodukt)



55 als Vergleichssubstanz bei 0,2 ppm eine 50%ige Hemmung (EC_{50}) von *Colletotrichum lagenarium* auf.

Beispiel 3.3: Immunisierende Wirkung gegen *Pyricularia oryzae* an Reispflanzen

A) Blattapplikation

Reispflanzen werden nach 3-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe durch Blattapplikation behandelt (Konzentration: 0,02 % Aktivsubstanz). Nach 2-3 Tagen werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension (350000 Sporen/ml) inokuliert und für 7 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 24 °C inkubiert. Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Pilzbefalls 7-8 Tage nach Inokulation.

Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in diesem Test einen Befall von 100 % auf.

Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 8 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Pyricularia oryzae*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.2, 1.34, 1.37, 1.38, 1.39, 1.72, 1.79, 1.86, 1.96, 1.103, 1.119, 1.135, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 3.13, 4.2, 5.2 oder 7.2 behandelt wurden, fast völlig frei von *Pyricularia oryzae* (Befall von 20 bis 0 %).

B) Bodenapplikation

Reispflanzen werden nach 3-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe durch Bodenapplikation behandelt (Konzentration: 0,002 % Aktivsubstanz auf das Bodenvolumen bezogen). Nach 2-3 Tagen werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension ($35 \cdot 10^5$ Sporen/ml) inokuliert und für 7 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 24 °C inkubiert.

Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Pilzbefalls 7-8 Tage nach Inokulation.

Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in diesem Test einen Befall von 100 % auf. Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 7 zeigten eine gute Wirkung gegen *Pyricularia oryzae*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit den Verbindungen 1.2, 1.34, 1.37, 1.38, 1.39, 1.79, 1.96, 1.103, 1.119, 1.135, 2.2, 2.3, 3.1, 3.9, 3.13 oder 7.3 behandelt wurden, fast völlig frei von *Pyricularia oryzae* (Befall von 20 bis 0 %).

Beispiel 3.4: Vergleichstest: direkte Wirkung gegen *Pyricularia oryzae*

Der formulierte Wirkstoff wird bei verschiedenen Konzentrationen (100, 10, 1, 0,1 ppm) mit autoklaviertem und abgekühltem Nährboden (Gemüsesaft), der 10^8 Sporen/ml enthält, gemischt und in Mikrotiterplatten gegossen. Inkubation erfolgt bei 22 °C im Dunkeln. Nach 2-3 Tagen wird das Pilzwachstum spektrophotometrisch bestimmt.

Bei z.B. der Verbindung 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.34, 1.37, 1.39, 1.72, 1.86, 1.96, 1.100, 1.101, 1.103, 1.108, 1.140, 2.5, 3.1, 3.9, 3.26, 7.26 oder 7.6 wurde keine Hemmung des Pilzwachstums beobachtet. Dagegen trat bei Anwendung des Fungizids Benomyl (Handelsprodukt/vgl. Beispiel 3.2) als Vergleichssubstanz bei 0,1 ppm eine 50 %ige Hemmung (EC_{50}) von *Pyricularia oryzae* auf.

Beispiel 3.5: Immunisierende Wirkung gegen *Pseudomonas lachrymans* an *Cucumis sativus* L.A) Blattapplikation

Gurkenpflanzen werden nach 2-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe besprüht (Konzentration: 0,02 % Aktivsubstanz).

Nach 1 Woche werden die Pflanzen mit einer Bakteriensuspension (10^8 Bakterien/ml) infiziert und für 7 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 23 °C inkubiert.

Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Bakterienbefalls 7-8 Tage nach der Infektion.

Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 7 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Pseudomonas lachrymans*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.34, 1.38, 1.46, 1.72, 1.79, 1.81, 1.119, 1.135, 2.2, 2.3, 3.1, 3.28, 3.29 oder 7.26 behandelt wurden, weitgehend frei von *Pseudomonas* (Befall 20 bis 0 %).

B) Bodenapplikation

Gurkenpflanzen werden nach 2-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe durch Bodenapplikation behandelt (Konzentration: 0,002 % Aktivsubstanz bezogen auf das Bodenvolumen).

Nach 1 Woche werden die Pflanzen mit einer Bakteriensuspension (10^8 Bakterien/ml) infiziert und für 7 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 23 °C inkubiert.

Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Pilzbefalls 7-8 Tage nach der Infektion.

Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 7 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Pseudomonas lachrymans*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.34, 1.38, 1.46, 1.72, 1.79, 1.81, 1.119, 1.135, 2.2, 2.3, 3.1, 3.9, 3.28, 3.29 oder 7.26 behandelt wurden, fast völlig frei von *Pseudomonas* (Befall 20 bis 0 %).

5 Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in den Tests A und B einen Krankheitsbefall von 100 % auf.

Beispiel 3.6 : Vergleichstest: direkte Wirkung gegen *Pseudomonas lachrymans*

10 Der formulierte Wirkstoff wird bei verschiedenen Konzentrationen (100, 10, 1, 0.1 ppm) mit autoklavierter und abgekühlter Nährbrühe (Nutrient broth 0.8 %), die 10^6 Bakterien/ml enthält, gemischt und in Mikrotiterplatten gegossen. Die Inkubation erfolgt dann bei 22 °C im Dunkeln auf einem Schütteltisch (120 rpm). Nach 2-3 Tagen Inkubationsdauer wird das Bakterienwachstum spektrophotometrisch bestimmt.

Bei z.B. der Verbindung 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.34, 1.38, 1.72, 1.79, 1.81, 1.96, 1.101, 1.119, 1.140, 2.2, 15 2.3, 2.5, 3.1, 3.6, 3.9, 3.26, 3.28, 3.29 oder 7.26 wurde keine Hemmung des Bakterienwachstums beobachtet. Dagegen trat bei Anwendung des Bakterizids Streptomycin als Vergleichssubstanz bei 0,4 ppm eine 50%ige Hemmung (EC_{50}) von *Pseudomonas lachrymans* auf.

Beispiel 3.7: Immunisierende Wirkung gegen *Xanthomonas oryzae* an Reispflanzen

20

A) Blattapplikation

Reispflanzen werden nach 3-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe durch Blattapplikation behandelt (Konzentration: 0,02 % Aktivsubstanz). Nach 2-3 Tagen werden 25 die Pflanzen mit einer Bakteriensuspension (10^8 Bakterien/ml) inokuliert und für 7 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 24 °C inkubiert. Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Bakterienbefalls 7-8 Tage nach Inokulation.

Verbindungen aus den Tabellen bewirken eine gute Immunisierung gegen *Xanthomonas oryzae*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.3, 1.5, 1.16, 1.37, 1.38, 1.72, 1.81, 1.86, 1.95, 1.102, 1.103, 30 1.108, 1.136, 1.139, 2.2, 2.5 oder 3.29 behandelt wurden, fast völlig frei von *Xanthomonas oryzae* (Befall von 20 bis 0 %).

B) Bodenapplikation

35 Reispflanzen werden nach 3-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe durch Bodenapplikation behandelt (Konzentration: 0,002 % Aktivsubstanz bezogen auf das Bodenvolumen). Nach 2-3 Tagen werden die Pflanzen mit einer Bakteriensuspension (10^8 Bakterien/ml) inokuliert und für 7 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 24 °C inkubiert.

Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Bakterienbefalls 7-8 Tage nach Inokulation.

40 Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 7 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Xanthomonas oryzae*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.16, 1.34, 1.35, 1.38, 1.44, 1.46, 1.68, 1.71, 1.72, 1.81, 1.86, 1.96, 1.102, 1.103, 1.119, 1.135, 1.136, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.13, 3.28, 3.29, 7.2, 7.5 oder 7.26 behandelt wurden, fast völlig frei von *Xanthomonas oryzae* (Befall 20 bis 0 %).

Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in den Tests A und B einen Befall von 100 % auf.

45

Beispiel 3.8: Vergleichstest: direkte Wirkung gegen *Xanthomonas oryzae*

Der formulierte Wirkstoff wird bei verschiedenen Konzentrationen (100, 10, 1, 0.1 ppm) mit autoklavierter und abgekühlter Nährbrühe (Nutrient broth 0.8 %), die 10^6 Bakterien/ml enthält, gemischt und in 50 Mikrotiterplatten gegossen. Inkubation erfolgt bei 22 °C im Dunkeln auf einem Schütteltisch (120 rpm). Nach 2-3 Tagen wird das Bakterienwachstum spektrophotometrisch bestimmt.

Bei z.B. der Verbindung 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.34, 1.38, 1.81, 1.101, 1.119, 1.135, 1.140, 2.3 oder 2.5 wurde keine Hemmung des Bakterienwachstums beobachtet. Dagegen trat bei Anwendung des Bakterizids Streptomycin als Vergleichssubstanz bei 0,4 ppm eine 50%ige Hemmung (EC_{50}) von *Xantho-* 55 *monas oryzae* auf.

Beispiel 3.9: Immunisierende Wirkung gegen *Xanthomonas versicatori* an Paprikapflanzen

A) Blattapplikation

Paprikapflanzen werden nach 4-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe durch Blattapplikation behandelt (Konzentration: 0,02 % ppm). Nach 2-3 Tagen werden die Pflanzen mit einer Bakteriensuspension (10^8 Bakterien/ml) inokuliert und für 6 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 25 °C inkubiert. Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Bakterienbefalls 7-8 Tage nach Inokulation.

Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in dem Test einen Befall von 100 % auf.

Verbindungen aus dem Tabellen 1 bis 7 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Xanthomonas vesicatoria*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.2, 1.5, 1.9, 1.16, 1.34, 1.35, 1.37, 1.72, 1.81, 1.86, 1.96, 1.102, 1.103, 1.108, 1.136, 3.1, 3.13, 3.28, 3.29, 5.2, 7.26 oder 7.5 behandelt wurden, fast völlig frei von *Xanthomonas vesicatoria* (Befall von 20 bis 0 %).

B) Bodenapplikation

Paprikapflanzen werden nach 4-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe durch Bodenapplikation behandelt (Konzentration: 60 ppm bezogen auf das Bodenvolumen). Nach 2-3 Tagen werden die Pflanzen mit Bakteriensuspension (10^8 Bakterien/ml) inokuliert und für 6 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 25 °C inkubiert.

Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Bakterienbefalls 7-8 Tage nach Inokulation.

Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in dem Test einen Befall von 100 % auf.

Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 7 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Xanthomonas vesicatoria*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 1.11, 1.16, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.39, 1.68, 1.71, 1.72, 1.81, 1.86, 1.95, 1.100, 1.102, 1.103, 1.108, 1.116, 1.140, 1.144, 2.5, 3.1, 3.13, 3.28, 3.29, 5.2, 7.2 oder 7.26 behandelt wurden, fast völlig frei von *Xanthomonas vesicatoria* (Befall von 0 bis 20 %).

Beispiel 3.10: Immunisierende Wirkung gegen Phytophthora infestans an TomatenpflanzenA) Blattapplikation

Tomatenpflanzen werden nach 3-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe (0,02 % Aktivsubstanz) besprüht. Nach 2-3 Tagen werden die behandelten Pflanzen mit einer Sporangiensuspension des Pilzes ($5 \cdot 10^4$ Sporangien/ml) infiziert. Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt nach einer Inkubation der infizierten Pflanzen während 5 Tagen bei 90-100 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20 °C.

Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in diesem Test einen Befall von 100 % auf.

Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 7 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Phytophthora infestans*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.6, 1.16, 1.34, 1.44, 1.68, 1.71, 1.72, 1.96, 1.101, 3.9 oder 7.26 behandelt wurden, weitgehend frei von *Phytophthora* (Befall: 20 bis 0 %).

B) Bodenapplikation

Zu Tomatenpflanzen wird nach 3-wöchiger Anzucht eine aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellte Spritzbrühe gegossen (0,006 % Aktivsubstanz bezogen auf das Erdvolumen). Es wird dabei darauf geachtet, dass die Spritzbrühe nicht mit den oberirdischen Pflanzenteilen in Berührung kam. Nach 4 Tagen werden die behandelten Pflanzen mit einer Sporangiensuspension ($5 \cdot 10^4$ Sporangien/ml) des Pilzes infiziert. Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt nach einer Inkubation der infizierten Pflanzen während 5 Tagen bei 90-100 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20 °C.

Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in diesem Test einen Befall von 100 % auf.

Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 7 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Phytophthora infestans*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.6, 1.34, 1.44, 1.68, 1.71, 1.72, 1.101, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.13 oder 7.26 behandelt wurden, weitgehend frei von *Phytophthora* (Befall: 20 bis 0 %).

Beispiel 3.11: Vergleichstest: direkte Wirkung gegen Phytophthora infestans

Der formulierte Wirkstoff wird bei verschiedenen Konzentrationen (100, 10, 1, 0,1 ppm) mit steril filtriertem Nährboden (Erbsen/Agar), der 10^6 Sporangien/ml enthält, gemischt und in Mikrotiterplatten

gegossen. Die Inkubation erfolgt bei 22 °C im Dunkeln. Nach 2-3 Tagen wird das Pilzwachstum spektrophotometrisch bestimmt.

Bei z.B. der Verbindung 1.1, 1.2, 1.4, 1.34, 1.72, 1.86, 1.104, 1.108, 1.116, 1.135, 1.140, 1.144, 2.5, 3.1, 3.6, 3.9, 3.13, 3.26, 7.6 oder 7.26 wurde keine Hemmung des Pilzwachstums beobachtet. Dagegen trat bei Anwendung von Ridomil (Handelsprodukt) als Vergleichssubstanz bei 0,2 ppm eine 50%ige Hemmung von *Phytophthora infestans* auf.

Beispiel 3.12: Immunisierende Wirkung gegen *Plasmopara viticola* an Reben

Im 4-5 Blattstadium werden Rebensämlinge mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe (0,02 % Aktivsubstanz) besprüht. Nach 1 Woche werden die behandelten Pflanzen mit einer Sporangiensuspension ($5 \cdot 10^4$ Sporangien/ml) des Pilzes infiziert. Nach einer Inkubation während 6 Tagen bei 95-100 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20 °C wird die Schutzwirkung beurteilt.

Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in diesem Test einen Befall von 100 % auf.

Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 8 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Plasmopara viticola*. So blieben Reben, die z.B. mit der Verbindung 1.1, 1.2 oder 1.5 behandelt wurden, weitgehend frei von *Plasmopara viticola* (Befall: 20 - 0 %).

Beispiel 3.13: Immunisierende Wirkung gegen *Pseudomonas tomato* an Tomatenpflanzen

A) Blattapplikation

Tomatenpflanzen werden nach 3-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe durch Blattapplikation behandelt (Konzentration: 0,02 % Aktivsubstanz). Nach 2-3 Tagen werden die Pflanzen mit einer Bakteriensuspension (10^8 Bakterien/ml) inokuliert und für 6 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 25 °C inkubiert. Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Bakterienbefalls 7-8 Tage nach Inokulation.

Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in diesem Test einen Befall von 100 % auf.

Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 8 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Pseudomonas tomato*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.16, 1.95 oder 7.5 behandelt wurden, weitgehend frei von *Pseudomonas* (Befall: 20 bis 0 %).

B) Bodenapplikation

Tomatenpflanzen werden nach 3-wöchiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe durch Bodenapplikation behandelt (Konzentration: 0,002 % Aktivsubstanz bezogen auf das Bodenvolumen). Nach 2-3 Tagen werden die Pflanzen mit einer Bakteriensuspension (10^8 Bakterien/ml) inokuliert und für 6 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 25 °C inkubiert.

Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Bakterienbefalls 7-8 Tage nach Inokulation.

Unbehandelte aber infizierte Kontrollpflanzen weisen in diesem Test einen Befall von 100 % auf.

Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 7 bewirken eine gute Immunisierung gegen *Pseudomonas tomato*. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.44, 1.95 oder 7.5 behandelt wurden, fast völlig frei von *Pseudomonas* (Befall: 20 bis 0 %).

Beispiel 3.14: Immunisierende Wirkung gegen *Phytophthora parasitica* var. *nicotianae* an Tabakpflanzen

Bodenapplikation

Tabakpflanzen (8 Wochen alt) werden mit einer formulierten Lösung des Wirkstoffes durch Bodenapplikation behandelt (Konzentration: 2 ppm bezogen auf das Bodenvolumen) oder in das Blatt injiziert (Konzentration: 0,02 % Aktivsubstanz). Nach 4 Tagen werden die Pflanzen mit *Phytophthora parasitica* infiziert. 2 ml einer Zoosporensuspension ($8 \cdot 10^4$ z/ml) werden um die Stengelbasis pipettiert und mit Wasser in den Boden gewaschen. Die Pflanzen werden 3 Wochen bei 24 °-26 °C aufbewahrt.

Die Beurteilung der Symptome erfolgt aufgrund des Welkgrades der Pflanzen.

Unbehandelte aber infizierte Pflanzen waren zu 100 % verwelkt.

Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 7 zeigen gute Wirkung gegen *Phytophthora parasitica*. So reduzierte z.B. die Verbindung 1.2 die Welkerscheinungen auf 0-5 %.

Beispiel 3.15: Direkte Wirkung gegen Phytophthora parasitica var. nicotianae

Der Wirkstoff wird mit Nährboden (V-8 Agar) in einer Konzentration von 100 ppm gemischt und in Petrischalen gegossen. Nach dem Abkühlen wird entweder eine Myzelrondelle (8 mm) im Zentrum der Platte platziert oder 100 µl einer Pilzsporensuspension (10^5 Sporen/ml) auf die Platte gestrichen. Die Platten werden bei 22° C inkubiert.

Die Verbindung 1.2 zeigte keine hemmende Aktivität auf die Keimung und das Wachstum des Pilzes im Vergleich zu den Kontrollplatten ohne Wirkstoff.

10 Beispiel 3.16: Immunisierende Wirkung gegen Peronospora tabacina an TabakpflanzenA) Blattapplikation

Tabakpflanzen (8 Wochen alt) werden mit einer formulierten Lösung des Wirkungsstoffes besprüht (Konzentration: 0,02 % Aktivsubstanz). Vier Tage nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer Sporangiensuspension von Peronospora tabacina (10^4 Sporangien/ml) inokuliert, 20 Stunden im Dunkeln bei 25° C und hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahrt und dann bei normaler Tag/Nacht Wechselfolge weiterinkubiert.

20 B) Bodenapplikation

Tabakpflanzen (8 Wochen alt) werden mit einer formulierten Lösung des Wirkungsstoffes durch Bodenapplikation behandelt (Konzentration: 0,006 % Aktivsubstanz bezogen auf das Bodenvolumen). Nach 4 Tagen werden die Pflanzen mit einer Sporangiensuspension von Peronospora tabacina (10^4 Sporangien/ml) inokuliert, 20 Stunden im Dunkeln bei 25° C und hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahrt und dann bei normaler Tag/Nacht Wechselfolge weiterinkubiert.

Die Beurteilung der Symptome in den Tests A und B erfolgt aufgrund der mit Pilz befallenen Blattoberfläche.

Die Kontrollpflanzen zeigen einen Befall von 90 bis 100%. Pflanzen, welche in Test A und B mit der Verbindung 1.2 behandelt wurden, zeigten einen Befall von 0-35 %.

30 Beispiel 3.17: Direkte Wirkung gegen Peronospora tabacina

Formulierter Wirkstoff wird in verschiedenen Konzentrationen (10, 1, 0,1 ppm) mit Wasseragar gemischt und in Petrischalen gegossen. Nach dem Abkühlen werden 100 µl einer Sporangiensuspension (10^6 Sporen/ml) auf die Platte gestrichen. Die Platten werden 16 Stunden bei 18° C inkubiert.

Bei z.B. der Verbindung 1.2 wurde keine Hemmung der Keimung von Peronospora tabacina beobachtet.

Beispiel 3.18: Immunisierende Wirkung gegen Cercospora nicotianae an Tabakpflanzen40 A) Blattapplikation

Tabakpflanzen (8 Wochen alt) werden mit einer formulierten Lösung des Wirkstoffs besprüht (Konzentration: 200 ppm). Vier Tagen nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension von Cercospora nicotianae (10^5 Sporen/ml) inokuliert und für 5 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 22°-25° C inkubiert. Die Inkubation wird dann bei normaler Luftfeuchtigkeit und bei 20°-22° C weitergeführt.

B) Bodenapplikation

Tabakpflanzen (8 Wochen alt) wurden mit einer formulierten Lösung des Wirkstoffs durch Bodenapplikation behandelt (Konzentration: 0,002 % Aktivsubstanz). Nach 4 Tagen wurden die Pflanzen mit einer Sporensuspension von Cercospora nicotianae (10^5 Sporen/ml) inokuliert und für 5 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 22°-25° C inkubiert. Die Inkubation wurde dann bei normaler Luftfeuchtigkeit und bei 20°-22° C weitergeführt.

Die Beurteilung der Symptome in den Tests A und B erfolgt aufgrund des Pilzbefalls 12 bis 14 Tage nach der Infektion.

Die Kontrollpflanzen zeigten einen Befall von 100 %.

Pflanzen, welche in den Tests A und B mit der Verbindung 1.2 behandelt wurden, zeigten einen Befall von

0-20 %.

Beispiel 3.19: Direkte Wirkung gegen Cercospora nicotianae

5 Wirkstoff wird in verschiedenen Konzentrationen (100, 10, 1, 0,1 ppm) mit Nährboden (V-8 Agar) gemischt und in Petrischalen gegossen. Nach dem Abkühlen wird entweder eine Myzelrondelle (8 mm) im Zentrum der Platte platziert oder 100 µl einer Sporensuspension ($5 \cdot 10^4$ Sporen/ml) auf die Platte gestrichen. Die Platten werden bei 22 °C inkubiert.

10 Die Verbindung 1.2 zeigte keine hemmende Aktivität auf die Keimung und das Wachstum des Pilzes im Vergleich zu den Kontrollplatten ohne Wirkstoff.

Beispiel 3.20: Immunisierende Wirkung gegen Pseudomonas tabaci an Tabakpflanzen

A) Blattapplikation

15 Tabakpflanzen (8 Wochen alt) werden mit einer formulierten Lösung des Wirkstoffs besprüht (Konzentration: 200 ppm) oder injiziert (Konzentration: 200, 60, 20 ppm). Nach 4 Tagen werden die Pflanzen mit einer Bakteriensuspension ($2 \cdot 10^7$ Bakterien/ml) besprüht und für 3 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und 22°-25 °C aufbewahrt. Die Inkubation wird dann 3 Tage bei normaler Luftfeuchtigkeit und 22°-25 °C
20 weiterverfolgt.

B) Bodenapplikation

25 Tabakpflanzen (8 Wochen alt) werden mit einer formulierten Lösung des Wirkstoffs durch Bodenapplikation behandelt (Konzentration: 0,002 % bis 0,0002 % Aktivsubstanz). Nach 4 Tagen wurden die Pflanzen mit einer Bakteriensuspension ($2 \cdot 10^7$ Bakterien/ml) besprüht und für 3 Tage bei hoher Luftfeuchtigkeit und 22°-25 °C aufbewahrt. Die Inkubation wird dann 3 Tage bei normaler Luftfeuchtigkeit und 22-25 °C weiterverfolgt.

Die Beurteilung der Symptome in den Tests A und B erfolgt aufgrund des Bakteriefalls.

30 Die Kontrollpflanzen zeigten einen Befall von 100 %.

Pflanzen, welche in den Tests A und B mit der Verbindung 1.2 oder 1.46 behandelt wurden zeigten einen Befall von 0-20 %.

Beispiel 3.21: Direkte Wirkung gegen Pseudomonas tabaci

35 Der Wirkstoff wird in verschiedenen Konzentrationen (100, 10, 1, 0,1 ppm) mit flüssigem Nährboden (Nutrient broth), der 10^6 Bakterien/ml enthält, gemischt und in Mikrotiterplatten gegossen. Die Platten werden bei 22 °C inkubiert und das Wachstum der Bakterien wird nach 16 Stunden durch Messung der optischen Dichte bestimmt.

40 Bei z. B. der Verbindung 1.2 wurde keine Hemmung des Wachstums von Pseudomonas tabaci beobachtet. Streptomycin dagegen verursachte eine 50%ige Hemmung (EC_{50}) des Wachstums bei 0,1 ppm

Beispiel 3.22: Immunisierende Wirkung gegen den Tabakmosaikvirus und den Kartoffelvirus Y auf Tabakpflanzen

45 Tabakpflanzen (8 Wochen alt) wurden mit einer formulierten Lösung des Wirkstoffs besprüht (Konzentration: 200 ppm) oder injiziert (Konzentration: 0,02 % bis 0,0002 % Aktivsubstanz). Nach 4 Tagen werden die Pflanzen mit einer Suspension von Tabakmosaikvirus (0,5 µg/ml + Carborundum) oder von Kartoffelvirus Y (Saft eines infizierten Blattes, 1 g/100 ml H₂O + Carborundum) mechanisch inokuliert und
50 bei einer Temperatur von 20°-22 °C inkubiert.

Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt für den Tabakmosaikvirus aufgrund der Anzahl und der Größe der Lokalläsionen 7 Tage nach der Inokulation und für den Kartoffelvirus Y durch serologische Bestimmung der Virenanzahl 7 und 10 Tage nach der Inokulation.

55 Pflanzen, welche mit der Verbindung 1.2 behandelt wurden, zeigten im Test beim Tabakmosaikvirus eine 88 bis 100%ige Hemmung der Entwicklung der Läsionen im Vergleich zu den entsprechenden Kontrollen (100 % Schädigung) und beim Kartoffelvirus Y eine 70 bis 100%ige Hemmung der Virusvermehrung im Vergleich zu den entsprechenden Kontrollen (= 100 %-Wert) auf. Die unbehandelten aber infizierten Pflanzen wiesen Läsionen von 100 % auf (Kontrolle).

Beispiel 3.23: Direkte Wirkung gegen den Tabakmosaikvirus

Der formulierte Wirkstoff wird direkt zu dem Tabakmosaikvirus-Inokulum addiert (200 ppm + 0,5 µg/ml Virus + Carborundum). Nach einer Stunde wird die Mischung auf Tabakpflanzen (8 Wochen alt) mechanisch inokuliert.

Pflanzen, die mit dieser Mischung aus Tabakmosaikviren und der Verbindung 1.2 inokuliert wurden, zeigten keine Schutzwirkung.

Beispiel 3.24: Immunisierende Wirkung gegen Erysiphe graminis auf Weizen

Weizenpflanzen werden nach 5-tägiger Anzucht mit einer aus Spritzpulver des Wirkstoffes hergestellten Spritzbrühe besprüht (Konzentration: 0,02 %). Einen Tag später werden die Pflanzen mit Konidien von Erysiphe graminis infiziert und bei 20 °C inkubiert.

Die Beurteilung der Schutzwirkung erfolgt aufgrund des Pilzbefalls 8-10 Tage nach der Infektion.

Als Wirkstoff eingesetzte Verbindungen aus den Tabellen 1 bis 8 zeigten in diesem Test eine gute Wirkung gegen Erysiphe graminis. So blieben Pflanzen, die z.B. mit der Verbindung 1.2 behandelt wurden, weitgehend frei von Erysiphe-Befall (0 bis 20 % Schädigung). Unbehandelte aber infizierte Pflanzen (Kontrolle) wiesen dagegen einen Erysiphe-Befall von 100 % auf.

Beispiel 3.25a: In-vitro-Test der direkten Wirkung gegen Pyricularia oryzae, Colletotrichum lagenarium oder Phytophthora infestans

Der Wirkstoff der Testverbindungen wird a) zu einem flüssigen V-8-Medium (Gemüsegemisch) gegeben, das 10⁴ Sporen/ml von Pyricularia oryzae oder Colletotrichum lagenarium enthält, und b) zu einem flüssigen Erbsenmedium gegeben, das 10⁴ Sporangien/ml von Phytophthora infestans enthält, wobei in beiden Fällen die Endkonzentration des Wirkstoffs 60 ppm beträgt. Die präparierten Nährmedien werden auf Mikrotiterplatten gegeben und dort bei 22 °C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit im Dunkeln 2 Tage lang gehalten, wobei die Präparate mit Pyricularia oryzae und Colletotrichum geschüttelt werden.

Das Pilzwachstum wird anschliessend durch spektrometrische Absorptionsmessung der Medien bei 595 nm (Trübungsmessung) bestimmt.

Beispiel 3.25b: In-vitro-Test von direkter Wirkung gegen Xanthomonas oryzae und Pseudomonas lachrymans

Der Wirkstoff der Testverbindungen wird zu einem Nährmedium (Bacto-Nutrient Broth Difco) gegeben, das 10⁶ Keime/ml von Xanthomonas oryzae oder Pseudomonas lachrymans enthält, wobei die Endkonzentration des Wirkstoffs 60 ppm beträgt. Das präparierte Nährmedium wird auf Mikrotiterplatten gegeben und dort bei 22 °C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit im Dunkeln 2 Tage lang geschüttelt.

Das Bakterienwachstum wird anschliessend durch spektrometrische Absorptionsmessungen der Medien bei 595 nm (Trübungsmessung) bestimmt.

Parallel zur Wirkstoffprüfung in den vorstehend beschriebenen Tests werden Kontrollversuche in der beschriebenen Weise jedoch ohne Verwendung von Wirkstoffen durchgeführt. Der dabei gemessene Trübungsgrad stellt den 100 %-Wert der zur Anwendung gelangenden Bewertungsskala dar.

Die Auswertung erfolgt auf der Basis folgender Notenskala:

Pilzwachstum (in %)	Note
81 - 100	9*
71 - 80	8*
61 - 70	7*
51 - 60	6
41 - 50	5
31 - 40	4
21 - 30	3
11 - 20	2
0 - 10	1

* Bei Noten grösser als oder gleich 7 wird auf Abwesenheit einer direkten Mikrobizidwirkung geschlossen.

5

10

15

20

25

30

35

40


45

50

55


Fungizide oder bakterizide in-vitro-Wirkung von Verbindungen der Formel I im Vergleich mit bekannten Substanzen

a) Test-Verbindungen der Formel






Verb. Nr.	Z	Colletotrichum lagenarium	Pyricularia oryzae	Phytophthora infestans	Xanthomonas oryzae	Pseudomonas lachrymans
1.1	COOH	9	9	9	9	9
1.2	COOMethyl	9	9	9	9	9
1.4	COO-n-propyl	9	9	9	9	9
1.135	COO-cyclohexyl	6	-	9	9	-
1.34	COO-Benzyl	9	9	9	9	9
1.96	COO-CH ₂ -2'Furyl	-	9	4	-	9
2.5	COS-Benzyl	9	9	9	9	9
1.101	COOCH ₂ -2-Pyridinyl	9	9	6	9	9
1.140	COOCH ₂ -2-Methylphenyl	9	9	9	9	9
1.144	COOCH ₂ -3-Methoxyphenyl	9	-	9	9	-
1.116	COOCH ₂ -1-Naphthyl	9	-	9	6	-
1.108	COOCH ₂ CH ₂ P(O)(OMethyl) ₂	-	9	9	-	9
1.104	COOCH ₂ CH ₂ Si(Methyl) ₃	-	3	9	-	9

(Fortsetzung)

Verb. Nr.	Z	Colletotrichum lagenarium	Pyricularia oryzae	Phytophthora infestans	Xanthomonas oryzae	Pseudomonas lachrymans
1.72		-	9	9	-	9
1.86	COO-Diaceton-D-glucosidyl	-	9	9	-	9
3.1	CONH ₂	-	9	9	-	9
3.26	CON(allyl) ₂	-	9	9	-	8
3.13		-	6	9	-	9
1.100		9	9	-	9	-
3.6	CONH-Phenyl	-	-	9	-	9
3.9	CONH-CH ₂ COOH	-	9	9	-	9
7.26 *	CN	-	9	9	-	8

b) Test-Verbindungen der Formeln

Verb. Nr.	Formel	Colletotrichum lagenarium	Pyricularia oryzae	Phytophthora infestans	Xanthomonas oryzae	Pseudomonas lachrymans
7.6		-	9	9	-	8
*		1	1	1	-	-
*		1	1	1	-	-

* Verbindungen aus DE-OS 1 695 786

Patentansprüche

Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten : AT, BE, CH, DE, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE

1. Verfahren zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen, dadurch gekennzeichnet, dass auf Pflanzen und/oder deren Umgebung als Wirkstoff eine Verbindung der nachfolgenden Formel I appliziert wird:



b) Test-Verbindungen der Formeln


Verb. Nr.	Formel	Colletotrichum lagenarium	Pyricularia oryzae	Phytophthora infestans	Xanthomonas oryzae	Pseudomonas lachrymans
7.6		-	9	9	1	8
*		1	1	1	1	1
*		1	1	1	1	1

* Verbindungen aus DE-OS 1 695 786

Patentansprüche

Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten : AT, BE, CH, DE, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE

1. Verfahren zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen, dadurch gekennzeichnet, dass auf Pflanzen und/oder deren Umgebung als Wirkstoff eine Verbindung der nachfolgenden Formel I appliziert wird:



(I)


worin bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy, oder Amino, wobei M das Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions ist, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet wird; und

Z Cyano oder -CO-A, wobei A entweder OH oder SH bedeutet, deren H auch durch das Moläquivalent eines anorganischen oder organischen kationischen Restes ersetzt sein kann.

2. Verfahren zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismus, dadurch gekennzeichnet, dass auf Pflanzen und/oder deren Umgebung als Wirkstoff eine Verbindung der nachfolgenden Formel I appliziert werden:



(I)

worin bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy, oder Amino, wobei M das Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions ist, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet wird; und

Z Cyano oder -CO-A,




A UR, N(R₁)R₂ oder U¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

U¹ Sauerstoff oder -N(R₅)-;

R Wasserstoff, C₁-C₈-Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, U-C₁-C₃-Alkyl oder C₂-C₄-Dialkyl-amino substituiertes oder durch die CO-Gruppe unterbrochenes C₁-C₈-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkenyl, C₃-C₆-Alkinyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkinyl, (T)_n-C₃-C₈-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe

, (T)_n-Napht,(T)_n-Si(C₁-C₈-Alkyl)₃,

X^a, X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC, MOOC, C₁-C₈-Alkyl-OOC, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₂-Halogenalkyl mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder

X^a C₁-C₂-Halogenalkoxy mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenylloxy,



Benzyloxy, Sulfamoyl und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder
 X^a Phenyl, Phenyloxy oder Benzyloxy und
 X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder
 X^a , X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

5 Naphth einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest;
 W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen,
 Trifluormethyl, Cyano, C_1 - C_2 -Alkyl oder einen C_1 - C_2 -Alkoxy-carbonyl- C_2 - C_4 -alkylen-imino-Rest substitu-
 ierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen
 Monosaccharid-Rest;

10 T die Brückenglieder $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH(CH_3)-$, $-CCH_3(CH_3)-$, $-CH_2CH_2CH_2-$ oder $-CH_2CH_2O-$;

R_1 Wasserstoff, C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C_1 - C_5 -Alkyl,
 durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl-OOC substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff
 oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl-OOC
 substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, C_3 - C_5 -Alkenyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkenyl, C_3 - C_5 -
 15 Alkynyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkynyl, $(T)_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-
 OOC substituiertes $(T)_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, $(T)_n$ -Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy,
 Methyl, Methoxy, CF_3 , Cyano, HOOC oder MOOC substituiertes $(T)_n$ -Phenyl;

R_2 Wasserstoff, Hydroxy, C_1 - C_3 -Alkyl, durch Cyano oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_3 -Alkyl, C_1 -
 C_4 -Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als
 20 Heteroatome;

R_1 und R_2 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R_3 Wasserstoff, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder
 MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R_4 Wasserstoff, C_1 - C_6 -Alkyl, $CONH_2$, $CONH-CONH-C_1-C_3$ -Alkyl, C_1 - C_3 -Alkanoyl, durch Halogen oder
 C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_3 -Alkanoyl, C_3 - C_5 -Alkenoyl oder durch Halogen oder C_1 - C_3 -Alkoxy
 25 substituiertes C_3 - C_5 -Alkenoyl;

R_3 und R_4 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen
 carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

30 R_5 Wasserstoff oder Methyl;

R_6 Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl; und

n Null oder 1;

wobei in den Verbindungen der Formel I der organische Rest A ein Molgewicht von weniger als 900
 besitzt; und umfassen im Falle von U als Sauerstoff oder Schwefel die Salze der pflanzenphysiologisch
 35 verträglichen 7-Carbonsäure mit primären, sekundären oder tertiären Aminen oder mit anorganischen
 Basen.

3. Verfahren gemäss Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufwandmenge weniger als 1
 kg AS/ha beträgt.

40 4. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungen der Formel I verwendet
 werden, in welcher bedeuten:

X und Y für Wasserstoff;

Z für Cyano oder COA;

45 A für UR oder $U'N(=C)_n(R_3)R_4$;

U für Sauerstoff;

U' für Sauerstoff oder $-N(R_5)-$;

R für Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, durch Halogen oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_8 -Alkyl, C_3 - C_6 -
 Alkenyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Alkynyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -
 50 Alkynyl, $(T)_n$ - C_3 - C_8 -Cycloalkyl, Benzyl, halogeniertes Benzyl, Benzylmethoxy, $(T)_n$ -Si(CH₃)₃, (T) -P(O)(C₁-
 C_4 -Alkyl)CH₃, (T) -P(O)(OC₁- C_4 -Alkyl)₂ oder die Gruppe $(T)_n$ -W;

W für einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten Heterocyclus mit 1 bis 3
 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie für Diaceton-D-glucosidyl;

T für die Brückenglieder $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH(CH_3)-$, $-CCH_3(CH_3)-$ oder $-CH_2CH_2CH_2-$;

55 R_3 für Wasserstoff, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl, Phenyl oder W;

R_4 für Wasserstoff, C_1 - C_6 -Alkyl, $CONH_2$, $CONH-CONH-C_1-C_3$ -Alkyl, C_1 - C_3 -Alkanoyl oder C_3 - C_5 -Alke-
 noyl;

R_3 und R_4 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, W oder W';



W für einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S;

W' für einen Rest aus der Gruppe .

5




10

n für Null oder 1.

5. Verbindungen der Formel I'

15



20

in welcher bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy oder Amino;

25

Z Cyano oder COA;

A UR, N(R₁)R₂ oder U'N(=C)_n(R₃)R₄;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;


U Sauerstoff oder Schwefel;

30


U' Sauerstoff oder -N(R₅)-;

R Wasserstoff, C₁-C₈-Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, oder U-C₁-C₃-Alkyl substituiertes C₁-C₈-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkenyl, C₃-C₆-Alkynyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₈-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe

35



40



45

X^a, X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC, MOOC, C₁-C₈-Alkyl-OOC, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₂-Halogenalkyl mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder

50

X^a C₁-C₂-Halogenalkoxy mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenyloxy, Benzyloxy, Sulfamoyloxy und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder

X^a Phenyl, Phenyloxy oder Benzyloxy und X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder

X^a, X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

Napht einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest;

55

W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder C₁-C₂-Alkyl oder einen C₁-C₂-Alkoxycarbonyl-C₂-C₄-alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;



T die Brückenglieder $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ oder $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R₁ Wasserstoff, C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C₁-C₅-Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, C₃-C₅-Alkenyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkenyl, C₃-C₅-Alkynyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, (T)_n-Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF₃, Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes (T)_n-Phenyl;

R₂ Wasserstoff, Hydroxy, C₁-C₃-Alkyl, durch Cyano oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R₁ und R₂ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R₃ Wasserstoff, Cyano, C₁-C₅-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R₄ Wasserstoff, C₁-C₅-Alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₅-Alkanoyl, durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkanoyl, C₃-C₅-Alkanoyl oder durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₃-C₅-Alkanoyl;

R₃ und R₄ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R₅ Wasserstoff oder Methyl;

R₆ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl; und

n Null oder 1;

mit Ausnahme der Verbindungen:

7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;


Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester;

6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

6-Chlor-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure.

6. Verbindungen der Formel I'



(I')

in welcher bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy oder Amino;

Z Cyano oder COA;




A UR, N(R₁)R₂ oder U¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

U¹ Sauerstoff oder -N(R₅)-;

R Wasserstoff, C₁-C₃-Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Alkoxy oder U-C₁-C₃-Alkyl substituiertes C₁-C₃-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC₁-C₄-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₅-Alkenyl, C₃-C₅-Alkynyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₅-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder C_1 - C_2 -Alkyl oder einen C_1 - C_2 -Alkoxy-carbonyl- C_2 - C_4 -alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ oder $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$;

R_1 Wasserstoff, C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C_1 - C_5 -Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl- OOC substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl- OOC substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, C_3 - C_5 -Alkenyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl- OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkenyl, C_3 - C_5 -Alkynyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl- OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkynyl, $(\text{T})_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl- OOC substituiertes $(\text{T})_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, $(\text{T})_n$ -Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF_3 , Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes $(\text{T})_n$ -Phenyl;

R_2 Wasserstoff, Hydroxy, C_1 - C_3 -Alkyl, durch Cyano oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_3 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R_1 und R_2 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R_3 Wasserstoff, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R_4 Wasserstoff, C_1 - C_6 -Alkyl, CONH_2 , CONH-CONH- C_1 - C_3 -Alkyl, C_1 - C_3 -Alkanoyl, durch Halogen oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_3 -Alkanoyl, C_3 - C_5 -Alkenoyl oder durch Halogen oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_3 - C_5 -Alkenoyl;

R_3 und R_4 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R_5 Wasserstoff oder Methyl;

R_6 Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl; und

n Null oder 1;

mit Ausnahme der Verbindungen:

7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester;

6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

6-Chlor-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure.

7. Verbindungen der Formel I' gemäss Anspruch 5, bei denen Z = COA bedeutet und R eine andere Bedeutung hat als Wasserstoff und unsubstituiertes Alkyl.

8. Verbindungen der Formel I' gemäss Anspruch 5 aus der Gruppe:

7-n-Pentoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(4-Methoxy-benzyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(Cycloheximino-oxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(3-Hydroxy-n-propoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

1,2,5,6-Di-O-isopropyliden-3-(7-benzo-1,2,3-thiadiazoyl)-D-glucofuranose;

7-Furfuryloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(1,2,4-Triazol-1-yl)-methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(2-Pyridylmethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;



7-Trimethylsilyl-methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-[2-(Trimethylsilyl)-ethoxycarbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-Dimethylphosphono-ethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-Cyclohexyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 5 7-(1-Phenethyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(3-Methoxybenzyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(Ethylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(n-Propylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(Benzylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 10 7-Carbamoyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-N-Phenylcarbamoyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 N-(7-Benzo-1,2,3-thiadiazoyl)-glycin;
 7-(N-Diallylcarbamoyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 6-Fluor-7-methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 15 6-Fluor-7-carboxy-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 5-Fluor-7-benzyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 5-Fluor-7-carboxy-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 5-Fluor-7-ethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

20 9. Verbindungen der Formel I' gemäss Anspruch 6 aus der Gruppe:


7-Ethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-n-Propoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-iso-Propoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-n-Butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 25 7-sek.Butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-tert.Butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-Cyclopropylmethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(2'-Phenethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-Benzyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 30 7-Allyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-Propin-2-yloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 2-(7-Benzo-1,2,3-thiadiazoyloxy-imino)-2-cyano-N-(ethylaminocarbonyl)-acetamid;
 Na-Salz der Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;
 K-Salz der Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;
 35 Triethylammoniumsalz der Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;
 7-(1'-Phenethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(1'-Naphthylmethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(Methylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(Ethylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 40 7-(Benzylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-[(Di-cyanomethyl)-amino-carbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 3-[(N-Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamino]-2-methyl-
 propencarbonsäuremethylester;
 3-[(N-Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamino]-2-ethyl-
 45 propencarbonsäuremethylester;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(α -methylpropyliden)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclobutyliden)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclopentyliden)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclohexyliden)-hydrazin;
 50 2-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-1-(2'-sec-butyl)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclopentyl)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclohexyl)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cycloheptyl)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-1,2-diacetyl-hydrazin;
 55 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-phenyl-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-pyridin-2'-yl-hydrazin.

10. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungen der Formel I' gemäss



Anspruch 5 verwendet werden.

11. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungen der Formel I' gemäss Anspruch 6 verwendet werden.
12. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungen der Formel I' gemäss Anspruch 7 verwendet werden.
13. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Wirkstoff 1,2,3-Benzothiadiazol-7-carbonsäure oder ein Salz davon mit einer basischen Verbindung verwendet wird.
14. Verfahren gemäss Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass als Salze solche mit primären, sekundären oder tertiären Aminen oder Alkali- oder Erdalkaliverbindungen verwendet werden.
15. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Wirkstoff 7-Methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol verwendet wird.
16. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Wirkstoff 7-Benzoyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol verwendet wird.
17. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Wirkstoff 7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol verwendet wird.
18. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Wirkstoffe Verbindungen von 7-C₂-C₄-Alkoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol verwendet werden.
19. Mittel zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen enthaltend als Wirkstoff mindestens eine Verbindung der Formel I gemäss Anspruch 1 oder 2 mit Ausnahme der Verbindungen 7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol; 4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol; 6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol, 4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol und 7-Methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol.
20. Mittel zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen enthaltend als Wirkstoff mindestens eine Verbindung der Formel I' gemäss Anspruch 5.
21. Mittel zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen enthaltend als Wirkstoff mindestens eine Verbindung der Formel I' gemäss Anspruch 6.
22. Mittel gemäss Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass es als Wirkstoff mindestens eine Verbindung der Formel I' gemäss Anspruch 7 enthält.
23. Mittel gemäss Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass es als Wirkstoff mindestens eine Verbindung gemäss einem der Ansprüche 8 oder 9 enthält.
24. Mittel gemäss Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass es als Wirkstoff mindestens eine der Verbindungen Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure oder 7-Methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol enthält.
25. Mittel gemäss Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass es als Wirkstoff 1,2,3-Benzothiadiazol-7-carbonsäure oder ein Salz davon mit einer basischen Verbindung enthält.
26. Mittel gemäss Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass als Salze solche mit primären, sekundären oder tertiären Aminen oder Alkali- oder Erdalkaliverbindungen verwendet werden.
27. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I'



(I')

in welcher bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy oder Amino;

Z Cyano oder COA;


A UR, N(R₁)R₂ oder U¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

U¹ Sauerstoff oder -N(R₅)-;

R Wasserstoff, C₁-C₈-Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, oder U-C₁-C₈-Alkyl substituiertes C₁-C₈-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC; C₄-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkenyl, C₃-C₆-Alkynyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₈-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



X^a, X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC, MOOC, C₁-C₃-Alkyl-OOC, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₂-Halogenalkyl mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder

X^a C₁-C₂-Halogenalkoxy mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenylloxy, Benzylloxy, Sulfamoyloxy und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder

X^a Phenyl, Phenylloxy oder Benzylloxy und X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder

X^a, X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

Napht einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest;

W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder C₁-C₂-Alkyl oder einen C₁-C₂-Alkoxycarbonyl-C₂-C₄-alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- oder -CH₂CH₂O-;

R₁ Wasserstoff, C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C₁-C₅-Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, C₃-C₅-Alkenyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkenyl, C₃-C₅-Alkynyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, (T)_n-Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF₃, Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes (T)_n-Phenyl;

R₂ Wasserstoff, Hydroxy, C₁-C₃-Alkyl, durch Cyano oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R₁ und R₂ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R₃ Wasserstoff, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;



R₄ Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₆-Alkanoyl, durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkanoyl, C₃-C₅-Alkenoyl oder durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₃-C₅-Alkenoyl;

R₃ und R₄ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R₅ Wasserstoff oder Methyl;

R₆ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl; und

n Null oder 1;

mit Ausnahme der Verbindungen:

7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;


Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester;

6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

6-Chlor-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;

dadurch gekennzeichnet, dass

1. Verbindungen der Formel Ia



in welcher R, X, Y und U die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden, indem man umsetzt:

1.1 Verbindungen der Formel II



worin L' eine Abgangsgruppe, z.B. Halogen, O-Acyl, wie z.B. der zum symmetrischen Anhydrid der Säure Ib gehörende Acylrest, oder 1-Imidazolyl bedeutet, mit Verbindungen der Formel III

RUH (III)

a) im Ueberschuss des Reaktanden RUH oder

b) in Gegenwart einer organischen Base entweder mit oder ohne 4-Dialkylaminopyridin als Katalysator in inerten Lösungsmitteln oder

c) in Gegenwart anorganischer Basen, wobei jeweils im Temperaturbereich von -10° bis 180° C, vorzugsweise 0° bis 100° C, gearbeitet wird; und


1.2 Verbindungen der Formel Ib





mit Verbindungen der Formel III im Ueberschuss oder in einem inerten Lösungsmittel in Gegenwart einer Säure, wie Schwefelsäure, Salzsäure, p-Toluolsulfonsäure oder Bortrifluorid-Diethylether-Komplex, oder von Dicyclohexylcarbodiimid bei Temperaturen von -10° bis 180°C , vorzugsweise 0° bis 140°C ; und

2. Verbindungen der Formel Ic



(Ic)

in welcher die Symbole R_1 , R_2 , X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden, indem man umsetzt:

2.1 Verbindungen der Formel II mit Verbindungen der Formel IV




(IV)

a) im Ueberschuss des Reaktanden $\text{HN}(R_1)R_2$ oder

b) in Gegenwart einer organischen Base entweder mit oder ohne 4-Dialkylaminopyridin als Katalysator in inerten Lösungsmitteln oder

c) in Gegenwart anorganischer Basen, wobei jeweils im Temperaturbereich von -10° bis 180°C , vorzugsweise 0° bis 100°C , gearbeitet wird; und


3. Verbindungen der Formel Id



(Id)


worin A' den Rest $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(R_3)R_4$ darstellt und X, Y, R_3 , R_4 , R_5 und n die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden, indem man

3.1 Verbindungen der Formel Ie




(Ie)

in welcher Z' die Gruppe COOH , COCl , COOAlk' oder einen Acyloxycarbonylrest, wie z.B.




Benzoyloxycarbonyl oder Acetyloxycarbonyl darstellt, worin Alk^1 C_1 - C_4 -Alkyl bedeutet, in Gegenwart einer Base mit Hydrazin-Derivaten der Formeln V oder VI



(V)

oder



(VI)

in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von -10° bis 180°C , bevorzugt 0° bis 100°C ; oder

3.2 Verbindungen der Formel Ie schrittweise zuerst mit Hydrazin umgesetzt und dann die erhaltenen Hydrazinverbindungen

3.2.1 mit dem Alkylierungsmittel $\text{R}_3\text{-L}$ oder $\text{R}_4\text{-L}$, worin L eine Abgangsgruppe darstellt, in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von 0° bis 160°C , bevorzugt 20° bis 120°C ; oder

3.2.2 mit einem Aldehyd oder Keton der Formel $\text{R}_3(\text{R}_4)\text{C=O}$, worin R_3 und R_4 die unter Formel I angegebenen Bedeutungen haben, mit oder ohne Zusatz einer organischen oder anorganischen Säure bei Temperaturen von -10° bis 150°C , vorzugsweise bei 20° bis 100°C , und anschließend gewünschtenfalls


3.2.3 mit einem Alkylierungsmittel L-R_5 , worin L eine Abgangsgruppe darstellt, in Gegenwart einer starken Base in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von -80° bis 120°C , vorzugsweise -40° bis 80°C ; oder gewünschtenfalls

3.2.4 die unter (3.2.1) hergestellten Hydrazonderivate

a) mit Wasserstoff unter einem Druck von 1 bis $30 \cdot 10^5$ Pa in Gegenwart eines Katalysators im Gemisch mit Aktivkohle in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von 0° bis 100°C hydriert oder

b) mit einem komplexen Metallhydrid, wie z.B. Na-Cyanoborhydrid, in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von -10° bis 80° , vorzugsweise 0° bis 50°C , behandelt; und


4. Verbindungen der Formel If



(If)

in welcher die Symbole X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden, indem man

Verbindungen der Formel Ig [hergestellt nach Verfahren (2)]




(Ig)



mit einem Dehydratisierungsmittel in einem inerten Lösungsmittel oder ohne Lösungsmittel bei Temperaturen von -10° bis 250°C behandelt, wobei als Dehydratisierungsmittel verwendet werden:


- a) Trifluoressigsäureanhydrid in Gegenwart einer Base, wie z.B. Pyridin, in einem inerten Lösungsmittel, wie z.B. Tetrahydrofuran oder Dioxan, bei Temperaturen von -10° bis 40°C ; oder
- b) Chlorsulfonylisocyanat in einem inerten Lösungsmittel, wie z.B. Tetrahydrofuran, bei Temperaturen von 0° bis 65°C und anschließender Behandlung mit Dimethylformamid;
- c) Phosphorpentoxid mit oder ohne inerten Lösungsmittel, wie z.B. 1,2-Dichlorethan, Xylol oder Chlorbenzol, gegebenenfalls im Bombenrohr unter erhöhtem Druck, bei 50° bis 250°C ;

5.1 Verbindungen der Formel IL^1




(IL^1),

in welcher R_3 , R_4 , X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden, indem man Oximderivate der Formel




mit aktivierten Säurederivaten der Formel




worin AKS ein Halogen, ein O-Acyl, wie z.B. der O-Acylrest der freien Säure vorstehender Formel, Acetoxy oder Benzoyloxy, oder 1-Imidazolyl darstellt, in einem inerten Lösungsmittel und einer Base bei -20°C bis 120°C , bevorzugt bei 0° bis 50°C , oder die freie Säure (= Ib) in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid unter den gleichen Bedingungen umsetzt;

5.2 Verbindungen der Formel IL^2



(IL^2)

in welcher R_3 , R_4 , X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden durch Reduktion von Verbindungen der Formel IL^1



(IL^1)

- a) mit einem Silan, wie z.B. Triethylsilan, in Gegenwart einer Säure, wie z.B. Trifluoressigsäure,




bei 0° bis 80° C, oder

b) mit Natriumcyanoborhydrid in Gegenwart einer organischen Säure, wie z.B. Essigsäure, bei 0° bis 80° C, oder


c) auf katalytischen Wege, z.B. mit Pt/H₂.

28. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel Ik



(Ik)

indem man eine Verbindung der Formel XI'




(XI')

in saurem Medium mit einer Nitritverbindung bei -40° bis 30° C diazotiert und im gleichen oder zweiten Reaktionsgefäß mit einem Reduktionsmittel bei -40° bis 80° C, vorzugsweise bei -30° bis 30° C, behandelt, wobei das Reduktionsmittel vor, nach oder gleichzeitig mit der Nitritverbindung hinzugefügt wird, wobei die Substituenten der Verbindungen folgende Bedeutungen haben:

X' Wasserstoff, Halogen, Methyl, Methoxy oder COOH;

E^b eine leicht abspaltbare Gruppe wie z.B. Wasserstoff, C₁-C₁₆-Alkyl, z.B. Methyl, Ethyl, Isopropyl, n-Dodecyl, oder Benzyl oder Acyl, z.B. Acetyl oder den Sulfonsäure-Rest (-SO₃H-) oder Cyano oder darüber hinaus als Teil einer Disulfid-Brücke einen zweiten Rest



;

Z^b Cyano oder COA;


A UR, N(R₁)R₂ oder U¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

U¹ Sauerstoff oder -N(R₅)-;

R Wasserstoff, C₁-C₈-Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, oder U-C₁-C₃-Alkyl substituiertes C₁-C₈-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkenyl, C₃-C₆-Alkynyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₈-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



X^a , X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC, MOOC, $\text{C}_1 - \text{C}_3$ -Alkyl-OOC, $\text{C}_1 - \text{C}_4$ -Alkyl, $\text{C}_1 - \text{C}_4$ -Alkoxy, $\text{C}_1 - \text{C}_2$ -Halogenalkyl mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder

X^a $\text{C}_1 - \text{C}_2$ -Halogenalkoxy mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenylloxy, Benzyloxy, Sulfamoyloxy und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder

X^a Phenyl, Phenylloxy oder Benzyloxy und X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder

X^a , X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

Napht einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest;

W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder $\text{C}_1 - \text{C}_2$ -Alkyl oder einen $\text{C}_1 - \text{C}_2$ -Alkoxy-carbonyl- $\text{C}_2 - \text{C}_4$ -alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ oder $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 Wasserstoff, $\text{C}_1 - \text{C}_5$ -Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes $\text{C}_1 - \text{C}_5$ -Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder $\text{C}_1 - \text{C}_2$ -Alkyl-OOC substituiertes $\text{C}_1 - \text{C}_5$ -Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder $\text{C}_1 - \text{C}_2$ -Alkyl-OOC substituiertes $\text{C}_1 - \text{C}_5$ -Alkyl, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ -Alkenyl, durch $\text{C}_1 - \text{C}_3$ -Alkyl-OOC substituiertes $\text{C}_3 - \text{C}_5$ -Alkenyl, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ -Alkynyl, durch $\text{C}_1 - \text{C}_3$ -Alkyl-OOC substituiertes $\text{C}_3 - \text{C}_5$ -Alkynyl, $(\text{T})_n - \text{C}_3 - \text{C}_6$ -Cycloalkyl, durch $\text{C}_1 - \text{C}_3$ -Alkyl-OOC substituiertes $(\text{T})_n - \text{C}_3 - \text{C}_6$ -Cycloalkyl, $(\text{T})_n$ -Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF_3 , Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes $(\text{T})_n$ -Phenyl;

R_2 Wasserstoff, Hydroxy, $\text{C}_1 - \text{C}_3$ -Alkyl, durch Cyano oder $\text{C}_1 - \text{C}_3$ -Alkoxy substituiertes $\text{C}_1 - \text{C}_3$ -Alkyl, $\text{C}_1 - \text{C}_4$ -Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R_1 und R_2 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R_3 Wasserstoff, Cyano, $\text{C}_1 - \text{C}_6$ -Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R_4 Wasserstoff, $\text{C}_1 - \text{C}_6$ -Alkyl, CONH_2 , $\text{CONH}-\text{CONH}-\text{C}_1 - \text{C}_3$ -Alkyl, $\text{C}_1 - \text{C}_6$ -Alkanoyl, durch Halogen oder $\text{C}_1 - \text{C}_3$ -Alkoxy substituiertes $\text{C}_1 - \text{C}_3$ -Alkanoyl, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ -Alkenoyl oder durch Halogen oder $\text{C}_1 - \text{C}_3$ -Alkoxy substituiertes $\text{C}_3 - \text{C}_5$ -Alkenoyl;

R_3 und R_4 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;


R_5 Wasserstoff oder Methyl;

R_6 Wasserstoff oder $\text{C}_1 - \text{C}_4$ -Alkyl; und

n Null oder 1;


mit Ausnahme von primären oder sekundären Aminogruppen, UH- oder Nitro-Gruppen, $\text{Si}(\text{C}_1 - \text{C}_8 - \text{Alkyl})_3$ oder Phosphor-haltigen Resten.

29. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel






indem man eine Verbindung der Formel



in saurem Medium mit einer Nitritverbindung bei -20° bis 30°C diazotiert und im gleichen Reaktionsgefäß mit einem Reduktionsmittel bei -20° bis 80°C , vorzugsweise bei 20° bis 30°C , behandelt, wobei das Reduktionsmittel vor, nach oder gleichzeitig mit der Nitritverbindung hinzugefügt wird, wobei die Substituenten der Verbindungen folgende Bedeutungen haben:

R^a Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, oder U- C_1 - C_3 -Alkyl substituiertes C_1 - C_8 -Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC $_1$ - C_4 -Alkyl, C_3 - C_6 -Alkenyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Alkynyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -Alkynyl, (T) $_n$ - C_3 - C_8 -Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



X^a , X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC, MOOC, C_1 - C_3 -Alkyl-OOC, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_2 -Halogenalkyl mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder

X^a C_1 - C_2 -Halogenalkoxy mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenylloxy, Benzyloxy, Sulfamoyloxy und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder

X^a Phenyl, Phenylloxy oder Benzyloxy und X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder

X^a , X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

Napht einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest; W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder C_1 - C_2 -Alkyl oder einen C_1 - C_2 -Alkoxy-carbonyl- C_2 - C_4 -alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ oder $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 Wasserstoff- C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C_1 - C_5 -Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl-OOC substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl-OOC substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, C_3 - C_5 -Alkenyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkenyl, C_3 - C_5 -Alkynyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkynyl, (T) $_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes (T) $_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, (T) $_n$ -Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF_3 , Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes (T) $_n$ -Phenyl;

R_2 Wasserstoff, Hydroxy, C_1 - C_3 -Alkyl, durch Cyano oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_3 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R_1 und R_2 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R_3 Wasserstoff, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R_4 Wasserstoff, C_1 - C_6 -Alkyl, CONH_2 , CONH-CONH- C_1 - C_3 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkanoyl, durch Halogen oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_3 -Alkanoyl, C_3 - C_5 -Alkenoyl oder durch Halogen oder C_1 - C_3 -Alkoxy



substituiertes C₃-C₅-Alkenoyl;

R₄ Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₆-Alkanoyl, durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkanoyl, C₃-C₅-Alkenoyl oder durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₃-C₅-Alkenoyl;

R₃ und R₄ zusammen einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R₅ Wasserstoff oder Methyl;

R₆ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl; und

n Null oder 1;

mit Ausnahme von Resten mit UH- oder Nitro-Gruppen sowie Silizium- oder Phosphor-haltigen Resten, und

E^b eine leicht abspaltbare Gruppe wie z.B. Wasserstoff, C₁-C₁₆-Alkyl, z.B. Methyl, Ethyl, Isopropyl, n-Dodecyl, oder Benzyl oder Acyl, z.B. Acetyl oder den Sulfonsäure-Rest (-SO₃H-) oder Cyano.


30. Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäss Anspruch 1 oder 2

31. Verwendung der Verbindungen gemäß Formel I' gemäss Anspruch 8 oder 9 zur Immunisierung von Pflanzen gegen Krankheiten.

32. Verwendung von 7-Methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol als Wirkstoff zur Herstellung eines Mittels zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen.

Patentansprüche für folgenden Vertragsstaat : ES

1. Verfahren zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen, dadurch gekennzeichnet, dass auf Pflanzen und/oder deren Umgebung als Wirkstoff eine Verbindung der nachfolgenden Formel I appliziert wird:



(I)


worin bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy, oder Amino, wobei M das Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions ist, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet wird; und

Z Cyano oder -CO-A, wobei A entweder OH oder SH bedeutet, deren H auch durch das Moläquivalent eines anorganischen oder organischen kationischen Restes ersetzt sein kann.

2. Verfahren zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismus, dadurch gekennzeichnet, dass auf Pflanzen und/oder deren Umgebung als Wirkstoffe eine Verbindung der nachfolgenden Formel I appliziert werden:



(I)

worin bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy, oder Amino, wobei M das Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions ist, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet



wird; und

Z Cyano oder -CO-A,


A UR, N(R₁)R₂ oder U¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

U¹ Sauerstoff oder -N(R₅)-;

R Wasserstoff, C₁-C₈-Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, U-C₁-C₃-Alkyl oder C₂-C₄-Dialkyl-amino substituiertes oder durch die CO-Gruppe unterbrochenes C₁-C₈-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC, C₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkenyl, C₃-C₆-Alkynyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



X^a, X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC, MOOC, C₁-C₃-Alkyl-OOC, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₂-Halogenalkyl mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder

X^a C₁-C₂-Halogenalkoxy mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenylloxy, Benzyloxy, Sulfamoyl und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder

X^a Phenyl, Phenylloxy oder Benzyloxy und

X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder

X^a, X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

Napht einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest;

W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano, C₁-C₂-Alkyl oder einen C₁-C₂-Alkoxy-carbonyl-C₂-C₄-alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclen mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CCH₃(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- oder -CH₂CH₂O-;

R₁ Wasserstoff, C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C₁-C₅-Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, C₃-C₅-Alkenyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkenyl, C₃-C₅-Alkynyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, (T)_n-Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, CF₃, Cyano, HOOC oder MOOC substituiertes (T)_n-Phenyl;

R₂ Wasserstoff, Hydroxy, C₁-C₃-Alkyl, durch Cyano oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclen mit O, N oder S als Heteroatome;

R₁ und R₂ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclen W;

R₃ Wasserstoff, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclen W;

R₄ Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₃-Alkanoyl, durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkanoyl, C₃-C₅-Alkenoyl oder durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₃-C₅-Alkenoyl;

R₃ und R₄ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclen W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R₅ Wasserstoff oder Methyl;

R₆ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl; und



n Null oder 1;

wobei in den Verbindungen der Formel I der organische Rest A ein Molgewicht von weniger als 900 besitzt; und umfassen im Falle von U als Sauerstoff oder Schwefel die Salze der pflanzenphysiologisch verträglichen 7-Carbonsäure mit primären, sekundären oder tertiären Aminen oder mit anorganischen Basen.

3. Verfahren gemäss Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufwandmenge weniger als 1 kg AS/ha beträgt.

4. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungen der Formel I verwendet werden, in welcher bedeuten:

X und Y für Wasserstoff;

Z für Cyano oder COA;

A für UR oder $U^1N(=C)_n(R_3)R_4$;

U für Sauerstoff;

U^1 für Sauerstoff oder $-N(R_5)-$;

R für Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, durch Halogen oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiertes C_1 - C_8 -Alkyl, C_3 - C_6 -Alkenyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Alkynyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -Alkynyl, $(T)_n$ - C_3 - C_8 -Cycloalkyl, Benzyl, halogeniertes Benzyl, Benzylmethoxy, $(T)_n$ -Si(CH₃)₃, (T) -P(O)(C₁-C₄-Alkyl)CH₃, (T) -P(O)(OC₁-C₄-Alkyl)₂ oder die Gruppe $(T)_n$ -W;

W für einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie für Diaceton-D-glucosidyl;

T für die Brückenglieder $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH(CH_3)-$, $-CCH_3(CH_3)-$ oder $-CH_2CH_2CH_2-$;


R_3 für Wasserstoff, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl, Phenyl oder W;

R_4 für Wasserstoff, C_1 - C_6 -Alkyl, CONH₂, CONH-CONH- C_1 - C_3 -Alkyl, C_1 - C_3 -Alkanoyl oder C_3 - C_5 -Alkenoyl;

R_3 und R_4 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, W oder W';

W für einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S;

W' für einen Rest aus der Gruppe



n für Null oder 1.

5. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungen der Formel I'



in welcher bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy oder Amino;

Z Cyano oder COA;

A UR, $N(R_1)R_2$ oder $U^1N(=C)_n(R_3)R_4$;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;


U Sauerstoff oder Schwefel;

U^1 Sauerstoff oder $-N(R_5)-$;

R Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, oder U- C_1 - C_3 -Alkyl substituiertes



C₁-C₈-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkenyl, C₃-C₆-Alkynyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



X^a, X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC, MOOC, C₁-C₈-Alkyl-OOC, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₂-Halogenalkyl mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder

X^a C₁-C₂-Halogenalkoxy mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenylloxy, Benzyloxy, Sulfamoyloxy und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder

X^a Phenyl, Phenylloxy oder Benzyloxy und X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder

X^a, X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

Napht einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest;

W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder C₁-C₂-Alkyl oder einen C₁-C₂-Alkoxy-carbonyl-C₂-C₄-alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- oder -CH₂CH₂O-;

R₁ Wasserstoff, C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C₁-C₅-Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, C₃-C₅-Alkenyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkenyl, C₃-C₅-Alkynyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, (T)_n-Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF₃, Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes (T)_n-Phenyl;

R₂ Wasserstoff, Hydroxy, C₁-C₃-Alkyl, durch Cyano oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R₁ und R₂ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R₃ Wasserstoff, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R₄ Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₆-Alkanoyl, durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkanoyl, C₃-C₅-Alkenoyl oder durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₃-C₅-Alkenoyl;

R₃ und R₄ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R₅ Wasserstoff oder Methyl;

R₆ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl; und

n Null oder 1;

mit Ausnahme der Verbindungen:

7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester;

6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

6-Chlor-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure verwendet werden.



6. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungen der Formel I'



10 in welcher bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy oder Amino;

Z Cyano oder COA;



A UR, N(R₁)R₂ oder U'N(=C)_n(R₃)R₄;

15 M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

U' Sauerstoff oder -N(R₅)-;

20 R Wasserstoff, C₁-C₈-Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Alkoxy oder U-C₁-C₈-Alkyl substituiertes C₁-C₈-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC₁-C₄-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkenyl, C₃-C₆-Alkynyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



35 W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder C₁-C₂-Alkyl oder einen C₁-C₂-Alkoxy-carbonyl-C₂-C₄-alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder -CH₂-, -CH₂CH₂- oder -CH(CH₃)-;

40 R₁ Wasserstoff, C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C₁-C₅-Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, C₃-C₅-Alkenyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkenyl, C₃-C₅-Alkynyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, (T)_n-Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF₃, Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes (T)_n-Phenyl;

45 R₂ Wasserstoff, Hydroxy, C₁-C₃-Alkyl, durch Cyano oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R₁ und R₂ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

50 R₃ Wasserstoff, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R₄ Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₃-Alkanoyl, durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkanoyl, C₃-C₅-Alkenoyl oder durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₃-C₅-Alkenoyl;

55 R₃ und R₄ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R₅ Wasserstoff oder Methyl;



R₅ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl; und
n Null oder 1;

mit Ausnahme der Verbindungen:

7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester;

6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

6-Chlor-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure verwendet werden.

7. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungen der Formel I' gemäss Anspruch 5 verwendet werden, bei denen Z = COA bedeutet und R eine andere Bedeutung hat als Wasserstoff und unsubstituiertes Alkyl.

8. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Wirkstoff 1,2,3-Benzothiadiazol-7-carbonsäure oder ein Salz davon mit einer basischen Verbindung verwendet wird.

9. Verfahren gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass als Salze solche mit primären, sekundären oder tertiären Aminen oder Alkali- oder Erdalkaliverbindungen verwendet werden.

10. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Wirkstoff 7-Methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol verwendet wird.

11. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Wirkstoff 7-Benzoyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol verwendet wird.

12. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Wirkstoff 7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol verwendet wird.


13. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Wirkstoffe Verbindungen von 7-C₂-C₄-Alkoxy-carbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol verwendet werden.

14. Mittel zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen enthaltend als Wirkstoff mindestens eine Verbindung der Formel I gemäss Anspruch 1 oder 2 mit Ausnahme der Verbindungen 7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol; 4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol; 6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol, 4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol und 7-Methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol.

15. Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester zur Verwendung in einem Verfahren zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen.

16. Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester zur Verwendung für die Herstellung eines Mittels zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen.

17. Mittel zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen enthaltend als Wirkstoff mindestens eine Verbindung der Formel I'



(I')

in welcher bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;



Y Wasserstoff, Halogen, SO_3H , SO_3M , Nitro, Hydroxy oder Amino;

Z Cyano oder COA;



A UR , $\text{N}(\text{R}_1)\text{R}_2$ oder $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

U' Sauerstoff oder $-\text{N}(\text{R}_5)-$;

R Wasserstoff, $\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkyl}$, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, oder $\text{U-C}_1\text{-C}_3\text{-Alkyl}$ substituiertes $\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkyl}$, $(\text{T})\text{-COOH}$ oder $(\text{T})\text{-COOC}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl}$, $\text{C}_3\text{-C}_6\text{-Alkenyl}$, durch Halogen substituiertes $\text{C}_3\text{-C}_6\text{-Alkenyl}$, $\text{C}_3\text{-C}_6\text{-Alkynyl}$, durch Halogen substituiertes $\text{C}_3\text{-C}_6\text{-Alkynyl}$, $(\text{T})_n\text{-C}_3\text{-C}_6\text{-Cycloalkyl}$, oder eine Gruppe aus der Reihe



X^a , X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC , MOOC , $\text{C}_1\text{-C}_3\text{-Alkyl-OOC}$, $\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl}$, $\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkoxy}$, $\text{C}_1\text{-C}_2\text{-Halogenalkyl}$ mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder

X^a $\text{C}_1\text{-C}_2\text{-Halogenalkoxy}$ mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenylloxy, Benzylloxy, Sulfamoyloxy und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder

X^a Phenyl, Phenylloxy oder Benzylloxy und X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder

X^a , X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

Napht einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest;

W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder $\text{C}_1\text{-C}_2\text{-Alkyl}$ oder einen $\text{C}_1\text{-C}_2\text{-Alkoxy-carbonyl-C}_2\text{-C}_4\text{-alkylen-imino-Rest}$ substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ oder $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 Wasserstoff, $\text{C}_1\text{-C}_5\text{-Alkyl}$, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes $\text{C}_1\text{-C}_5\text{-Alkyl}$, durch Halogen, Cyano, HOOC oder $\text{C}_1\text{-C}_2\text{-Alkyl-OOC}$ substituiertes $\text{C}_1\text{-C}_5\text{-Alkyl}$, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder $\text{C}_1\text{-C}_2\text{-Alkyl-OOC}$ substituiertes $\text{C}_1\text{-C}_5\text{-Alkyl}$, $\text{C}_3\text{-C}_5\text{-Alkenyl}$, durch $\text{C}_1\text{-C}_3\text{-Alkyl-OOC}$ substituiertes $\text{C}_3\text{-C}_5\text{-Alkenyl}$, $\text{C}_3\text{-C}_5\text{-Alkynyl}$, durch $\text{C}_1\text{-C}_3\text{-Alkyl-OOC}$ substituiertes $\text{C}_3\text{-C}_5\text{-Alkynyl}$, $(\text{T})_n\text{-C}_3\text{-C}_6\text{-Cycloalkyl}$, durch $\text{C}_1\text{-C}_3\text{-Alkyl-OOC}$ substituiertes $(\text{T})_n\text{-C}_3\text{-C}_6\text{-Cycloalkyl}$, $(\text{T})_n\text{-Phenyl}$ oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF_3 , Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes $(\text{T})_n\text{-Phenyl}$;

R_2 Wasserstoff, Hydroxy, $\text{C}_1\text{-C}_3\text{-Alkyl}$, durch Cyano oder $\text{C}_1\text{-C}_3\text{-Alkoxy}$ substituiertes $\text{C}_1\text{-C}_3\text{-Alkyl}$, $\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkoxy}$, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R_1 und R_2 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R_3 Wasserstoff, Cyano, $\text{C}_1\text{-C}_6\text{-Alkyl}$, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R_4 Wasserstoff, $\text{C}_1\text{-C}_6\text{-Alkyl}$, CONH_2 , $\text{CONH-CONH-C}_1\text{-C}_3\text{-Alkyl}$, $\text{C}_1\text{-C}_6\text{-Alkanoyl}$, durch Halogen oder $\text{C}_1\text{-C}_3\text{-Alkoxy}$ substituiertes $\text{C}_1\text{-C}_3\text{-Alkanoyl}$, $\text{C}_3\text{-C}_5\text{-Alkenoyl}$ oder durch Halogen oder $\text{C}_1\text{-C}_3\text{-Alkoxy}$ substituiertes $\text{C}_3\text{-C}_5\text{-Alkenoyl}$;

R_3 und R_4 zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;



R_5 Wasserstoff oder Methyl;
 R_6 Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl; und
 n Null oder 1;
 mit Ausnahme der Verbindungen:
 7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;
 Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester;
 6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 6-Chlor-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure.

18. Mittel zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen enthaltend als Wirkstoff mindestens eine Verbindung der Formel I'



in welcher bedeuten:

X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;

Y Wasserstoff, Halogen, SO_3H , SO_3M , Nitro, Hydroxy oder Amino;

Z Cyano oder COA;



A UR , $N(R_1)R_2$ oder $U'N(=C)_n(R_3)R_4$;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

U' Sauerstoff oder $-N(R_5)-$;

R Wasserstoff, C_1 - C_8 -Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, Alkoxy oder U - C_1 - C_3 -Alkyl substituiertes C_1 - C_8 -Alkyl, (T) -COOH oder (T) -COOC- C_1 - C_4 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Alkynyl, durch Halogen substituiertes C_3 - C_6 -Alkynyl, $(T)_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder C_1 - C_2 -Alkyl oder einen C_1 - C_2 -Alkoxycarbonyl- C_2 - C_4 -alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$ oder $-CH(CH_3)-$;

R_1 Wasserstoff, C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C_1 - C_5 -Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl-OOC substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C_1 - C_2 -Alkyl-OOC substituiertes C_1 - C_5 -Alkyl, C_3 - C_5 -Alkenyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkenyl, C_3 - C_5 -Alkynyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes C_3 - C_5 -Alkynyl, $(T)_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, durch C_1 - C_3 -Alkyl-OOC substituiertes $(T)_n$ - C_3 - C_6 -Cycloalkyl, $(T)_n$ -Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF_3 , Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes $(T)_n$ -Phenyl;



R₂ Wasserstoff, Hydroxy, C₁-C₃-Alkyl, durch Cyano oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R₁ und R₂ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R₃ Wasserstoff, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R₄ Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₃-Alkanoyl, durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkanoyl, C₃-C₅-Alkenoyl oder durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₃-C₅-Alkenoyl;

R₃ und R₄ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R₅ Wasserstoff oder Methyl;

R₆ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl; und

n Null oder 1;

mit Ausnahme der Verbindungen:

7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;

Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester;

6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;

6-Chlor-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure.

19. Mittel gemäss Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass es als Wirkstoff mindestens eine Verbindung der Formel I' gemäss Anspruch 17 enthält, bei denen Z = COA bedeutet und R eine andere Bedeutung hat als Wasserstoff und unsubstituiertes Alkyl.

20. Mittel gemäss Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass es als Wirkstoff mindestens eine Verbindung der Formel I' aus der Gruppe:

7-n-Pentoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(4-Methoxy-benzyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(Cycloheximino-oxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(3-Hydroxy-n-propoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

1,2,5,6-Di-O-isopropyliden-3-(7-benzo-1,2,3-thiadiazoyl)-D-glucufuranose;

7-Furfuryloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(1,2,4-Triazol-1-yl)-methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(2-Pyridylmethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-Trimethylsilyl-methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-[2-(Trimethylsilyl)-ethoxycarbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-Dimethylphosphono-ethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-Cyclohexyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(1-Phenethyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(3-Methoxybenzyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(Ethylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(n-Propylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-(Benzylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-Carbamoyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-N-Phenylcarbamoyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

N-(7-Benzo-1,2,3-thiadiazoyl)-glycin;

7-(N-Diallylcarbamoyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;

6-Fluor-7-methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

6-Fluor-7-carboxy-benzo-1,2,3-thiadiazol;

5-Fluor-7-benzyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

5-Fluor-7-carboxy-benzo-1,2,3-thiadiazol;


5-Fluor-7-ethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol; oder aus der Gruppe:

7-Ethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;

7-n-Propoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;




- 7-iso-Propoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-n-Butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-sek.Butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-tert.Butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 5 7-Cyclopropylmethoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(2'-Phenethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-Benzoyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-Allyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-Propin-2-yloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 10 N-Ethylaminocarbonyl-2-cyano-2-oximinocarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-yl-acetamid;
 Na-Salz der Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;
 K-Salz der Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;
 Triethylammoniumsalz der Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;
 7-(1'-Phenethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 15 7-(1'-Naphthylmethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(Methylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(Ethylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 7-(Benzylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 20 7-[(Di-cyanomethyl)-amino-carbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 3-[(N-Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamino]-2-methyl-
 propencarbonsäuremethylester;
 3-[(N-Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamino]-2-ethyl-
 propencarbonsäuremethylester;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(α -methylpropyliden)-hydrazin;
 25 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclobutyliden)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclopentyliden)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclohexyliden)-hydrazin;
 2-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-1-(2'-sec-butyl)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclopentyl)-hydrazin;
 30 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cyclohexyl)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-(cycloheptyl)-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-1,2-diacetyl-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-phenyl-hydrazin;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonyl)-2-pyridin-2'-yl-hydrazin enthält.
 35 21. Mittel gemäss Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass es als Wirkstoff mindestens eine der
 Verbindungen Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure oder 7-Methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol ent-
 hält.
 40 22. Mittel gemäss Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass es als Wirkstoff 1,2,3-Benzothiadiazol-7-
 carbonsäure oder ein Salz davon mit einer basischen Verbindung enthält.
 23. Mittel gemäss Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass als Salze solche mit primären, sekundären
 oder tertiären Aminen oder Alkali- oder Erdalkaliverbindungen verwendet werden.
 45 24. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I'



(I')

- 55 in welcher bedeuten:
 X Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC;
 Y Wasserstoff, Halogen, SO₃H, SO₃M, Nitro, Hydroxy oder Amino;
 Z Cyano oder COA;

Gruppe aus der Reihe




7-Cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol:



4-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 4,6-Dibrom-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;
 Benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäuremethylester;
 6-Chlor-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazol;
 6-Chlor-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-carbonsäure;
 dadurch gekennzeichnet, dass

1. Verbindungen der Formel Ia



in welcher R, X, Y und U die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden, indem man umsetzt:

1.1 Verbindungen der Formel II



worin L' eine Abgangsgruppe, z.B. Halogen, O-Acyl, wie z.B. der zum symmetrischen Anhydrid der Säure Ib gehörende Acylrest, oder 1-Imidazolyl bedeutet, mit Verbindungen der Formel III

RUH (III)


- a) im Ueberschuss des Reaktanden RUH oder
- b) in Gegenwart einer organischen Base entweder mit oder ohne 4-Dialkylaminopyridin als Katalysator in inerten Lösungsmitteln oder
- c) in Gegenwart anorganischer Basen, wobei jeweils im Temperaturbereich von -10° bis 180° C, vorzugsweise 0° bis 100° C, gearbeitet wird; und

1.2 Verbindungen der Formel Ib



mit Verbindungen der Formel III im Ueberschuss oder in einem inerten Lösungsmittel in Gegenwart einer Säure, wie Schwefelsäure, Salzsäure, p-Toluolsulfonsäure oder Bortrifluorid-Diethylether-Komplex, oder von Dicyclohexylcarbodiimid bei Temperaturen von -10° bis 180° C, vorzugsweise 0° bis 140° C; und

2. Verbindungen der Formel Ic



(Ic)

in welcher die Symbole R_1 , R_2 , X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden, indem man umsetzt:


2.1 Verbindungen der Formel II mit Verbindungen der Formel IV



(IV)

- a) im Ueberschuss des Reaktanden $\text{HN}(\text{R}_1)\text{R}_2$ oder
- b) in Gegenwart einer organischen Base entweder mit oder ohne 4-Dialkylaminopyridin als Katalysator in inerten Lösungsmitteln oder
- c) in Gegenwart anorganischer Basen, wobei jeweils im Temperaturbereich von -10° bis 160°C , vorzugsweise 0° bis 100°C , gearbeitet wird; und


3. Verbindungen der Formel Id



(Id)


worin A' den Rest $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$ darstellt und X, Y, R_3 , R_4 , R_5 und n die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden, indem man

3.1 Verbindungen der Formel Ie




(Ie)

in welcher Z' die Gruppe COOH , COCl , COOAlk^1 oder einen Acyloxycarbonylrest, wie z.B.




Benzoyloxycarbonyl oder Acetyloxycarbonyl darstellt, worin Alk^1 C_1 - C_4 -Alkyl bedeutet, in Gegenwart einer Base mit Hydrazin-Derivaten der Formeln V oder VI



(V)

oder



(VI)

in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von -10° bis 180°C , bevorzugt 0° bis 100°C ; oder

3.2 Verbindungen der Formel Ie schrittweise zuerst mit Hydrazin umgesetzt und dann die erhaltenen Hydrazinverbindungen

3.2.1 mit dem Alkylierungsmittel $R_3\text{-L}$ oder $R_4\text{-L}$, worin L eine Abgangsgruppe darstellt, in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von 0° bis 160°C , bevorzugt 20° bis 120°C ; oder

3.2.2 mit einem Aldehyd oder Keton der Formel $R_3(R_4)\text{C=O}$, worin R_3 und R_4 die unter Formel I angegebenen Bedeutungen haben, mit oder ohne Zusatz einer organischen oder anorganischen Säure bei Temperaturen von -10° bis 150°C , vorzugsweise bei 20° bis 100°C , und anschliessend gewünschtenfalls


3.2.3 mit einem Alkylierungsmittel L-R_5 , worin L eine Abgangsgruppe darstellt, in Gegenwart einer starken Base in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von -80° bis 120°C , vorzugsweise -40° bis 80°C ; oder gewünschtenfalls

3.2.4 die unter (3.2.1) hergestellten Hydrazonderivate

a) mit Wasserstoff unter einem Druck von 1 bis $30 \cdot 10^5$ Pa in Gegenwart eines Katalysators im Gemisch mit Aktivkohle in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von 0° bis 100°C hydriert oder

b) mit einem komplexen Metallhydrid, wie z.B. Na-Cyanoborhydrid, in einem inerten Lösungsmittel bei Temperaturen von -10° bis 80° , vorzugsweise 0° bis 50°C , behandelt; und


4. Verbindungen der Formel If



(If)

in welcher die Symbole X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden, indem man

Verbindungen der Formel Ig [hergestellt nach Verfahren (2)]



(Ig)


mit einem Dehydratisierungsmittel in einem inerten Lösungsmittel oder ohne Lösungsmittel bei Temperaturen von -10° bis 250°C behandelt, wobei als Dehydratisierungsmittel verwendet werden:

a) Trifluoressigsäureanhydrid in Gegenwart einer Base, wie z.B. Pyridin, in einem inerten Lösungsmittel, wie z.B. Tetrahydrofuran oder Dioxan, bei Temperaturen von -10° bis 40°C ; oder


b) Chlorsulfonylisocyanat in einem inerten Lösungsmittel, wie z.B. Tetrahydrofuran, bei Temperaturen von 0° bis 65°C und anschliessender Behandlung mit Dimethylformamid;

c) Phosphorpentoxid mit oder ohne inerten Lösungsmittel, wie z.B. 1,2-Dichlorethan, Xylol oder Chlorbenzol, gegebenenfalls im Bombenrohr unter erhöhtem Druck, bei 50° bis 250°C ;


5.1 Verbindungen der Formel IL¹

(IL¹),

in welcher R₃, R₄, X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden, indem man Oximderivate der Formel




mit aktivierten Säurederivaten der Formel




worin AKS ein Halogen, ein O-Acyl, wie z.B. der O-Acylrest der freien Säure vorstehender Formel, Acetoxy oder Benzoyloxy, oder 1-Imidazolyl darstellt, in einem inerten Lösungsmittel und einer Base bei -20°C bis 120°C, bevorzugt bei 0°C bis 50°C, oder die freie Säure (= Ib) in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid unter den gleichen Bedingungen umsetzt;

5.2 Verbindungen der Formel IL²

(IL²)

in welcher R₃, R₄, X und Y die unter Formel I angegebenen Bedeutungen besitzen, hergestellt werden durch Reduktion von Verbindungen der Formel IL¹


(IL¹)

a) mit einem Silan, wie z.B. Triethylsilan, in Gegenwart einer Säure, wie z.B. Trifluoressigsäure, bei 0°C bis 80°C, oder

b) mit Natriumcyanoborhydrid in Gegenwart einer organischen Säure, wie z.B. Essigsäure, bei 0°C bis 80°C, oder


c) auf katalytischen Wege, z.B. mit Pt/H₂.

25. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel Ik



(Ik)

indem man eine Verbindung der Formel XI'




(XI')

in saurem Medium mit einer Nitritverbindung bei -40° bis 30° C diazotiert und im gleichen oder zweiten Reaktionsgefäß mit einem Reduktionsmittel bei -40° bis 80° C, vorzugsweise bei -30° bis 30° C, behandelt, wobei das Reduktionsmittel vor, nach oder gleichzeitig mit der Nitritverbindung hinzugefügt wird, wobei die Substituenten der Verbindungen folgende Bedeutungen haben:

X' Wasserstoff, Halogen, Methyl, Methoxy oder COOH;

E^b eine leicht abspaltbare Gruppe wie z.B. Wasserstoff, C₁-C₁₆-Alkyl, z.B. Methyl, Ethyl, Isopropyl, n-Dodecyl, oder Benzyl oder Acyl, z.B. Acetyl oder den Sulfonsäure-Rest (-SO₃H-) oder Cyano oder darüber hinaus als Teil einer Disulfid-Brücke einen zweiten Rest



Z^b Cyano oder COA;



A UR, N(R₁)R₂ oder U¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M Moläquivalent eines Alkali- oder Erdalkali-Ions, das aus einer entsprechenden Base oder basischen Verbindung gebildet ist;

U Sauerstoff oder Schwefel;

U¹ Sauerstoff oder -N(R₅)-;

R Wasserstoff, C₁-C₈-Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, oder U-C₁-C₃-Alkyl substituiertes C₁-C₈-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkenyl, C₃-C₆-Alkynyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkynyl, (T)_n-C₃-C₈-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe

, (T)_n-Napht,(T)_n-Si(C₁-C₈-Alkyl)₃,

(T)-P(OR₆)₂ ; oder (T)_n-W ;

X^a, X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC, MOOC, C₁-C₃-



Alkyl-OOC, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₂-Halogenalkyl mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder

X^a C₁-C₂-Halogenalkoxy mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenylloxy, Benzyloxy, Sulfamoyloxy und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder

X^a Phenyl, Phenylloxy oder Benzyloxy und X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder

X^a, X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

Napht einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest;

W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder C₁-C₂-Alkyl oder einen C₁-C₂-Alkoxy-carbonyl-C₂-C₄-alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- oder -CH₂CH₂O-;

R₁ Wasserstoff, C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C₁-C₅-Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, C₃-C₅-Alkenyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkenyl, C₃-C₅-Alkyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, (T)_n-Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF₃, Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes (T)_n-Phenyl;

R₂ Wasserstoff, Hydroxy, C₁-C₃-Alkyl, durch Cyano oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R₁ und R₂ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R₃ Wasserstoff, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R₄ Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₆-Alkanoyl, durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkanoyl, C₃-C₅-Alkenoyl oder durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₃-C₅-Alkenoyl;

R₃ und R₄ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;


R₅ Wasserstoff oder Methyl;

R₆ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl; und


n Null oder 1;

mit Ausnahme von primären oder sekundären Aminogruppen, UH- oder Nitro-Gruppen, Si(C₁-C₈-Alkyl)₃ oder Phosphor-haltigen Resten.

26. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel



indem man eine Verbindung der Formel




in saurem Medium mit einer Nitritverbindung bei -20° bis 30°C diazotiert und im gleichen Reaktions-



gefäß mit einem Reduktionsmittel bei -20° bis 80°C, vorzugsweise bei 20° bis 30°C, behandelt, wobei das Reduktionsmittel vor, nach oder gleichzeitig mit der Nitritverbindung hinzugefügt wird, wobei die Substituenten der Verbindungen folgende Bedeutungen haben:

R^a Wasserstoff, C₁-C₈-Alkyl, durch Halogen, Cyano, Nitro, Hydroxy, oder U-C₁-C₈-Alkyl substituiertes C₁-C₈-Alkyl, (T)-COOH oder (T)-COOC₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Alkenyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkenyl, C₃-C₆-Alkyl, durch Halogen substituiertes C₃-C₆-Alkyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, oder eine Gruppe aus der Reihe



X^a, X^b und X^c unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Cyano, HOOC, MOOC, C₁-C₈-Alkyl-OOC, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₂-Halogenalkyl mit bis zu 5 Halogenatomen, insbesondere Fluoratomen; oder

X^a C₁-C₂-Halogenalkoxy mit bis zu 5 Halogenatomen, Nitro, Dimethylamino, Phenyl, Phenylloxy, Benzylloxy, Sulfamoyloxy und X^b und X^c gleichzeitig Wasserstoff; oder

X^a Phenyl, Phenylloxy oder Benzylloxy und X^b Halogen oder Methyl und X^c Wasserstoff; oder

X^a, X^b und X^c zusammen 4 oder 5 Fluoratome;

Napht einen unsubstituierten oder mit Halogen, Methyl, Methoxy oder Nitro substituierten Naphthylrest;

W einen 5- bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten unsubstituierten oder durch Halogen, Trifluormethyl, Cyano oder C₁-C₂-Alkyl oder einen C₁-C₂-Alkoxy-carbonyl-C₂-C₄-alkylen-imino-Rest substituierten Heterocyclus mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe O, N und S sowie darüber hinaus einen Monosaccharid-Rest;

T die Brückenglieder -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- oder -CH₂CH₂O-;

R₁ Wasserstoff, C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff- oder Schwefelatom unterbrochenes C₁-C₅-Alkyl, durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, durch ein Sauerstoff oder ein Schwefelatom unterbrochenes und durch Halogen, Cyano, HOOC oder C₁-C₂-Alkyl-OOC substituiertes C₁-C₅-Alkyl, C₃-C₅-Alkenyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkenyl, C₃-C₅-Alkyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes C₃-C₅-Alkyl, (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, durch C₁-C₃-Alkyl-OOC substituiertes (T)_n-C₃-C₆-Cycloalkyl, (T)_n-Phenyl oder im Phenylteil durch Halogen, Hydroxy, Methyl, CF₃, Cyano, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes (T)_n-Phenyl;

R₂ Wasserstoff, Hydroxy, C₁-C₃-Alkyl, durch Cyano oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, einen 3- bis 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit O, N oder S als Heteroatome;

R₁ und R₂ zusammen mit dem Atom, an welches sie gebunden sind, einen Heterocyclus W;

R₃ Wasserstoff, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, Hydroxy, Methyl, Methoxy, HOOC oder MOOC substituiertes Phenyl, einen Heterocyclus W;

R₄ Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃-Alkyl, C₁-C₆-Alkanoyl, durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₁-C₃-Alkanoyl, C₃-C₅-Alkenoyl oder durch Halogen oder C₁-C₃-Alkoxy substituiertes C₃-C₅-Alkenoyl;

R₃ und R₄ zusammen einen Heterocyclus W oder einen carbocyclischen Ring W';

W' einen carbocyclischen Rest mit 3- bis 7 Ringkohlenstoffatomen;

R₅ Wasserstoff oder Methyl;

R₆ Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl; und

n Null oder 1;

mit Ausnahme von Resten mit UH- oder Nitro-Gruppen sowie Silizium- oder Phosphor-haltigen Resten, und

E^b eine leicht abspaltbare Gruppe wie z.B. Wasserstoff, C₁-C₁₆-Alkyl, z.B. Methyl, Ethyl, Isopropyl, n-Dodecyl, oder Benzyl oder Acyl, z.B. Acetyl oder den Sulfonsäure-Rest (-SO₃H-) oder Cyano.

27. Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1 oder 2 zur Immunisierung von



Pflanzen gegen Krankheiten.

28. Verwendung der Verbindungen der Formel I' gemäss Anspruch 20 zur Immunisierung von Pflanzen gegen Krankheiten.

29. Verwendung von 7-Methoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazol als Wirkstoff zur Herstellung eines Mittels zur Immunisierung von Pflanzen gegen den Befall durch phytopathogene Mikroorganismen.

Claims

Claims for the following Contracting States : AT, BE, CH, DE, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE

1. A process for immunising plants against attack by phytopathogenic microorganisms which comprises applying as active ingredient to said plants and/or to the locus thereof a compound of the following formula I



wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy or amino, M being the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that is formed from a corresponding base or basic compound; and

Z is cyano or -CO-A, A being either OH or SH, the H of which may also have been replaced by the molar equivalent of an inorganic or organic cationic radical.

2. A process for immunising plants against attack by phytopathogenic microorganisms which comprises applying as active ingredient to said plants and/or to the locus thereof a compound of the following formula I



wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy or amino, M being the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that is formed from a corresponding base or basic compound; and

Z is cyano or -CO-A,



A is UR, N(R₁)R₂ or U¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a corresponding base or basic compound;

U is oxygen or sulfur;

U¹ is oxygen or -N(R₅)-;

R is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy, U-C₁-C₈alkyl or by C₂-C₄dialkylamino or is interrupted by the CO group, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄alkyl, C₃-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, or a group selected from the following:



each of X^a , X^b and X^c , independently of the others, is hydrogen, halogen, hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, $\text{C}_1 - \text{C}_3\text{alkyl-OOC}$, $\text{C}_1 - \text{C}_4\text{alkyl}$, $\text{C}_1 - \text{C}_4\text{alkoxy}$, $\text{C}_1 - \text{C}_2\text{haloalkyl}$ having up to 5 halogen atoms, especially fluorine atoms; or X^a is $\text{C}_1 - \text{C}_2\text{haloalkoxy}$ having up to 5 halogen atoms, nitro, dimethylamino, phenyl, phenoxy, benzyloxy, sulfamoyloxy and X^b and X^c are both hydrogen; or X^a is phenyl, phenoxy or benzyloxy and X^b is halogen or methyl and X^c is hydrogen; or X^a , X^b and X^c together are 4 or 5 fluorine atoms;

naphth is a naphthyl radical that is unsubstituted or is substituted by halogen, methyl, methoxy or by nitro;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, $\text{C}_1 - \text{C}_2\text{alkyl}$ or by a $\text{C}_1 - \text{C}_2\text{alkoxycarbonyl-C}_2 - \text{C}_4\text{alkyleneimino}$ radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CCH}_3(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ or $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 is hydrogen, $\text{C}_1 - \text{C}_5\text{alkyl}$, $\text{C}_1 - \text{C}_5\text{alkyl}$ interrupted by an oxygen or sulfur atom, $\text{C}_1 - \text{C}_5\text{alkyl}$ substituted by halogen, cyano, HOOC or by $\text{C}_1 - \text{C}_2\text{alkyl-OOC}$, $\text{C}_1 - \text{C}_5\text{alkyl}$ interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by $\text{C}_1 - \text{C}_2\text{alkyl-OOC}$, $\text{C}_3 - \text{C}_5\text{alkenyl}$, $\text{C}_3 - \text{C}_5\text{alkenyl}$ substituted by $\text{C}_1 - \text{C}_3\text{alkyl-OOC}$, $\text{C}_3 - \text{C}_5\text{alkynyl}$, $\text{C}_3 - \text{C}_5\text{alkynyl}$ substituted by $\text{C}_1 - \text{C}_3\text{alkyl-OOC}$, $(T)_n - \text{C}_3 - \text{C}_6\text{cycloalkyl}$, $(T)_n - \text{C}_3 - \text{C}_6\text{cycloalkyl}$ substituted by $\text{C}_1 - \text{C}_3\text{alkyl-OOC}$, $(T)_n - \text{phenyl}$, or $(T)_n - \text{phenyl}$ substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, CF_3 , cyano, HOOC or by MOOC;

R_2 is hydrogen, hydroxy, $\text{C}_1 - \text{C}_3\text{alkyl}$, $\text{C}_1 - \text{C}_3\text{alkyl}$ substituted by cyano or by $\text{C}_1 - \text{C}_3\text{alkoxy}$, $\text{C}_1 - \text{C}_4\text{alkoxy}$, a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R_1 and R_2 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R_3 is hydrogen, cyano, $\text{C}_1 - \text{C}_6\text{alkyl}$, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R_4 is hydrogen, $\text{C}_1 - \text{C}_6\text{alkyl}$, CONH_2 , $\text{CONH-CONH-C}_1 - \text{C}_3\text{alkyl}$, $\text{C}_1 - \text{C}_3\text{alkanoyl}$, $\text{C}_1 - \text{C}_3\text{alkanoyl}$ substituted by halogen or by $\text{C}_1 - \text{C}_3\text{alkoxy}$, $\text{C}_3 - \text{C}_5\text{alkenoyl}$, or $\text{C}_3 - \text{C}_5\text{alkenoyl}$ substituted by halogen or by $\text{C}_1 - \text{C}_3\text{alkoxy}$;

R_3 and R_4 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W';

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R_5 is hydrogen or methyl;

R_6 is hydrogen or $\text{C}_1 - \text{C}_4\text{alkyl}$; and

n is 0 or 1;

and in a compound of formula I the organic radical A has a molecular weight of less than 900; or in the case where U is oxygen or sulfur, a salt of the phytophysiologically tolerable 7-carboxylic acid with a primary, secondary or tertiary amine or with an inorganic base.

3. A process according to claim 1 or claim 2, wherein the application rate is less than 1 kg of active ingredient/hectare.

4. A process according to claim 2, wherein there is used a compound of formula I wherein:

X and Y are hydrogen;

Z is cyano or COA;

A is UR or $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$;

U is oxygen;

U' is oxygen or $-\text{N}(\text{R}_5)-$;



R is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy, C₃-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, benzyl, halogenated benzyl, methoxybenzyl, (T)_n-Si(CH₃)₃, (T)-P(O)(C₁-C₄alkyl)CH₃, (T)-P(O)(OC₁-C₄alkyl)₂ or the group (T)_n-W;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated unsubstituted heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S, or is diacetone-D-glucosidyl;

T is a bridge member -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CCH₃(CH₃)-, or -CH₂CH₂CH₂-;

R₃ is hydrogen, cyano, C₁-C₆alkyl, phenyl or W;

R₄ is hydrogen, C₁-C₆alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃alkyl, C₁-C₃alkanoyl or C₃-C₅alkenoyl;

R₃ and R₄ together with the atom to which they are bonded are W or W';

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S;

W' is a radical from the group:



n is 0 or 1.

5. A compound of formula I'



wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy or amino;

Z is cyano or COA;



A is UR, N(R₁)R₂ or U'¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a corresponding base or basic compound;

U is oxygen or sulfur;

U'¹ is oxygen or -N(R₅)-

R is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy or by U-C₁-C₃alkyl, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄alkyl, C₃-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, or a group selected from the following:



each of X^a, X^b and X^c, independently of the others, is hydrogen, halogen, hydroxy, cyano, HOOC,



MOOC, C₁-C₃alkyl-OOC, C₁-C₄alkyl, C₁-C₄alkoxy, C₁-C₂haloalkyl having up to 5 halogen atoms, especially fluorine atoms; or X^a is C₁-C₂haloalkoxy having up to 5 halogen atoms, nitro, dimethylamino, phenyl, phenoxy, benzyloxy or sulfamoyloxy and X^b and X^c are both hydrogen; or X^a is phenyl, phenoxy or benzyloxy and X^b is halogen or methyl and X^c is hydrogen; or X^a, X^b and X^c together are 4 or 5 fluorine atoms;

naphth is a naphthyl radical that is unsubstituted or is substituted by halogen, methyl, methoxy or by nitro;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, C₁-C₂alkyl or by a C₁-C₂alkoxycarbonyl-C₂-C₄alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- or -CH₂CH₂O-;

R₁ is hydrogen, C₁-C₅alkyl, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, C₁-C₅alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₃-C₅alkenyl, C₃-C₅alkenyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, C₃-C₅alkynyl, C₃-C₅alkynyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-phenyl or (T)_n-phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF₃, cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R₂ is hydrogen, hydroxy, C₁-C₃alkyl, C₁-C₃alkyl substituted by cyano or by C₁-C₃alkoxy, C₁-C₄alkoxy, or a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle having O, N or S as hetero atoms;

R₁ and R₂ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R₃ is hydrogen, cyano, C₁-C₆alkyl, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R₄ is hydrogen, C₁-C₆alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃alkyl, C₁-C₆alkanoyl, C₁-C₃alkanoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy, C₃-C₅alkenoyl, or C₃-C₅alkenoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy;

R₃ and R₄ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W';

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R₅ is hydrogen or methyl;

R₆ is hydrogen or C₁-C₄alkyl; and

n is 0 or 1;

with the exception of the compounds:

7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4,6-dibromo-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;


benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;

benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid methyl ester;

6-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

6-chlorobenzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid.

6. A compound of formula I'



(I')

wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy or amino;

Z is cyano or COA;

A is UR, N(R₁)R₂ or U'N(=C)_n(R₃)R₄;



M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a corresponding base or basic compound;

U is oxygen or sulfur;

U' is oxygen or -N(R₅)-;



R is hydrogen, C₁-C₈ alkyl, C₁-C₈ alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy, alkoxy or by U-C₁-C₃ alkyl, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄ alkyl, C₂-C₆ alkenyl, halo-substituted C₃-C₆ alkenyl, C₃-C₆ alkynyl, halo-substituted C₃-C₆ alkynyl, (T)_n-C₃-C₆ cycloalkyl, or a group selected from the following:



W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, C₁-C₂ alkyl or by a C₁-C₂ alkoxy carbonyl-C₂-C₄ alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member -CH₂-, -CH₂CH₂- or -CH(CH₃)-

R₁ is hydrogen, C₁-C₅ alkyl, C₁-C₅ alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, C₁-C₅ alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂ alkyl-OOC, C₁-C₅ alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂ alkyl-OOC, C₃-C₅ alkenyl, C₃-C₅ alkenyl substituted by C₁-C₃ alkyl-OOC, C₃-C₅ alkynyl, C₃-C₅ alkynyl substituted by C₁-C₃ alkyl-OOC, (T)_n-C₃-C₆ cycloalkyl, (T)_n-C₃-C₆ cycloalkyl substituted by C₁-C₃ alkyl-OOC, (T)_n-phenyl or (T)_n-phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF₃, cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R₂ is hydrogen, hydroxy, C₁-C₃ alkyl, C₁-C₃ alkyl substituted by cyano or by C₁-C₃ alkoxy, C₁-C₄ alkoxy, or a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R₁ and R₂ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R₃ is hydrogen, cyano, C₁-C₆ alkyl, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R₄ is hydrogen, C₁-C₆ alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃ alkyl, C₁-C₃ alkanoyl, C₁-C₃ alkanoyl substituted by halogen or by C₁-C₃ alkoxy, C₃-C₅ alkenoyl, or C₃-C₅ alkenoyl substituted by halogen or by C₁-C₃ alkoxy;

R₃ and R₄ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W';

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R₅ is hydrogen or methyl;

R₆ is hydrogen or C₁-C₄ alkyl; and

n is 0 or 1;

with the exception of the compounds:

- 7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;
- 4-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;
- 4,6-dibromo-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;
- benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;
- benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid methyl ester;
- 6-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;
- 6-chlorobenzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid.

7. A compound of formula I' according to claim 5 wherein Z = COA and R has a meaning other than hydrogen and unsubstituted alkyl.

8. A compound of formula I' according to claim 5 from the group:


- 7-n-pentyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
- 7-(4-methoxybenzyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
- 7-(cycloheximino-oxy carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
- 7-(3-hydroxy-n-propoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
- 1,2,5,6-di-O-isopropylidene-3-(7-benzo-1,2,3-thiadiazoyl)-D-glucofuranose;
- 7-furfuryloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
- 7-(1,2,4-triazol-1-yl)-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;



- 7-(2-pyridylmethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-trimethylsilylmethoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-[2-(trimethylsilyl)-ethoxycarbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-dimethylphosphono-ethoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 5 7-cyclohexyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(1-phenethyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(3-methoxybenzyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(ethylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(n-propylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 10 7-(benzylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-carbamoylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-N-phenylcarbamoylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 N-(7-benzo-1,2,3-thiadiazoyl)-glycine;
 7-(N-diallylcarbamoyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 15 6-fluoro-7-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 6-fluoro-7-carboxybenzo-1,2,3-thiadiazole;
 5-fluoro-7-benzyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 5-fluoro-7-carboxybenzo-1,2,3-thiadiazole;
 5-fluoro-7-ethoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole.
 20
9. A compound of formula I' according to claim 6 from the group:
 7-ethoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-n-propoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-isopropoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 25 7-n-butoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-sec-butoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-tert-butoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-cyclopropylmethoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(2'-phenethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 30 7-benzyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-allyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-propyn-2-yloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 2-(7-benzo-1,2,3-thiadiazoyloxy-imino)-2-cyano-N-(ethylaminocarbonyl)-acetamide;
 sodium salt of benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;
 35 potassium salt of benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;
 triethylammonium salt of benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;
 7-(1'-phenethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(1'-naphthylmethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(methylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 40 7-(ethylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(benzylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-[(dicyanomethyl)-aminocarbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 3-[(N-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamino]-2-methylpropenecarboxylic acid
 methyl ester;
 45 3-[(N-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamino]-2-ethylpropenecarboxylic acid
 methyl ester;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(α -methylpropylidene)-hydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclobutylidene)-hydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclopentylidene)-hydrazine;
 50 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclohexylidene)-hydrazine;
 2-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-1-(2'-sec-butyl)-hydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclopentyl)-hydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclohexyl)-hydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cycloheptyl)-hydrazine;
 55 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-1,2-diacetylhydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-phenylhydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-pyridin-2'-ylhydrazine.



10. A process according to claim 2, wherein a compound of formula I' as defined in claim 5 is used.
11. A process according to claim 2, wherein a compound of formula I' as defined in claim 6 is used.
- 5 12. A process according to claim 2, wherein a compound of formula I' as defined in claim 7 is used.
13. A process according to claim 2, wherein 1,2,3-benzothiadiazole-7-carboxylic acid or a salt thereof with a basic compound is used as active ingredient.
- 10 14. A process according to claim 13, wherein the salt used is one with a primary, secondary or tertiary amine or an alkali metal or alkaline earth metal compound.
- 15 15. A process according to claim 2, wherein 7-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole is used as active ingredient.
16. A process according to claim 2, wherein 7-benzyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole is used as active ingredient.
- 20 17. A process according to claim 2, wherein 7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole is used as active ingredient.
18. A process according to claim 2, wherein a compound of 7-C₂-C₄alkoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole is used as active ingredient.
- 25 19. A composition for the immunisation of plants against attack by phytopathogenic microorganisms, comprising as active ingredient at least one compound of formula I defined in claim 1 or claim 2 with the exception of the compounds 7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole; 4-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole; 6-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole; 4,6-dibromo-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole and 7-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole.
- 30 20. A composition for the immunisation of plants against attack by phytopathogenic microorganisms, comprising as active ingredient at least one compound of formula I' defined in claim 5.
21. A composition for the immunisation of plants against attack by phytopathogenic microorganisms, comprising as active ingredient at least one compound of formula I' defined in claim 6.
- 35 22. A composition according to claim 19, comprising as active ingredient at least one compound of formula I' defined in claim 7.
- 40 23. A composition according to claim 19, comprising as active ingredient at least one compound according to either claim 8 or claim 9.
24. A composition according to claim 19, comprising as active ingredient at least one of the compounds: benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid and 7-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole.
- 45 25. A composition according to claim 19, comprising as active ingredient 1,2,3-benzothiadiazole-7-carboxylic acid or a salt thereof with a basic compound.
26. A composition according to claim 25, wherein the salt used is one with a primary, secondary or tertiary amine or an alkali metal or alkaline earth metal compound.
- 50 27. A process for the preparation of a compound of formula I'



(I')



wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy or amino;

Z is cyano or COA;


A is UR, N(R₁)R₂ or U'¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a corresponding base or basic compound;

U is oxygen or sulfur;

U' is oxygen or -N(R₅)-;

R is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy or by U-C₁-C₃alkyl, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄alkyl, C₃-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, or a group selected from the following:



each of X^a, X^b and X^c, independently of the others, is hydrogen, halogen, hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, C₁-C₃alkyl-OOC, C₁-C₄alkyl, C₁-C₄alkoxy, C₁-C₂haloalkyl having up to 5 halogen atoms, especially fluorine atoms;

or X^a is C₁-C₂haloalkoxy having up to 5 halogen atoms, nitro, dimethylamino, phenyl, phenoxy, benzyloxy, sulfamoyloxy and X^b and X^c are both hydrogen; or

X^a is phenyl, phenoxy or benzyloxy and X^b is halogen or methyl and X^c is hydrogen; or

X^a, X^b and X^c together are 4 or 5 fluorine atoms;

naphth is a naphthyl radical that is unsubstituted or is substituted by halogen, methyl, methoxy or by nitro;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, C₁-C₂alkyl or by a C₁-C₂alkoxycarbonyl-C₂-C₄alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- or -CH₂CH₂O-;

R₁ is hydrogen, C₁-C₅alkyl, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, C₁-C₅alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₃-C₅alkenyl, C₃-C₅alkenyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, C₃-C₅alkynyl, C₃-C₅alkynyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-phenyl, or (T)_n-phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF₃, cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R₂ is hydrogen, hydroxy, C₁-C₃alkyl, C₁-C₃alkyl substituted by cyano or by C₁-C₃alkoxy, C₁-C₄alkoxy, a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R₁ and R₂ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R₃ is hydrogen, cyano, C₁-C₆alkyl, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R₄ is hydrogen, C₁-C₆alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃alkyl, C₁-C₆alkanoyl, C₁-C₃alkanoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy, C₃-C₅alkenoyl, or C₃-C₅alkenoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy;

R₃ and R₄ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W';

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R₅ is hydrogen or methyl;

R₆ is hydrogen or C₁-C₄alkyl; and

n is 0 or 1;


with the exception of the compounds:

7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;



4-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;
 4,6-dibromo-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;
 benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;
 benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid methyl ester;
 6-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;
 6-chlorobenzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;
 in which process


1. a compound of formula Ia



(Ia)

in which R, X, Y and U have the meanings given under formula I, is prepared by reacting:

1.1 a compound of formula II



(II)

in which L' is a leaving group, for example halogen, O-acyl, for example the acyl radical belonging to the symmetric anhydride of acid Ib, or 1-imidazolyl, with a compound of formula III

RUH (III)


a) in an excess of the reactant RUH or

b) in the presence of an organic base either with or without 4-dialkylaminopyridine as catalyst in an inert solvent or

c) in the presence of an inorganic base,

the reaction in each case being carried out in a temperature range of from -10° to 180°C, preferably from 0° to 100°C; or


1.2 a compound of formula Ib



(Ib)

with a compound of formula III in excess or in an inert solvent in the presence of an acid, such as sulfuric acid, hydrochloric acid, p-toluenesulfonic acid or boron trifluoride/diethyl ether complex, or in the presence of dicyclohexylcarbodiimide at a temperature of from -10° to 180°C, preferably from 0° to 140°C; and

2. a compound of formula Ic



(Ic)

in which the symbols R_1 , R_2 , X and Y have the meanings given under formula I, is prepared by reacting:

2.1 a compound of formula II with a compound of formula IV



(IV)


a) in an excess of the reactant $\text{HN}(\text{R}_1)\text{R}_2$ or

b) in the presence of an organic base either with or without 4-dialkylaminopyridine as catalyst in an inert solvent or

c) in the presence of an inorganic base,

the reaction in each case being carried out in a temperature range of from -10° to 160°C , preferably from 0° to 100°C ; and


3. a compound of formula Id



(Id),


in which A' is the radical $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$ and X, Y, R_3 , R_4 , R_5 and $\underline{n}$ have the meanings given under formula I, is prepared by:

3.1 reacting a compound of formula Ie




(Ie)


in which Z' is a group COOH , COCl , COOAlk^1 or an acyloxycarbonyl radical, for example



benzyloxycarbonyl or acetyloxycarbonyl, in which Alk^1 is C_1 - C_4 alkyl, in the presence of a base, with a hydrazine derivative of formula V or VI



(V) or



(VI)

in an inert solvent at a temperature of from -10° to 180° C, preferably from 0° to 100° C; or
3.2 reacting a compound of formula Ie stepwise first with hydrazine, and then reacting the resulting hydrazine compound

3.2.1 with the alkylating agent R_3 -L or R_4 -L in which L is a leaving group, in an inert solvent at a temperature of from 0° to 160° C, preferably from 20° to 120° C; or


3.2.2 with an aldehyde or ketone of formula $R_3(R_4)C=O$ in which R_3 and R_4 have the meanings given under formula I, with or without the addition of an organic or inorganic acid, at a temperature of from -10° to 150° C, preferably from 20° to 100° C, and subsequently, if desired,

3.2.3 with an alkylating agent L- R_5 in which L is a leaving group, in the presence of a strong base in an inert solvent at a temperature of from -80° to 120° C, preferably from -40° to 80° C; or, if desired,

3.2.4 a) hydrogenating the hydrazone derivative prepared under (3.2.1) with hydrogen at a pressure of from 1 to 30×10^5 Pa in the presence of a catalyst in admixture with activated carbon in an inert solvent at a temperature of from 0° to 100° C, or


3.2.4 b) treating the hydrazone derivative prepared under (3.2.1) with a complex metal hydride, for example sodium cyanoborohydride, in an inert solvent at a temperature of from -10° to 80° C, preferably from 0° to 50° C; and

4. a compound of formula If



(If),

in which the symbols X and Y have the meanings given under formula I, is prepared by treating a compound of formula Ig [prepared according to process (2)]



(Ig)


with a dehydrating agent in an inert solvent or without a solvent at a temperature of from -10° to 250° C, suitable dehydrating agents being:

a) trifluoroacetic acid anhydride in the presence of a base, for example pyridine, in an inert solvent, for example tetrahydrofuran or dioxane, at a temperature of from -10° to 40° C; or


b) chlorosulfonyl isocyanate in an inert solvent, for example tetrahydrofuran, at a temperature of from 0° to 65° C, with subsequent treatment with dimethylformamide;

c) phosphorus pentoxide with or without an inert solvent, for example 1,2-dichloroethane, xylene or chlorobenzene, optionally in a bomb tube under elevated pressure, at from 50° to 250° C;


5.1 a compound of formula IL¹

(IL¹)


in which R₃, R₄, X and Y have the meanings given under formula I, is prepared by reacting an oxime derivative of formula




with an activated acid derivative of formula



in which AKS is a halogen, an O-acyl, for example the O-acyl radical of the free acid of the formula above, acetoxy or benzyloxy, or 1-imidazolyl, in an inert solvent and a base at from -20°C to 120°C, preferably from 0° to 50°C, or by reacting the free acid (= Ib) in the presence of dicyclohexylcarbodiimide under the same conditions;
5.2 a compound of formula IL²

(IL²)

in which R₃, R₄, X and Y have the meanings given under formula I, is prepared by reduction of a compound of formula IL¹


(IL¹)

a) with a silane, for example triethylsilane, in the presence of an acid, for example trifluoroacetic acid, at from 0° to 80°C, or

b) with sodium cyanoborohydride in the presence of an organic acid, for example acetic acid, at from 0° to 80°C, or

c) by catalytic methods, for example with Pt/H₂.


28. A process for the preparation of a compound of formula Ik



(Ik)




by diazotisation of a compound of formula XI'



in an acidic medium with a nitrite compound at from -40° to 30°C and, in the same reaction vessel or in a second reaction vessel, treatment with a reducing agent at from -40° to 80°C , preferably at from -30° to 30°C , the reducing agent being added before, after or at the same time as the nitrite compound, the substituents of the compounds having the following meanings:

X' is hydrogen, halogen, methyl, methoxy or COOH ;

E^b is a readily removable group, for example hydrogen, C_1 - C_{16} alkyl, for example methyl, ethyl, isopropyl, n-dodecyl, or benzyl or acyl, for example acetyl or the sulfonic acid radical ($-\text{SO}_3\text{H}$) or cyano, or as part of a disulfide bridge, is a second radical



Z^b is cyano or COA;



A is UR , $\text{N}(\text{R}_1)\text{R}_2$ or $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$;

M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a corresponding base or basic compound;

U is oxygen or sulfur;

U' is oxygen or $-\text{N}(\text{R}_5)-$;

R is hydrogen, C_1 - C_8 alkyl, C_1 - C_8 alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy or by $\text{U}-\text{C}_1$ - C_3 alkyl, $(\text{T})-\text{COOH}$ or $(\text{T})-\text{COOC}_1$ - C_4 alkyl, C_3 - C_6 alkenyl, halo-substituted C_3 - C_6 alkenyl, C_3 - C_6 alkynyl, halo-substituted C_3 - C_6 alkynyl, $(\text{T})_n$ - C_3 - C_8 cycloalkyl, or a group selected from the following:



each of X^a , X^b and X^c , independently of the others, is hydrogen, halogen, hydroxy, cyano, HOOC , MOOC , C_1 - C_3 -alkyl- OOC , C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, C_1 - C_2 haloalkyl having up to 5 halogen atoms, especially fluorine atoms;

or X^a is C_1 - C_2 haloalkoxy having up to 5 halogen atoms, nitro, dimethylamino, phenyl, phenoxy, benzyloxy, sulfamoyloxy and X^b and X^c are both hydrogen; or

X^a is phenyl, phenoxy or benzyloxy and X^b is halogen or methyl and X^c is hydrogen; or

X^a , X^b and X^c together are 4 or 5 fluorine atoms;

naphth is a naphthyl radical that is unsubstituted or is substituted by halogen, methyl, methoxy or by nitro;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, C_1 -



C₂alkyl or by a C₁-C₂alkoxycarbonyl-C₂-C₄alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- or -CH₂CH₂O-;

R₁ is hydrogen, C₁-C₅alkyl, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, C₁-C₅alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₃-C₅alkenyl, C₃-C₅alkenyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, C₃-C₅alkynyl, C₃-C₅alkynyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-phenyl, or (T)_n-phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF₃, cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R₂ is hydrogen, hydroxy, C₁-C₃alkyl, C₁-C₃alkyl substituted by cyano or by C₁-C₃alkoxy, C₁-C₄alkoxy, a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R₁ and R₂ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R₃ is hydrogen, cyano, C₁-C₆alkyl, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R₄ is hydrogen, C₁-C₆alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃alkyl, C₁-C₆alkanoyl, C₁-C₃alkanoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy, C₃-C₅alkenoyl, or C₃-C₅alkenoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy;

R₃ and R₄ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W';

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;


R₅ is hydrogen or methyl;

R₆ is hydrogen or C₁-C₄alkyl; and


n is 0 or 1;

with the exception of primary or secondary amino groups, UH or nitro groups, Si(C₁-C₈alkyl)₃ or phosphorus-containing radicals.

29. A process for the preparation of a compound of formula




by diazotisation of a compound of formula



in an acidic medium with a nitrite compound at from -20° to 30° C, and in the same reaction vessel treatment with a reducing agent at from -20° to 80° C, preferably at from 20° to 30° C, the reducing agent being added before, after or at the same time as the nitrite compound, the substituents of the compounds having the following meanings:

R^a is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy or by U-C₁-C₃-alkyl, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄alkyl, C₃-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, or a group selected from the following:



each of X^a , X^b and X^c , independently of the others, is hydrogen, halogen, hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl-OOC, $\text{C}_1 - \text{C}_4$ alkyl, $\text{C}_1 - \text{C}_4$ alkoxy, $\text{C}_1 - \text{C}_2$ haloalkyl having up to 5 halogen atoms, especially fluorine atoms;

or X^a is $\text{C}_1 - \text{C}_2$ haloalkoxy having up to 5 halogen atoms, nitro, dimethylamino, phenyl, phenoxy, benzyloxy, sulfamoyloxy and X^b and X^c are both hydrogen; or

X^a is phenyl, phenoxy or benzyloxy and X^b is halogen or methyl and X^c is hydrogen; or

X^a , X^b and X^c together are 4 or 5 fluorine atoms;

naphth is a naphthyl radical that is unsubstituted or is substituted by halogen, methyl, methoxy or by nitro;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, $\text{C}_1 - \text{C}_2$ alkyl or by a $\text{C}_1 - \text{C}_2$ alkoxycarbonyl- $\text{C}_2 - \text{C}_4$ alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ or $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 is hydrogen, $\text{C}_1 - \text{C}_5$ alkyl, $\text{C}_1 - \text{C}_5$ alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, $\text{C}_1 - \text{C}_5$ alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by $\text{C}_1 - \text{C}_2$ alkyl-OOC, $\text{C}_1 - \text{C}_5$ alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by $\text{C}_1 - \text{C}_2$ alkyl-OOC, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkenyl, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkenyl substituted by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl-OOC, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkynyl, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkynyl substituted by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl-OOC, $(\text{T})_n - \text{C}_3 - \text{C}_6$ cycloalkyl, $(\text{T})_n - \text{C}_3 - \text{C}_6$ cycloalkyl substituted by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl-OOC, $(\text{T})_n$ -phenyl, or $(\text{T})_n$ -phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF_3 , cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R_2 is hydrogen, hydroxy, $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl, $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl substituted by cyano or by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkoxy, $\text{C}_1 - \text{C}_4$ alkoxy, a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R_1 and R_2 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R_3 is hydrogen, cyano, $\text{C}_1 - \text{C}_6$ alkyl, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R_4 is hydrogen, $\text{C}_1 - \text{C}_6$ alkyl, CONH_2 , $\text{CONH-CONH-}\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl, $\text{C}_1 - \text{C}_6$ alkanoyl, $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkanoyl substituted by halogen or by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkoxy, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkenoyl, or $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkenoyl substituted by halogen or by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkoxy;

R_3 and R_4 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W' ;

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R_5 is hydrogen or methyl;

R_6 is hydrogen or $\text{C}_1 - \text{C}_4$ alkyl; and

n is 0 or 1;

with the exception of radicals containing UH or nitro groups and silicon- or phosphorus-containing radicals, and

E^b is a readily removable group, for example hydrogen, $\text{C}_1 - \text{C}_{16}$ alkyl, for example methyl, ethyl, isopropyl, n-dodecyl, or benzyl or acyl, for example acetyl or the sulfonic acid radical $(-\text{SO}_3\text{H}-)$ or cyano.

30. The use of a compound of formula I according to claim 1 or claim 2, for the immunisation of plants against diseases.

31. Use of a compound of formula I' according to claim 8 or claim 9 for the immunisation of plants against diseases.

32. Use of 7-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole as active ingredient in the preparation of a composition for the immunisation of plants against attack by phytopathogenic microorganisms.



Claims for the following Contracting State : ES

1. A process for immunising plants against attack by phytopathogenic microorganisms which comprises applying as active ingredient to said plants and/or to the locus thereof a compound of the following formula I



wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy or amino, M being the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that is formed from a corresponding base or basic compound; and

Z is cyano or -CO-A, A being either OH or SH, the H of which may also have been replaced by the molar equivalent of an inorganic or organic cationic radical.

2. A process for immunising plants against attack by phytopathogenic microorganisms which comprises applying as active ingredient to said plants and/or to the locus thereof a compound of the following formula I



wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy or amino, M being the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that is formed from a corresponding base or basic compound; and

Z is cyano or -CO-A,



A is UR, N(R₁)R₂ or U'¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a corresponding base or basic compound;

U is oxygen or sulfur;

U'¹ is oxygen or -N(R₅)-;

R is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy, U-C₁-C₃alkyl or by C₂-C₄dialkylamino or is interrupted by the CO group, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄alkyl, C₃-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, or a group selected from the following:



each of X^a , X^b and X^c , independently of the others, is hydrogen, halogen, hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl-OOC, $\text{C}_1 - \text{C}_4$ alkyl, $\text{C}_1 - \text{C}_4$ alkoxy, $\text{C}_1 - \text{C}_2$ haloalkyl having up to 5 halogen atoms, especially fluorine atoms;

or X^a is $\text{C}_1 - \text{C}_2$ haloalkoxy having up to 5 halogen atoms, nitro, dimethylamino, phenyl, phenoxy, benzyloxy, sulfamoyl and X^b and X^c are both hydrogen; or

X^a is phenyl, phenoxy or benzyloxy and X^b is halogen or methyl and X^c is hydrogen; or

X^a , X^b and X^c together are 4 or 5 fluorine atoms;

naphth is a naphthyl radical that is unsubstituted or is substituted by halogen, methyl, methoxy or by nitro;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, $\text{C}_1 - \text{C}_2$ alkyl or by a $\text{C}_1 - \text{C}_2$ alkoxycarbonyl- $\text{C}_2 - \text{C}_4$ alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CCH}_3(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ or $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 is hydrogen, $\text{C}_1 - \text{C}_5$ alkyl, $\text{C}_1 - \text{C}_5$ alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, $\text{C}_1 - \text{C}_5$ alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by $\text{C}_1 - \text{C}_2$ alkyl-OOC, $\text{C}_1 - \text{C}_5$ alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by $\text{C}_1 - \text{C}_2$ alkyl-OOC, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkenyl, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkenyl substituted by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl-OOC, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkynyl, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkynyl substituted by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl-OOC, $(\text{T})_n - \text{C}_3 - \text{C}_6$ cycloalkyl, $(\text{T})_n - \text{C}_3 - \text{C}_6$ cycloalkyl substituted by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl-OOC, $(\text{T})_n$ -phenyl, or $(\text{T})_n$ -phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, CF_3 , cyano, HOOC or by MOOC;

R_2 is hydrogen, hydroxy, $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl, $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl substituted by cyano or by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkoxy, $\text{C}_1 - \text{C}_4$ alkoxy, a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R_1 and R_2 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R_3 is hydrogen, cyano, $\text{C}_1 - \text{C}_6$ alkyl, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R_4 is hydrogen, $\text{C}_1 - \text{C}_6$ alkyl, CONH_2 , $\text{CONH-CONH-}\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkyl, $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkanoyl, $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkanoyl substituted by halogen or by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkoxy, $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkenoyl, or $\text{C}_3 - \text{C}_5$ alkenoyl substituted by halogen or by $\text{C}_1 - \text{C}_3$ alkoxy;

R_3 and R_4 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W' ;

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R_5 is hydrogen or methyl;

R_6 is hydrogen or $\text{C}_1 - \text{C}_4$ alkyl; and

n is 0 or 1;

and in a compound of formula I the organic radical A has a molecular weight of less than 900; or in the case where U is oxygen or sulfur, a salt of the phytophysiologically tolerable 7-carboxylic acid with a primary, secondary or tertiary amine or with an inorganic base.

3. A process according to claim 1 or claim 2, wherein the application rate is less than 1 kg of active ingredient/hectare.
4. A process according to claim 2, wherein there is used a compound of formula I wherein:
 - X and Y are hydrogen;
 - Z is cyano or COA;
 - A is UR or $\text{U}^1\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$;
 - U is oxygen;
 - U^1 is oxygen or $-\text{N}(\text{R}_5)-$;



R is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy, C₃-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, benzyl, halogenated benzyl, methoxybenzyl, (T)_n-Si(CH₃)₃, (T)-P(O)(C₁-C₄alkyl)CH₃, (T)-P(O)(OC₁-C₄alkyl)₂ or the group (T)_n-W;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated unsubstituted heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S, or is diacetone-D-glucosidyl;

T is a bridge member -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CCH₃(CH₃)-, or -CH₂CH₂CH₂-;

R₃ is hydrogen, cyano, C₁-C₆alkyl, phenyl or W;

R₄ is hydrogen, C₁-C₆alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃alkyl, C₁-C₃alkanoyl or C₃-C₅alkenoyl;

R₃ and R₄ together with the atom to which they are bonded are W or W';

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S;

W' is a radical from the group:

15



20

n is 0 or 1.

5. A process according to claim 2, wherein there is used a compound of formula I'

25



30

wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy or amino;

35

Z is cyano or COA;

A is UR, N(R₁)R₂ or U'N(=C)_n(R₃)R₄;

M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a corresponding base or basic compound;


U is oxygen or sulfur;

40

U' is oxygen or -N(R₅)-


R is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy or by U-C₁-C₃alkyl, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄alkyl, C₃-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, or a group selected from the following:

45



50

55





each of X^a , X^b and X^c , independently of the others, is hydrogen, halogen, hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, C_1 - C_3 alkyl-OOC, C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, C_1 - C_2 haloalkyl having up to 5 halogen atoms, especially fluorine atoms;

or X^a is C_1 - C_2 haloalkoxy having up to 5 halogen atoms, nitro, dimethylamino, phenyl, phenoxy, benzyloxy or sulfamoyloxy and X^b and X^c are both hydrogen; or

X^a is phenyl, phenoxy or benzyloxy and X^b is halogen or methyl and X^c is hydrogen; or

X^a , X^b and X^c together are 4 or 5 fluorine atoms;

naphth is a naphthyl radical that is unsubstituted or is substituted by halogen, methyl, methoxy or by nitro;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, C_1 - C_2 alkyl or by a C_1 - C_2 alkoxycarbonyl- C_2 - C_4 alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH(CH_3)-$, $-CH_2CH_2CH_2-$ or $-CH_2CH_2O-$;

R_1 is hydrogen, C_1 - C_5 alkyl, C_1 - C_5 alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, C_1 - C_5 alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by C_1 - C_2 alkyl-OOC, C_1 - C_5 alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by C_1 - C_2 alkyl-OOC, C_3 - C_5 alkenyl, C_3 - C_5 alkenyl substituted by C_1 - C_3 alkyl-OOC, C_3 - C_5 alkynyl, C_3 - C_5 alkynyl substituted by C_1 - C_3 alkyl-OOC, $(T)_n$ - C_3 - C_6 cycloalkyl, $(T)_n$ - C_3 - C_6 cycloalkyl substituted by C_1 - C_3 alkyl-OOC, $(T)_n$ -phenyl or $(T)_n$ -phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF_3 , cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R_2 is hydrogen, hydroxy, C_1 - C_3 alkyl, C_1 - C_3 alkyl substituted by cyano or by C_1 - C_3 alkoxy, C_1 - C_4 alkoxy, or a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle having O, N or S as hetero atoms;

R_1 and R_2 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R_3 is hydrogen, cyano, C_1 - C_6 alkyl, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R_4 is hydrogen, C_1 - C_6 alkyl, $CONH_2$, $CONH-CONH-C_1-C_3$ alkyl, C_1 - C_6 alkanoyl, C_1 - C_3 alkanoyl substituted by halogen or by C_1 - C_3 alkoxy, C_3 - C_5 alkenoyl, or C_3 - C_5 alkenoyl substituted by halogen or by C_1 - C_3 alkoxy;

R_3 and R_4 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W' ;

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R_5 is hydrogen or methyl;

R_6 is hydrogen or C_1 - C_4 alkyl; and

n is 0 or 1;

with the exception of the compounds:

7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4,6-dibromo-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;


benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;

benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid methyl ester;

6-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

6-chlorobenzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid.

6. A process according to claim 2, wherein there is used a compound of formula I'



(I')

wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO_3H , SO_3M , nitro, hydroxy or amino;

Z is cyano or COA;

A is UR , $N(R_1)R_2$ or $U^1N(=C)_n(R_3)R_4$;

M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a




corresponding base or basic compound;

U is oxygen or sulfur;

U' is oxygen or -N(R₅)-;

R is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy, alkoxy or by U-C₁-C₃alkyl, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄alkyl, C₂-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, or a group selected from the following:



W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, C₁-C₂alkyl or by a C₁-C₂alkoxycarbonyl-C₂-C₄alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member -CH₂-, -CH₂CH₂- or -CH(CH₃)-;

R₁ is hydrogen, C₁-C₅alkyl, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, C₁-C₅alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₃-C₅alkenyl, C₃-C₅alkenyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, C₃-C₅alkynyl, C₃-C₅alkynyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-phenyl or (T)_n-phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF₃, cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R₂ is hydrogen, hydroxy, C₁-C₃alkyl, C₁-C₃alkyl substituted by cyano or by C₁-C₃alkoxy, C₁-C₄alkoxy, or a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R₁ and R₂ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R₃ is hydrogen, cyano, C₁-C₆alkyl, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R₄ is hydrogen, C₁-C₆alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃alkyl, C₁-C₃alkanoyl, C₁-C₃alkanoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy, C₃-C₅alkenoyl, or C₃-C₅alkenoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy;

R₃ and R₄ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W';

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R₅ is hydrogen or methyl;

R₆ is hydrogen or C₁-C₄alkyl; and

n is 0 or 1;

with the exception of the compounds:

7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4,6-dibromo-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;

benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid methyl ester;


6-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

6-chlorobenzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid.

7. A process according to claim 2, wherein a compound of formula I' according to claim 5 is used wherein Z = COA and R has a meaning other than hydrogen and unsubstituted alkyl.
8. A process according to claim 2, wherein 1,2,3-benzothiadiazole-7-carboxylic acid or a salt thereof with a basic compound is used as active ingredient.
9. A process according to claim 8, wherein the salt used is one with a primary, secondary or tertiary amine or an alkali metal or alkaline earth metal compound.



10. A process according to claim 2, wherein 7-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole is used as active ingredient.
11. A process according to claim 2, wherein 7-benzyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole is used as active ingredient.
12. A process according to claim 2, wherein 7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole is used as active ingredient.
13. A process according to claim 2, wherein a compound of 7-C₂-C₄alkoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole is used as active ingredient.
14. A composition for the immunisation of plants against attack by phytopathogenic microorganisms, comprising as active ingredient at least one compound of formula I defined in claim 1 or claim 2 with the exception of the compounds 7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole; 4-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole; 6-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole; 4,6-dibromo-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole and 7-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole.
15. Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid methyl ester for use in a process for the immunisation of plants against attack by phytopathogenic microorganisms.
16. Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid methyl ester for use in the preparation of a composition for the immunisation of plants against attack by phytopathogenic microorganisms.
17. A composition for the immunisation of plants against attack by phytopathogenic microorganisms comprising as active ingredient at least one compound of formula I'



(I')

wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy or amino;

Z is cyano or COA;


A is UR, N(R₁)R₂ or U'¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a corresponding base or basic compound;


U is oxygen or sulfur;

U'¹ is oxygen or -N(R₅)-;

R is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy or by U-C₁-C₈alkyl, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄alkyl, C₃-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, or a group selected from the following:



(T)_n-naphth, (T)_n-Si(C₁-C₈alkyl)₃,



(T)-P(OR₆)₂; and (T)_n-W;



each of X^a , X^b and X^c , independently of the others, is hydrogen, halogen, hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, C_1 - C_3 alkyl-OOC, C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, C_1 - C_2 haloalkyl having up to 5 halogen atoms, especially fluorine atoms;

or X^a is C_1 - C_2 haloalkoxy having up to 5 halogen atoms, nitro, dimethylamino, phenyl, phenoxy, benzyloxy, sulfamoyloxy and X^b and X^c are both hydrogen; or

X^a is phenyl, phenoxy or benzyloxy and X^b is halogen or methyl and X^c is hydrogen; or

X^a , X^b and X^c together are 4 or 5 fluorine atoms;

naphth is a naphthyl radical that is unsubstituted or is substituted by halogen, methyl, methoxy or by nitro;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, C_1 - C_2 alkyl or by a C_1 - C_2 alkoxycarbonyl- C_2 - C_4 alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH(CH_3)-$, $-CH_2CH_2CH_2-$ or $-CH_2CH_2O-$;

R_1 is hydrogen, C_1 - C_5 alkyl, C_1 - C_5 alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, C_1 - C_5 alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by C_1 - C_2 alkyl-OOC, C_1 - C_5 alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by C_1 - C_2 alkyl-OOC, C_3 - C_5 alkenyl, C_3 - C_5 alkenyl substituted by C_1 - C_3 alkyl-OOC, C_3 - C_5 alkynyl, C_3 - C_5 alkynyl substituted by C_1 - C_3 alkyl-OOC, $(T)_n$ - C_3 - C_6 cycloalkyl, $(T)_n$ - C_3 - C_6 cycloalkyl substituted by C_1 - C_3 alkyl-OOC, $(T)_n$ -phenyl, or $(T)_n$ -phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF_3 , cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R_2 is hydrogen, hydroxy, C_1 - C_3 alkyl, C_1 - C_3 alkyl substituted by cyano or by C_1 - C_3 alkoxy, C_1 - C_4 alkoxy, a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R_1 and R_2 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R_3 is hydrogen, cyano, C_1 - C_6 alkyl phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R_4 is hydrogen, C_1 - C_6 alkyl, $CONH_2$, $CONH-CONH-C_1-C_3$ alkyl, C_1 - C_6 alkanoyl, C_1 - C_3 alkanoyl substituted by halogen or by C_1 - C_3 alkoxy, C_3 - C_5 alkenoyl, or C_3 - C_5 alkenoyl substituted by halogen or by C_1 - C_3 alkoxy;

R_3 and R_4 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W' ;

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R_5 is hydrogen or methyl;

R_6 is hydrogen or C_1 - C_4 alkyl; and

n is 0 or 1;

with the exception of the compounds:

7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4,6-dibromo-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;


benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;

benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid methyl ester;

6-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

6-chlorobenzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid.

18. A composition for the immunisation of plants against attack by phytopathogenic microorganisms comprising as active ingredient at least one compound of formula I'



(I')

wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO_3H , SO_3M , nitro, hydroxy or amino;

Z is cyano or COA;

A is UR , $N(R_1)R_2$ or $U^1N(=C)_n(R_3)R_4$;

M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a






corresponding base or basic compound;

U is oxygen or sulfur;

U' is oxygen or -N(R₅)-;

R is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy, alkoxy or by U-C₁-C₃alkyl, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄alkyl, C₂-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, or a group selected from the following:



W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, C₁-C₂alkyl or by a C₁-C₂alkoxycarbonyl-C₂-C₄alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member -CH₂-, -CH₂CH₂- or -CH(CH₃)-;

R₁ is hydrogen, C₁-C₅alkyl, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, C₁-C₅alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₃-C₅alkenyl, C₃-C₅alkenyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, C₃-C₅alkynyl, C₃-C₅alkynyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-phenyl or (T)_n-phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF₃, cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R₂ is hydrogen, hydroxy, C₁-C₃alkyl, C₁-C₃alkyl substituted by cyano or by C₁-C₃alkoxy, C₁-C₄alkoxy, or a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R₁ and R₂ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R₃ is hydrogen, cyano, C₁-C₆alkyl, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R₄ is hydrogen, C₁-C₆alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃alkyl, C₁-C₃alkanoyl, C₁-C₃alkanoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy, C₃-C₅alkenoyl, or C₃-C₅alkenoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy;

R₃ and R₄ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W';

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R₅ is hydrogen or methyl;

R₆ is hydrogen or C₁-C₄alkyl; and

n is 0 or 1;

with the exception of the compounds:

7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4,6-dibromo-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;

benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid methyl ester;

6-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

6-chlorobenzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid.

19. A composition according to claim 14, comprising as active ingredient at least one compound of formula I' according to claim 17, wherein Z = COA and R has a meaning other than hydrogen and unsubstituted alkyl.

20. A composition according to claim 14, comprising as active ingredient at least one compound of formula I' from the group:

7-n-pentyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;

7-(4-methoxybenzyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;



- 7-(cycloheximino-oxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(3-hydroxy-n-propoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 1,2,5,6-di-O-isopropylidene-3-(7-benzo-1,2,3-thiadiazoyl)-D-glucofuranose;
 7-furfuryloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 5 7-(1,2,4-triazol-1-yl)-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(2-pyridylmethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-trimethylsilylmethoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-[2-(trimethylsilyl)-ethoxycarbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-dimethylphosphono-ethoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 10 7-cyclohexyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(1-phenethyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(3-methoxybenzyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(ethylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(n-propylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 15 7-(benzylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-carbamoylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-N-phenylcarbamoylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 N-(7-benzo-1,2,3-thiadiazoyl)-glycine;
 7-(N-diallylcarbamoyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 20 6-fluoro-7-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 6-fluoro-7-carboxybenzo-1,2,3-thiadiazole;
 5-fluoro-7-benzyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 5-fluoro-7-carboxybenzo-1,2,3-thiadiazole;
 5-fluoro-7-ethoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 25 or from the group:
 7-ethoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-n-propoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-isopropoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-n-butoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 30 7-sec-butoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-tert-butoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-cyclopropylmethoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(2'-phenethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-benzyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 35 7-allyloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-propyn-2-yloxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole;
 2-(7-benzo-1,2,3-thiadiazolyloxy-imino)-2-cyano-N-(ethylaminocarbonyl)-acetamide;
 sodium salt of benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;
 potassium salt of benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;
 40 triethylammonium salt of benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;
 7-(1'-phenethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(1'-naphthylmethoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(methylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-(ethylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 45 7-(benzylthiocarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 7-[(dicyanomethyl)-aminocarbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazole;
 3-[(N-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamino]-2-methylpropenecarboxylic acid
 methyl ester;
 3-[(N-benzo-1,2,3-thiadiazol-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamino]-2-ethylpropenecarboxylic acid
 50 methyl ester;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(α -methylpropylidene)-hydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclobutylidene)-hydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclopentylidene)-hydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclohexylidene)-hydrazine;
 55 2-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-1-(2'-sec-butyl)-hydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclopentyl)-hydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclohexyl)-hydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cycloheptyl)-hydrazine;



1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-1,2-diacetylhydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-phenylhydrazine;
 1-(benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-pyridin-2'-yl-hydrazine.

21. A composition according to claim 14, comprising as active ingredient at least one of the compounds: benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid and 7-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole.
22. A composition according to claim 14, comprising as active ingredient 1,2,3-benzothiadiazole-7-carboxylic acid or a salt thereof with a basic compound.
23. A composition according to claim 22, wherein the salt used is one with a primary, secondary or tertiary amine or an alkali metal or alkaline earth metal compound.
24. A process for the preparation of a compound of formula I'



wherein:

X is hydrogen, halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or MOOC;

Y is hydrogen, halogen, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy or amino;

Z is cyano or COA;



A is UR, N(R₁)R₂ or U¹N(=C)_n(R₃)R₄;

M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a corresponding base or basic compound;

U is oxygen or sulfur;

U¹ is oxygen or -N(R₅)-;

R is hydrogen, C₁-C₈alkyl, C₁-C₈alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy or by U-C₁-C₈alkyl, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄alkyl, C₃-C₆alkenyl, halo-substituted C₃-C₆alkenyl, C₃-C₆alkynyl, halo-substituted C₃-C₆alkynyl, (T)_n-C₃-C₈cycloalkyl, or a group selected from the following:



each of X^a, X^b and X^c, independently of the others, is hydrogen, halogen, hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, C₁-C₃alkyl-OOC, C₁-C₄alkyl, C₁-C₂haloalkyl having up to 5 halogen atoms, especially fluorine atoms;

or X^a is C₁-C₂haloalkoxy having up to 5 halogen atoms, nitro, dimethylamino, phenyl, phenoxy, benzyloxy, sulfamoyloxy and X^b and X^c are both hydrogen; or

X^a is phenyl, phenoxy or benzyloxy and X^b is halogen or methyl and X^c is hydrogen; or

X^a, X^b and X^c together are 4 or 5 fluorine atoms;

naphth is a naphthyl radical that is unsubstituted or is substituted by halogen, methyl, methoxy or by nitro;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, C₁-C₂alkyl or by a C₁-C₂alkoxycarbonyl-C₂-C₄alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- or -CH₂CH₂O-;



R₁ is hydrogen, C₁-C₅alkyl, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, C₁-C₅alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₁-C₅alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by C₁-C₂alkyl-OOC, C₃-C₅alkenyl, C₃-C₅alkenyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, C₃-C₅alkynyl, C₃-C₅alkynyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl, (T)_n-C₃-C₆cycloalkyl substituted by C₁-C₃alkyl-OOC, (T)_n-phenyl, or (T)_n-phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF₃, cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R₂ is hydrogen, hydroxy, C₁-C₃alkyl, C₁-C₃alkyl substituted by cyano or by C₁-C₃alkoxy, C₁-C₄alkoxy, a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R₁ and R₂ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R₃ is hydrogen, cyano, C₁-C₆alkyl, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R₄ is hydrogen, C₁-C₆alkyl, CONH₂, CONH-CONH-C₁-C₃alkyl, C₁-C₆alkanoyl, C₁-C₃alkanoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy, C₃-C₅alkenoyl, or C₃-C₅alkenoyl substituted by halogen or by C₁-C₃alkoxy;

R₃ and R₄ together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W';

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R₅ is hydrogen or methyl;

R₆ is hydrogen or C₁-C₄alkyl; and

n is 0 or 1;

with the exception of the compounds:

7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

4,6-dibromo-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;


benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid methyl ester;

6-chloro-7-cyanobenzo-1,2,3-thiadiazole;

6-chlorobenzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylic acid;

in which process


1. a compound of formula Ia



(Ia)

in which R, X, Y and U have the meanings given under formula I, is prepared by reacting:

1.1 a compound of formula II



(II)

in which L' is a leaving group, for example halogen, O-acyl, for example the acyl radical belonging to the symmetric anhydride of acid Ib, or 1-imidazolyl, with a compound of formula III

RUH (III)

a) in an excess of the reactant RUH or


b) in the presence of an organic base either with or without 4-dialkylaminopyridine as catalyst in an inert solvent or

c) in the presence of an inorganic base,

the reaction in each case being carried out in a temperature range of from -10° to 180° C,




preferably from 0° to 100°C; or
1.2 a compound of formula Ib



(Ib)

with a compound of formula III in excess or in an inert solvent in the presence of an acid, such as sulfuric acid, hydrochloric acid, p-toluenesulfonic acid or boron trifluoride/diethyl ether complex, or in the presence of dicyclohexylcarbodiimide at a temperature of from -10° to 180°C, preferably from 0° to 140°C; and

2. a compound of formula Ic



(Ic)

in which the symbols R₁, R₂, X and Y have the meanings given under formula I, is prepared by reacting:


2.1 a compound of formula II with a compound of formula IV



(IV)

- a) in an excess of the reactant HN(R₁)R₂ or
 - b) in the presence of an organic base either with or without 4-dialkylaminopyridine as catalyst in an inert solvent or
 - c) in the presence of an inorganic base,
- the reaction in each case being carried out in a temperature range of from -10° to 160°C, preferably from 0° to 100°C; and


3. a compound of formula Id



(Id),


in which A' is the radical U'ⁿN(=C)_n(R₃)R₄ and X, Y, R₃, R₄, R₅ and n have the meanings given under formula I, is prepared by:

3.1 reacting a compound of formula Ie




(Ie)

in which Z' is a group COOH, COCl, COOAlk¹ or an acyloxycarbonyl radical, for example




benzoyloxycarbonyl or acetoxy carbonyl, in which Alk¹ is C₁-C₄ alkyl, in the presence of a base, with a hydrazine derivative of formula V or VI



(V)

or



(VI)

in an inert solvent at a temperature of from -10° to 180°C, preferably from 0° to 100°C; or
3.2 reacting a compound of formula Ie stepwise first with hydrazine, and then reacting the resulting hydrazine compound

3.2.1 with the alkylating agent R₃-L or R₄-L in which L is a leaving group, in an inert solvent at a temperature of from 0° to 160°C, preferably from 20° to 120°C; or


3.2.2 with an aldehyde or ketone of formula R₃(R₄)C=O in which R₃ and R₄ have the meanings given under formula I, with or without the addition of an organic or inorganic acid, at a temperature of from -10° to 150°C, preferably from 20° to 100°C, and subsequently, if desired,

3.2.3 with an alkylating agent L-R₅ in which L is a leaving group, in the presence of a strong base in an inert solvent at a temperature of from -80° to 120°C, preferably from -40° to 80°C; or, if desired,

3.2.4 a) hydrogenating the hydrazone derivative prepared under (3.2.1) with hydrogen at a pressure of from 1 to 30x10⁵ Pa in the presence of a catalyst in admixture with activated carbon in an inert solvent at a temperature of from 0° to 100°C, or


3.2.4 b) treating the hydrazone derivative prepared under (3.2.1) with a complex metal hydride, for example sodium cyanoborohydride, in an inert solvent at a temperature of from -10° to 80°C, preferably from 0° to 50°C; and

4. a compound of formula If



(If),

in which the symbols X and Y have the meanings given under formula I, is prepared by treating a compound of formula Ig [prepared according to process (2)]




(Ig)


with a dehydrating agent in an inert solvent or without a solvent at a temperature of from -10° to 250° C, suitable dehydrating agents being:

- a) trifluoroacetic acid anhydride in the presence of a base, for example pyridine, in an inert solvent, for example tetrahydrofuran or dioxane, at a temperature of from -10° to 40° C; or
- b) chlorosulfonyl isocyanate in an inert solvent, for example tetrahydrofuran, at a temperature of from 0° to 65° C, with subsequent treatment with dimethylformamide;
- c) phosphorus pentoxide with or without an inert solvent, for example 1,2-dichloroethane, xylene or chlorobenzene, optionally in a bomb tube under elevated pressure, at from 50° to 250° C;


5.1 a compound of formula IL¹

(IL¹)

in which R_3 , R_4 , X and Y have the meanings given under formula I, is prepared by reacting an oxime derivative of formula




with an activated acid derivative of formula




in which AKS is a halogen, an O-acyl, for example the O-acyl radical of the free acid of the formula above, acetoxy or benzyloxy, or 1-imidazolyl, in an inert solvent and a base at from -20° C to 120° C, preferably from 0° to 50° C, or by reacting the free acid (= Ib) in the presence of dicyclohexylcarbodiimide under the same conditions;

5.2 a compound of formula IL²


(IL²)

in which R_3 , R_4 , X and Y have the meanings given under formula I, is prepared by reduction of a compound of formula IL¹

(IL¹)


- a) with a silane, for example triethylsilane, in the presence of an acid, for example trifluoroacetic acid, at from 0° to 80° C, or
 b) with sodium cyanoborohydride in the presence of an organic acid, for example acetic acid, at from 0° to 80° C, or
 c) by catalytic methods, for example with Pt/H₂.

25. A process for the preparation of a compound of formula Ik



(Ik)

by diazotisation of a compound of formula XI'




(XI')

in an acidic medium with a nitrite compound at from -40° to 30° C and, in the same reaction vessel or in a second reaction vessel, treatment with a reducing agent at from -40° to 80° C, preferably at from -30° to 30° C, the reducing agent being added before, after or at the same time as the nitrite compound, the substituents of the compounds having the following meanings:

X' is hydrogen, halogen, methyl, methoxy or COOH;

E^b is a readily removable group, for example hydrogen, C₁-C₁₆ alkyl, for example methyl, ethyl, isopropyl, n-dodecyl, or benzyl or acyl, for example acetyl or the sulfonic acid radical (-SO₃H-) or cyano, or as part of a disulfide bridge, is a second radical



Z^b is cyano or COA;


A is UR, N(R₁)R₂ or U¹N(=C)(R₃)R₄;

M is the molar equivalent of an alkali metal or alkaline earth metal ion that has been formed from a corresponding base or basic compound;

U is oxygen or sulfur;

U¹ is oxygen or -N(R₅)-;

R is hydrogen, C₁-C₈ alkyl, C₁-C₈ alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy or by U-C₁-C₃ alkyl, (T)-COOH or (T)-COOC₁-C₄ alkyl, C₃-C₆ alkenyl, halo-substituted C₃-C₆ alkenyl, C₃-C₆ alkynyl, halo-substituted C₃-C₆ alkynyl, (T)_n-C₃-C₈ cycloalkyl, or a group selected from the following:



each of X^a , X^b and X^c , independently of the others, is hydrogen, halogen, hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, $\text{C}_1\text{-C}_3\text{alkyl-OOC}$, $\text{C}_1\text{-C}_4\text{alkyl}$, $\text{C}_1\text{-C}_4\text{alkoxy}$, $\text{C}_1\text{-C}_2\text{haloalkyl}$ having up to 5 halogen atoms, especially fluorine atoms;

or X^a is $\text{C}_1\text{-C}_2\text{haloalkoxy}$ having up to 5 halogen atoms, nitro, dimethylamino, phenyl, phenoxy, benzyloxy, sulfamoyloxy and X^b and X^c are both hydrogen; or

X^a is phenyl, phenoxy or benzyloxy and X^b is halogen or methyl and X^c is hydrogen; or

X^a , X^b and X^c together are 4 or 5 fluorine atoms;

naphth is a naphthyl radical that is unsubstituted or is substituted by halogen, methyl, methoxy or by nitro;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, $\text{C}_1\text{-C}_2\text{alkyl}$ or by a $\text{C}_1\text{-C}_2\text{alkoxycarbonyl-C}_2\text{-C}_4\text{alkyleneimino}$ radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ or $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 is hydrogen, $\text{C}_1\text{-C}_5\text{alkyl}$, $\text{C}_1\text{-C}_5\text{alkyl}$ interrupted by an oxygen or sulfur atom, $\text{C}_1\text{-C}_5\text{alkyl}$ substituted by halogen, cyano, HOOC or by $\text{C}_1\text{-C}_2\text{alkyl-OOC}$, $\text{C}_1\text{-C}_5\text{alkyl}$ interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by $\text{C}_1\text{-C}_2\text{alkyl-OOC}$, $\text{C}_3\text{-C}_5\text{alkenyl}$, $\text{C}_3\text{-C}_5\text{alkenyl}$ substituted by $\text{C}_1\text{-C}_3\text{alkyl-OOC}$, $\text{C}_3\text{-C}_5\text{alkynyl}$, $\text{C}_3\text{-C}_5\text{alkynyl}$ substituted by $\text{C}_1\text{-C}_3\text{alkyl-OOC}$, $(\text{T})_n\text{-C}_3\text{-C}_5\text{cycloalkyl}$, $(\text{T})_n\text{-C}_3\text{-C}_5\text{cycloalkyl}$ substituted by $\text{C}_1\text{-C}_3\text{alkyl-OOC}$, $(\text{T})_n\text{-phenyl}$, or $(\text{T})_n\text{-phenyl}$ substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF_3 , cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R_2 is hydrogen, hydroxy, $\text{C}_1\text{-C}_3\text{alkyl}$, $\text{C}_1\text{-C}_3\text{alkyl}$ substituted by cyano or by $\text{C}_1\text{-C}_3\text{alkoxy}$, $\text{C}_1\text{-C}_4\text{alkoxy}$, a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R_1 and R_2 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R_3 is hydrogen, cyano, $\text{C}_1\text{-C}_5\text{alkyl}$, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R_4 is hydrogen, $\text{C}_1\text{-C}_6\text{alkyl}$, CONH_2 , $\text{CONH-CONH-C}_1\text{-C}_3\text{alkyl}$, $\text{C}_1\text{-C}_6\text{alkanoyl}$, $\text{C}_1\text{-C}_3\text{alkanoyl}$ substituted by halogen or by $\text{C}_1\text{-C}_3\text{alkoxy}$, $\text{C}_3\text{-C}_5\text{alkenoyl}$, or $\text{C}_3\text{-C}_5\text{alkenoyl}$ substituted by halogen or by $\text{C}_1\text{-C}_3\text{alkoxy}$;

R_3 and R_4 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W';

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;


R_5 is hydrogen or methyl;

R_6 is hydrogen or $\text{C}_1\text{-C}_4\text{alkyl}$; and


n is 0 or 1;

with the exception of primary or secondary amino groups, UH or nitro groups, $\text{Si}(\text{C}_1\text{-C}_8\text{alkyl})_3$ or phosphorus-containing radicals.

26. A process for the preparation of a compound of formula




by diazotisation of a compound of formula



in an acidic medium with a nitrite compound at from -20° to 30°C , and in the same reaction vessel treatment with a reducing agent at from -20° to 80°C , preferably at from 20° to 30°C , the reducing agent being added before, after or at the same time as the nitrite compound, the substituents of the compounds having the following meanings:

R^a is hydrogen, C_1 - C_8 alkyl, C_1 - C_8 alkyl that is substituted by halogen, cyano, nitro, hydroxy or by U- C_1 - C_8 alkyl, (T)-COOH or (T)-COOC $_1$ - C_4 alkyl, C_3 - C_5 alkenyl, halo-substituted C_3 - C_6 alkenyl, C_3 - C_6 alkynyl, halo-substituted C_3 - C_6 alkynyl, (T) $_n$ - C_3 - C_8 cycloalkyl, or a group selected from the following:



each of X^a , X^b and X^c , independently of the others, is hydrogen, halogen, hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, C_1 - C_3 alkyl-OOC, C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, C_1 - C_2 haloalkyl having up to 5 halogen atoms, especially fluorine atoms;

or X^a is C_1 - C_2 haloalkoxy having up to 5 halogen atoms, nitro, dimethylamino, phenyl, phenoxy, benzyloxy, sulfamoyloxy and X^b and X^c are both hydrogen; or

X^a is phenyl, phenoxy or benzyloxy and X^b is halogen or methyl and X^c is hydrogen; or

X^a , X^b and X^c together are 4 or 5 fluorine atoms;

naphth is a naphthyl radical that is unsubstituted or is substituted by halogen, methyl, methoxy or by nitro;

W is a 5- to 7-membered saturated or unsaturated heterocycle having from 1 to 3 hetero atoms from the group O, N and S that is unsubstituted or is substituted by halogen, trifluoromethyl, cyano, C_1 - C_2 alkyl or by a C_1 - C_2 alkoxycarbonyl- C_2 - C_4 alkyleneimino radical, or is a monosaccharide radical;

T is a bridge member $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ or $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 is hydrogen, C_1 - C_5 alkyl, C_1 - C_5 alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom, C_1 - C_5 alkyl substituted by halogen, cyano, HOOC or by C_1 - C_2 alkyl-OOC, C_1 - C_5 alkyl interrupted by an oxygen or sulfur atom and substituted by halogen, cyano, HOOC or by C_1 - C_2 alkyl-OOC, C_3 - C_5 alkenyl, C_3 - C_5 alkenyl substituted by C_1 - C_3 alkyl-OOC, C_3 - C_5 alkynyl, C_3 - C_5 alkynyl substituted by C_1 - C_3 alkyl-OOC, (T) $_n$ - C_3 - C_6 cycloalkyl, (T) $_n$ - C_3 - C_6 cycloalkyl substituted by C_1 - C_3 alkyl-OOC, (T) $_n$ -phenyl, or (T) $_n$ -phenyl substituted in the phenyl moiety by halogen, hydroxy, methyl, CF_3 , cyano, methoxy, HOOC or by MOOC;

R_2 is hydrogen, hydroxy, C_1 - C_3 alkyl, C_1 - C_3 alkyl substituted by cyano or by C_1 - C_3 alkoxy, C_1 - C_4 alkoxy, a 3- to 6-membered saturated or unsaturated heterocycle containing O, N or S as hetero atoms;

R_1 and R_2 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W;

R_3 is hydrogen, cyano, C_1 - C_6 alkyl, phenyl, phenyl substituted by halogen, hydroxy, methyl, methoxy, HOOC or by MOOC, or a heterocycle W;

R_4 is hydrogen, C_1 - C_6 alkyl, CONH $_2$, CONH-CONH- C_1 - C_3 alkyl, C_1 - C_6 alkanoyl, C_1 - C_3 alkanoyl substituted by halogen or by C_1 - C_3 alkoxy, C_3 - C_5 alkenoyl, or C_3 - C_5 alkenoyl substituted by halogen or by C_1 - C_3 alkoxy;

R_3 and R_4 together with the atom to which they are bonded are a heterocycle W or a carbocyclic ring W';

W' is a carbocyclic radical having from 3 to 7 ring carbon atoms;

R_5 is hydrogen or methyl;

R_6 is hydrogen or C_1 - C_4 alkyl; and

n is 0 or 1;

with the exception of radicals containing UH or nitro groups and silicon- or phosphorus-containing



radicals, and

E^b is a readily removable group, for example hydrogen, C₁-C₁₆alkyl, for example methyl, ethyl, isopropyl, n-dodecyl, or benzyl or acyl, for example acetyl or the sulfonic acid radical (-SO₃H-) or cyano.

27. The use of a compound of formula I according to claim 1 or claim 2, for the immunisation of plants against diseases.


28. Use of a compound of formula I' according to claim 20 for the immunisation of plants against diseases.

29. Use of 7-methoxycarbonylbenzo-1,2,3-thiadiazole as active ingredient in the preparation of a composition for the immunisation of plants against attack by phytopathogenic microorganisms.

Revendications

Revendications pour les Etats contractants suivants : AT, BE, CH, DE, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE

1. Procédé d'immunisation de végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes, caractérisé en ce qu'on applique sur les végétaux et/ou sur leur environnement, comme matière active, un composé ayant la formule I ci-après :



(I)


dans laquelle :

X est un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;

Y est un hydrogène, un halogène ou un radical SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy ou amino, M étant l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ; et

Z est le radical cyano ou -CO-A, où A est OH ou SH, H pouvant aussi être remplacé par l'équivalent molaire d'un résidu cationique minéral ou organique.

2. Procédé d'immunisation de végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes, caractérisé en ce qu'on applique sur les végétaux et/ou sur leur environnement, comme matière active, un composé ayant la formule I ci-après :



(I)

dans laquelle :

X est un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;

Y est un hydrogène, un halogène ou un radical SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy ou amino, M étant l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ; et

Z est le radical cyano ou -CO-A,

A est UR, N(R₁)R₂ ou U'¹N(=C)_n(R₃)R₄ ;

M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;


U est l'oxygène ou le soufre ;

U'¹ est l'oxygène ou -N(R₅)- ;

R est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈, un radical alkyle en C₁-C₈ substitué par



halogène, cyano, nitro, hydroxy, U-(alkyle en C₁-C₃) ou di-(alkyle en C₂-C₄)-amino ou interrompu par le groupe CO ; (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C₁-C₄), alcényle en C₃-C₆, alcényle en C₃-C₆ à substituant halogène, alcynyle en C₃-C₆, alcynyle en C₃-C₆ à substituant halogène, (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₈), ou encore un groupe de la série :



X^a, X^b et X^c, chacun indépendamment l'un de l'autre, représentent un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, (alkyle en C₁-C₃)-OOC, alkyle en C₁-C₄, alcoxy en C₁-C₄, halogéno-(alkyle en C₁-C₂) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène, en particulier des atomes de fluor ; ou bien X^a est un radical halogéno-(alcoxy en C₁-C₂) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène ou un radical nitro, diméthylamino, phényle, phényloxy, benzyloxy, sulfamoyleoxy, et X^b et X^c sont simultanément des atomes d'hydrogène ; ou bien

X^a est le radical phényle, phényloxy ou benzyloxy, et X^b est un halogène ou le radical méthyle et X^c est un hydrogène ; ou bien

X^a , X^b et X^c sont ensemble 4 ou 5 atomes de fluor :

Napht est un résidu naphthyle non substitué, ou substitué par halogéno, méthyle, méthoxy ou nitro ;

W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en C₁-C₂ ou par un radical (alcoxy en C₁-C₂)-carbonyle-(alkylène en C₂-C₄)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide :

T représente les chaînons pontants $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CCH}_3(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ ou $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$:

R₁ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₅, un radical alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en C₁-C₅ substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou un atome de soufre et substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alcényle en C₃-C₅ ; alcényle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; alcynyle en C₃-C₅ ; alcynyle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆ ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆) substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-phényle ou (T)_n-phényle substitué dans la partie phényle par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF₃, cyano, HOOC ou MOOC ;

R₂ est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en C₁-C₃, alkyle en C₁-C₃ substitué par cyano ou alcoxy en C₁-C₃, alcoxy en C₁-C₄, ou encore un hétérocycle à 3-6 chaînons, saturé ou insaturé, comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R₁ et R₂, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R₃ est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C₁-C₆, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R₄ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₆, CONH₂, CONH-CONH-(alkyle en C₁-C₃), alcanoyle en C₁-C₃, alcanoyle en C₁-C₃ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃, alcénoyle en C₃-C₅ ou alcénoyle en C₃-C₅ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃ ;

R₃ et R₄, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' :

W est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le cycle :

R₅ est un hydrogène ou le radical méthyle :

R₆ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄ ; et

n vaut zéro ou 1 :

où dans les composés de formule I, le résidu organique A a une masse moléculaire inférieure à 900 ; et, quand U est un oxygène ou un soufre, ces composés englobent les sels de l'acide 7-carboxylique, compatibles du point de vue phytosanitaire, avec des amines primaires, secondaires ou tertiaires ou des bases minérales.



3. Procédé selon les revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la quantité appliquée est inférieure à 1 kg SA/ha.

4. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on l'utilise des composés de formule I dans laquelle :

X et Y représentent chacun un hydrogène ;

Z est le radical cyano ou COA ;

A est UR ou U'N(=C)_n(R₃)R₄ ;

U est l'oxygène ;

U' est l'oxygène ou -N(R₅)- ;

R est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈, alkyle en C₁-C₈ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₈, alcényle en C₃-C₆, alcényle en C₃-C₆ substitué par halogéno, alcynyle en C₃-C₆, alcynyle en C₃-C₆ substitué par halogéno, (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₈), benzyle, benzyle halogéné, benzylméthoxy, (T)_n-Si(CH₃)₃, (T)-P(O)(alkyle en C₁-C₄)CH₃, (T)-P(O)(O-alkyle en C₁-C₄)₂ ou le groupe (T)_n-W ;

W est un hétérocycle à 5-7 chaîons, saturé ou insaturé, non substitué et ayant 1 à 3 hétéro-atomes du groupe O, N et S, ou encore le diacétone-D-glucosidyle ;

T représente les chaîons pontants -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CCH₃(CH₃)- ou -CH₂CH₂CH₂- ;

R₃ est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C₁-C₆, phényle ou W ;

R₄ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₆, CONH₂, CONH-CONH-(alkyle en C₁-C₃), alcanoylo en C₁-C₃ ou alcénoylo en C₃-C₅ ;

R₃ et R₄, avec l'atome auquel ils sont liés, représentent W ou W' ;


W est un hétérocycle à 5-7 chaîons, saturé ou insaturé, ayant 1 à 3 hétéro-atomes du groupe O, N et S ;

W' est un résidu du groupe



n vaut zéro ou 1.

5. Composés de formule I'



(I')

dans laquelle :

X est un hydrogène ou un radical halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;

Y est un hydrogène ou un radical halogéno, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy ou amino ;

Z est le radical cyano ou COA ;


A est UR, N(R₁)R₂ ou U'N(=C)_n(R₃)R₄ ;

M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;

U est l'oxygène ou le soufre ;

U' est l'oxygène ou -N(R₅)- ;

R est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈, un radical alkyle en C₁-C₈ substitué par halogéno, cyano, nitro, hydroxy ou U-(alkyle en C₁-C₃), (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C₁-C₄), alcényle en C₃-C₆, alcényle en C₃-C₆ à substituant halogène, alcynyle en C₃-C₆, alcynyle en C₃-C₆ à substituant halogène, (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₈), ou encore un groupe de la série :



X^a , X^b et X^c , chacun indépendamment l'un de l'autre, représentent un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$)-OOC, alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_4$, alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_4$, halogéno-(alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_2$) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène, en particulier des atomes de fluor ; ou bien X^a est un radical halogéno-(alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_2$) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène ou un radical nitro, diméthylamino, phényle, phényloxy, benzyloxy, sulfamoyloxy, et X^b et X^c sont simultanément des atomes d'hydrogène ; ou bien

X^a est le radical phényle, phényloxy ou benzyloxy, et X^b est un halogène ou le radical méthyle et X^c est un hydrogène ; ou bien

X^a , X^b et X^c sont ensemble 4 ou 5 atomes de fluor ;

Napht est un résidu naphtyle non substitué, ou substitué par halogéno, méthyle, méthoxy ou nitro ;

W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaîons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_2$ ou par un radical (alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_2$)-carbonyle-(alkylène en $\text{C}_2 - \text{C}_4$)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaîons pontants $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ ou $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 est un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_5$, un radical alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_5$ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_5$ substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_2$)-OOC ; alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_5$ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre et substitué par halogéno, cyano, HYOOO ou (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_2$)-OOC ; alcényle en $\text{C}_3 - \text{C}_5$; alcényle en $\text{C}_3 - \text{C}_5$ substitué par (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$)-OOC ; alcynyle en $\text{C}_3 - \text{C}_5$; alcynyle en $\text{C}_3 - \text{C}_5$ substitué par (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$)-OOC ; $(\text{T})_n$ -cycloalkyle en $\text{C}_3 - \text{C}_6$; $(\text{T})_n$ -cyclo(alkyle en $\text{C}_3 - \text{C}_6$) substitué par (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$)-OOC ; $(\text{T})_n$ -phényle ou $(\text{T})_n$ -phényle substitué dans la partie phényle par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF_3 , cyano, HOOC ou MOOC ;

R_2 est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$, alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$ substitué par cyano ou alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_3$, alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_4$, ou encore un hétérocycle à 3-6 chaîons, saturé ou insaturé, comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R_1 et R_2 , avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R_3 est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_6$, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R_4 est un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_6$, CONH_2 , CONH-CONH- (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$), alcanoyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$, alcanoyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$ substitué par halogéno ou alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_3$, alcénoyle en $\text{C}_3 - \text{C}_5$ ou alcénoyle en $\text{C}_3 - \text{C}_5$ substitué par halogéno ou alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_3$;

R_3 et R_4 , avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le noyau ;

R_5 est un hydrogène ou le radical méthyle ;

R_6 est un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_4$; et

n vaut zéro ou 1 ;

à l'exception des composés suivants :

7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4,6-dibromo-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;


ester méthylique de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;

6-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

acide 6-chloro-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique.



6. Composés de formule I'



(I')

dans laquelle :

X est un hydrogène ou un radical halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;

Y est un hydrogène ou un radical halogéno, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy ou amino ;

Z est le radical cyano ou COA ;



A est UR, N(R₁)R₂ ou U'¹N(=C)_n(R₃)R₄ ;

M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;

U est l'oxygène ou le soufre ;

U'¹ est l'oxygène ou -N(R₅)- ;

R est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈, un radical alkyle en C₁-C₈ substitué par halogéno, cyano, nitro, hydroxy, alcoxy ou U-(alkyle en C₁-C₃), (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C₁-C₄), alcényle en C₂-C₆, alcényle en C₃-C₆ à substituant halogène, alcynyle en C₃-C₆, alcynyle en C₃-C₆ à substituant halogène, (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₈), ou encore un groupe de la série :



W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaîons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en C₁-C₂ ou par un radical (alcoxy en C₁-C₂)-carbonyle-(alkylène en C₂-C₄)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaîons pontants -CH₂-, -CH₂CH₂-, ou CH(CH₃)- ;

R₁ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₅, un radical alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en C₁-C₅ substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre et substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alcényle en C₃-C₅ ; alcényle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; alcynyle en C₃-C₅ ; alcynyle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆) ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆) substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-phényle ou (T)_n-phényle substitué dans la partie phényle par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF₃, cyano, HOOC ou MOOC ;

R₂ est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en C₁-C₃, alkyle en C₁-C₃ substitué par cyano ou alcoxy en C₁-C₃, alcoxy en C₁-C₄, ou encore un hétérocycle à 3-6 chaîons, saturé ou insaturé, comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R₁ et R₂, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R₃ est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C₁-C₆, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R₄ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₆, CONH₂, CONH-CONH-(alkyle en C₁-C₃), alcanoylo en C₁-C₃, alcanoylo en C₁-C₃ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃, alcénoylo en C₃-C₅ ou alcénoylo en C₃-C₅ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃ ;

R₃ et R₄, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le noyau ;



R₅ est un hydrogène ou le radical méthyle ;
 R₆ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄ ; et
 n vaut zéro ou 1 ;

à l'exception des composés suivants :

- 5 7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 4-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 4,6-dibromo-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;
- ester méthylique de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;
- 10 6-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- acide 6-chloro-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique.

7. Composés de formule I' selon la revendication 5, dans lesquels Z = COA et R a une signification autre qu'hydrogène et alkyle non substitué.

8. Composés de formule I' selon la revendication 5, appartenant au groupe suivant :

- 7-n-pentoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-(4-méthoxy-benzyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-(cycloheximino-oxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 20 7-(3-hydroxy-n-propoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 1,2,5,6-di-O-isopropylidène-3-(7-benzo-1,2,3-thiadiazol)D-glucosurannose ;
- 7-furfuryloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-(1,2,4-triazole-1-yl)-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-(2-pyridylméthoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 25 7-triméthylsilyl-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7[2-(triméthylsilyl)-éthoxycarbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-diméthylphosphono-éthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-cyclohexyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-(1-phénéthyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 30 7-(3-méthoxybenzyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-(éthylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-(n-propylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-(benzylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-carbamoyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 35 7-N-phénylcarbamoyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- N-(7-benzo-1,2,3-thiadiazolyle)-glycine ;
- 7-(N-diallylcarbamoyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 6-fluoro-7-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 6-fluoro-7-carboxy-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 40 5-fluoro-7-benzyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 5-fluoro-7-carboxy-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 5-fluoro-7-éthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole.

9. Composés de formule I' selon la revendication 6, appartenant au groupe suivant :

- 45 7-éthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-n-propoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-iso-propoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-n-butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-sec-butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 50 7-tert-butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-cyclopropylméthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-(2'-phénéthoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-benzyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 7-allyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 55 7-propyn-2-yloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
- 2-(7-benzo-1,2,3-thiadiazolyloxy-imino)-2-cyano-N-(éthylaminocarbonyl)-acétamide ;
- Sel de Na de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;
- Sel de K de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;



Sel de triéthylammonium de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;

7-(1'-phénéthoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(1'-naphthylméthoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(méthylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(éthylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(benzylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-[(di-cyanométhyl)-amino-carbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

Ester méthylique de l'acide 3-[(N-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazole-2-ylamino]-2-méthylpropénecarboxylique ;

Ester méthylique de l'acide 3-[(N-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazole-2-ylamino]-2-éthylpropénecarboxylique ;

1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(A-méthylpropylidène)-hydrazine ;

1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclobutylidène)-hydrazine ;

1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclopentylidène)-hydrazine ;

1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclohexylidène)-hydrazine ;

2-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-1-(2'-sec-butyl)-hydrazine ;

1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclopentyl)-hydrazine ;

1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclohexyl)-hydrazine ;

1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cycloheptyl)-hydrazine ;

1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-1,2-diacétyl-hydrazine ;

1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-phényl-hydrazine ;

1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-pyridine-2'-yl-hydrazine.

10. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise des composés de formule I' selon la revendication 5.

11. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise des composés de formule I' selon la revendication 6.

12. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise des composés de formule I' selon la revendication 7.

13. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise comme matière active l'acide 1,2,3-benzothiadiazole-7-carboxylique ou un de ses sels avec un composé basique.

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'on utilise comme sels des sels obtenus avec des amines primaires, secondaires ou tertiaires ou des composés de métaux alcalins ou alcalino-terreux.

15. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise comme matière active le 7-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole.

16. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise comme matière active le 7-benzoyloxy-carbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole.

17. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise comme matière active le 7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole.

18. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise comme matières actives des composés 7-(alcoxy en C₂-C₄)-carbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole.


19. Produit destiné à immuniser les végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes, contenant comme matière active au moins un composé de formule I selon la revendication 1 ou 2 à l'exception des composés 7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole, 4-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole, 6-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole, 4,6-dibromo-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole et 7-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole.

20. Produit destiné à l'immunisation des végétaux contre une infestation par des micro-organismes



phytopathogènes, contenant comme matière active au moins un composé de formule I' selon la revendication 5.






21. Produit destiné à l'immunisation des végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes, contenant comme matière active au moins un composé de formule I' selon la revendication 6.
22. Produit selon la revendication 19, caractérisé en ce qu'il contient comme matière active au moins un composé de formule I' selon la revendication 7.
23. Produit selon la revendication 19, caractérisé en ce qu'il contient comme matière active au moins un composé selon l'une des revendications 8 ou 9.
24. Produit selon la revendication 19, caractérisé en ce qu'il contient comme matière active au moins l'un des composés acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ou 7-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole.
25. Produit selon la revendication 19, caractérisé en ce qu'il contient comme matière active de l'acide 1,2,3-benzothiadiazole-7-carboxylique ou un de ses sels avec un composé basique.
26. Produit selon la revendication 25, caractérisé en ce qu'on utilise comme sels des sels avec des amines primaires, secondaires ou tertiaires ou avec des composés de métaux alcalins ou alcalino-terreux.
27. Procédé de préparation de composés de formule I'



(I')

dans laquelle :

- X est un hydrogène ou un radical halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;
 Y est un hydrogène ou un radical halogéno, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy ou amino ;
 Z est le radical cyano ou COA ;
 A est UR, N(R₁)R₂ ou U'N(=C)_n(R₃)R₄ ;
 M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;
 U est l'oxygène ou le soufre ;
 U' est l'oxygène ou -N(R₅)- ;
 R est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈, un radical alkyle en C₁-C₈ substitué par halogéno, cyano, nitro, hydroxy ou U-(alkyle en C₁-C₈), (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C₁-C₄), alcényle en C₃-C₆, alcényle en C₃-C₆ à substituant halogène, alcynyle en C₃-C₆, alcynyle en C₃-C₆ à substituant halogène, (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₈), ou encore un groupe de la série :



X^a, X^b et X^c, chacun indépendamment l'un de l'autre, représentent un hydrogène, un halogène ou



un radical hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, (alkyle en C₁-C₃)-OOC, alkyle en C₁-C₄, alcoxy en C₁-C₄; halogéno-(alkyle en C₁-C₂) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène, en particulier des atomes de fluor; ou bien X^a est un radical halogéno-(alcoxy en C₁-C₂) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène ou un radical nitro, diméthylamino, phényle, phényloxy, benzyloxy, sulfamoyloxy, et X^b et X^c sont simultanément des atomes d'hydrogène; ou bien

X^a est le radical phényle, phényloxy ou benzyloxy, et

X^b est un halogène ou le radical méthyle et X^c est un hydrogène; ou bien

X^a, X^b et X^c sont ensemble 4 ou 5 atomes de fluor;

Napht est un résidu naphthyle non substitué, ou substitué par halogéno, méthyle, méthoxy ou nitro;

W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaîons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en C₁-C₂ ou par un radical (alcoxy en C₁-C₂)-carbonyle-(alkylène en C₂-C₄)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide;

T représente les chaîons pontants -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- ou -CH₂CH₂O-;

R₁ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₅, un radical alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre; alkyle en C₁-C₅ substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC; alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou un atome de soufre et substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC; alcényle en C₃-C₅; alcényle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC; alcynyle en C₃-C₅; alcynyle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₅); (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₅) substitué par alkyle en C₁-C₃-OOC; (T)_n-phényle ou (T)_n-phényle substitué dans la partie phényle par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF₃, cyano, HOOC ou MOOC;

R₂ est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en C₁-C₃, alkyle en C₁-C₃ substitué par cyano ou alcoxy en C₁-C₃, alcoxy en C₁-C₄, ou encore un hétérocycle à 3-6 chaîons saturé ou insaturé comportant O, N ou S comme hétéro-atomes;

R₁ et R₂, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W;

R₃ est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C₁-C₆, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W;

R₄ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₆, CONH₂, CONH-CONH-(alkyle en C₁-C₃), alcanoylo en C₁-C₆, alcanoylo en C₁-C₃ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃, alcénoylo en C₃-C₅ ou alcénoylo en C₃-C₅ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃;

R₃ et R₄, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W';

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le noyau;

R₅ est un hydrogène ou le radical méthyle;

R₆ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄; et

n vaut zéro ou 1;

à l'exception des composés suivants:

7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole;

4-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole;

4,6-dibromo-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole;

acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique;


ester méthylique de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique;

6-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole;

acide 6-chloro-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique,

caractérisé en ce que:


1. on prépare des composés de formule la



(Ia)

dans laquelle R, X, Y et U ont les significations données pour la formule I, en faisant réagir:

1.1. des composés de formule II




(II)

dans laquelle L' est un groupe éliminable, par exemple un halogène, un groupe O-acyle comme par exemple le résidu acyle appartenant à l'anhydride symétrique de l'acide Ib, ou encore le groupe 1-imidazolyle, avec des composés de formule III

RUH (III)


- a) en présence d'un excès du réactif RUH, ou bien
 - b) en présence d'une base organique, avec ou sans 4-dialkylaminopyridine servant de catalyseur, dans des solvants inertes, ou bien
 - c) en présence de bases minérales, en travaillant dans chaque cas dans l'intervalle de températures de -10° à 180°C et de préférence de 0° à 100°C ; et
- 1.2. des composés de formule Ib



(Ib)

avec des composés de formule III en excès ou dans un solvant inerte, en présence d'un acide tel que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide p-toluènesulfonique ou le complexe trifluorure de bore-diéthyléther, ou encore de dicyclohexylcarbodiimide, à des températures de -10° à 180°C et de préférence de 0° à 140°C ; et

2. on préparé des composés de formule Ic



(Ic)

dans laquelle les symboles R_1 , R_2 , X et Y ont les significations données pour la formule I, en faisant réagir :

2.1. des composés de formule II avec des composés de formule IV




(IV)

- a) en présence d'un excès de réactif $\text{HN}(\text{R}_1)\text{R}_2$ ou bien
- b) en présence d'une base organique, avec ou sans 4-dialkylaminopyridine servant de catalyseur dans des solvants inertes, ou bien
- c) en présence de bases minérales, en travaillant dans chaque cas dans l'intervalle de températures de -10° à 160°C et de préférence de 0° à 100°C ; et




3. on prépare des composés de formule Id



(Id)


dans laquelle A' est le résidu $U'N(=C)_n(R_3)R_4$, et X, Y, R_3 , R_4 , R_5 et n ont les significations données pour la formule I, en faisant réagir

3.1. des composés de formule Ie




(Ie)


dans laquelle Z' est le groupe COOH, COCl, COOAlk¹ ou un résidu acyloxycarbonyle, comme par exemple



benzoyloxycarbonyle ou acétyloxycarbonyle, Alk¹ représentant un radical alkyle en C₁-C₄, en présence d'une base, avec des dérivés de l'hydrazine de formules V ou VI



(V) ou



(VI)

dans un solvant inerte à des températures de -10° à 180° C et de préférence de 0° à 100° C ; ou

3.2. on fait réagir par étapes des composés de formule Ie, d'abord avec l'hydrazine, puis on fait réagir les dérivés obtenus de l'hydrazine

3.2.1. avec l'agent d'alkylation R_3-L ou R_4-L , où L est un groupe éliminable, dans un solvant inerte, à des températures de 0° à 160° C et de préférence de 20° à 120° C ; ou bien

3.2.2. avec un aldéhyde ou une cétone de formule $R_3(R_4)C=O$, où R_3 et R_4 ont les significations données pour la formule I, avec ou sans addition d'un acide minéral ou organique, à des températures de -10° à 150° C et de préférence de 20° à 100° C, puis, si on le souhaite,

3.2.3. avec un agent d'alkylation $L-R_5$, où L est un groupe éliminable, en présence d'une base forte, dans un solvant inerte, à des températures de -80° à 120° et de préférence de -40° à 80° C ; ou encore, si on le souhaite


3.2.4.

a) on hydrogène les dérivés hydrazones préparés en 3.2.1. à l'aide d'hydrogène sous une pression de 1 à $30 \cdot 10^5$ Pa, en présence d'un catalyseur en mélange avec du charbon activé, dans un solvant inerte, à des températures de 0° à 100° C, ou bien

b) on traite les dérivés hydrazones préparés en 3.2.1. avec un hydrure métallique complexe tel que le cyanoborohydrure de Na, dans un solvant inerte, à des températures de -10° à 80° et de préférence de 0° à 50° C ; et




4. on prépare des composés de formule If



(If)

dans laquelle les symboles X et Y ont les significations données pour la formule I, en traitant des composés de formule Ig [préparés par le procédé (2)]



(Ig)


avec un agent de déshydratation, dans un solvant inerte ou sans solvant, à des températures de -10° à 250°C , auquel cas on utilise comme agent de déshydratation :

a) de l'anhydride trifluoracétique en présence d'une base comme par exemple la pyridine, dans un solvant inerte tel par exemple que le tétrahydrofurane ou le dioxanne, à des températures de -10° à 40°C ; ou bien

b) de l'isocyanate de chlorosulfonyle dans un solvant inerte, comme par exemple le tétrahydrofurane, à des températures de 0° à 65°C , opération suivie d'un traitement au diméthylformamide ;


c) du pentoxyde de phosphore, avec ou sans solvant inerte comme par exemple le 1,2-dichlorométhane, le xylène ou le chlorobenzène, éventuellement dans une bombe tubulaire sous pression élevée, à une température de 50° à 250°C ;

5.1. on prépare des composés de formule IL₁




(IL₁)

dans laquelle R₃, R₄, X et Y ont les significations données pour la formule I, en faisant réagir des dérivés oximes de formule




avec des dérivés d'acide activés de formule




où AKS désigne un halogène, un radical O-acyle comme par exemple le résidu O-acyle de l'acide libre ayant la formule ci-dessus, le radical acétoxy ou benzoxyloxy, ou encore 1-imidazolyle, dans un solvant inerte et une base, à une température de -20° à 120° et de préférence de 0° à 50°C , ou



encore l'acide libre (= lb) en présence de dicyclohexylcarbodiimide dans les mêmes conditions ;
5.2. on prépare des composés de formule IL₂


(IL₂)

dans laquelle R₃, R₄, X et Y ont les significations données pour la formule I, par réduction de composés de formule IL₁

(IL₁)


- a) avec un silane, par exemple le triéthylsilane, en présence d'un acide tel que l'acide trifluoracétique, à une température de 0° à 80° C, ou bien
- b) avec du cyanoborohydrure de sodium en présence d'un acide organique tel que l'acide acétique, à une température de 0° à 80° C, ou bien
- c) par voie catalytique, par exemple avec Pt/H₂.

28. Procédé de préparation de composés de formule Ik



(Ik)

qui consiste à diazoter un composé de formule XI'




(XI')

en milieu acide, avec un composé nitrite, à une température de -40° à 30° C, et à le traiter, dans le même réacteur ou dans un autre réacteur, avec un réducteur à une température de -40° à 80° et de préférence de -30° à 30° C, le réducteur étant ajouté avant ou après le composé nitrite ou en même temps que ce dernier, les substituants des composés ayant les significations suivantes :

X' est un hydrogène, un halogène ou le radical méthyle, méthoxy ou COOH ;

E^b est un groupe facilement éliminable comme par exemple un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₁₆, par exemple méthyle, éthyle, isopropyle ou n-dodécyle, ou benzyle ou encore acyle, par exemple acétyle, ou un résidu acide sulfonique (-SO₃H) ou cyano, ou encore, comme élément d'un pont disulfure, un deuxième résidu



Z^b est le radical cyano ou COA ;



A est UR, $\text{N}(\text{R}_1)\text{R}_2$ ou $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$;

M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;

U est l'oxygène ou le soufre ;

U' est l'oxygène ou $-\text{N}(\text{R}_5)-$;

R est un hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_8 , un radical alkyle en C_1-C_8 substitué par halogéno, cyano, nitro, hydroxy ou U-(alkyle en C_1-C_3), (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C_1-C_4), alcényle en C_3-C_5 , alcényle en C_3-C_6 à substituant halogène, alcynyle en C_3-C_6 , alcynyle en C_3-C_6 à substituant halogène, $(\text{T})_n$ -cyclo(alkyle en C_3-C_8), ou encore un groupe de la série :



X^a , X^b et X^c , chacun indépendamment l'un de l'autre, représentent un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, (alkyle en C_1-C_3)-OOC, alkyle en C_1-C_4 , alcoxy en C_1-C_4 , halogéno-(alkyle en C_1-C_2) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène, en particulier des atomes de fluor ; ou bien X^a est un radical halogéno-(alcoxy en C_1-C_2) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène ou un radical nitro, diméthylamino, phényle, phényloxy, benzyloxy, sulfamoyle, et X^b et X^c sont simultanément des atomes d'hydrogène ; ou bien

X^a est le radical phényle, phényloxy ou benzyloxy, et

X^b est un halogène ou le radical méthyle et X^c est un hydrogène ; ou bien

X^a , X^b et X^c forment ensemble 4 ou 5 atomes de fluor ;

Napht est un résidu naphtyle non substitué, ou substitué par halogéno, méthyle, méthoxy ou nitro ;

W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en C_1-C_2 ou par un radical (alcoxy en C_1-C_2)-carbonyl-(alkylène en C_2-C_4)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaînons pontants $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ ou $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 est un hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_5 , un radical alkyle en C_1-C_5 interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en C_1-C_5 substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C_1-C_2)-OOC ; alkyle en C_1-C_5 interrompu par un atome d'oxygène ou un atome de soufre et substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C_1-C_2)-OOC ; alcényle en C_3-C_5 ; alcényle en C_3-C_5 substitué par (alkyle en C_1-C_3)-OOC ; alcynyle en C_3-C_5 ; alcynyle en C_3-C_5 substitué par (alkyle en C_1-C_3)-OOC ; $(\text{T})_n$ -cyclo (alkyle en C_3-C_6) ; $(\text{T})_n$ -cyclo(alkyle en C_3-C_6) substitué par alkyle en C_1-C_3 -OOC ; $(\text{T})_n$ -phényle ou $(\text{T})_n$ -phényle substitué dans la partie phényle par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF_3 , cyano, HOOC ou MOOC ;

R_2 est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en C_1-C_3 , alkyle en C_1-C_3 substitué par cyano ou alcoxy en C_1-C_3 , alcoxy en C_1-C_4 , ou encore un hétérocycle à 3-6 chaînons, saturé ou insaturé, comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R_1 et R_2 , avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R_3 est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C_1-C_6 , phényle, phényle substitué par



halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R₄ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₆, CONH₂, CONH-CONH-(alkyle en C₁-C₃), alcanoyle en C₁-C₆, alcanoyle en C₁-C₃ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃, alcénoyle en C₃-C₅ ou alcénoyle en C₃-C₅ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃ ;

R₃ et R₄, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le noyau ;


R₅ est un hydrogène ou le radical méthyle ;

R₆ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄ ; et


n vaut zéro ou 1 ;

à l'exception des groupes amino primaires ou secondaires, des groupes UH- ou nitro, des radicaux Si-(alkyle en C₁-C₃)₃ ou des résidus contenant du phosphore.

29. Procédé de préparation de composés de formule




qui consiste à diazoter un composé de formule



en milieu acide avec un composé nitrite, à une température de -20° à 30°C et, dans le même réacteur, à le traiter avec un réducteur à une température de -20° à 80° et de préférence de -20° à 30°C, le réducteur étant ajouté avant ou après le composé nitrite ou en même temps que ce dernier, les substituants des composés ayant les significations suivantes :

R^a est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈, un radical alkyle en C₁-C₈ substitué par halogéno, ou ; cyano, nitro, hydroxy ou U-(alkyle en C₁-C₃) ; (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C₁-C₄), alcényle en C₃-C₆, alcényle en C₃-C₆ à substituant halogène, alcynyle en C₃-C₆, alcynyle en C₃-C₆ à substituant halogène, (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₈), ou encore un groupe de la série :



X^a, X^b et X^c, chacun indépendamment l'un de l'autre, représentent un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, (alkyle en C₁-C₃)-OOC, alkyle en C₁-C₄, alcoxy en C₁-C₄, halogéno-(alkyle en C₁-C₂) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène, en particulier des atomes de fluor ; ou bien X^a est un radical halogéno-(alcoxy en C₁-C₂) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène ou un radical nitro, diméthylamino, phényle, phényloxy, benzyloxy, sulfamoyle, et X^b et X^c sont simultanément des atomes d'hydrogène ; ou bien

X^a est le radical phényle, phényloxy ou benzyloxy, et



X^b est un halogène ou le radical méthyle et X^c est un hydrogène ; ou bien

X^a , X^b et X^c forment ensemble 4 ou 5 atomes de fluor ;

Napht est un résidu naphthyle non substitué, ou substitué par halogéno, méthyle, méthoxy ou nitro ;

W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en C₁-C₂ ou par un radical (alcoxy en C₁-C₂)-carbonyle-(alkylène en C₂-C₄)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaînons pontants -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- ou -CH₂CH₂O- ;

R₁ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₅, un radical alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en C₁-C₅ substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou un atome de soufre et substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alcényle en C₃-C₅ ; alcényle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; alcynyle en C₃-C₅ ; alcynyle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆) ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆) substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-phényle ou (T)_n-phényle substitué dans la partie phényle par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF₃, cyano, HOOC ou MOOC ;

R₂ est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en C₁-C₃, alkyle en C₁-C₃ substitué par cyano ou alcoxy en C₁-C₃, alcoxy en C₁-C₄, ou encore un hétérocycle à 3-6 chaînons, saturé ou insaturé, comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R₁ et R₂, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R₃ est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C₁-C₆, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R₄ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₆, CONH₂, CONH-CONH-(alkyle en C₁-C₃), alcanoylo en C₁-C₆, alcanoylo en C₁-C₃ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃, alcénoylo en C₃-C₅ ou alcénoylo en C₃-C₅ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃ ;

R₃ et R₄, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone sur le noyau ;

R₅ est un hydrogène ou le radical méthyle ;

R₆ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄ ; et
n vaut zéro ou 1 ;

à l'exception des résidus comportant des groupes UH- ou nitro, ainsi que des résidus contenant du silicium ou du phosphore, et

E^b est un groupe facilement éliminable comme par exemple l'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₁₆, par exemple méthyle, éthyle, isopropyle ou n-dodécyle, ou benzyle ou encore acyle, par exemple acétyle, ou un résidu acide sulfonique (-SO₃H) ou cyano.


30. Utilisation des composés de formule I selon la revendication 1 ou 2 pour l'immunisation des végétaux contre les maladies.

31. Utilisation des composés de formule I' selon la revendication 8 ou 9 pour l'immunisation des végétaux contre les maladies.

32. Utilisation du 7-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole en tant que matière active pour la préparation d'un produit destiné à immuniser les végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes.

Revendications pour l'Etat contractant suivant : ES

1. Procédé d'immunisation de végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes, caractérisé en ce qu'on applique sur les végétaux et/ou sur leur environnement, comme matière active, un composé ayant la formule I ci-après :



(I)


dans laquelle :

X est un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;

Y est un hydrogène, un halogène ou un radical SO_3H , SO_3M , nitro, hydroxy ou amino, M étant l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ; et

Z est le radical cyano ou $-\text{CO}-\text{A}$, où A est OH ou SH, H pouvant aussi être remplacé par l'équivalent molaire d'un résidu cationique minéral ou organique.

2. Procédé d'immunisation de végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes, caractérisé en ce qu'on applique sur les végétaux et/ou sur leur environnement, comme matière active, un composé ayant la formule I ci-après :



(I)

dans laquelle :

X est un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;

Y est un hydrogène, un halogène ou un radical SO_3H , SO_3M , nitro, hydroxy ou amino, M étant l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ; et

Z est le radical cyano ou $-\text{CO}-\text{A}$,



A est UR , $\text{N}(\text{R}_1)\text{R}_2$ ou $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$;

M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;

U est l'oxygène ou le soufre ;

U' est l'oxygène ou $-\text{N}(\text{R}_5)-$;

R est un hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_8 , un radical alkyle en C_1-C_8 substitué par halogène, cyano, nitro, hydroxy, U-(alkyle en C_1-C_3) ou di-(alkyle en C_2-C_4)-amino ou interrompu par le groupe CO ; (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C_1-C_4), alcényle en C_3-C_6 , alcényle en C_3-C_6 à substituant halogène, alcynyle en C_3-C_6 , alcynyle en C_3-C_6 à substituant halogène, $(\text{T})_n$ -cyclo(alkyle en C_3-C_8), ou encore un groupe de la série :



X^a , X^b et X^c , chacun indépendamment l'un de l'autre, représentent un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, (alkyle en C_1-C_3)-OOC, alkyle en C_1-C_4 , alcoxy en C_1-C_4 , halogéno-(alkyle en C_1-C_2) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène, en particulier des atomes de fluor ; ou



bien X^a est un radical halogéno-(alcoxy en C_1-C_2) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène ou un radical nitro, diméthylamino, phényle, phényloxy, benzyloxy, sulfamoyle, et X^b et X^c sont simultanément des atomes d'hydrogène ; ou bien

X^a est le radical phényle, phényloxy ou benzyloxy, et X^b est un halogène ou le radical méthyle et X^c est un hydrogène ; ou bien

X^a , X^b et X^c sont ensemble 4 ou 5 atomes de fluor ;

Napht est un résidu naphthyle non substitué, ou substitué par halogéno, méthyle, méthoxy ou nitro ;

W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en C_1-C_2 ou par un radical (alcoxy en C_1-C_2)-carbonyle-(alkylène en C_2-C_4)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaînons pontants $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH(CH_3)-$, $-CCH_3(CH_3)-$, $-CH_2CH_2CH_2-$ ou $-CH_2CH_2O-$;

R_1 est un hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_5 , un radical alkyle en C_1-C_5 interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en C_1-C_5 substitué par halogéno, cyano, $HOOC$ ou (alkyle en C_1-C_2)- OOO ; alkyle en C_1-C_5 interrompu par un atome d'oxygène ou un atome de soufre et substitué par halogéno, cyano, $HOOC$ ou (alkyle en C_1-C_2)- OOO ; alcényle en C_3-C_5 ; alcényle en C_3-C_5 substitué par (alkyle en C_1-C_3)- OOO ; alcynyle en C_3-C_5 ; alcynyle en C_3-C_5 substitué par (alkyle en C_1-C_3)- OOO ; $(T)_n$ -cyclo(alkyle en C_3-C_6) ; $(T)_n$ -cyclo(alkyle en C_3-C_6) substitué par (alkyle en C_1-C_3)- OOO ; $(T)_n$ -phényle ou $(T)_n$ -phényle substitué dans la partie phényle par des radicaux halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF_3 , cyano, $HOOC$ ou $MOOC$;

R_2 est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en C_1-C_3 , alkyle en C_1-C_3 substitué par cyano ou alcoxy en C_1-C_3 , alcoxy en C_1-C_4 , ou encore un hétérocycle à 3-6 chaînons, saturé ou insaturé, comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R_1 et R_2 , avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R_3 est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C_1-C_6 , phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, $HOOC$ ou $MOOC$, ou encore un hétérocycle W ;

R_4 est un hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_6 , $CONH_2$, $CONH-CONH$ -(alkyle en C_1-C_3), alcanoyle en C_1-C_3 , alcanoyle en C_1-C_3 substitué par halogéno ou alcoxy en C_1-C_3 , alcénoyle en C_3-C_5 ou alcénoyle en C_3-C_5 substitué par halogéno ou alcoxy en C_1-C_3 ;

R_3 et R_4 , avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le cycle ;

R_5 est un hydrogène ou le radical méthyle ;

R_6 est un hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_4 ; et

n vaut zéro ou 1 ;

où dans les composés de formule I, le résidu organique A a une masse moléculaire inférieure à 900 ; et, quand U est un oxygène ou un soufre, ces composés englobent les sels de l'acide 7-carboxylique, compatibles du point de vue phytosanitaire, avec des amines primaires, secondaires ou tertiaires ou des bases minérales.

3. Procédé selon les revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la quantité appliquée est inférieure à 1 kg SA/ha.

4. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on l'utilise des composés de formule I dans laquelle :

X et Y représentent chacun un hydrogène ;

Z est le radical cyano ou $COAl$;

A est UR ou $U'N(=C)_n(R_3)R_4$;

U est l'oxygène ;


U' est l'oxygène ou $-N(R_5)-$;

R est un hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_8 , alkyle en C_1-C_8 substitué par halogéno ou alcoxy en C_1-C_3 , alcényle en C_3-C_6 , alcényle en C_3-C_6 substitué par halogéno, alcynyle en C_3-C_6 , alcynyle en C_3-C_6 substitué par halogéno, $(T)_n$ -cyclo(alkyle en C_3-C_8), benzyle, benzyle halogéné, benzylméthoxy, $(T)_n-Si(CH_3)_3$, $(T)-P(O)(alkyle\ en\ C_1-C_4)CH_3$, $(T)-P(O)(O-alkyle\ en\ C_1-C_4)_2$ ou le groupe $(T)_n-W$;

W est un hétérocycle à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, non substitué et ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, ou encore le diacétone-D-glucosidyle ;



T représente les chaînons pontants $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CCH}_3(\text{CH}_3)-$ ou $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$;
 R_3 est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C_1-C_6 , phényle ou W ;
 R_4 est un hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_6 , CONH_2 , $\text{CONH}-\text{CONH}-(\text{alkyle en } \text{C}_1-\text{C}_3)$,
 alcanoyle en C_1-C_3 ou alcénoyle en C_3-C_5 ;
 R_3 et R_4 , avec l'atome auquel ils sont liés, représentent W ou W' ;
 W est un hétérocycle à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, ayant 1 à 3 hétéro-atomes du groupe O, N et S ;
 W' est un résidu du groupe




n vaut zéro ou 1.

5. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise des composés de formule I'



dans laquelle :

X est un hydrogène ou un radical halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;
 Y est un hydrogène ou un radical halogéno, SO_3H , SO_3M , nitro, hydroxy ou amino ;
 Z est le radical cyano ou COA ;
 A est UR , $\text{N}(\text{R}_1)\text{R}_2$ ou $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$;
 M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;
 U est l'oxygène ou le soufre ;
 U' est l'oxygène ou $-\text{N}(\text{R}_5)-$;
 R est un hydrogène ou un radical alkyle en C_1-C_8 , un radical alkyle en C_1-C_8 substitué par halogéno, cyano, nitro, hydroxy ou $\text{U}-(\text{alkyle en } \text{C}_1-\text{C}_8)$, $(\text{T})-\text{COOH}$ ou $(\text{T})-\text{COO}(\text{alkyle en } \text{C}_1-\text{C}_4)$, alcényle en C_3-C_6 , alcényle en C_3-C_6 à substituant halogène, alcynyle en C_3-C_6 , alcynyle en C_3-C_6 à substituant halogène, $(\text{T})_n-\text{cyclo}(\text{alkyle en } \text{C}_3-\text{C}_8)$, ou encore un groupe de la série :



X^a , X^b et X^c , chacun indépendamment l'un de l'autre, représentent un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, cyano, HOOC , MOOC , $(\text{alkyle en } \text{C}_1-\text{C}_3)-\text{OOC}$, $\text{alkyle en } \text{C}_1-\text{C}_4$, alcoxy en C_1-C_4 , halogéno-(alkyle en C_1-C_2) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène, en particulier des atomes de fluor ; ou bien X^a est un radical halogéno-(alcoxy en C_1-C_2) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène ou un radical nitro, diméthylamino, phényle, phényloxy, benzyloxy, sulfamoyloxy, et X^b et X^c sont simultanément des atomes d'hydrogène ; ou bien

X^a est le radical phényle, phényloxy ou benzyloxy, et X^b est un halogène ou le radical méthyle et



X^c est un hydrogène ; ou bien

X^a , X^b et X^c sont ensemble 4 ou 5 atomes de fluor ;

Napht est un résidu naphthyle non substitué, ou substitué par halogéno, méthyle, méthoxy ou nitro ;

W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, M et S, à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en C₁-C₂ ou par un radical (alcoxy en C₁-C₂)-carbonyle-(alkylène en C₂-C₄)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaînons pontants -CH₂-, -CH₂CH₂-, -CH(CH₃)-, -CH₂CH₂CH₂- ou -CH₂CH₂O- ;

R₁ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₅, un radical alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en C₁-C₅ substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre et substitué par halogéno, cyano, HYOOO ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alcényle en C₃-C₅ ; alcényle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; alcynyle en C₃-C₅ ; alcynyle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-cycloalkyle en C₃-C₆ ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆) substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-phényle ou (T)_n-phényle substitué dans la partie phényle par des radicaux halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF₃, cyano, HOOC ou MOOC ;

R₂ est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en C₁-C₃, alkyle en C₁-C₃ substitué par cyano ou alcoxy en C₁-C₃, alcoxy en C₁-C₄, ou encore un hétérocycle à 3-8 chaînons, saturé ou insaturé, comportant O, M ou S comme hétéro-atomes ;

R₁ et R₂, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R₃ est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C₁-C₆, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R₄ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₆, CONH₂, CONH-CONH-(alkyle en C₁-C₃), alcanoyle en C₁-C₃, alcanoyle en C₁-C₃ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃, alcénoyle en C₃-C₅ ou alcénoyle en C₃-C₅ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃ ;

R₃ et R₄, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le noyau ;

R₅ est un hydrogène ou le radical méthyle ;

R₆ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄ ; et
n vaut zéro ou 1 ;

à l'exception des composés suivants :

7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4,6-dibromo-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;


acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;

ester méthylique de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;

6-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

acide 6-chloro-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique.

6. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise des composés de formule I'



(I')

dans laquelle :

X est un hydrogène ou un radical halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;

Y est un hydrogène ou un radical halogéno, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy ou amino ;

Z est le radical cyano ou COA ;



A est UR, N(R₁)R₂ ou U'N(=C)_n(R₃)R₄ ;

M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;

U est l'oxygène ou le soufre ;

U' est l'oxygène ou -N(R₅)- ;

R est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈, un radical alkyle en C₁-C₈ substitué par halogéno, cyano, nitro, hydroxy, alcoxy ou U-(alkyle en C₁-C₃), (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C₁-C₄), alcényle en C₃-C₆, alcényle en C₃-C₆ à substituant halogéno, alcynyle en C₃-C₆, alcynyle en C₃-C₆ à substituant halogéno, (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₈), ou encore un groupe de la série :



W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaîons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en C₁-C₂ ou par un radical (alcoxy en C₁-C₂)-carbonyle-(alkylène en C₂-C₄)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaîons pontants -CH₂-, -CH₂CH₂-, ou -CH(CH₃)- ;

R₁ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₅, un radical alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en C₁-C₅ substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre et substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alcényle en C₃-C₅ ; alcényle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; alcynyle en C₃-C₅ ; alcynyle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆) ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆) substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-phényle ou (T)_n-phényle substitué dans la partie phényle par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF₃, cyano, HOOC ou MOOC ;

R₂ est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en C₁-C₃, alkyle en C₁-C₃ substitué par cyano ou alcoxy en C₁-C₃, alcoxy en C₁-C₄, ou encore un hétérocycle à 3-6 chaîons saturé ou insaturé comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R₁ et R₂, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R₃ est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C₁-C₆, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R₄ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₆, CONH₂, CONH-CONH-(alkyle en C₁-C₃), alcanoylo en C₁-C₃, alcanoylo en C₁-C₃ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃, alcénoylo en C₃-C₅ ou alcénoylo en C₃-C₅ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃ ;

R₃ et R₄, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le noyau ;

R₅ est un hydrogène ou le radical méthyle ;

R₆ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄ ; et

n vaut zéro ou 1 ;

à l'exception des composés suivants :

7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4,6-dibromo-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;

ester méthylique de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;

6-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

acide 6-chloro-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique.


7. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise des composés de formule I' selon la revendication 5, dans lesquels Z = COA et R a une signification autre qu'hydrogène et alkyle substitué.

8. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise comme matière active l'acide 1,2,3-



benzothiadiazole-7-carboxylique ou un de ses sels avec un composé basique.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'on utilise comme sels des sels obtenus avec des amines primaires, secondaires ou tertiaires ou des composés de métaux alcalins ou alcalino-terreux.
10. Procédé selon la revendication 2, dans lequel on utilise comme matière active le 7-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole.
11. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise comme matière active le 7-benzyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole.
12. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise comme matière active le 7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole.
13. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'on utilise comme matières actives des composés 7-(alcoxy en C₂-C₄)-carbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole.
14. Produit destiné à immuniser les végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes, contenant comme matière active au moins un composé de formule I selon la revendication 1 ou 2 à l'exception des composés 7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole, 4-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole, 6-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole, 4,6-dibromo-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole et 7-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole.
15. Ester méthylique de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique, à utiliser dans un procédé d'immunisation des végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes.
16. Ester méthylique de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique, à utiliser dans la préparation d'un produit destiné à l'immunisation de végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes.
17. Produit destiné à l'immunisation de végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes, contenant comme matière active au moins un composé de formule I'



(I')

dans laquelle :

X est un hydrogène ou un radical halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;

Y est un hydrogène ou un radical halogéno, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy ou amino ;

Z est le radical cyano ou COA ;



A est UR, N(R₁)R₂ ou U¹N(=C)_n(R₃)R₄ ;

M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;

U est l'oxygène ou le soufre ;

U¹ est l'oxygène ou -N(R₅)- ;

R est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈, un radical alkyle en C₁-C₈ substitué par halogéno, cyano, nitro, hydroxy ou U-(alkyle en C₁-C₃), (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C₁-C₄), alcényle en C₃-C₆, alcényle en C₃-C₆ à substituant halogène, alcynyle en C₃-C₆, alcynyle en C₃-C₆ à substituant halogène, (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₈), ou encore un groupe de la série :



X^a , X^b et X^c , chacun indépendamment l'un de l'autre, représentent un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, (alkyle en $C_1 - C_3$)-OOC, alkyle en $C_1 - C_4$, alcoxy en $C_1 - C_4$, halogéno-(alkyle en $C_1 - C_2$) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène, en particulier des atomes de fluor ; ou bien X^a est un radical halogéno-(alcoxy en $C_1 - C_2$) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène ou un radical nitro, diméthylamino, phényle, phényloxy, benzyloxy, sulfamoyloxy, et X^b et X^c sont simultanément des atomes d'hydrogène ; ou bien

X^a est le radical phényle, phényloxy ou benzyloxy, et X^b est un halogène ou le radical méthyle et X^c est un hydrogène ; ou bien

X^a , X^b et X^c sont ensemble 4 ou 5 atomes de fluor ;

Napht est un résidu naphtyle non substitué, ou substitué par halogéno, méthyle, méthoxy ou nitro ;

W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en $C_1 - C_2$ ou par un radical (alcoxy en $C_1 - C_2$)-carbonyle-(alkylène en $C_2 - C_4$)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaînons pontants $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CH(CH_3)-$, $-CH_2CH_2CH_2-$ ou $-CH_2CH_2O-$;

R_1 est un hydrogène ou un radical alkyle en $C_1 - C_5$, un radical alkyle en $C_1 - C_5$ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en $C_1 - C_5$ substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en $C_1 - C_2$)-OOC ; alkyle en $C_1 - C_5$ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre et substitué par halogéno, cyano, HYOOC ou (alkyle en $C_1 - C_2$)-OOC ; alcényle en $C_3 - C_5$; alcényle en $C_3 - C_5$ substitué par (alkyle en $C_1 - C_3$)-OOC ; alcynyle en $C_3 - C_5$; alcynyle en $C_3 - C_5$ substitué par (alkyle en $C_1 - C_3$)-OOC ; $(T)_n$ -cycloalkyle en $C_3 - C_6$; $(T)_n$ -cyclo(alkyle en $C_3 - C_6$) substitué par (alkyle en $C_1 - C_3$)-OOC ; $(T)_n$ -phényle ou $(T)_n$ -phényle substitué dans la partie phényle par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF_3 , cyano, HOOC ou MOOC ;

R_2 est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en $C_1 - C_3$, alkyle en $C_1 - C_3$ substitué par cyano ou alcoxy en $C_1 - C_3$, alcoxy en $C_1 - C_4$, ou encore un hétérocycle à 3-6 chaînons, saturé ou insaturé, comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R_1 et R_2 , avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R_3 est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en $C_1 - C_6$, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R_4 est un hydrogène ou un radical alkyle en $C_1 - C_6$, $CONH_2$, $CONH-CONH$ -(alkyle en $C_1 - C_3$), alcanoyle en $C_1 - C_3$, alcanoyle en $C_1 - C_3$ substitué par halogéno ou alcoxy en $C_1 - C_3$, alcénoyle en $C_3 - C_5$ ou alcénoyle en $C_3 - C_5$ substitué par halogéno ou alcoxy en $C_1 - C_3$;

R_3 et R_4 , avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le noyau ;

R_5 est un hydrogène ou le radical méthyle ;

R_6 est un hydrogène ou un radical alkyle en $C_1 - C_4$; et

n vaut zéro ou 1 ;

à l'exception des composés suivants :

7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4,6-dibromo-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;


ester méthylique de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;

6-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

acide 6-chloro-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique.



18. Produit destiné à immuniser des végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytosanitaires, contenant comme matière active au moins un composé de formule I'



(I')

dans laquelle :

X est un hydrogène ou un radical halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;

Y est un hydrogène ou un radical halogéno, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy ou amino ;

Z est le radical cyano ou COA ;


A est UR, N(R₁)R₂ ou U'¹N(=C)_n(R₃)R₄ ;

M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;

U est l'oxygène ou le soufre ;

U'¹ est l'oxygène ou -N(R₅)- ;

R est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈, un radical alkyle en C₁-C₈ substitué par halogéno, cyano, nitro, hydroxy, alcoxy ou U-(alkyle en C₁-C₃), (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C₁-C₄), alcényle en C₂-C₆, alcényle en C₃-C₆ à substituant halogène, alcynyle en C₃-C₆, alcynyle en C₃-C₆ à substituant halogène, (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₈), ou encore un groupe de la série :



W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en C₁-C₂ ou par un radical (alcoxy en C₁-C₂)-carbonyle-(alkylène en C₂-C₄)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaînons pontants -CH₂-, -CH₂CH₂-, ou CH(CH₃)- ;

R₁ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₅, un radical alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en C₁-C₅ substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alkyle en C₁-C₅ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre et substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alcényle en C₃-C₅ ; alcényle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; alcynyle en C₃-C₅ ; alcynyle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆) ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆) substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-phényle ou (T)_n-phényle substitué dans la partie phényle par des radicaux halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF₃, cyano, HOOC ou MOOC ;

R₂ est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en C₁-C₃, alkyle en C₁-C₃ substitué par cyano ou alcoxy en C₁-C₃, alcoxy en C₁-C₄, ou encore un hétérocycle à 3-6 chaînons, saturé ou insaturé, comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R₁ et R₂, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R₃ est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C₁-C₆, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R₄ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₆, CONH₂, CONH-CONH-(alkyle en C₁-C₃), alcanoyle en C₁-C₃, alcanoyle en C₁-C₃ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃, alcénoyle en C₃-C₅ ou alcénoyle en C₃-C₅ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃ ;

R₃ et R₄, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;



W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le noyau ;

R₅ est un hydrogène ou le radical méthyle ;

R₆ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄ ; et

n vaut zéro ou 1 ;

5 à l'exception des composés suivants :

7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4,6-dibromo-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;

10 ester méthylique de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;

6-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

acide 6-chloro-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique.

15 19. Produit selon la revendication 14, caractérisé en ce qu'il contient comme matière active au moins un composé de formule I' selon la revendication 17, où Z = COA et R a une signification autre qu'hydrogène ou radical alkyle non substitué.

20 20. Produit selon la revendication 14, caractérisé en ce qu'il contient comme matière active au moins un composé de formule I' appartenant au groupe suivant :

7-n-pentoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(4-méthoxy-benzoyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(cycloheximino-oxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(3-hydroxy-n-propoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

1,2,5,6-di-O-isopropylidène-3-(7-benzo-1,2,3-thiadiazol)D-glucosurannose ;

25 7-furfuryloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(1,2,4-triazole-1-yl)-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(2-pyridylméthoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-triméthylsilyl-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7[2-(triméthylsilyl)-éthoxycarbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

30 7-diméthylphosphono-éthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-cyclohexyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(1-phényléthoxyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(3-méthoxybenzyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(éthylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

35 7-(n-propylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(benzylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-carbamoyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-N-phénylcarbamoyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

N-(7-benzo-1,2,3-thiadiazolyle)-glycine ;

40 7-(N-diallylcarbamoyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

6-fluoro-7-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

6-fluoro-7-carboxy-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

5-fluoro-7-benzoyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

5-fluoro-7-carboxy-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

45 5-fluoro-7-éthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ; ou appartenant au groupe suivant :

7-éthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-n-propoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-iso-propoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

50 7-n-butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-sec-butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-tert-butoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-cyclopropylméthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-(2'-phényléthoxyloxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

55 7-benzoyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

7-allyloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;


7-propyn-2-yloxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

2-(7-benzo-1,2,3-thiadiazolyloxy-imino)-2-cyano-N-(éthylaminocarbonyl)-acétamide ;



- Sel de Na de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;
 Sel de K de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;
 Sel de triéthylammonium de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;
 7-(1'-phénéthoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
 7-(1'-naphthylméthoxycarbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
 7-(méthylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
 7-(éthylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
 7-(benzylthio-carbonyl)-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
 7-[(di-cyanométhyl)-amino-carbonyl]-benzo-1,2,3-thiadiazole ;
 Ester méthylique de l'acide 3-[(N-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazole-2-ylamino]-2-méthylpropénecarboxylique ;
 Ester méthylique de l'acide 3-[(N-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-ylcarbonyl)-1,3,4-thiadiazole-2-ylamino]-2-éthylpropénecarboxylique ;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(A-méthylpropylidène)-hydrazine ;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclobutylidène)-hydrazine ;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclopentylidène)-hydrazine ;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclohexylidène)-hydrazine ;
 2-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-1-(2'-sec-butyl)-hydrazine ;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclopentyl)-hydrazine ;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cyclohexyl)-hydrazine ;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-(cycloheptyl)-hydrazine ;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-1,2-diacétylhydrazine ;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-phényl-hydrazine ;
 1-(Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbonyl)-2-pyridine-2'-ylhydrazine.


21. Produit selon la revendication 14, caractérisé en ce qu'il contient comme matière active au moins l'un des composés acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ou 7-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole.
22. Produit selon la revendication 14, caractérisé en ce qu'il contient comme matière active de l'acide 1,2,3-benzothiadiazole-7-carboxylique ou un de ses sels avec un composé basique.
23. Produit selon la revendication 22, caractérisé en ce qu'on utilise comme sels des sels avec des amines primaires, secondaires ou tertiaires ou avec des composés de métaux alcalins ou alcalino-terreux.
24. Procédé de préparation de composés de formule I'



(I')

dans laquelle :

- X est un hydrogène ou un radical halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC ;
 Y est un hydrogène ou un radical halogéno, SO₃H, SO₃M, nitro, hydroxy ou amino ;
 Z est le radical cyano ou COA ;
 A est UR, N(R₁)R₂ ou U'¹N(=C)_n(R₃)R₄ ;
 M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;
 U est l'oxygène ou le soufre ;
 U'¹ est l'oxygène ou -N(R₅)- ;
 R est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈, un radical alkyle en C₁-C₈ substitué par halogéno, cyano, nitro, hydroxy ou U-(alkyle en C₁-C₃), (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C₁-C₄), alcényle en C₃-C₆, alcényle en C₃-C₆ à substituant halogène, alcynyle en C₃-C₆, alcynyle en C₃-C₆ à substituant halogène, (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₈), ou encore un groupe de la série :



X^a , X^b et X^c , chacun indépendamment l'un de l'autre, représentent un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$)-OOC, alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_4$, alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_4$, halogéno-(alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_2$) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène, en particulier des atomes de fluor : ou bien X^a est un radical halogéno-(alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_2$) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène ou un radical nitro, diméthylamino, phényle, phényloxy, benzyloxy, sulfamoyloxy, et X^b et X^c sont simultanément des atomes d'hydrogène ; ou bien

X^a est le radical phényle, phényloxy ou benzyloxy, et

X^b est un halogène ou le radical méthyle et X^c est un hydrogène ; ou bien

X^a , X^b et X^c sont ensemble 4 ou 5 atomes de fluor ;

Napht est un résidu naphthyle non substitué, ou substitué par halogéno, méthyle, méthoxy ou nitro ;

W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_2$ ou par un radical (alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_2$)-carbonyle-(alkylène en $\text{C}_2 - \text{C}_4$)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaînons pontants $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ ou $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 est un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_5$, un radical alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_5$ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_5$ substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_2$)-OOC ; alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_5$ interrompu par un atome d'oxygène ou un atome de soufre et substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_2$)-OOC ; alcényle en $\text{C}_3 - \text{C}_5$; alcényle en $\text{C}_3 - \text{C}_5$ substitué par (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$)-OOC ; alcynyle en $\text{C}_3 - \text{C}_5$; alcynyle en $\text{C}_3 - \text{C}_5$ substitué par (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$)-OOC ; $(\text{T})_n$ -cyclo(alkyle en $\text{C}_3 - \text{C}_6$) ; $(\text{T})_n$ -cyclo(alkyle en $\text{C}_3 - \text{C}_6$) substitué par alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$ -OOC ; $(\text{T})_n$ -phényle ou $(\text{T})_n$ -phényle substitué dans la partie phényle par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF_3 , cyano, HOOC ou MOOC ;

R_2 est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$, alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$ substitué par cyano ou alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_3$, alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_4$, ou encore un hétérocycle à 3-6 chaînons saturé ou insaturé comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R_1 et R_2 , avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R_3 est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_6$, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R_4 est un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_6$, CONH_2 , CONH-CONH- (alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_3$), alcanoyl en $\text{C}_1 - \text{C}_6$, alcanoyl en $\text{C}_1 - \text{C}_3$ substitué par halogéno ou alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_3$, alcénoyl en $\text{C}_3 - \text{C}_5$ ou alcénoyl en $\text{C}_3 - \text{C}_5$ substitué par halogéno ou alcoxy en $\text{C}_1 - \text{C}_3$;

R_3 et R_4 , avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le noyau ;

R_5 est un hydrogène ou le radical méthyle ;

R_6 est un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1 - \text{C}_4$; et

n vaut zéro ou 1 ;

à l'exception des composés suivants :

7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

4,6-dibromo-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;

acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;

ester méthylique de l'acide benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique ;

6-chloro-7-cyano-benzo-1,2,3-thiadiazole ;


acide 6-chloro-benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carboxylique,

caractérisé en ce que :



1. on prépare des composés de formule la

5




(Ia)

10

dans laquelle R, X, Y et U ont les significations données pour la formule I, en faisant réagir :

1.1. des composés de formule II

15



(II)

20

dans laquelle L' est un groupe éliminable, par exemple un halogène, un groupe O-acyle comme par exemple le résidu acyle appartenant à l'anhydride symétrique de l'acide Ib, ou encore le groupe 1-imidazyle,

avec des composés de formule III

25

RUH (III)

a) en présence d'un excès du réactif RUH, ou bien


b) en présence d'une base organique, avec ou sans 4-dialkylaminopyridine servant de catalyseur dans des solvants inertes, ou bien

30

c) en présence de bases minérales, en travaillant dans chaque cas dans l'intervalle de températures de -10° à 180° C et de préférence de 0° à 100° C ; et

1.2. des composés de formule Ib

35



(Ib)


40

avec des composés de formule III en excès ou dans un solvant inerte, en présence d'un acide tel que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide p-toluènesulfonique ou le complexe trifluorure de borediéthyléther, ou encore de dicyclohexylcarbodiimide à des températures de -10° à 180° C et de préférence de 0° à 140° C ; et

45

2. on prépare des composés de formule Ic

50



(Ic)

55

dans laquelle les symboles R₁, R₂, X et Y ont les significations données pour la formule I, en faisant réagir :

2.1. des composés de formule II avec des composés de formule IV




(IV)

a) en présence d'un excès de réactif $HN(R_1)R_2$ ou bien

b) en présence d'une base organique, avec ou sans 4-dialkylaminopyridine servant de catalyseur dans des solvants inertes, ou bien

c) en présence de bases minérales, en travaillant dans chaque cas dans l'intervalle de températures de -10° à 160° C et de préférence de 0° à 100° C ; et


3. on prépare des composés de formule Id



(Id)


dans laquelle A' est le résidu $U'N(=C)_n(R_3)R_4$, et X, Y, R_3 , R_4 , R_5 et n ont les significations données pour la formule I, en faisant réagir

3.1. des composés de formule Ie




(Ie)


dans laquelle Z' est le groupe $COOH$, $COCl$, $COOAlk'$ ou un résidu acyloxycarbonyle, comme par exemple



benzoyloxycarbonyle ou acétyloxycarbonyle, Alk' représentant un radical alkyle en C_1-C_4 , en présence d'une base, avec des dérivés de l'hydrazine de formules V ou VI



(V) ou



(VI)

dans un solvant inerte à des températures de -10° à 180° C et de préférence de 0° à 100° C ; ou

3.2. on fait réagir par étapes des composés de formule Ie, d'abord avec l'hydrazine, puis on fait réagir les dérivés obtenus de l'hydrazine

3.2.1. avec l'agent d'alkylation R_3-L ou R_4-L , où L est un groupe éliminable, dans un solvant inerte, à des températures de 0° à 160° C et de préférence de 20° à 120° C ; ou bien

3.2.2. avec un aldéhyde ou une cétone de formule $R_3(R_4)C=O$, où R_3 et R_4 ont les significations données pour la formule I, avec ou sans addition d'un acide minéral ou



organique, à des températures de -10° à 150°C et de préférence de 20° à 100°C , puis, si on le souhaite,


3.2.3. avec un agent d'alkylation L-R_5 , où L est un groupe éliminable, en présence d'une base forte, dans un solvant inerte, à des températures de -80° à 120° et de préférence de -40° à 80°C ; ou encore, si on le souhaite

3.2.4.

a) on hydrogène les dérivés hydrazones préparés en 3.2.1. à l'aide d'hydrogène sous une pression de 1 à $30 \cdot 10^5$ Pa, en présence d'un catalyseur en mélange avec du charbon activé, dans un solvant inerte, à des températures de 0° à 100°C , ou bien


b) on traite les dérivés hydrazones préparés en 3.2.1. avec un hydrure métallique complexe tel que le cyanoborohydrure de Na, dans un solvant inerte, à des températures de -10° à 80° et de préférence de 0° à 50°C ; et

4. on prépare des composés de formule If



(If)

dans laquelle les symboles X et Y ont les significations données pour la formule I, en traitant des composés de formule Ig [préparés par le procédé (2)]



(Ig)


avec un agent de déshydratation, dans un solvant inerte ou sans solvant, à des températures de -10° à 250°C , auquel cas on utilise comme agent de déshydratation :

a) de l'anhydride trifluoracétique en présence d'une base comme par exemple la pyridine, dans un solvant inerte tel par exemple que le tétrahydrofurane ou le dioxane, à des températures de -10° à 40°C ; ou bien

b) de l'isocyanate de chlorosulfonyle dans un solvant inerte, comme par exemple le tétrahydrofurane, à des températures de 0° à 65°C , opération suivie d'un traitement au diméthylformamide ;


c) du pentoxyde de phosphore, avec ou sans solvant inerte comme par exemple le 1,2-dichlorométhane, le xylène ou le chlorobenzène, éventuellement dans une bombe tubulaire sous pression élevée, à une température de 50° à 250°C ;

5.1. on prépare des composés de formule IL₁




(IL₁)


dans laquelle R_3 , R_4 , X et Y ont les significations données pour la formule I, en faisant réagir des dérivés oximes de formule




avec des dérivés d'acide activés de formule



où AKS désigne un halogène, un radical O-acyle comme par exemple le résidu O-acyle de l'acide libre ayant la formule ci-dessus, le radical acétoxy ou benzyloxy, ou encore 1-imidazolyle, dans un solvant inerte et une base, à une température de -20° à 120° et de préférence de 0° à 50° C, ou encore l'acide libre (= lb) en présence de dicyclohexylcarbodiimide dans les mêmes conditions ;
5.2. on prépare des composés de formule IL_2

(IL₂)

dans laquelle R_3 , R_4 , X et Y ont les significations données pour la formule I, par réduction de composés de formule IL_1


(IL₁)

a) avec un silane, par exemple le triéthylsilane, en présence d'un acide tel que l'acide trifluoracétique, à une température de 0° à 80° C, ou bien

b) avec du cyanoborohydrure de sodium, en présence d'un acide organique tel que l'acide acétique, à une température de 0° à 80° C, ou bien


c) par voie catalytique, par exemple avec Pt/H₂.

25. Procédé de préparation de composés de formule Ik



(Ik)

qui consiste à diazoter un composé de formule XI'




(XI')



en milieu acide, avec un composé nitrite, à une température de -40° à 30°C , et à le traiter, dans le même réacteur ou dans un autre réacteur, avec un réducteur à une température de -40° à 80° et de préférence de -30° à 30°C , le réducteur étant ajouté avant ou après le composé nitrite ou en même temps que ce dernier, les substituants des composés ayant les significations suivantes :

X^a est un hydrogène, un halogène ou le radical méthyle, méthoxy ou COOH ;

E^b est un groupe facilement éliminable comme par exemple un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_{16}$, par exemple méthyle, éthyle, isopropyle ou n-dodécyle, ou benzyle ou encore acyle, par exemple acétyl, ou un résidu acide sulfonique ($-\text{SO}_3\text{H}$) ou cyano, ou encore, comme élément d'un pont disulfure, un deuxième résidu



Z^b est le radical cyano ou COA ;



A est UR , $\text{N}(\text{R}_1)\text{R}_2$ ou $\text{U}'\text{N}(=\text{C})_n(\text{R}_3)\text{R}_4$;

M est l'équivalent molaire d'un ion d'un métal alcalin ou alcalino-terreux, formé à partir d'une base ou d'un composé basique correspondants ;

U est l'oxygène ou le soufre ;

U' est l'oxygène ou $-\text{N}(\text{R}_5)-$;

R est un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_8$, un radical alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_8$ substitué par halogène, cyano, nitro, hydroxy ou U-(alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_3$), (T)- COOH ou (T)- $\text{COO}(\text{alkyle en } \text{C}_1\text{-C}_4)$, alcényle en $\text{C}_3\text{-C}_6$, alcényle en $\text{C}_3\text{-C}_6$ à substituant halogène, alcynyle en $\text{C}_3\text{-C}_6$, alcynyle en $\text{C}_3\text{-C}_6$ à substituant halogène, $(\text{T})_n\text{-cyclo(alkyle en } \text{C}_3\text{-C}_8)$, ou encore un groupe de la série :



X^a , X^b et X^c , chacun indépendamment l'un de l'autre, représentent un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, cyano, HOOC , MOOC , (alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_3$)- OOC , alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_4$, alcoxy en $\text{C}_1\text{-C}_4$, halogéno-(alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_2$) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène, en particulier des atomes de fluor ; ou bien X^a est un radical halogéno-(alcoxy en $\text{C}_1\text{-C}_2$) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène ou un radical nitro, diméthylamino, phényle, phényloxy, benzyloxy, sulfamoyl, et X^b et X^c sont simultanément des atomes d'hydrogène ; ou bien

X^a est le radical phényle, phényloxy ou benzyloxy, et

X^b est un halogène ou le radical méthyle et X^c est un hydrogène ; ou bien

X^a , X^b et X^c forment ensemble 4 ou 5 atomes de fluor ;

Napht est un résidu naphtyle non substitué, ou substitué par halogène, méthyle, méthoxy ou nitro ;

W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogène, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_2$ ou par un radical (alcoxy en $\text{C}_1\text{-C}_2$)-carbonyl-(alkylène en $\text{C}_2\text{-C}_4$)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaînons pontants $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ ou $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$;

R_1 est un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_5$, un radical alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_5$ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_5$ substitué par halogène, cyano, HOOC ou (alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_2$)- OOC ; alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_5$ interrompu par un atome d'oxygène ou un atome de soufre et substitué



par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en C₁-C₂)-OOC ; alcényle en C₃-C₅ ; alcényle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; alcynyle en C₃-C₅ ; alcynyle en C₃-C₅ substitué par (alkyle en C₁-C₃)-OOC ; (T)_n-cyclo (alkyle en C₃-C₆) ; (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₆) substitué par alkyle en C₁-C₃-OOC ; (T)_n-phényle ou (T)_n-phényle substitué dans la partie phényle par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF₃, cyano, HOOC ou MOOC ;

R₂ est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en C₁-C₃, alkyle en C₁-C₃ substitué par cyano ou alcoxy en C₁-C₃, alcoxy en C₁-C₄, ou encore un hétérocycle à 3-6 chaînons, saturé ou insaturé, comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R₁ et R₂, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R₃ est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en C₁-C₆, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R₄ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₆, CONH₂, CONH-CONH-(alkyle en C₁-C₃), alcanoyle en C₁-C₆, alcanoyle en C₁-C₃ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃, alcénoyle en C₃-C₅ ou alcénoyle en C₃-C₅ substitué par halogéno ou alcoxy en C₁-C₃ ;

R₃ et R₄, avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone dans le noyau ;


R₅ est un hydrogène ou le radical méthyle ;

R₆ est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄ ; et


n vaut zéro ou 1 ;

à l'exception des groupes amino primaires ou secondaires, des groupes UH- ou nitro, des radicaux Si- (alkyle en C₁-C₈)₃ ou des résidus contenant du phosphore.

26. Procédé de préparation de composés de formule




qui consiste à diazoter un composé de formule



en milieu acide, avec un composé nitrite, à une température de -20° à 30° C et, dans le même réacteur, à le traiter avec un réducteur à une température de -20° à 80° et de préférence de -20° à 30° C, le réducteur étant ajouté avant ou après le composé nitrite ou en même temps que ce dernier, les substituants des composés ayant les significations suivantes :

R^a est un hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₈, un radical alkyle en C₁-C₈ substitué par halogéno cyano, nitro, hydroxy ou U-(alkyle en C₁-C₃) ; (T)-COOH ou (T)-COO(alkyle en C₁-C₄), alcényle en C₃-C₆, alcényle en C₃-C₆ à substituant halogène, alcynyle en C₃-C₆, alcynyle en C₃-C₆ à substituant halogène, (T)_n-cyclo(alkyle en C₃-C₈), ou encore un groupe de la série :



X^a , X^b et X^c , chacun indépendamment l'un de l'autre, représentent un hydrogène, un halogène ou un radical hydroxy, cyano, HOOC, MOOC, (alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_3$)-OOC, alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_4$, alcoxy en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_4$, halogéno-(alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_2$) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène, en particulier des atomes de fluor ; ou bien X^a est un radical halogéno-(alcoxy en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_2$) ayant jusqu'à 5 atomes d'halogène ou un radical nitro, diméthylamino, phényle, phényloxy, benzyloxy, sulfamoyle, et X^b et X^c sont simultanément des atomes d'hydrogène ; ou bien

X^a est le radical phényle, phényloxy ou benzyloxy, et

X^b est un halogène ou le radical méthyle et X^c est un hydrogène ; ou bien

X^a , X^b et X^c forment ensemble 4 ou 5 atomes de fluor ;

Napht est un résidu naphthyle non substitué, ou substitué par halogéno, méthyle, méthoxy ou nitro ;

W est un hétérocycle ayant 1 à 3 hétéroatomes du groupe O, N et S, à 5-7 chaînons, saturé ou insaturé, non substitué ou encore substitué par halogéno, trifluorométhyle, cyano ou alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_2$ ou par un radical (alcoxy en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_2$)-carbonyle-(alkylène en $\text{C}_2\text{---}\text{C}_4$)-imino, ou encore un résidu de monosaccharide ;

T représente les chaînons pontants $\text{---CH}_2\text{---}$, $\text{---CH}_2\text{CH}_2\text{---}$, $\text{---CH}(\text{CH}_3)\text{---}$, $\text{---CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{---}$ ou $\text{---CH}_2\text{CH}_2\text{O---}$;

R_1 est un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_5$, un radical alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_5$ interrompu par un atome d'oxygène ou de soufre ; alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_5$ substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_2$)-OOC ; alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_5$ interrompu par un atome d'oxygène ou un atome de soufre et substitué par halogéno, cyano, HOOC ou (alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_2$)-OOC ; alcényle en $\text{C}_3\text{---}\text{C}_5$; alcényle en $\text{C}_3\text{---}\text{C}_5$ substitué par (alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_3$)-OOC ; alcynyle en $\text{C}_3\text{---}\text{C}_5$; alcynyle en $\text{C}_3\text{---}\text{C}_5$ substitué par (alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_3$)-OOC ; $(\text{T})_n$ -cyclo(alkyle en $\text{C}_3\text{---}\text{C}_6$) ; $(\text{T})_n$ -cyclo(alkyle en $\text{C}_3\text{---}\text{C}_6$) substitué par (alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_3$)-OOC ; $(\text{T})_n$ -phényle ou $(\text{T})_n$ -phényle substitué dans la partie phényle par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, CF_3 , cyano, HOOC ou MOOC ;

R_2 est un hydrogène ou un radical hydroxy, alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_3$, alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_3$ substitué par cyano ou alcoxy en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_3$, alcoxy en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_4$, ou encore un hétérocycle à 3-6 chaînons, saturé ou insaturé, comportant O, N ou S comme hétéro-atomes ;

R_1 et R_2 , avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ;

R_3 est un hydrogène ou un radical cyano, alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_6$, phényle, phényle substitué par halogéno, hydroxy, méthyle, méthoxy, HOOC ou MOOC, ou encore un hétérocycle W ;

R_4 est un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_6$, CONH_2 , CONH---CONH -(alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_3$), alcanoyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_6$, alcanoyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_3$ substitué par halogéno ou alcoxy en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_3$, alcénoyle en $\text{C}_3\text{---}\text{C}_5$ ou alcénoyle en $\text{C}_3\text{---}\text{C}_5$ substitué par halogéno ou alcoxy en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_3$;

R_3 et R_4 avec l'atome auquel ils sont liés, forment un hétérocycle W ou un noyau carbocyclique W' ;

W' est un résidu carbocyclique ayant 3 à 7 atomes de carbone sur le noyau ;

R_5 est un hydrogène ou le radical méthyle ;

R_6 est un hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_4$; et

n vaut zéro ou 1 ;

à l'exception des résidus comportant des groupes UH- ou nitro, ainsi que des résidus contenant du silicium ou du phosphore, et

E^b est un groupe facilement éliminable comme par exemple l'hydrogène ou un radical alkyle en $\text{C}_1\text{---}\text{C}_{16}$, par exemple méthyle, éthyle, isopropyle ou n-dodécyle, ou benzyle ou encore acyle, par exemple acétyle, ou un résidu acide sulfonique ($\text{---SO}_3\text{H}$) ou cyano.

27. Utilisation des composés de formule I selon la revendication 1 ou 2 pour l'immunisation des végétaux contre les maladies.



28. Utilisation des composés de formule I' selon la revendication 20 pour l'immunisation des végétaux contre les maladies.

29. Utilisation du 7-méthoxycarbonyl-benzo-1,2,3-thiadiazole en tant que matière active pour la préparation d'un produit destiné à immuniser les végétaux contre une infestation par des micro-organismes phytopathogènes.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55