



[図1]


プラセボ投与群
N=18
低用量投与群
N=17
高用量投与群
N=24
n.s.
n.s.
-347.0
-219.6
178.6
脳脊髄液中のAβ-38濃度変化量 (pg/mL)



プラセボ投与群
N=18
低用量投与群
N=17
高用量投与群
N=24
n.s.
n.s.
-916.0
-840.3
280.8
脳脊髄液中のAβ-40濃度変化量 (pg/mL)


プラセボ投与群
N=18
低用量投与群
N=17
高用量投与群
N=24
n.s.
n.s.
-21.4
-9.7
11.6
脳脊髄液中のAβ-42濃度変化量 (pg/mL)


[図2]


プラセボ投与群
N=16
低用量投与群
N=17
高用量投与群
N=24
n.s.
* p=0.0338
0.29
-3.94
-7.30
脳脊髄液中のp-Tau濃度変化量 (pg/mL)
プラセボ投与群
N=15
低用量投与群
N=12
高用量投与群
N=22
n.s.
n.s.
-70.1
-42.4
11.4
脳脊髄液中のtotal-Tau濃度変化量 (pg/mL)


[図3]


プラセボ投与群
N=15
低用量投与群
N=12
高用量投与群
N=22
n.s.
*p=0.0406
6.6
-2.0
-4.6
脳脊髄液中のp-Tau/total-Tau変化量 (%)

[図4]


プラセボ投与群
N=18
低用量投与群
N=17
n.s.
高用量投与群
N=24
* p=0.0120
28.2
-7.9
-101.4
-150
-100
-50
0
50
100
脳脊髄液中のtotal-Tau濃度変化量 (pg/mL)

[図5]


プラセボ投与群
N=18
低用量投与群
N=17
n.s.
高用量投与群
N=24
n.s.
-0.22
-0.20
0.04
-0.4
-0.2
0.0
0.2
脳脊髄液中のp-Tau/total-Tau変化量 (%)