

布地奈德给药均一性及稳定性
（前中后共10喷）理论喷量180 mcg
含量（%）
115
110
105
100
95
90
85
起始时间点
40℃ 1个月
40℃ 2个月
40℃ 3个月
40℃ 6个月
储放时间

Fig.1



盐酸丙卡特罗给药均一性及稳定性
（前中后共10喷）理论喷量10 mcg
含量（%）
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
起始时间点
40℃ 1个月
40℃ 2个月
40℃ 3个月
40℃ 6个月
储放时间

Fig.2



布地奈德成分粒径分布及稳定性（理论喷量180 mcg）
含量（mcg）
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
起始时间点
40℃ 1个月
40℃ 2个月
40℃ 3个月
40℃ 6个月

Fig. 3



盐酸丙卡特罗成分粒径分布及稳定性（理论喷量10 mcg）
含量（mcg）
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
3
4
5
6
7
起始时间点
40℃ 1个月
40℃ 2个月
40℃ 3个月
40℃ 6个月

Fig. 4



福替卡松给药均一性及稳定性（理论喷量250 mcg）
115
110
105
100
95
90
85
80
含量（%）
起始时间
40℃ 1个月
40℃ 2个月
40℃ 3个月
40℃ 6个月
储放时间

Fig. 5



福替卡松成分粒径分布及稳定性（理论喷量250 mcg）
含量（mcg）
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
起始时间点
40℃ 1个月
40℃ 2个月
40℃ 3个月
40℃ 6个月

Fig. 6



阿布叔醇给药均一性及稳定性（理论喷量 240mcg）
含量（%）
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
起始时间点
40℃ 1个月
40℃ 2个月
40℃ 3个月
40℃ 6个月
储放时间

Fig. 7



阿布叙醇成分粒径分布及稳定性（理论喷量240 mcg）
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
含量（%）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
起始时间点
40℃ 1个月
40℃ 2个月
40℃ 3个月
40℃ 6个月

Fig. 8