Fig. 1A




Fig. 1D




Fig. 1 B




Fig. 1E




Fig. 1 C



Fig. 1F



Fig. 2A




Fig. 2B





Fig. 3



Slider is moved ahead after 30 medicament units
from the outer ring of the blister pack have been punctured
in order to puncture units from 31 to 60 in the inner ring.




Fig. 4A




Fig. 4B




Fig. 4C

Fig. 5A




Fig. 5C




Fig. 5B




Fig. 5D




Fig. 6A




Fig. 6C






Fig. 6B



0-30 position

Fig. 6D



31-60 position

Fig. 7A




Fig. 7B




Fig. 7C




Fig. 7D




Fig. 7E




Fig. 8A




Fig. 8B




Fig. 8C




Fig. 9A




Fig. 9B




Fig. 10A




Fig. 10B





Fig. 10C






Fig. 11A




Fig. 11B




Fig. 12A




Fig. 12B




Fig. 13A




Fig. 13B



5.00
2
2.5
2.00
ø5
2
ø60
ø27
ø5
ø36
ø51
inner blister
outer blister

Fig. 14



2.65
2
5.00
2.4
ø5
ø5
2
ø60
ø30
inner blister
ø39
ø51
outer blister

Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17