


[図1A]


2202
2405
1406
4101
2101
1403
3102
3304
3405


[図1B]


3101
1404
1302
4302
1201
1405
3203


[図2]


2202
3102
2101
1406
1405
2405
3101
1201
1302
4302
1407
2303
3203
1403
1404
3304
4403
2404
3405
4101
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
サイクル数
2.5 mg/kg コホート
5.0mg/kg コホート
10 mg/kg コホート
20 mg/kg コホート


[図3]


p = 0.0852
打ち切り
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
50
100
150
200
250
300
350
400
無増悪生存期間(日)


[図4A]


図4A(GPC3-IHC高値群)
sGPC3 (ng/mL)
8
6
4
2
0
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
日
2101
4101
3102
2202
3304
1403
1406
2405


[図4B]


図4B(GPC3-IHC陰性・低値群)
sGPC3 (ng/mL)
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
日
3101
3203
1201
2303
1302
4302
1404
1405
1407


[図5A]


1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
生存率
p = 0.1234
打ち切り
0
50
100
150
200
250
300
350
400
無増悪生存期間(日)


[図5B]


1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
生存率
p = 0.0201
打ち切り
0
50
100
150
200
250
300
350
400
無増悪生存期間(日)


[図6A]


p = 0.0219
打ち切り
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
50
100
150
200
250
300
350
400
無増悪生存期間(日)


[図6B]


p = 0.0038
打ち切り
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
50
100
150
200
250
300
350
400
無増悪生存期間(日)


[図7A]


血清GPC3測定中央値未満
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
50
100
150
200
250
300
350
400
無増悪生存期間(日)


[図7B]


血清GPC3測定中央値以上
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
100
200
300
400
500
無増悪生存期間(日)


[図7C]


血清GPC3測定中央値未満
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
50
100
150
200
250
300
350
400
全生存期間(日)


[図7D]


血清GPC3測定中央値以上
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
100
200
300
400
500
無増悪生存期間(日)


[図7E]


血清GPC3 175 pg/mL <
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
100
200
300
400
500
無増悪生存期間(日)


[図7F]


血清GPC3 175 pg/mL <
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
100
200
300
400
500
無増悪生存期間(日)


[図8A]


血清GPC3測定中央値未満
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
100
200
300
400
500
無増悪生存期間(日)


[図8B]


血清GPC3測定中央値以上
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
無増悪生存期間(日)


[図8C]


血清GPC3測定中央値未満
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
50
100
150
200
250
300
350
400
全生存期間(日)


[図8D]


血清GPC3測定中央値以上
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
100
200
300
400
500
無増悪生存期間(日)

[図8E]


血清GPC3 259.7 pg/mL <
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
100
200
300
400
500
無増悪生存期間(日)

[図8F]


血清GPC3 259.7 pg/mL <
生存率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
100
200
300
400
500
無増悪生存期間(日)