

[続葉有]

MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO(BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: 悪性腫瘍の治療に関連する方法を提供する。悪性腫瘍の治療用の医薬組成物であって、プリンシドフォビル、その薬学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含み、前記治療の対象はTLE1低発現の悪性腫瘍を有する、医薬組成物を用いる。悪性腫瘍の治療用の医薬組成物であって、プリンシドフォビル、その薬学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物を含み、前記治療の対象はTLE1の発現レベルを指標に特定された対象である、医薬組成物を用いてもよい。悪性腫瘍対象におけるプリンシドフォビル、その薬学的に許容される塩又はそれらの溶媒和物への感受性を予測する方法であって、悪性腫瘍対象由来のサンプルにおけるTLE1の発現レベルを検査する工程を含む、方法を用いてもよい。