

請求の範囲

- [請求項1] ジクアホソルまたはその塩、およびポリビニルピロリドンを含む水性眼科用組成物。
- [請求項2] さらに、銀塩を含む、請求項1に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項3] 銀塩が、硝酸銀を含む、請求項2に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項4] ドライアイの予防または治療のための、請求項1～3のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項5] 1～5% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムおよびK値が30超ないし120以下のポリビニルピロリドンを含む、請求項4に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項6] 3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムおよびK値が30超ないし120以下のポリビニルピロリドンを含む、請求項4に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項7] 1～5% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムを含むし、粘度が25℃において1.5～30 mPa・sである、請求項4に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項8] 3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムを含むし、粘度が25℃において1.5～30 mPa・sである、請求項4に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項9] 1日2～4回点眼投与されるように用いられることを特徴とする、請求項5～8のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項10] 1日3回点眼投与されるように用いられることを特徴とする、請求項5～8のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項11] 1回1～2滴、点眼投与されるように用いられることを特徴とする、請求項9または10に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項12] 請求項1に記載の水性眼科用組成物0.1～1 mLがユニットドーズ型点眼容器に充填されていることを特徴とする眼科医薬用製品。
- [請求項13] 請求項1に記載の水性眼科用組成物0.3～0.5 mLがユニット

ドーズ型点眼容器に充填されていることを特徴とする眼科医薬用製品。
。

- [請求項14] 請求項1～3のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物1～10 mLがマルチドーズ型点眼容器に充填されていることを特徴とする眼科医薬用製品。
- [請求項15] 請求項1～3のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物5 mLがマルチドーズ型点眼容器に充填されていることを特徴とする、眼科医薬用製品。
- [請求項16] 請求項1に記載の水性眼科用組成物1～10 mLがPFMD容器に充填されていることを特徴とする眼科医薬用製品。
- [請求項17] 請求項1に記載の水性眼科用組成物5 mLがPFMD容器に充填されていることを特徴とする眼科医薬用製品。
- [請求項18] ドライアイの予防または治療のための、請求項12～17のいずれか1項に記載の眼科医薬用製品。
- [請求項19] 水性眼科用組成物が1～5% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムおよびK値が30超ないし120以下のポリビニルピロリドンを含む、請求項18に記載の眼科医薬用製品。
- [請求項20] 水性眼科用組成物が3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムおよびK値が30超ないし120以下のポリビニルピロリドンを含む、請求項18に記載の眼科医薬用製品。
- [請求項21] 水性組成物が1～5% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムを含む、25℃において1.5～30 mPa・sの粘度を有する、請求項18に記載の眼科医薬用製品。
- [請求項22] 水性組成物が3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムを含む、25℃において1.5～30 mPa・sの粘度を有する、請求項18に記載の眼科医薬用製品。
- [請求項23] 1日2～4回点眼投与されるように用いられることを特徴とする、請求項19～22のいずれか1項に記載の眼科医薬用製品。

- [請求項24] 1日3回点眼投与されるように用いられることを特徴とする、請求項19～22のいずれか1項に記載の眼科医薬用製品。
- [請求項25] 1回1～2滴、点眼投与されるように用いられることを特徴とする、請求項23または24に記載の眼科医薬用製品。
- [請求項26] K値が17以上のポリビニルピロリドンを含む、請求項1～4のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項27] K値が17～120のポリビニルピロリドンを含む、請求項1～4のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項28] K値が30超ないし120以下のポリビニルピロリドンを含む、請求項1～4のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項29] K値が90のポリビニルピロリドンを含む、請求項1～4のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項30] 前記ポリビニルピロリドンの濃度が、0.001% (w/v) 以上である、請求項1～11のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項31] 前記ジクアホソルまたはその塩の濃度が、0.0001～10% (w/v) である、請求項1～4のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項32] 前記ジクアホソルまたはその塩の濃度が、0.01～5% (w/v) である、請求項1～4のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項33] 前記ジクアホソルまたはその塩の濃度が、1～5% (w/v) である、請求項1～4のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項34] 前記ジクアホソルまたはその塩の濃度が、3% (w/v) である、請求項1～4のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項35] 前記水性眼科用組成物のpHが、6～8の範囲である、請求項1～11のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項36] 前記水性眼科用組成物のpHが、7～8の範囲である、請求項1～11のいずれか1項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項37] 前記水性眼科用組成物が無菌水性点眼液である、請求項1～11の

いずれか 1 項に記載の水性眼科用組成物。

- [請求項38] 室温で保存可能である、請求項 1 ～ 11 のいずれか 1 項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項39] 前記水性眼科用組成物の粘度が 25℃において 1.5 ～ 30 mPa・s である、請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項40] 前記ジクアホソルの塩が、ジクアホソルナトリウムである、請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項41] 1 回 1 ～ 2 滴、1 日 2 ～ 4 回点眼投与されるように用いられることを特徴とする、3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウム、K 値が 90 のポリビニルピロリドンおよび硝酸銀を含有する、ドライアイの予防または治療のための水性眼科用組成物。
- [請求項42] 1 回 1 ～ 2 滴、1 日 2 ～ 4 回点眼投与されるように用いられることを特徴とする、3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウム、ポリビニルピロリドンおよび硝酸銀を含有する、ドライアイの予防または治療のための水性眼科用組成物であって、粘度が 25℃において 3 ～ 30 mPa・s である、水性眼科用組成物。
- [請求項43] 1 日 3 回点眼投与されるように用いられることを特徴とする、請求項 41 または 42 に記載の水性眼科用組成物。
- [請求項44] 3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムおよび K 値が 90 のポリビニルピロリドンを含有する水性眼科用組成物 0.1 ～ 1 mL がユニットドーズ型点眼容器に充填された、ドライアイの予防または治療のための眼科医薬用製品であって、1 回 1 ～ 2 滴、1 日 2 ～ 4 回、前記水性眼科用組成物が点眼投与されるように用いられることを特徴とする、眼科医薬用製品。
- [請求項45] 3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムおよびポリビニルピロリドンを含有する水性眼科用組成物 0.1 ～ 1 mL がユニットドーズ型点眼容器に充填された、ドライアイの予防または治療のための

眼科医薬用製品であって、前記水性眼科用組成物が25℃において3～30 mPa・sの粘度を有し、且つ1回1～2滴、1日2～4回、点眼投与されるように用いられることを特徴とする、眼科医薬用製品。

[請求項46] 3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムおよびK値が90のポリビニルピロリドンを含む水性眼科用組成物1～10 mLがマルチドーズ型点眼容器に充填された、ドライアイの予防または治療のための眼科医薬用製品であって、1回1～2滴、1日2～4回、前記水性眼科用組成物が点眼投与されるように用いられることを特徴とする、眼科医薬用製品。

[請求項47] 3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムおよびポリビニルピロリドンを含む水性眼科用組成物1～10 mLがマルチドーズ型点眼容器に充填された、ドライアイの予防または治療のための眼科医薬用製品であって、前記水性眼科用組成物が25℃において3～30 mPa・sの粘度を有し、且つ1回1～2滴、1日2～4回、点眼投与されるように用いられることを特徴とする、眼科医薬用製品。

[請求項48] 3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムおよびK値が90のポリビニルピロリドンを含む水性眼科用組成物1～10 mLがPFMD容器に充填された、ドライアイの予防または治療のための眼科医薬用製品であって、1回1～2滴、1日2～4回、前記水性眼科用組成物が点眼投与されるように用いられることを特徴とする、眼科医薬用製品。

[請求項49] 3% (w/v) の濃度のジクアホソルナトリウムおよびポリビニルピロリドンを含む水性眼科用組成物1～10 mLがPFMD容器に充填された、ドライアイの予防または治療のための眼科医薬用製品であって、前記水性眼科用組成物が25℃において3～30 mPa・sの粘度を有し、且つ1回1～2滴、1日2～4回、点眼投与されるように用いられることを特徴とする、眼科医薬用製品。

- [請求項50] 1日3回点眼投与されるように用いられることを特徴とする、請求項44～49のいずれか1項に記載の眼科医薬用製品。
- [請求項51] さらに、硝酸銀を含有する、請求項46または47のいずれか1項に記載の眼科医薬用製品。