


1

图 1



紫杉醇亚微球乳剂对MDA-MB-231肿瘤抑制作用
肿瘤体积（mm3）
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
D0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 47 50 53 56 59 62 66 70 73 76 80
分组给药后时间（天）
阴性对照组
亚微乳45mg/kg
注射用紫杉醇45mg/kg
紫素20mg/kg
亚微乳67.5mg/kg0.58ml

图 2



紫杉醇亚微球乳剂给药后MDA-MB-231模型鼠荷瘤变化
动物荷瘤率（%）
120
100
80
60
40
20
0
D0 3 6 9 12 15 18 21 25 27 30 33 36 39 42 45 47 50 53 56 59 62 66 70 73 76 80
分组给药后时间（天）
阴性对照组
亚微乳45mg/kg
注射用紫杉醇45mg/kg
紫素20mg/kg
亚微乳67.5mg/kg

图 3



紫杉醇亚微球乳剂给药对荷MDA-MB-231肿瘤裸鼠体重影响
动物体重（g）
分组给药后时间（天）
阴性对照组
亚微乳45mg/kg
注射用紫杉醇45mg/kg
紫素20mg/kg
亚微乳67.5mg/kg0.58ml

图 4