請求の範囲

[請求項1] 後天性血友病Ａを治療するおよび/または後天性血友病Ａの発症率を低下させるために使用するための、エミシズマブを含む医薬組成物であって、エミシズマブが、6mg/kgの抗体の用量で初日に投与され、3mg/kg～6mg/kgの抗体の用量で2日目に投与され、かつ1.5mg/kg～3mg/kgの抗体の用量で8日目から1週間毎の投与が1回以上反復される、前記医薬組成物。

[請求項2] 初日の投与、2日目の投与、および8日目からの1週間毎の投与が、それぞれ1回投与で行われる、請求項1に記載の医薬組成物。

[請求項3] 初日の投与、2日目の投与、および8日目からの1週間毎の投与が、それぞれ皮下投与で行われる、請求項1または２に記載の医薬組成物。

[請求項4] エミシズマブが、3mg/kgの抗体の用量で2日目に投与される、請求項1～3のいずれかに記載の医薬組成物。

[請求項5] エミシズマブが、1.5mg/kgの抗体の用量で8日目から1週間毎の投与が1回以上反復される、請求項1～4のいずれかに記載の医薬組成物。

[請求項6] 免疫抑制薬投与下で使用される、請求項1～5のいずれかに記載の医学的組成物。

[請求項7] 免疫抑制薬がステロイド薬である、請求項6に記載の医学的組成物。

[請求項8] （i）容器；（ii）エミシズマブを含む、前記容器内の医学的組成物、ならびに（iii）エミシズマブを6mg/kgの抗体の用量で初日に投与し、3mg/kg～6mg/kgの抗体の用量で2日目に投与し、かつ1.5mg/kg～3mg/kgの抗体の用量で8日目から1週間毎の投与が1回以上反復されることを指示する文書を含む、製品。

[請求項9] 初日の投与、2日目の投与、および8日目からの1週間毎の投与が、それぞれ1回投与で行われる、請求項8に記載の製品。

[請求項10] 初日の投与、2日目の投与、および8日目からの1週間毎の投与が、

それぞれ皮下投与で行われる、請求項8または9に記載の製品。

[請求項11] エミシズマブが、3mg/kgの抗体の用量で2日目に投与される、請求項8～10のいずれかに記載の製品。

[請求項12] エミシズマブが、1.5mg/kgの抗体の用量で8日目から1週間毎の投与が1回以上反復される、請求項8～11のいずれかに記載の製品。

[請求項13] エミシズマブは免疫抑制薬と併用して使用することを指示する前記文書を含む、請求項8～12のいずれかに記載の製品。

[請求項14] 後天性血友病Ａを治療するおよび/または後天性血友病Ａの発症率を低下させるために使用するための、エミシズマブを含む医薬組成物であって、エミシズマブが、6mg/kgの抗体の用量で初日に投与され、3mg/kg～6mg/kgの抗体の用量で2日目に投与され、かつ3mg/kg～4mg/kgの抗体の用量で8日目から2週間毎の投与が1回以上反復される、または6mg/kgの抗体の用量で8日目から4週間毎の投与が1回以上反復される、前記医薬組成物。

[請求項15] 後天性血友病Ａを治療するおよび/または後天性血友病Ａの発症率を低下させるために使用するための、エミシズマブを含む医薬組成物であって、エミシズマブが、6mg/kgの抗体の用量で初日に投与され、3mg/kg～6mg/kgの抗体の用量で2日目に投与され、1.5mg/kg～3mg/kgの抗体の用量で8日目に投与され、かつ3mg/kg～4mg/kgの抗体の用量で15日目から2週間毎の投与が1回以上反復される、または6mg/kgの抗体の用量で15日目から4週間毎の投与が1回以上反復される、前記医薬組成物。