

明 細 書

発明の名称：ピリジニルピラゾロキノリン化合物

技術分野

[0001] 本発明は、ホスホジエステラーゼ 9 (PDE 9) の阻害活性を有するピリジニルピラゾロキノリン化合物およびその薬剤学的に許容される塩ならびにその医薬用途に関する。

背景技術

[0002] 細胞内で二次情報伝達物質として働く環状グアノシンーリン酸（以下、cGMP という。）は、学習記憶行動を初めとする様々な生理機能に重要な役割を果たすことが知られている。

[0003] 脳内神経回路のシナプス後部にて、一酸化窒素合成酵素により生合成された一酸化窒素（以下、NO という。）は、cGMP 合成酵素であるグアニル酸シクラーゼを活性化する。活性化されたグアニル酸シクラーゼは、グアノシン三リン酸より cGMP を生合成する。cGMP は様々なシナプス可塑性に関与するタンパク質をリン酸化する cGMP 依存性蛋白質リン酸化酵素（以下、PKG という。）を活性化する。この NO/cGMP/PKG カスケードの活性化は、学習記憶行動の神経基盤と考えられている海馬のシナプス可塑性（Long Term Potentiation；以下、LTP という。）の誘起に関与することが知られている（例えば、非特許文献 1 を参照）。このカスケードのシグナル伝達を活性化する薬剤が海馬の LTP や動物の学習行動を改善することが知られている一方で、このカスケードを阻害する薬剤は、前記の改善作用とは逆の作用を示すことが知られている（非特許文献 2）。したがって、これらの知見より、脳内で cGMP を上昇させることは、学習記憶行動の改善につながると期待される。


[0004] cGMP はホスホジエステラーゼ（以下、PDE という。）により PKG 活性化作用を有しない 5' -GMP に代謝される。PDE には 11 種のファミリーが知られており、PDE 9 は、cGMP を特異的に代謝し、脳や脾臓

、小腸等に発現していることが知られている（例えば、非特許文献3を参照）。つまり、PDE9を阻害することにより、脳内でcGMPが増加することと期待される。実際にPDE9阻害剤は、海馬LTPを亢進すること、動物にて新奇物体認識試験・受動的回避学習試験等で学習記憶行動を改善することが報告されている（非特許文献4）。また、臨床で、アルツハイマー病患者では、その上部側頭皮質において、グアニル酸シクラーゼ活性が低下しており、cGMPレベルが減少している可能性が示唆されている（非特許文献5）。したがって、PDE9は、アレキサンダー病、アルパーズ病、アルツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症（ALS；ルー・ゲーリツク病または運動ニューロン疾患として知られている）、毛細血管拡張性運動失調、バツナ病（シュピールマイヤー・フオークト・シェーグレン・バツナ病として知られている）、ピンスヴァンガー認知症（皮質下動脈硬化性脳障害）、双極性障害、ウシ海綿状脳症（BSE）、キャナバン病、化学療法誘発認知症、コケイン症候群、大脳皮質基底核変性症、クロイツフェルト・ヤコブ病、鬱病、ダウン症候群、前頭側頭葉変性症（前頭側頭型認知症、語義認知症および進行性非流暢性失語症を含む）、ゲルストマン・シュトラウスラー・シャインカー病、緑内障、ハンチントン病（舞蹈病）、HIV関連認知症、多動、ケネディ病、コルサコフ症候群（健忘一作話症候群）、クラッペ病、レーヴィ小体認知症、進行性l o g o p e n i c 失語症、マチャド・ジョセフ病（3型脊髄小脳失調）、多発性硬化症、多発性萎縮症（オリゾ橋小脳萎縮症）、重症筋無力症、パーキンソン病、ペリツエウス・メルツバハ病、ピック病、初老期認知症（軽度認知障害）、原発性側索硬化症、原発性進行性失語症、放射性誘発認知症、レフサム病（フイタン酸蓄積症）、サンボフ病、シルター病、統合失調症、語義認知症、老人性認知症、シャイ・ブレイガー症候群、脊髄小脳失調、棘筋萎縮症、スライル・リチャード・ソール・スエフスキー病（進行性核上麻痺）、血管アミロイドーシスおよび血管性認知症（多発梗塞性認知症）などの神経変性疾患および精神疾患、特に、アルツハイマー病における認知機能障害等の病理学に多くの密接な関係

をもっている可能性がある。

[0005] 最近では、PDE 9 阻害活性を有し、アルツハイマー病の予防または治療を目的とする以下の化合物が知られている（特許文献 1）。


[化1]



[0006] 上記化合物はピラゾロピリミジン誘導体であり、ピラゾロキノリン骨格とはまったく異なる構造を有する化合物である。

[0007] 一方、ピラゾロキノリン骨格を有する化合物として、特許文献 2 に記載の以下の化合物が知られている。

[化2]




[式中、環 A はベンゼン環等であり、R⁶ は直接結合等である。]

しかしながら、上記化合物において環 B はベンゼン環等を示す。また、上記化合物は、PDE 4 の阻害活性を有し、各種炎症性疾患に用いられることが記載されているが、PDE 9 の阻害活性等については記載も示唆もない。

[0008] PDE 9 阻害活性を有する化合物として、特許文献 3 および特許文献 4 に記載の以下の化合物が知られている。

[化3]



先行技術文献

特許文献

- [0012] 特許文献1：国際公開2008／139293号
特許文献2：国際公開2007／032466号
特許文献3：国際公開2008／072779号
特許文献4：国際公開2010／101230号
特許文献5：国際公開2012／033144号

非特許文献

- [0013] 非特許文献1：Domek-Lopacinska et al., "Cyclic GMP metabolism and its role in brain physiology", J. Physiol. Pharmacol., vol. 56, Suppl 2: pp. 15-34, 2005.
非特許文献2：Wang X., "Cyclic GMP-dependent protein kinase and cellular signaling in the nervous system", J. Neurochem., vol. 68, pp. 443-456, 1997.
非特許文献3：Fisher et al., "Isolation and characterization of PDE9A, a novel human cGMP-specific phosphodiesterase", J. Biol. Chem., vol. 273: pp. 15559-15564, 1998.
非特許文献4：vander Staay et al., "The novel selective PDE9 inhibitor BAY 73-6691 improves learning and memory in rodents", Neuropharmacology, vol. 55: pp. 908-918, 2008.
非特許文献5：Bonkale et al., "Reduced nitric oxide responsive soluble guanylyl cyclase activity in the superior temporal cortex of patients with Alzheimer's disease", Neurosci. Lett., vol. 187, pp. 5-8, 1995.

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0014] 本発明の課題は、PDE9阻害作用を有する新規化合物またはその薬剤学的に許容される塩、およびそれらを含む医薬組成物を提供することにある。

る。


課題を解決するための手段

[0015] 本発明者らは、上記課題を解決すべく、精力的に研究を重ねた結果、P D E 9 阻害作用を有する新規なピリジニルピラゾロキノリン化合物又はその薬剤学的に許容される塩を見出した。

[0016] すなわち、本発明は以下<1>から<14>に関する。


<1>式(1)で表わされる化合物またはその薬剤学的に許容される塩。

[化7]




[式中、R¹は式

[化8]




で表わされる基、式

[化9]



で表わされる基または式

[化10]




で表わされる基であり、

R²は3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル基または4-メトキ

シシクロヘキシル基である。]


<2>式(11)で表わされる<1>記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩。

[化11]




[式中、 R^3 は式

[化12]



で表わされる基または式


[化13]



で表わされる基である。]

<3>式(111)で表わされる<1>記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩。

[化14]




[式中、 R^2 は3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル基または4

ーメトキシシクロヘキシル基である。]


<4> (－)－7－(6－メトキシ－2, 4－ジメチルピリジン－3－イル)
)－1－((3R*, 4R*)－3－メチルテトラヒドロ－2H－ピラン－4
 －イル)－1H－ピラゾロ[4, 3－c]キノリン－4(5H)－オン((
 －)－cis)またはその薬剤学的に許容される塩。

[化15]




<5> (－)－7－(6－メトキシ－2, 4－ジメチルピリジン－3－イル)
)－1－((3R*, 4S*)－3－メチルテトラヒドロ－2H－ピラン－4
 －イル)－1H－ピラゾロ[4, 3－c]キノリン－4(5H)－オン((
 －)－trans)またはその薬剤学的に許容される塩。

[化16]



<6> (－)－7－(2－メトキシ－4, 6－ジメチルピリジン－3－イル)
)－1－((3R*, 4S*)－3－メチルテトラヒドロ－2H－ピラン－4
 －イル)－1H－ピラゾロ[4, 3－c]キノリン－4(5H)－オン((
 －)－trans)またはその薬剤学的に許容される塩。


[化17]



* relative stereochemistry chiral

<7> (–) – 7 – (2 – メトキシ – 3, 5 – ジメチルピリジン – 4 – イル) – 1 – ((3 R*, 4 R*) – 3 – メチルトetraヒドロ – 2 H – ピラン – 4 – イル) – 1 H – ピラゾロ [4, 3 – c] キノリン – 4 (5 H) – オン ((–) – c i s) またはその薬剤学的に許容される塩。


[化18]



* relative stereochemistry chiral

<8> 7 – (2 – メトキシ – 3, 5 – ジメチルピリジン – 4 – イル) – 1 – (トランス – 4 – メトキシシクロヘキシル) – 1 H – ピラゾロ [4, 3 – c] キノリン – 4 (5 H) – オンまたはその薬剤学的に許容される塩。

[化19]



<9><1>記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩を有効成分として含有する医薬組成物。

<10> PDE9の阻害剤である<9>記載の医薬組成物。

<11> 脳内cGMP濃度を上昇させるための<9>記載の医薬組成物。

<12> <1>記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩を含有する、アルツハイマー病における認知機能障害改善剤。

<13> <1>記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩を患者に投与する、アルツハイマー病における認知機能障害の改善方法。

<14> アルツハイマー病における認知機能障害の改善に使用される、<1>記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩。

発明の効果

[0017] 本発明に係る式(1)で表されるピリジニルピラゾロキノリン化合物(以下、化合物(1)という。)および/またはその薬剤学的に許容される塩は、下記の薬理試験例における活性データにて示されているように、PDE9阻害作用を有する。本発明の化合物(1)は、PDE9阻害作用として、1000nM以下の IC_{50} 値を示しているものが殆どであり、100nM以下の IC_{50} 値を示す化合物が好ましい。

[0018] 本発明の化合物(1)は、PDE9阻害作用を有することにより、脳内におけるcGMP濃度を上昇させることが期待できる。PDE9阻害作用やcGMPの上昇は、学習記憶行動の改善につながり、アルツハイマー病における認知機能障害等の治療剤としての利用可能性を有している。

発明を実施するための形態

[0019] 以下、本発明の内容について詳細に説明する。

[0020] 本明細書中においては、化合物の構造式が便宜上一定の異性体を表すことがあるが、本発明には化合物の構造上生ずるすべての幾何異性体、光学異性体、立体異性体、互変異性体等の異性体および異性体混合物を含み、便宜上の式の記載に限定されるものではなく、いずれか一方の異性体でも、各異性体を任意の比率で含む混合物でもよい。したがって例えば、本発明の化合物には、光学異性体およびラセミ体が存在することがありえるが、本発明においてはいずれにも限定されず、ラセミ体であっても、各光学活性体のいずれ

かであっても、各光学活性体を任意の比率で含む混合物でもよい。しかしながら、異性体、ラセミ体、異性体混合物のうち、あるものは、他のものよりも活性を示す可能性があるとして理解されている。

[0021] また、結晶多形が存在することもあるが同様にいずれにも限定されず、いずれかの結晶形の単一物であっても混合物であってもよく、また、本発明には非晶質体も含まれ、そして、本発明にかかる化合物には、無水物と溶媒和物（特に水和物）とが包含される。

[0022] 本発明には、化合物（I）の同位体標識された化合物も含まれる。同位体標識された化合物は1つ又はそれ以上の原子が自然界に通常見出される原子質量か質量数と異なった原子質量か質量数を有する原子で置き換えられていること以外、化合物（I）と同一である。本発明の化合物に組み入れることができる同位元素は、例えば、水素、炭素、窒素、酸素、フッ素、リン、硫黄、沃素、および塩素の同位元素であり、 ^2H 、 ^3H 、 ^{11}C 、 ^{14}C 、 ^{15}N 、 ^{18}O 、 ^{18}F 、 ^{32}P 、 ^{35}S 、 ^{123}I 、および ^{125}I 等が含まれる。


[0023] 上記同位体標識化合物、例えば、 ^3H および／または ^{14}C などの放射性同位元素が組み入れられた化合物は医薬および／または基質の組織分布アッセイに有用である。 ^3H と ^{14}C はそれらの調製と検出の容易さのため有用と考えられている。同位元素 ^{11}C および ^{18}F はPET（陽電子放射断層撮影）で有用と考えられており、同位元素 ^{125}I はSPECT（単光子放出コンピュータ断層撮影）で有用と考えられており、脳イメージングですべて有用である。 ^2H などのより重い同位元素による置換は、より高い代謝的安定性による生体内半減期を増加又は必要用量の減少等のある種の治療上の利点を生じさせ、それ故に、ある状況下では有用と考えられている。上記同位体標識化合物は容易に利用可能な同位体標識された試薬を同位体標識されていない試薬の代わりに用いて、以下の実施例に開示された手順を行うことによって一様に調製することができる。

[0024] 以下に、本明細書において記載する用語、記号等の意義を説明し、本発明を詳細に説明する。

[0025] 式(1)で表される化合物における R^1 および R^2 の定義及び好適例について以下に説明する。


R^1 は、式

[化20]




で表わされる基、式

[化21]



で表わされる基または式

[化22]



で表わされる基である。

[0026] R^2 は、3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル基または4-メトキシシクロヘキシル基である。

[0027] 本明細書における「薬剤学的に許容される塩」とは、本発明にかかる化合物と塩を形成されるものであれば特に限定されず、具体的には例えば、無機酸塩、有機酸塩、無機塩基塩、有機塩基塩、酸性または塩基性アミノ酸塩等が挙げられる。

[0028] 本明細書における「薬剤学的に許容される塩」とは、特に限定する記載がない限り、適宜な比で塩を形成しさえすれば、形成された塩において、当該化合物1分子に対する酸の分子数は特に限定されないが、好ましくは該化合物1分子に対して酸は、約0.1～約5分子であり、より好ましくは該化合

物 1 分子に対して酸は約 0.5 ～ 約 2 分子であり、さらに好ましくは、当該化合物 1 分子に対して酸は、約 0.5、約 1、または約 2 分子である。

[0029] 無機酸塩の好ましい例としては、例えば塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩等があげられ、有機酸塩の好ましい例としては、例えば酢酸塩、コハク酸塩、フマル酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩、クエン酸塩、乳酸塩、ステアリン酸塩、安息香酸塩、メタンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩等があげられる。

[0030] 無機塩基塩の好ましい例としては、例えばナトリウム塩、カリウム塩などのアルカリ金属塩；カルシウム塩、マグネシウム塩などのアルカリ土類金属塩；アルミニウム塩；アンモニウム塩などがあげられ、有機塩基塩の好ましい例としては、例えばジエチルアミン塩、ジエタノールアミン塩、メグルミン塩、N, N'-ジベンジルエチレンジアミン塩などがあげられる。

[0031] 酸性アミノ酸塩の好ましい例としては、例えばアスパラギン酸塩、グルタミン酸塩などが挙げられ、塩基性アミノ酸塩の好ましい例としては、例えばアルギニン塩、リジン塩、オルニチン塩などがあげられる。

[0032] [製剤] 本発明の一般式 (I) の化合物および／またはその薬剤学的に許容し得る塩は、常法により製剤化が可能であり、剤形としては、例えば、経口剤（錠剤、顆粒剤、散剤、カプセル剤、シロップ剤等）、注射剤（静脈内投与用、筋肉内投与用、皮下投与用、腹腔内投与用等）、外用剤（経皮吸収製剤（軟膏剤、貼付剤等）、点眼剤、点鼻剤、坐剤等）とすることができる。

[0033] 経口用固形製剤を製造する場合には、一般式 (I) の化合物および／またはその薬剤学的に許容し得る塩に、必要に応じて、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、着色剤等を添加し、常法により錠剤、顆粒剤、散剤、カプセル剤を製造することができる。また、錠剤、顆粒剤、散剤、カプセル剤等は、必要に応じて、コーティングを施してもよい。

賦形剤としては、例えば、乳糖、コーンスターチ、結晶セルロース等を、結合剤としては、例えば、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロ

ピルメチルセルロース等を、崩壊剤としては、例えば、カルボキシメチルセルロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム等を、滑沢剤としては、例えば、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム等を、着色剤としては、例えば、酸化チタン等を、コーティング剤としては、例えば、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、メチルセルロース等を挙げることができるが、もちろんこれらに限定される訳ではない。

これらの錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤等の固形製剤は、通常、0.001～99.5重量%、好ましくは0.01～90重量%等の一般式(1)の化合物および／またはその薬剤学的に許容し得る塩を含むことができる。

[0034] 注射剤（静脈内投与用、筋肉内投与用、皮下投与用、腹腔内投与用等）を製造する場合には、一般式(1)の化合物および／またはその薬剤学的に許容し得る塩に、必要に応じて、pH調整剤、緩衝剤、懸濁化剤、溶解補助剤、抗酸化剤、保存剤（防腐剤）、等張化剤等を添加し、常法により注射剤を製造することができる。また、凍結乾燥して、用時溶解型の凍結乾燥製剤としてもよい。

pH調整剤や緩衝剤としては、例えば、有機酸または無機酸および／またはその塩等を、懸濁化剤としては、例えば、メチルセルロース、ポリソルベート80、カルボキシメチルセルロースナトリウム等を、溶解補助剤としては、例えば、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート等を、抗酸化剤としては、例えば、 α -トコフェロール等を、保存剤としては、例えば、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル等を、等張化剤としては、例えば、ブドウ糖、塩化ナトリウム、マンニトール等を挙げることができるが、もちろんこれらに限定される訳ではない。

これらの注射剤は、通常、0.000001～99.5重量%、好ましくは0.00001～90重量%等の一般式(1)の化合物および／またはその薬剤学的に許容し得る塩を含むことができる。

[0035] 外用剤を製造する場合には、一般式(1)の化合物および／またはその薬

剤学的に許容し得る塩に、基剤原料を添加し、必要に応じて、前記の例えば、保存剤、安定剤、pH調整剤、抗酸化剤、着色剤等を加えて、常法により、例えば、経皮吸収製剤（軟膏剤、貼付剤等）、点眼剤、点鼻剤、坐剤等を製造することができる。

使用する基剤原料としては、例えば、医薬品、医薬部外品、化粧品等に通常使用される各種原料を用いることが可能である。具体的には、例えば、動植物油、鉱物油、エステル油、ワックス類、乳化剤、高級アルコール類、脂脂肪酸類、シリコン油、界面活性剤、リン脂質類、アルコール類、多価アルコール類、水溶性高分子類、粘土鉱物類、精製水等の原料を挙げることができる。

これらの外用剤は、通常、0.000001～99.5重量%、好ましくは0.00001～90重量%等の一般式（1）の化合物および／またはその薬剤学的に許容し得る塩を含むことができる。

[0036] 本発明の化合物は生理活性低分子化合物の標的タンパクを捕捉するためのケミカルプローブとすることができる。すなわち、本発明の化合物は、当該化合物の活性発現に必須な構造部分とは異なる部分に、J. Mass Spectrom. Soc. Jpn. Vol. 51, No. 5, p 492-498または WO2007/139149等に記載の手法で標識基、リンカー等を導入することでアフィニティークロマトグラフィー、フォトアフィニティープローブ等に変換することができる。

[0037] ケミカルプローブに用いる標識基、リンカー等は、例えば以下の（1）ないし（5）からなる群に示される基が挙げられる。

（1）光親和性標識基（例えば、ペンゾイル基、ベンゾフェノン基、アジド基、カルボニルアジド基、ジアジリジン基、エノン基、ジアゾ基およびニトロ基等）および化学親和性基（例えば、アルファ-炭素原子がハロゲン原子で置換されたケトン基、カルバモイル基、エステル基、アルキルチオ基、 α 、 β -不飽和ケトン、エステル等のマイケル受容体、およびオキシラン基等のタンパク質標識基、

(2) $-S-S-$ 、 $-O-Si-O-$ 、単糖（グルコース基、ガラクトース基等）または二糖（ラクトース等）等の開裂可能なリンカー、および酵素反応で開裂可能なオリゴペプチドリナー、

(3) ビオチン、3-（4, 4-ジフルオロ-5, 7-ジメチル-4H-3a, 4a-ジアザ-4-ボラ-s-インダセン-3-イル）プロピオニル基等のフィッシングタグ基、

(4) ^{125}I 、 ^{32}P 、 ^3H 、 ^{14}C などの放射性標識基；フルオレセイン、ローダミン、ダンシル、ウンベリフェロン、7-ニトロフラザニル、3-（4, 4-ジフルオロ-5, 7-ジメチル-4H-3a, 4a-ジアザ-4-ボラ-s-インダセン-3-イル）プロピオニル基等の蛍光標識基；ルミフェリン、ルミノール等の化学発光基；ランタノイド金属イオン、ラジウムイオン等の重金属イオン等の検出可能なマーカーまたは

(5) ガラスビーズ、ガラスベット、マイクロタイタープレート、アガロースビーズ、アガロースベッド、ポリスチレンビーズ、ポリスチレンベッド、ナイロンビーズ、ナイロンベッド等の固相担体と結合させる基等。

上記の(1)ないし(5)からなる群より選択される標識基等を上記文献に記載の方法等に準じて本発明の化合物に導入して調製されるプローブは、新たな創薬ターゲットの探索等に有用な標識タンパクの同定のためのケミカルプローブとして用いることができる。

実施例

[0038] 本発明の化合物(1)は、例えば、以下の実施例に記載した方法またはそれに準じた方法により製造することができ、また、当該化合物の効果は、以下の試験例に記載した方法により確認することができる。ただし、これらは例示的なものであって、本発明は、如何なる場合も以下の具体例に制限されるものではなく、また本発明の範囲を逸脱しない範囲で変化させてもよい。

[0039] 文献名等が記載されている化合物は、その文献等に従って製造したことを示す。

[0040] また、本明細書に使用される略号は当業者に周知の慣用的な略号である。

本明細書においては下記の略号を使用する。

CDI : 1, 1' - カルボニルジイミダゾール

DCM : ジクロロメタン

DIPEA : N, N - ジイソプロピルエチルアミン

DMF : N, N - ジメチルホルムアミド

DMF-DMA : N, N - ジメチルホルムアミドジメチルアセタール

DMSO : ジメチルスルホキシド

DTT : ジチオスレイトール

EDC : 1 - エチル - 3 - (3 - ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド
塩酸塩

EDTA : エチレンジアミン四酢酸

EGTA : グリコールエーテルジアミン四酢酸

HOBT : 1 - ヒドロキシベンゾトリアゾール

KTB : カリウム tert - ブトキシド

MTBE : tert - ブチルメチルエーテル

n - : ノルマル

p - : パラ

Pd(dppf)Cl₂ · DCM 錯体 : 1, 1' - ビス(ジフェニルホスフィ
ノ)フェロセンジクロロパラジウム(II) · DCM 錯体

Pd(PPh₃)₄ : テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)
)

t - : ターシャリー

TEA : トリエチルアミン

TFA : トリフルオロ酢酸

THF : テトラヒドロフラン

Tris : トリスヒドロキシメチルアミノメタン

¹H-NMR : プロトン核磁気共鳴スペクトルメトリー

LC-MS : 液体クロマトグラフィー-マススペクトルメトリー

[0041] 以下の実施例及び製造例中の「室温」は通常約10℃から約35℃を示す。
%は特記しない限り重量パーセントを示す。

[0042] プロトン核磁気共鳴スペクトルの化学シフトは、テトラメチルシランに対する δ 単位(ppm)で記録され、カップリング定数はヘルツ(Hz)で記録されている。分裂パターンの略号は以下の通りである。s:シングレット、d:ダブルット、t:トリプレット、q:カルテット、m:マルチプレット、brs:ブロードシングレット、brd:ブロードダブルット。

[0043] 化合物の光学分割には、Biotage社製Parallel FlexTM M (カラム:DAICEL社製CHIRALPAK (登録商標) AD-H, IA, IB, IC, DAICEL社製CHIRALCEL (登録商標) OD-H, OJ-Hのいずれか、カラムサイズ:2cm ϕ ×25cm)、流速10.0mL/分を用いた。旋光度(+/-)は、日本分光OR-2090型旋光度検出器(水銀キセノン(Hg-Xe)ランプ、150W)を用いて測定した。

クロマトグラフィーに関して、シリカゲルカラムクロマトグラフィーと記載がある場合は、YAMAZEN社製パラレルプレップ(カラム:YAMAZEN社製Hi-FlashTM Column (Silicagel)、サイズ;S(16×60mm)、M(20×75mm)、L(26×100mm)、2L(26×150mm)、3L(46×130mm)のいずれか)、富士シリシア化学株式会社製クロマトグラフィー用シリカゲル球状PSQ 60BTM、富士シリシア化学株式会社製クロマトグラフィー用シリカゲルBW-300TM、ワコーゲル(登録商標)C-200(和光純薬工業)、またはMerck Ltd. Japanシリカゲル60(登録商標)(70~230mesh)を用いた。また、NHシリカゲルカラムクロマトグラフィーと記載がある場合は、YAMAZEN社製パラレルプレップ(カラム:YAMAZEN社製Hi-FlashTM Column (Amino)、サイズ;S(16×60mm)、M(20×75mm)、L(26×100mm)、2L(26×150mm)、3L(46×130mm)のいずれ

か)、あるいは、FUJII SILISIA CHEMICAL LTD.
NH SILICA GEL (200~350 mesh) を用いた。


[0044] (±) - はラセミ体を、(+) -、(-) - はそれぞれエナンチオマーの
(+) 型、(-) 型であることを示す。

[0045] 以下に示す化合物の命名は、一般的に用いられる試薬を除き、「E - ノー
トブック (登録商標)」バージョン 12 (パーキンエルマー社) で表示され
たものを用いた。

[0046] 製造例 1

3 - ブロモ - 6 - メトキシ - 2, 4 - ジメチルピリジンの合成

[化23]



[0047] (1) 5 - ブロモ - 4, 6 - ジメチルピリジン - 2 - オールの合成

2 - アミノ - 5 - ブロモ - 4, 6 - ジメチルピリジン (15 g) を硫酸 (14.2 mL) および水 (212 mL) の混合溶液に溶解させた。得られた溶液に、0℃にて亜硝酸ナトリウム (6.18 g) の水 (31 mL) 溶液を加えた。その反応液を室温にて1時間攪拌した後、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下濃縮し、残渣にMTBEを加え固体を析出させた後、ろ過した。得られた固体をMTBEで洗浄することで、標記化合物 (13.7 g) を得た。

ESI - MS m/z 204 $[M+H]^+$

[0048] (2) 3 - ブロモ - 6 - メトキシ - 2, 4 - ジメチルピリジンの合成

5 - ブロモ - 4, 6 - ジメチルピリジン - 2 - オール (7 g)、ヨウ化メチル (21.6 mL) および炭酸銀 (19.1 g) の混合物を、クロロホルム (140 mL) 中、室温にて36時間攪拌した。反応液をシリカゲルパッドに供し、混合溶媒 (酢酸エチル : n - ヘプタン = 2 : 8) を用いて溶出した。得られたフラクションを減圧下濃縮することで、標記化合物 (6.98

g) を得た。


$^1\text{H-NMR}$ (400MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 2.32–2.35 (m, 3H), 2.56–2.58 (m, 3H), 3.88 (s, 3H), 6.43–6.48 (m, 1H).

ESI-MS m/z 216 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0049] 製造例 2

3-ブロモ-2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジンの合成

[化24]



[0050] (1) 3-ブロモ-2-クロロ-4, 6-ジメチルピリジンの合成

2-クロロ-4, 6-ジメチルピリジン-3-アミン (2.85 g) を臭化水素酸 (15 mL, 48%水溶液) に溶解させ、0℃に冷却した。その溶液に亜硝酸ナトリウム (1.51 g) の水 (2 mL) 溶液をゆっくりと滴下し、0℃にて15分間攪拌した。その溶液に臭化銅 (I) (4.18 g) の臭化水素酸 (5 mL, 48%水溶液) 懸濁液を滴下し、0℃にて10分間攪拌した後、60℃にて1時間攪拌した。反応液を室温に冷却した後、酢酸エチルを用いて抽出した。有機層をそのままNH-シリカゲルパッドに供し、酢酸エチルを用いて溶出した。得られた溶液を減圧下濃縮し、残渣をNHシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/n-ヘプタン, 0~30%) で精製し、標記化合物 (2.97 g) を得た。

ESI-MS m/z 220 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0051] (2) 3-ブロモ-2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジンの合成

3-ブロモ-2-クロロ-4, 6-ジメチルピリジン (2.97 g)、28% ナトリウムメトキシド メタノール溶液 (11.0 mL) およびDMF (30 mL) の混合物を、80℃にて36時間攪拌した。反応液に水を加え、ジエチルエーテルで抽出した。有機層を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲ

ルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／*n*-ヘプタン，0～10％）で精製し、標記化合物（2.33 g）を得た。


$^1\text{H-NMR}$ （400 MHz， CDCl_3 ） δ （ppm）：2.33–2.34（m，3H），2.36–2.38（m，3H），3.98（s，3H），6.61–6.64（m，1H）。

ESI-MS m/z 216 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0052] 製造例3

（2-メトキシ-3，5-ジメチルピリジン-4-イル）ボロン酸の合成

[化25]



[0053] （1）2-フルオロ-3-ヨード-5-メチルピリジンの合成

2.69 M *n*-ブチルリチウム ヘキサン溶液（224 mL）を、ジイソプロピルアミン（92 mL）およびTHF（1.2 L）の混合物に、窒素雰囲気下、 -18°C にて滴下した。滴下終了後、この混合物を攪拌しながら20分かけて -5°C まで昇温した。反応液を -73°C に冷却し、この反応液に2-フルオロ-5-メチルピリジン（61 g）のTHF溶液（240 mL）を滴下した。反応混合物を -75°C にて3時間半攪拌した。この反応液にヨウ素（139 g）のTHF溶液（24 mL）を滴下した。反応混合物を -75°C にて1時間55分攪拌した。反応終了後、同温で水（220 mL）を反応液に加えた。混合物を5分間同温で攪拌した。反応液を室温に戻した後、水（1.2 L）を加えた。この混合物に、チオ硫酸ナトリウム五水和物（136 g）水溶液（300 mL）と水（300 mL）を加え、10分間攪拌した。この混合物をMTBE（1.2 L）で抽出した。有機層を飽和食塩水（500 mL）で洗浄した。合わせた水層をMTBE（1 L）で抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤をろ過して除き、ろ液を減圧下濃縮した。残渣に*n*-ヘプタンを加え、冷却した。析出した

固体をろ取り、*n*-ヘプタンで洗浄した。ろ液を冷却し、析出した固体をろ取りした。この操作を5回繰り返すことで、標記化合物（109.69 g）得た。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 2.29–2.31 (m, 3H), 7.93–8.14 (m, 2H).

ESI-MS m/z 238 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0054] (2) 2-フルオロ-4-ヨード-3, 5-ジメチルピリジンの合成

2.69 M *n*-ブチルリチウム ヘキサン溶液 (215 mL) を、ジイソプロピルアミン (88 mL) および THF (1.2 L) の混合物に、窒素雰囲気下、 -18°C にて滴下した。滴下終了後、この混合物を攪拌しながら30分かけて -5°C まで昇温した。反応液を -72°C に冷却し、この反応液に2-フルオロ-3-ヨード-5-メチルピリジン (109.69 g) の THF 溶液 (240 mL) を滴下した。反応混合物を -74°C にて1時間半攪拌した。この反応液にヨウ化メチル (36 mL) の THF 溶液 (160 mL) を滴下した。反応混合物を -70°C ~ -74°C にて2時間攪拌した。反応終了後、同温で水 (200 mL) を反応液に加えた。混合物を2分間同温で攪拌した。反応液を室温に戻した後、水 (1.2 L) を加えた。得られた混合物を3分間攪拌し、更に水 (300 mL) を加えた。この混合物を MTBE (1.2 L) で抽出した。有機層を飽和食塩水 (500 mL) で洗浄した。合わせた水層を MTBE (1 L) で抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤をろ過して除き、ろ液を減圧下濃縮した。残渣に *n*-ヘプタン (100 mL) を加え、冷却した。析出した固体をろ取りした。*n*-ヘプタンで洗浄した。ろ液を冷却し、析出した固体をろ取りした。この操作を2回繰り返すことで、標記化合物 (86.9 g) 得た。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 2.39–2.40 (m, 6H), 7.80–7.82 (m, 1H).

ESI-MS m/z 252 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0055] (3) 4-ヨード-2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジンの合成

2-フルオロ-4-ヨード-3, 5-ジメチルピリジン (97.4 g) の THF (954 mL) に、20℃で、28%ナトリウムメトキシド メタノール溶液 (185 mL) を加えた。この混合物を 55℃～65℃にて2時間攪拌した。反応液を冷却した後、MTBE (1 L) と水 (1 L) を加えて分配した。有機層を飽和食塩水で洗浄した。合わせた水層を MTBE (500 mL × 2) で抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過して乾燥剤を除き、ろ液を減圧下濃縮した。残渣に n-ヘプタン (50 mL) を加え、0℃にて1時間攪拌した。析出した固体をろ取した。冷やした n-ヘプタン (10 mL) で固体を洗浄し、標記化合物 (42.6 g) を得た。ろ液を減圧下濃縮した。残渣に n-ヘプタン (5 mL) を加え、0℃にて30分間攪拌した。析出した固体をろ取した。冷やした n-ヘプタン (2 mL) で固体を洗浄し、標記化合物 (20.2 g) を得た。ろ液を減圧下濃縮した。残渣に n-ヘプタン (5 mL) を加え、0℃にて30分間攪拌した。析出した固体をろ取した。冷やした n-ヘプタン (2 mL) で固体を洗浄し、標記化合物 (10.7 g) を得た。合わせて標記化合物 (73.5 g) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 2.33–2.34 (m, 3H), 2.36–2.38 (m, 3H), 3.92 (s, 3H), 7.76 (s, 1H).

ESI-MS m/z 264 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0056] (4) (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) ボロン酸の合成

2.69M n-ブチルリチウム ヘキサン溶液 (6.5 mL) を、4-ヨード-2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン (2.0 g) および THF (40 mL) の混合物に、-78℃にて、10分間かけて滴下した。この混合物を -78℃にて20分間攪拌した。この混合物にホウ酸トリイソプロピル (5.26 mL) を5分間かけて滴下した。この混合物を1.5時間かけて20℃まで昇温しながら攪拌した。反応液に水を加えて酢酸エチルで抽

出した。得られた水層をクエン酸で中和し、酢酸エチルで抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過して乾燥剤を除去した後、ろ液を減圧下濃縮した。残渣にMTBEを加えトリチュレートした。析出した固体をろ取した。この固体を一番晶とする。ろ液を減圧下濃縮した。残渣にMTBEを加えトリチュレートした。析出した標記化合物（551mg）をろ取した。一番晶を酢酸エチルに懸濁した。少量のMTBEを加えトリチュレートした。析出した標記化合物（553.3mg）をろ取した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣にMTBEを加えトリチュレートした。析出した標記化合物（121.1mg）をろ取した。合わせて標記化合物（1.23g）を得た。


$^1\text{H-NMR}$ (400MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 2.19–2.20 (m, 3H), 2.23–2.24 (m, 3H), 3.91 (s, 3H), 4.94 (brs, 2H), 7.74 (s, 1H).

ESI-MS m/z 182 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0057] 製造例4

エチル 1-（3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル）-5-[2-ニトロ-4-（4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル）フェニル]-1H-ピラゾール-4-カルボキシレートの合成

[化26]



[0058] (1) エチル 5-（4-ブロモ-2-ニトロフェニル）-1-（3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル）-1H-ピラゾール-4-カルボキシレートの合成

塩化チオニル（１．９ｍＬ）を、４－ブロモ－２－ニトロ安息香酸（６ｇ）およびアセトニトリル（６０ｍＬ）の混合物に加え、５０℃にて２時間撹拌した。反応液にトリエチルアミン（６．８ｍＬ）およびエチル ３－ジメチルアミノアクリレート（３．９ｍＬ）を氷冷下、滴下した。室温で２時間撹拌した後、反応液をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣に酢酸エチルを加え、得られた懸濁液をろ過した後、ろ液を減圧下濃縮した。この操作をさらに２回繰り返した。得られたろ液を減圧下濃縮し、エチル ２－（４－ブロモ－２－ニトロベンゾイル）－３－（ジメチルアミノ）アクリレート（１１ｇ）を粗生成物として得た。このエチル ２－（４－ブロモ－２－ニトロベンゾイル）－３－（ジメチルアミノ）アクリレート（２．９５ｇ）をアセトニトリル（２０ｍＬ）に溶解した。この溶液に、（３－メチルテトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）ヒドラジン 塩酸塩（１．３ｇ）（Giovannini, RiccardoらPCT Int. Appl. (2009), WO2009121919/Example 8CA, 8CBに準じて合成した。）と水（２ｍＬ）を加えた。この反応混合物を室温にて一晩撹拌した後、９０℃にて２時間撹拌した。反応液を室温まで冷却した後、減圧下濃縮した。残渣に酢酸エチルと水を加え、有機層を分離した。水層を酢酸エチルで抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／ｎ－ヘプタン，１０～１００％）で精製し、標記化合物（０．６６ｇ）を得た。

ESI-MS m/z 460 $[M+Na]^+$

[0059] (2) エチル １－（３－メチルテトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－５－〔２－ニトロ－４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）フェニル〕－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキシレートの合成

エチル ５－（４－ブロモ－２－ニトロフェニル）－１－（３－メチルテトラヒドロ－２Ｈ－ピラン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキ

シレート (398 mg)、ビス (ピナコラト) ジボロン (277 mg)、酢酸カリウム (267 mg) および Pd (dppf) $\text{Cl}_2 \cdot \text{DCM}$ 錯体 (37.1 mg) を 1,4-ジオキサン (10 mL) に加えた。この混合物を 90 °C で窒素雰囲気下 2 時間攪拌した。反応液を室温まで冷却した後、セライトろ過した。ろ液に酢酸エチル (50 mL) と水 (50 mL) を加え、有機層と水層を分離した。水層を酢酸エチル (50 mL) で抽出した。合わせた有機層を飽和食塩水 (50 mL) で洗浄し、無水硫酸マグネシウムを用いて乾燥後、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル / n-ヘプタン, 10 ~ 80 %) で精製し、標記化合物 (441.0 mg) を粗生成物として得た。


ESI-MS m/z 405 $[\text{M}-\text{C}_6\text{H}_{10}+\text{H}]^+$

標記化合物の 4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン構造が分解し、ボロン酸 ($\text{B}(\text{OH})_2$) となった化合物の分子量が検出された。

[0060] 製造例 5

(1,4-ジオキサスピロ [4.5] デカン-8-イル) ヒドラジン 塩酸塩の合成

[化27]



[0061] (1) ベンジル 2-(1,4-ジオキサスピロ [4.5] デカン-8-イル) ヒドラジンカルボキシレートの合成

1,4-シクロヘキサンジオン モノエチレンケタール (CAS No. 4746-97-8, 5.0 g) のメタノール (100 mL) 溶液に、ベンジル カルバゼート (CAS No. 5331-43-1, 5.32 g) を

加え、室温で1時間撹拌した。反応液を濃縮した。得られた残渣をTHFに溶解し、再度濃縮した。得られた残渣のTHF(80 mL)溶液に、水素化ホウ素ナトリウム(2.42 g)を室温で加え、同温で15分間撹拌した。

反応液を氷冷した後、反応液へ、メタノール(10 mL)を30分間かけて滴下で加え、反応液を室温で1.5時間撹拌した。次いで反応液へ水(15 mL)を15分間かけて滴下で加えた後、反応液を室温で5分間撹拌した。

さらに反応液へ水(15 mL)を加えた後、反応液を室温で10分間撹拌した。反応液からTHFを減圧下に留去した。得られた残渣へ酢酸エチルを加え、混合物を15分間撹拌した後、有機層を分液した。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウム上で乾燥した。乾燥剤をろ過し、

ろ液を減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル/ヘプタン、50%)で精製し、MTBEとヘキサンの混合溶媒(1:1)でトリチュレートした。得られた粉末をろ過し、減圧下に乾燥して、標記化合物(7.52 g)を得た。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CD_3OD) δ (ppm) : 1.40-1.55 (m, 4H), 1.70-1.85 (m, 4H), 2.84 (br s, 1H), 3.90 (s, 4H), 5.10 (s, 2H), 7.24-7.40 (m, 5H).

ESI-MS m/z 329 [M+N⁺] +

[0062] (2) (1, 4-ジオキサスピロ[4.5]デカソ-8-イル)ヒドラジン

塩酸塩の合成

ベンジル 2- (1, 4-ジオキサスピロ[4.5]デカソ-8-イル)

ヒドラジンカルボキシレート(4.0 g)のエタノール(40 mL) - クロロホルム(3.16 mL)懸濁液へ、10%パラジウム-炭素(含水率50%, 400 mg)を加え、水素雰囲気下に室温で23.5時間撹拌した。反応液からパラジウム-炭素をろ去した。ろ液を減圧下に濃縮し、標記化合物(3.06 g)を得た。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CD_3OD) δ (ppm) : 1.57-1.9

0 (m, 8H), 3.06 (brs, 1H), 3.91 (s, 4H).

[0063] 実施例 1 a

(+) - 7 - (6 - メトキシ - 2, 4 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 -
- ((3R^{*}, 4R^{*}) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2H - ピラン - 4 - イル
) - 1H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5H) - オン ((+) -
c i s)

実施例 1 b

(-) - 7 - (6 - メトキシ - 2, 4 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 -
- ((3R^{*}, 4R^{*}) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2H - ピラン - 4 - イル
) - 1H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5H) - オン ((-) -
c i s)


実施例 1 c

(+) - 7 - (6 - メトキシ - 2, 4 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 -
- ((3R^{*}, 4S^{*}) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2H - ピラン - 4 - イル
) - 1H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5H) - オン ((+) -
t r a n s)

実施例 1 d

(-) - 7 - (6 - メトキシ - 2, 4 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 -
- ((3R^{*}, 4S^{*}) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2H - ピラン - 4 - イル
) - 1H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5H) - オン ((-) -
t r a n s) の合成

[化28]



[0064] (1) エチル 5-[4-(6-メトキシ-2, 4-ジメチルピリジン-3-イル)-2-ニトロフェニル]-1-(3-メチルテトラヒドロ-2 H-ピラン-4-イル)-1 H-ピラゾール-4-カルボキシレートの合成

製造例4で得られたエチル 1-(3-メチルテトラヒドロ-2 H-ピラン-4-イル)-5-[2-ニトロ-4-(4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル]-1 H-ピラゾール-4-カルボキシレート (220 mg)、製造例1で得られた3-ブロモ-6-メトキシ-2, 4-ジメチルピリジン (196 mg) および炭酸ナトリウム (144 mg) を、1, 4-ジオキサン (3.9 mL) および水 (0.8 mL) の混合液に20℃で加えた。この混合液にPd (PPh₃)₄ (52.4 mg) を加え、110℃にて2時間攪拌した。反応液を室温まで冷却した後、反応液に酢酸エチルを加えた。有機層と水層を分離した。水層を酢酸エチルで抽出した (10 mL × 2)。合わせた有機層を飽和食塩水 (10 mL) で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥、ろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/n-ヘプタン, 30~70%) で精製し、標記化合物 (137 mg) を得た。

ESI-MS m/z 495 [M+H]⁺

[0065] (2) 7-(6-メトキシ-2, 4-ジメチルピリジン-3-イル)-1-(3-メチルテトラヒドロ-2 H-ピラン-4-イル)-1 H-ピラゾロ [4, 3-c] キノリン-4 (5 H)-オンの合成

エチル 5-[4-(6-メトキシ-2, 4-ジメチルピリジン-3-イル)-2-ニトロフェニル]-1-(3-メチルテトラヒドロ-2 H-ピラン-4-イル)-1 H-ピラゾール-4-カルボキシレート (135 mg) を酢酸 (1.6 mL) に溶解した。この溶液に20℃にて鉄粉 (45.7 mg) を加えた。この混合物を90℃にて4時間攪拌した。反応液に酢酸エチル (10 mL) を加えて希釈し、炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて中和した。有機層と水層を分離した。水層を酢酸エチルで抽出した (25 mL × 2)。合わせた有機層を飽和食塩水 (10 mL) で洗浄し、無水硫酸マグネシ

ウムで乾燥し、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／*n*-ヘプタン，50～100％）で精製し、標記化合物（76mg）を得た。

ESI-MS m/z 419 $[M+H]^+$

[0066] (3) (+)-7-(6-メトキシ-2,4-ジメチルピリジン-3-イル)-1-((3*R**, 4*R**)-3-メチルテトラヒドロ-2*H*-ピラン-4-イル)-1*H*-ピラゾロ[4,3-*c*]キノリン-4(5*H*)-オン、(-)-7-(6-メトキシ-2,4-ジメチルピリジン-3-イル)-1-((3*R**, 4*R**)-3-メチルテトラヒドロ-2*H*-ピラン-4-イル)-1*H*-ピラゾロ[4,3-*c*]キノリン-4(5*H*)-オン、(+)-7-(6-メトキシ-2,4-ジメチルピリジン-3-イル)-1-((3*R**, 4*S**)-3-メチルテトラヒドロ-2*H*-ピラン-4-イル)-1*H*-ピラゾロ[4,3-*c*]キノリン-4(5*H*)-オンおよび(-)-7-(6-メトキシ-2,4-ジメチルピリジン-3-イル)-1-((3*R**, 4*S**)-3-メチルテトラヒドロ-2*H*-ピラン-4-イル)-1*H*-ピラゾロ[4,3-*c*]キノリン-4(5*H*)-オンの合成

7-(6-メトキシ-2,4-ジメチルピリジン-3-イル)-1-((3-メチルテトラヒドロ-2*H*-ピラン-4-イル)-1*H*-ピラゾロ[4,3-*c*]キノリン-4(5*H*)-オン(12mg)をエタノール(10mL)に溶解した。この溶液をキラルHPLC（カラム：DAICEL社製CHIRALPAK（登録商標）IA、移動相：エタノール）の条件で分割した。最初のフラクションとして(+)-7-(6-メトキシ-2,4-ジメチルピリジン-3-イル)-1-((3*R**, 4*S**)-3-メチルテトラヒドロ-2*H*-ピラン-4-イル)-1*H*-ピラゾロ[4,3-*c*]キノリン-4(5*H*)-オン(*trans*)と(-)-7-(6-メトキシ-2,4-ジメチルピリジン-3-イル)-1-((3*R**, 4*S**)-3-メチルテトラヒドロ-2*H*-ピラン-4-イル)-1*H*-ピラゾロ[4,3-*c*]キノリン-4(5*H*)-オン(*trans*)の混合物(8mg)を得た。2番

目のフラクションとして (+) - 7 - (6 - メトキシ - 2, 4 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 - ((3 R*, 4 R*) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン ((+) - c i s) (3 m g) を得た。3 番目のフラクションとして (-) - 7 - (6 - メトキシ - 2, 4 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 - ((3 R*, 4 R*) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン ((-) - c i s) (3 m g) を得た。上記 t r a n s - 体の混合物 (8 m g) をキラル H P L C (カラム: D A I C E L 社製 C H I R A L C E L (登録商標) O D - H、移動相: エタノール) の条件で分割した。最初のフラクションとして (-) - 7 - (6 - メトキシ - 2, 4 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 - ((3 R*, 4 S*) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン ((-) - t r a n s) (1 m g)、2 番目のフラクションとして (+) - 7 - (6 - メトキシ - 2, 4 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 - ((3 R*, 4 S*) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン ((+) - t r a n s) (1 m g) を得た。

(+) - 7 - (6 - メトキシ - 2, 4 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 - ((3 R*, 4 R*) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン ((+) - c i s)

¹H - NMR (400 MHz, CDCl₃) δ (p p m) : 0.93 (d, J = 6.6 Hz, 3 H), 2.01 - 2.09 (m, 4 H), 2.21 - 2.23 (m, 3 H), 2.45 - 2.54 (m, 1 H), 2.93 - 3.07 (m, 1 H), 3.63 - 3.73 (m, 1 H), 3.82 - 3.89 (m, 1 H), 3.97 (s, 3 H), 3.98 - 4.03 (m, 1 H), 4.23 - 4.31 (m, 1 H), 5.18 - 5.26 (m, 1 H), 6.55

(s, 1H), 7.12 (dd, J=8.2 Hz, 1.6 Hz, 1H), 7.18–7.31 (m, 1H), 8.01 (d, J=8.2 Hz, 1H), 8.30 (s, 1H), 10.15 (brs, 1H).

ESI-MS m/z 419 [M+H]⁺

カラム：DAICEL社製CHIRALPAK（登録商標） IA，移動相：エタノール，保持時間：17.1分

(-) - 7 - (6-メトキシ-2, 4-ジメチルピリジン-3-イル) - 1 - ((3R*, 4R*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン ((-) - cis)

カラム：DAICEL社製CHIRALPAK（登録商標） IA，移動相：エタノール，保持時間：20.4分

(-) - cis体の¹H-NMRのデータは、対応する(+) - cis体の¹H-NMRのデータと一致した。

(-) - 7 - (6-メトキシ-2, 4-ジメチルピリジン-3-イル) - 1 - ((3R*, 4S*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン ((-) - trans)

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : 0.76 (d, J=6.6 Hz, 3H), 2.02–2.05 (m, 3H), 2.10–2.18 (m, 1H), 2.21–2.24 (m, 3H), 2.34–2.48 (m, 1H), 2.79–2.92 (m, 1H), 3.31 (t, J=11.5 Hz, 1H), 3.66–3.75 (m, 1H), 3.97 (s, 3H), 4.13 (dd, J=11.9 Hz, 4.5 Hz, 1H), 4.18–4.26 (m, 1H), 4.68 (td, J=10.9 Hz, 4.3 Hz, 1H), 6.55 (s, 1H), 7.12 (dd, J=8.2 Hz, 1.6 Hz, 1H), 7.26 (d, J=1.6 Hz, 1H), 8.08 (d, J=8.2 Hz, 1H), 8.36 (s, 1H), 10.57 (brs, 1H)

).

ESI-MS m/z 419 $[M+H]^+$

カラム: DAICEL社製CHIRALCEL (登録商標) OD-H, 移

動相: エタノール, 保持時間: 13.3分

(+)-7-(6-メトキシ-2,4-ジメチルピリジン-3-イル)-1-
-((3R^{*}, 4S^{*}) -3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル
) -1H-ピラゾロ[4,3-c]キノリン-4(5H)-オン ((+)-
trans)

カラム: DAICEL社製CHIRALCEL (登録商標) OD-H, 移

動相: エタノール, 保持時間: 19.7分

(+)-trans体の¹H-NMRのデータは、対応する(-)-trans
 s体の¹H-NMRのデータと一致した。

[0067] 実施例 2 a

(+)-7-(2-メトキシ-4,6-ジメチルピリジン-3-イル)-1-
-((3R^{*}, 4S^{*}) -3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル
) -1H-ピラゾロ[4,3-c]キノリン-4(5H)-オン ((+)-
trans)

実施例 2 b

(-)-7-(2-メトキシ-4,6-ジメチルピリジン-3-イル)-1-
-((3R^{*}, 4R^{*}) -3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル
) -1H-ピラゾロ[4,3-c]キノリン-4(5H)-オン ((-)-
cis)


実施例 2 c

(+)-7-(2-メトキシ-4,6-ジメチルピリジン-3-イル)-1-
-((3R^{*}, 4R^{*}) -3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル
) -1H-ピラゾロ[4,3-c]キノリン-4(5H)-オン ((+)-
cis)

実施例 2 d

(-) - 7 - (2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン-3-イル) - 1 -
- ((3R*, 4S*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル
) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン ((-) -
t r a n s) の合成

[化29]



[0068] (1) エチル 5 - [4 - (2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン-3
-イル) - 2-ニトロフェニル] - 1 - (3-メチルテトラヒドロ-2H-
ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾール-4-カルボキシレートの合成

製造例4で得られたエチル 1 - (3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 5 - [2-ニトロ-4 - (4, 4, 5, 5-テトラメチル-1, 3, 2-ジオキサボロラン-2-イル) フェニル] - 1H-ピラゾール-4-カルボキシレート (220 mg)、製造例2で得られた3-ブロモ-2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン (196 mg) および炭酸ナトリウム (144 mg) を、1, 4-ジオキサン (3.9 mL) および水 (0.8 mL) の混合液に20℃で加えた。この混合液にPd (PPh₃)₄ (52.4 mg) を加え、110℃にて2時間攪拌した。反応液を室温まで冷却した後、反応液に酢酸エチルを加えた。有機層と水層を分離した。水層を酢酸エチルで抽出した (10 mL × 2)。合わせた有機層を飽和食塩水 (10 mL) で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル / n-ヘプタン, 30 ~ 70%) で精製し、標記化合物 (133 mg) を得

た。

ESI-MS m/z 495 $[M+H]^+$

[0069] (2) 7-(2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン-3-イル)-1-(3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)-1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オンの合成

エチル 5-[4-(2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン-3-イル)-2-ニトロフェニル]-1-(3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)-1H-ピラゾール-4-カルボキシレート (133 mg) を酢酸 (1.5 mL) に溶解した。この溶液に 20℃にて鉄粉 (45.1 mg) を加えた。この混合物を 90℃にて 4 時間攪拌した。反応液に酢酸エチル (10 mL) を加えて希釈し、炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて中和した。有機層と水層を分離した。水層を酢酸エチル (25 mL × 2) で抽出した。合わせた有機層を飽和食塩水 (10 mL) で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/n-ヘプタン, 50~100%) で精製し、標記化合物 (73 mg) を得た。

ESI-MS m/z 419 $[M+H]^+$

[0070] (3) (+)-7-(2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン-3-イル)-1-((3R*, 4S*)-3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)-1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン ((+)-trans)、(-)-7-(2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン-3-イル)-1-((3R*, 4R*)-3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)-1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン ((-)-cis)、(-)-7-(2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン-3-イル)-1-((3R*, 4S*)-3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)-1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン ((-)-trans) および (+)-7-(2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン-3-イル)-1-((3R*, 4R*)

－3－メチルテトラヒドロ－2H－ピラン－4－イル）－1H－ピラゾロ[4, 3－c]キノリン－4（5H）－オン（（＋）－cis）の合成

7－（2－メトキシ－4, 6－ジメチルピリジン－3－イル）－1－（3－メチルテトラヒドロ－2H－ピラン－4－イル）－1H－ピラゾロ[4, 3－c]キノリン－4（5H）－オン（30mg）をエタノール（5mL）に溶解した。この溶液をキラルHPLC（カラム：DAICEL社製CHIRALPAK（登録商標）AD-H、移動相：エタノール）の条件で分割した。最初のフラクションとして（＋）－7－（2－メトキシ－4, 6－ジメチルピリジン－3－イル）－1－（（3R*, 4R*）－3－メチルテトラヒドロ－2H－ピラン－4－イル）－1H－ピラゾロ[4, 3－c]キノリン－4（5H）－オン（cis）と（－）－7－（2－メトキシ－4, 6－ジメチルピリジン－3－イル）－1－（（3R*, 4S*）－3－メチルテトラヒドロ－2H－ピラン－4－イル）－1H－ピラゾロ[4, 3－c]キノリン－4（5H）－オン（trans）の混合物（14mg）を得た。2番目のフラクションとして（＋）－7－（2－メトキシ－4, 6－ジメチルピリジン－3－イル）－1－（（3R*, 4S*）－3－メチルテトラヒドロ－2H－ピラン－4－イル）－1H－ピラゾロ[4, 3－c]キノリン－4（5H）－オン（（＋）－trans）（3mg）を得た。3番目のフラクションとして（－）－7－（2－メトキシ－4, 6－ジメチルピリジン－3－イル）－1－（（3R*, 4R*）－3－メチルテトラヒドロ－2H－ピラン－4－イル）－1H－ピラゾロ[4, 3－c]キノリン－4（5H）－オン（（－）－cis）（3mg）を得た。上記の混合物（14mg）をキラルHPLC（カラム：DAICEL社製CHIRALCEL（登録商標）OD-H、移動相：エタノール／n－ヘキサン（70％））の条件で分割した。最初のフラクションとして（－）－7－（2－メトキシ－4, 6－ジメチルピリジン－3－イル）－1－（（3R*, 4S*）－3－メチルテトラヒドロ－2H－ピラン－4－イル）－1H－ピラゾロ[4, 3－c]キノリン－4（5H）－オン（（－）－trans）（5mg）、2番目のフラクシ

ンとして (+) - 7 - (2 - メトキシ - 4, 6 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 - ((3 R*, 4 R*) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン ((+) - c i s) (5 m g) を得た。

(+) - 7 - (2 - メトキシ - 4, 6 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 - ((3 R*, 4 S*) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン ((+) - t r a n s)

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 0.75 (d, $J = 6.6 \text{ Hz}$, 3H), 2.11 (s, 3H), 2.11 - 2.19 (m, 1H), 2.29 - 2.49 (m, 1H), 2.48 (s, 3H), 2.78 - 2.89 (m, 1H), 3.29 (t, $J = 11.3 \text{ Hz}$, 1H), 3.64 - 3.71 (m, 1H), 3.86 (s, 3H), 4.08 - 4.15 (m, 1H), 4.17 - 4.25 (m, 1H), 4.62 - 4.71 (m, 1H), 6.74 (s, 1H), 7.18 (d, $J = 8.0 \text{ Hz}$, 1H), 7.27 (s, 1H), 8.06 (d, $J = 8.0 \text{ Hz}$, 1H), 8.34 (s, 1H), 10.03 (b r s, 1H).

ESI-MS m/z 419 $[\text{M} + \text{H}]^+$

カラム : DAI CEL 社製 CHIRALPAK (登録商標) AD-H, 移動相 : エタノール、保持時間 : 23.8 分

(-) - 7 - (2 - メトキシ - 4, 6 - ジメチルピリジン - 3 - イル) - 1 - ((3 R*, 4 R*) - 3 - メチルテトラヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン ((-) - c i s)

ESI-MS m/z 419 $[\text{M} + \text{H}]^+$

カラム : DAI CEL 社製 CHIRALPAK (登録商標) AD-H, 移動層 : エタノール、保持時間 : 31.4 分

(-) - c i s 体の $^1\text{H-NMR}$ のデータは、対応する (+) - c i s 体の ^{1}

H-NMRのデータと一致した。

(-) - 7 - (2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン-3-イル) - 1
- ((3R^{*}, 4S^{*}) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル
) - 1H-ピラゾロ [4, 3-c] キノリン-4 (5H) - オン ((-) -
t r a n s)

カラム：DAI CEL社製CHIRALCEL（登録商標） OD-H、移動相：エタノール／n-ヘキサン（70％）、保持時間：13分

(-) - t r a n s体の¹H-NMRのデータは、対応する(+) - t r a n s体の¹H-NMRのデータと一致した。

(+) - 7 - (2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン-3-イル) - 1
- ((3R^{*}, 4R^{*}) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル
) - 1H-ピラゾロ [4, 3-c] キノリン-4 (5H) - オン ((+) -
c i s)

¹H-NMR (400MHz, CDCl₃) δ (ppm) : 0.90 (d, J = 7.2 Hz, 3H), 2.00-2.09 (m, 1H), 2.10 (s, 3H), 2.49 (s, 3H), 2.48-2.55 (m, 1H), 2.94-3.05 (m, 1H), 3.64-3.71 (m, 1H), 3.77-3.89 (m, 1H), 3.86 (s, 3H), 3.96-4.00 (m, 1H), 4.24-4.30 (m, 1H), 5.19-5.24 (m, 1H), 6.74 (s, 1H), 7.19 (dd, J = 8.4 Hz, 1.6 Hz, 1H), 7.31 (d, J = 1.6 Hz, 1H), 7.98 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 8.29 (s, 1H), 10.43 (brs, 1H).

カラム：DAI CEL社製CHIRALCEL（登録商標） OD-H、移動相：エタノール／n-ヘキサン（70％）、保持時間：14.9分

[0071] 実施例3a

(-) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1
- ((3R^{*}, 4R^{*}) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル
) - 1H-ピラゾロ [4, 3-c] キノリン-4 (5H) - オン ((-) -

c i s)

実施例 3 b

(+) - 7 - (2 - メトキシ - 3, 5 - ジメチルピリジン - 4 - イル) - 1 -
- ((3 R^{*}, 4 R^{*}) - 3 - メチルトetraヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル
) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン ((+) -
c i s)


実施例 4 a

(-) - 7 - (2 - メトキシ - 3, 5 - ジメチルピリジン - 4 - イル) - 1 -
- ((3 R^{*}, 4 S^{*}) - 3 - メチルトetraヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル
) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン ((-) -
t r a n s)

実施例 4 b

(+) - 7 - (2 - メトキシ - 3, 5 - ジメチルピリジン - 4 - イル) - 1 -
- ((3 R^{*}, 4 S^{*}) - 3 - メチルトetraヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル
) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン ((+) -
t r a n s) の合成

[化30]



[0072] (1) エチル 5 - (4 - ブロモ - 2 - ニトロフェニル) - 1 - (3 - メチ
ルトetraヒドロ - 2 H - ピラン - 4 - イル) - 1 H - ピラゾール - 4 - カル
ボキシレートの合成

4-ブロモ-2-ニトロ安息香酸 (6 g) をアセトニトリル (60 mL) に溶解した。その溶液に、塩化チオニル (1.9 mL) を加え 50℃ にて 2 時間攪拌した。トリエチルアミン (6.8 mL) を氷冷下、反応混合物に滴下した。さらに、エチル 3-ジメチルアミノアクリレート (3.9 mL) を反応混合物に滴下した。室温で 2 時間攪拌した後、反応液をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣に酢酸エチルを加え、生じた懸濁液をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣に酢酸エチルを加え、生じた懸濁液をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣に酢酸エチルを加え、生じた懸濁液をろ過した。ろ液を減圧下濃縮し、エチル 2-(4-ブロモ-2-ニトロベンゾイル)-3-(ジメチルアミノ)アクリレート (11 g) を粗生成物として得た。得られたエチル 2-(4-ブロモ-2-ニトロベンゾイル)-3-(ジメチルアミノ)アクリレート (2.95 g) をアセトニトリル (20 mL) に溶解した。この溶液に、(3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)ヒドラジン 塩酸塩 (1.3 g) (Giovannini, Riccardo ら PCT Int. Appl. (2009), WO2009121919/Example 8CA, 8CB に準じて合成した。) と水 (2 mL) を加えた。この反応混合物を室温にて一晩攪拌した後、90℃ にて 2 時間攪拌した。反応液を室温まで冷却した後、減圧下濃縮した。残渣に酢酸エチルと水を加えた。有機層を分離した。水層を酢酸エチルで抽出した。合わせた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/n-ヘプタン, 10~100%) で精製し、標記化合物 (0.66 g) を得た。

ESI-MS m/z 460 $[M+Na]^+$

[0073] (2) エチル 5-[4-(2-メトキシ-3,5-ジメチルピリジン-4-イル)-2-ニトロフェニル]-1-(3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)-1H-ピラゾール-4-カルボキシレートの合成

エチル 5-(4-ブロモ-2-ニトロフェニル)-1-(3-メチルテ

トラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)-1H-ピラゾール-4-カルボキシレート (320.8 mg) の1,4-ジオキサン (5 mL) と水 (1.5 mL) の混合液に、製造例3で得られた (2-メトキシ-3,5-ジメチルピリジン-4-イル) ボロン酸 (265 mg)、Pd (PPh₃)₄ (85 mg) および炭酸セシウム (715 mg) を加え、窒素雰囲気下、反応混合物を110℃で2時間攪拌した。反応液を室温に冷却した後、減圧下濃縮した。残渣を酢酸エチルで希釈し、水で洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/n-ヘプタン, 10~100%) で粗精製し、標記化合物 (382.8 mg) を粗生成物として得た。

ESI-MS m/z 495 [M+H]⁺

[0074] (3) 7-(2-メトキシ-3,5-ジメチルピリジン-4-イル)-1-(3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)-1H-ピラゾロ[4,3-c]キノリン-4(5H)-オンの合成

エチル 5-[4-(2-メトキシ-3,5-ジメチルピリジン-4-イル)-2-ニトロフェニル]-1-(3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)-1H-ピラゾール-4-カルボキシレート (112.3 mg) を酢酸 (2.5 mL) および水 (0.25 mL) に溶解し、窒素雰囲気下80℃にて15分攪拌した。この反応液に鉄粉 (76 mg) を一度に加え、反応液を窒素雰囲気下80℃にて2時間攪拌した後、窒素雰囲気下90℃にて一晩攪拌した。反応液を室温まで冷却した後、酢酸エチルで希釈し、減圧下濃縮した。残渣をクロロホルムで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下濃縮した。残渣をショートシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル) で精製し、標記化合物 (91.2 mg) を得た。

¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : 0.75-0.94 (m, 3H), 1.93-2.00 (m, 6H), 2.05-2.23 (m, 1H), 2.30-2.55 (m, 1H), 2.80-3.08 (m,

1 H), 3.32 (t, J = 12 Hz, 0.33 H), 3.65–3.75 (m, 1 H), 3.83–3.90 (m, 0.66 H), 3.97–4.00 (m, 0.66 H), 4.01 (s, 3 H), 4.10–4.15 (m, 0.33 H), 4.17–4.32 (m, 1 H), 4.63–4.73 (m, 0.33 H), 5.20–5.27 (m, 0.66 H), 7.07–7.10 (m, 1 H), 7.38 (s, 1 H), 7.95 (s, 1 H), 8.03–8.13 (m, 1 H), 8.31 (s, 0.66 H), 8.36 (s, 0.33 H), 11.92–11.96 (m, 1 H).

ESI-MS m/z 419 [M+H]⁺

[0075] (4) (-) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R^{*}, 4R^{*}) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン ((-) - cis)、(+)-7-(2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R^{*}, 4R^{*}) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン ((+) - cis)、(-)-7-(2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R^{*}, 4S^{*}) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン ((-) - trans) および (+)-7-(2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R^{*}, 4S^{*}) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン ((+) - trans) の合成

7-(2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - (3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン (91.2 mg) を5%クロロホルム/エタノール (10.5 mL) に溶解した。この溶液をキラルHPLC (カラム: DAICEL社製CHIRALPAK (登録商標) IA、移動相: エタノール/n-ヘキサン (50%)) の条件で分割した。(-)-7-

2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R*, 4S*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オンおよび(+) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R*, 4S*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン((±) - *t r a n s*)の混合物(17.7mg)を最初のフラクションとして得た。2番目のフラクションとして(+) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R*, 4R*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン((+) - *c i s*) (25.9mg)を得た。3番目のフラクションとして(-) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R*, 4R*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン((-) - *c i s*) (25.9mg)を得た。

上記(±) - *t r a n s*の混合物(17.7mg)をキラルHPLC(カラム: DAI CEL社製CHIRALPAK(登録商標) IB、移動相: エタノール/n-ヘキサン(15%))の条件で分割した。最初のフラクションとして(-) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R*, 4S*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン((-) - *t r a n s*) (3.7mg)、2番目のフラクションとして(+) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R*, 4S*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン((+) - *t r a n s*) (3.6mg)を得た。

(-) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R*, 4R*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル

(-) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R*, 4S*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ [4, 3-c] キノリン-4 (5H) - オン ((-) - cis)

$^1\text{H-NMR}$ (400MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 0.88-0.95 (m, 3H), 1.91-2.00 (m, 6H), 2.03-2.13 (m, 1H), 2.45-2.55 (m, 1H), 2.95-3.07 (m, 1H), 3.65-3.73 (m, 1H), 3.83-3.89 (m, 1H), 3.97-4.00 (m, 1H), 4.01 (s, 3H), 4.24-4.32 (m, 1H), 5.20-5.27 (m, 1H), 7.07-7.10 (m, 1H), 7.33 (s, 1H), 7.95 (s, 1H), 8.04 (d, $J=8.4\text{ Hz}$, 1H), 8.31 (s, 1H), 11.47 (brs, 1H).

ESI-MS m/z 419 $[\text{M}+\text{H}]^+$

カラム: DAICEL社製CHIRALPAK (登録商標) IA, 移動相: エタノール/ n -ヘキサン (20%), 保持時間: 15分

(+) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R*, 4R*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ [4, 3-c] キノリン-4 (5H) - オン ((+) - cis)

カラム: DAICEL社製CHIRALPAK (登録商標) IA, 移動相: エタノール/ n -ヘキサン (20%), 保持時間: 12.5分

(+) - cis体の $^1\text{H-NMR}$ のデータは、対応する(-) - cis体の $^1\text{H-NMR}$ のデータと一致した。

(-) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R*, 4S*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ [4, 3-c] キノリン-4 (5H) - オン ((-) - trans)

$^1\text{H-NMR}$ (400MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 0.75-0.77 (m, 3H), 1.93-1.98 (m, 6H), 2.09-2.18 (

m, 1 H), 2.34–2.48 (m, 1 H), 2.78–2.92 (m, 1 H), 3.31 (t, J=11.4 Hz, 1 H), 3.60–3.75 (m, 1 H), 4.00 (s, 3 H), 4.08–4.17 (m, 1 H), 4.20–4.25 (m, 1 H), 4.63–4.70 (m, 1 H), 7.06–7.08 (m, 1 H), 7.16–7.18 (m, 1 H), 7.95 (s, 1 H), 8.11 (d, J=11.4 Hz, 1 H), 8.36 (s, 1 H), 10.12 (brs, 1 H).

ESI-MS m/z 419 [M+H]⁺

カラム: DAICEL社製CHIRALPAK (登録商標) IB, 移動相: エタノール/n-ヘキサン (10%), 保持時間: 6.3分

(+) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R^{*}, 4S^{*}) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ [4, 3-c] キノリン-4 (5H) - オン ((+) - trans)

カラム: DAICEL社製CHIRALPAK (登録商標) IB, 移動相: エタノール/n-ヘキサン (10%), 保持時間: 7.8分

(+) - trans体の¹H-NMRのデータは、対応する(-) - trans体の¹H-NMRのデータと一致した。


[0076] 実施例 5 a

7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - (シス-4-メトキシシクロヘキシル) - 1H-ピラゾロ [4, 3-c] キノリン-4 (5H) - オンの合成

実施例 5 b

7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - (トランス-4-メトキシシクロヘキシル) - 1H-ピラゾロ [4, 3-c] キノリン-4 (5H) - オンの合成

[化31]



[0077] (1) エチル 3-(4-ブromo-2-フルオロフェニル)-3-オキシプロパノエートの合成

4-ブromo-2-フルオロ安息香酸 (CAS No. 112704-79-7) (10 g) のDCM (97 mL) 懸濁液へ、CDI (8.88 g) を加え、室温にて3.5時間攪拌した。この溶液を「溶液1」とする。

別のフラスコ中、カリウム エチルマロネート (15.5 g) のアセトニトリル (303 mL) 懸濁液へ、TEA (15.9 mL) および塩化マグネシウム (10.9 g) を加え、得られた混合物を室温で3時間10分間攪拌した。この反応混合物へ、先に調製した「溶液1」を25分かけて滴下した後、反応混合物を室温で終夜攪拌した。反応液を減圧下に半量まで濃縮した。得られた残渣を酢酸エチル (500 mL) で希釈し、氷冷下に5 N塩酸 (250 mL) を加えた後、室温にて1時間攪拌した。有機層を分液した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥剤をろ過し

た。ろ液を減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／*n*-ヘプタン，5～20％）で精製し、標記化合物（12.8 g）を得た。

ESI-MS m/z 291 $[M+H]^+$

[0078] (2) エチル 5-(4-ブロモ-2-フルオロフェニル)-1-(1,4-ジオキサスピロ[4.5]デカン-8-イル)-1H-ピラゾール-4-カルボキシレートの合成

エチル 3-(4-ブロモ-2-フルオロフェニル)-3-オキソプロパノエート（1.5 g）のDMF-DMA（6.89 mL）溶液を、50℃で2.5時間攪拌した。反応液を減圧下に濃縮した。残渣をトルエン（7 mL）に溶解し、得られた溶液を減圧下に濃縮し、この操作を再度繰り返した。残渣のエタノール（10 mL）溶液を、製造例5で得られた（1,4-ジオキサスピロ[4.5]デカン-8-イル）ヒドラジン 塩酸塩（3.06 g）とTEA（3 mL）とのエタノール（30 mL）溶液へ加えた。反応混合物を80℃で2.5時間攪拌した後、室温に冷却した。反応混合物を減圧下に濃縮した。残渣へ酢酸エチルと水を加え、有機層を分配した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下に濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／*n*-ヘプタン，15％）で精製し、標記化合物（2.10 g）を得た。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1.18 (t, $J=6.8\text{ Hz}$, 3H), 1.49–1.60 (m, 2H), 1.73–1.94 (m, 4H), 2.30–2.45 (m, 2H), 3.79–3.89 (m, 1H), 3.90–4.00 (m, 4H), 4.15 (q, $J=6.8\text{ Hz}$, 2H), 7.19 (t, $J=8.0\text{ Hz}$, 1H), 7.40–7.46 (m, 2H), 8.03 (s, 1H).

ESI-MS m/z 475 $[M+Na]^+$

[0079] (3) 5-(4-ブロモ-2-フルオロフェニル)-1-(1,4-ジオキ

サスピロ〔4. 5〕デカン-8-イル)-1H-ピラゾール-4-カルボン酸の合成

エチル 5-(4-ブロモ-2-フルオロフェニル)-1-(1, 4-ジオキサスピロ〔4. 5〕デカン-8-イル)-1H-ピラゾール-4-カルボキシレート (2. 1 g) のエタノール (20 mL) 懸濁液へ、5 N 水酸化ナトリウム水溶液 (2. 78 mL) を加え 50℃ で 6 時間攪拌した。反応液を室温に冷却した後、反応液を減圧下に濃縮した。得られた水性残渣へ、水と MTBE を加え、水層を分液した。得られた水層を、5 N 塩酸で酸性化した後、酢酸エチルで抽出した (2 回)。合わせた酢酸エチル抽出層を、水と飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下に濃縮して、標記化合物 (2. 03 g) を得た。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1. 48–1. 60 (m, 2H), 1. 72–1. 94 (m, 4H), 2. 28–2. 45 (m, 2H), 3. 77–3. 88 (m, 1H), 3. 90–3. 99 (m, 4H), 7. 18 (t, $J=8. 0\text{ Hz}$, 1H), 7. 39–7. 45 (m, 2H), 8. 07 (s, 1H).

ESI-MS m/z 449 $[\text{M}+\text{Na}]^+$

[0080] (4) 5-(4-ブロモ-2-フルオロフェニル)-N-(2, 4-ジメトキシベンジル)-1-(1, 4-ジオキサスピロ〔4. 5〕デカン-8-イル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミドの合成

5-(4-ブロモ-2-フルオロフェニル)-1-(1, 4-ジオキサスピロ〔4. 5〕デカン-8-イル)-1H-ピラゾール-4-カルボン酸 (1. 90 g) の DMF (40 mL) 溶液へ、2, 4-ジメトキシベンジルアミン (747 mg)、DIPEA (1. 56 mL)、HOBT (724 mg) および EDC (1. 03 g) を順次加え、反応混合物を終夜攪拌した。反応液を減圧下に約 1/3 量まで濃縮した。得られた残渣へ酢酸エチルと水と飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、有機層を分液した。有機層を水と飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥剤をろ過した。

ろ液を減圧下に濃縮して、標記化合物（2.51 g）を得た。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1.45–1.60 (m, 2H), 1.65–1.94 (m, 4H), 2.23–2.45 (m, 2H), 3.70–3.80 (m, 1H), 3.75 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.90–3.99 (m, 4H), 4.36 (t, $J=6.4$ Hz, 2H), 5.86 (t, $J=6.4$ Hz, 1H), 6.38–6.44 (m, 2H), 7.10 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.18 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.34–7.41 (m, 2H), 7.87 (s, 1H).

ESI-MS m/z 574 $[\text{M}+\text{H}]^+$

[0081] (5) 7-ブロモ-5-(2,4-ジメトキシベンジル)-1-(1,4-ジオキサスピロ[4.5]デカン-8-イル)-1H-ピラゾロ[4,3-c]キノリン-4(5H)-オンの合成

氷冷下、5-(4-ブロモ-2-フルオロフェニル)-N-(2,4-ジメトキシベンジル)-1-(1,4-ジオキサスピロ[4.5]デカン-8-イル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド（2.51 g）のTHF（30 mL）溶液へ、KTB（735 mg）加え、同温で5分間、次いで室温で2時間攪拌した。さらに、反応混合物へKTB（400 mg）を加え、40分間攪拌した。反応混合物へ飽和塩化アンモニウム水溶液、酢酸エチルと水を順次加え、有機層を分液した。水層を酢酸エチルで再抽出した。合わせた有機層を、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥剤をろ過し、減圧下に濃縮した。得られた残渣へ酢酸エチル（3 mL）とMTBE（9 mL）を加えた。得られた固体をろ取し、減圧下に乾燥して、標記化合物（2.04 g）を得た。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ (ppm) : 1.81 (td, $J=14.0, 4.0$ Hz, 2H), 1.97–2.06 (m, 2H), 2.15–2.24 (m, 2H), 2.43–2.55 (m, 2H), 3.76 (s, 3H), 4.01 (s, 7H), 4.73–4.83 (m, 1H)

, 5.50 (brs, 2H), 6.34 (dd, $J=8.4, 2.4$ Hz, 1H), 6.52 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 6.99 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.39 (dd, $J=8.8, 1.6$ Hz, 1H), 7.80 (d, $J=1.6$ Hz, 1H), 7.82 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 8.29 (s, 1H).

ESI-MS m/z 576 $[M+Na]^+$

[0082] (6) 5-(2,4-ジメトキシベンジル)-7-(2-メトキシ-3,5-ジメチルピリジン-4-イル)-1-(1,4-ジオキサスピロ[4.5]デカン-8-イル)-1H-ピラゾロ[4,3-c]キノリン-4(5H)-オンの合成

製造例1で得られた(2-メトキシ-3,5-ジメチルピリジン)ボロン酸(783mg)と7-ブロモ-5-(2,4-ジメトキシベンジル)-1-(1,4-ジオキサスピロ[4.5]デカン-8-イル)-1H-ピラゾロ[4,3-c]キノリン-4(5H)-オン(1.50g)との1,4-ジオキサン(10mL)溶液へ、水(2.5mL)、Pd(PPh₃)₄(313mg)および炭酸セシウム(2.64g)を加えた。反応混合物を、マイクロウェーブ反応装置を用いて130℃で3時間攪拌した。反応液を室温に冷却した後、反応混合物へ酢酸エチルおよび水を加え、有機層を分液した。有機層を、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下に濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル/*n*-ヘプタン, 40%)で精製した。濃縮残渣へ酢酸エチルとMTBEを加えた。得られた固体をろ取し、減圧下に乾燥して、標記化合物(1.52g)を得た。

¹H-NMR (400MHz, CDCl₃) δ (ppm): 1.73 (s, 3H), 1.76 (s, 3H), 1.87 (td, $J=14.0, 4.0$ Hz, 2H), 2.00-2.08 (m, 2H), 2.22-2.32 (m, 2H), 2.49-2.62 (m, 2H), 3.68 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 3.97 (s, 3H), 4.02 (s, 4H), 4.85-

4. 95 (m, 1 H), 5. 40–5. 60 (m, 2 H), 6. 29 (dd, J=8. 4, 2. 4 Hz, 1 H), 6. 42 (d, J=2. 4 Hz, 1 H), 6. 83 (d, J=8. 4 Hz, 1 H), 7. 05 (d, J=8. 4 Hz, 1 H), 7. 24 (s, 1 H), 7. 87 (s, 1 H), 8. 07 (d, J=8. 4 Hz, 1 H), 8. 33 (s, 1 H).

ESI-MS m/z 611 [M+H]⁺

[0083] (7) 5-(2, 4-ジメトキシベンジル)-7-(2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル)-1-(4-オキソシクロヘキシル)-1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オンの合成

5-(2, 4-ジメトキシベンジル)-7-(2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル)-1-(1, 4-ジオキサスピロ[4. 5]デカン-8-イル)-1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン(1. 30 g)のTHF(20 mL)溶液へ、2 N塩酸(20 mL)を加え、反応混合物を室温で19. 5時間攪拌した。反応液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(60 mL)へ注ぎ込んだ後、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥剤をろ過した。ろ液を減圧下に濃縮して、標記化合物(1. 12 g)を得た。

¹H-NMR(400 MHz, CDCl₃) δ(ppm): 1. 73 (s, 3 H), 1. 76 (s, 3 H), 2. 52–2. 87 (m, 8 H), 3. 68 (s, 3 H), 3. 74 (s, 3 H), 3. 97 (s, 3 H), 5. 27–5. 37 (m, 1 H), 5. 37–5. 62 (m, 2 H), 6. 29 (dd, J=8. 8, 2. 4 Hz, 1 H), 6. 42 (d, J=2. 4 Hz, 1 H), 6. 84 (d, J=8. 8 Hz, 1 H), 7. 06 (d, J=8. 4 Hz, 1 H), 7. 28 (s, 1 H), 7. 88 (s, 1 H), 8. 10 (d, J=8. 4 Hz, 1 H), 8. 35 (s, 1 H).

ESI-MS m/z 567 [M+H]⁺

[0084] (8) 5-(2, 4-ジメトキシベンジル)-1-(4-ヒドロキシシクロ

ヘキシル) - 7 - (2 - メトキシ - 3, 5 - ジメチルピリジン - 4 - イル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オンの合成

氷冷下、5 - (2, 4 - ジメトキシベンジル) - 7 - (2 - メトキシ - 3, 5 - ジメチルピリジン - 4 - イル) - 1 - (4 - オキシシクロヘキシル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン (570 mg) の THF (20 mL) - メタノール (10 mL) 溶液へ、水素化ホウ素ナトリウム (57.1 mg) を加え、同温で5分間、次いで室温で1時間撹拌した。反応液を氷冷し、反応液へ1 N 塩酸 (2 mL) を加えた。反応液を約 1 / 4 量まで濃縮後、残渣へ酢酸エチルと水を加え、有機層を分液した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液と飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウム上で乾燥し、乾燥剤をろ過した。ろ液をショートシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル) に付し、標記化合物 (597 mg) を得た。

ESI - MS m/z 569 $[M+H]^+$

[0085] (9) 5 - (2, 4 - ジメトキシベンジル) - 7 - (2 - メトキシ - 3, 5 - ジメチルピリジン - 4 - イル) - 1 - (4 - メトキシシクロヘキシル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オンの合成

5 - (2, 4 - ジメトキシベンジル) - 1 - (4 - ヒドロキシシクロヘキシル) - 7 - (2 - メトキシ - 3, 5 - ジメチルピリジン - 4 - イル) - 1 H - ピラゾロ [4, 3 - c] キノリン - 4 (5 H) - オン (300 mg) の THF (5 mL) 溶液へ、0℃で60%水素化ナトリウム (オイルディスパーション, 31.7 mg) を加えた後、室温で10分間撹拌した。反応混合液へ、ヨードメタン (0.1 mL) を加え、室温で1.5時間、50℃で2時間撹拌した。次いで反応混合物へヨードメタン (0.1 mL) 加え、50℃で終夜撹拌した。反応混合物へ水と酢酸エチルを加え、有機層を分液した。水層を酢酸エチルで再抽出した。合わせた有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、乾燥剤をろ過し、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (メタノール / クロロホル

ム、2%)で精製し、標記化合物(110mg)を得た。

ESI-MS m/z 583 $[M+H]^+$

[0086] (10) 7-(2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル)-1-(シス-4-メトキシシクロヘキシル)-1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン および 7-(2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル)-1-(トランス-4-メトキシシクロヘキシル)-1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オンの合成

5-(2, 4-ジメトキシベンジル)-7-(2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル)-1-(4-メトキシシクロヘキシル)-1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン(109mg)のTFA(1.5mL)溶液へトリエチルシラン(0.09mL)を加え、反応混合物を60℃で4.25時間攪拌した。反応液を減圧下に濃縮した。残渣へクロロホルムと飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、有機層を分液した。水層をクロロホルムで再抽出した。合わせた有機層を、無水硫酸マグネシウム上で乾燥し、乾燥剤をろ過し、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム、次いで酢酸エチル)で精製し、標記化合物のシス-トランス混合物(68mg)を得た。

この混合物をクロロホルム(1.1mL)-エタノール(4.4mL)に溶解し、ミリポアフィルターでろ過した。ろ液を、DAICEL社製CHIRALCEL(登録商標)IB(20mmφ×250mm)、エタノール100%、10mL/分の条件で精製し、シス体の標記化合物(10.1mg)、およびトランス体の標記化合物(47.0mg)を得た。

シス体

$^1\text{H-NMR}$ (400MHz, CDCl_3) δ (ppm): 1.63-1.74 (m, 2H), 1.94 (s, 3H), 1.97 (s, 3H), 2.00-2.09 (m, 2H), 2.22-2.30 (m, 2H), 2.47-2.60 (m, 2H), 3.39 (s, 3H), 3.60 (brs, 1H), 4.00 (s, 3H), 4.80-4.89 (m, 1H), 7.06 (dd

, $J = 8.4, 1.6 \text{ Hz}$, 1 H), 7.20 (d, $J = 1.6 \text{ Hz}$, 1 H), 7.94 (s, 1 H), 8.06 (d, $J = 8.4 \text{ Hz}$, 1 H), 8.30 (s, 1 H), 10.42 (brs, 1 H).

ESI-MS m/z 433 $[\text{M} + \text{H}]^+$

トランス体

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz , CDCl_3) δ (ppm) : $1.48-1.60$ (m, 2 H), 1.94 (s, 3 H), 1.97 (s, 3 H), $2.17-2.40$ (m, 6 H), $3.32-3.42$ (m, 1 H), 3.43 (s, 3 H), 4.01 (s, 3 H), $4.79-4.89$ (m, 1 H), 7.08 (d, $J = 8.4 \text{ Hz}$, 1 H), 7.25 (s, 1 H), 7.94 (s, 1 H), 8.04 (d, $J = 8.4 \text{ Hz}$, 1 H), 8.29 (s, 1 H), 10.95 (brs, 1 H).

ESI-MS m/z 433 $[\text{M} + \text{H}]^+$

[0087] [薬理試験例]

PDE9阻害活性試験例

1) ヒトリコンビナントPDE9タンパク質の調製

GenBankデータベースに登録されているhsPDE9A1の塩基配列 (Accession No. : AF048837) を基に、以下の配列 (北海道システム・サイエンス社) をプライマーとして、また、Human hippocampus cDNAライブラリー (CLONTECH社) を鋳型DNAとして、Pfu50 DNA polymerase (Invitrogen社) を用いて、以下の条件のポリメラーゼチェーンリアクション (PCR) によりhsPDE9A1 cDNAフラグメントを増幅した。
hPDE9-1プライマー : AGGATGGGATCCGGCTCCTCCA (配列番号1)

hPDE9A-3プライマー : CAGGCACAGTCTCCTTCACTG (配列番号2)

PCRの条件 : $[96^\circ\text{C}, 5 \text{ 分}] \times 1 \text{ サイクル}$, $[(96^\circ\text{C}, 10 \text{ 秒})$, (

57℃、5秒)、(72℃、2分)]×30サイクル。

[0088] 得られたh s P D E 9 A 1 c D N AフラグメントをT O P O - T A c l o n i n g v e c t o r (I n v i t r o g e n 社)に組み込み、塩基配列を確認した後、p c D N A 3. 1 / m y c H i s - t a g v e c t o r (i n v i t r o g e n 社)に導入し、哺乳動物細胞用ヒトP D E 9発現ベクターとした。哺乳動物細胞用ヒトP D E 9発現ベクターをL I P O F E T A M I N E 2 0 0 0 R e a g e n t (G I B C O 社)を用いてH E K 2 9 3細胞に一過性発現導入した。この細胞でP D E 9 Aが発現していることをW e s t e r n b l o t法で確認した後、ヒトP D E 9 A 1 c D N Aフラグメントをp Y N G v e c t o r (片倉工業株式会社)に導入し昆虫細胞発現ベクターとした。カイコにより大量発現されたカイコ破碎上清をバッファーA (20mmol/L T r i s - H C l p H 8. 0、1mmol/L D T T、10mmol/L イミダゾール)にて平衡化したN i カラムにて精製した。上清とN i カラムを1時間混和後、バッファーB (20mmol/L T r i s - H C l p H 8. 0、1mmol/L D T T)にて洗浄し、バッファーC (20mmol/L T r i s - H C l p H 8. 0、1mmol/L D T T、100mmol/L イミダゾール)にて溶出を行った。溶出画分を分取しP D E 9酵素溶液を得た。

[0089] 2) P D E 9阻害作用の測定

[³H] - c G M P (1mCi/mL)を0.5μCi/mLの濃度で含むバッファーD (40mmol/L T r i s - H C l、p H 7. 4、10mmol/L M g C l₂、1mM D T T、2μM c G M P)溶液100μLに、氷冷下にて評価化合物溶液(化合物をD M S Oに溶解し、D M S O濃度が5%となるように希釈したもの)10μL及び上記で調製したP D E 9酵素溶液をバッファーE (40mmol/L T r i s - H C l p H 7. 4、10mmol/L M g C l₂、1mM D T T、1mmol/L E G T A)で希釈した溶液90μLを加えた。この混合溶液を30℃にて10分間インキュベートした後、沸騰水中で2分間加熱することにより、P D E 9

の酵素反応を停止させた。次に、室温に戻して、50 μ Lの5' - N u c l e o t i d a s e (B I O M O L 社、10 u n i t s / m L) を加え、30 $^{\circ}$ Cにて10分間インキュベートすることにより、先の反応で生成した [^{3} H] - 5' - G M P を [^{3} H] - グアノシンに変換した。この反応液に、陰イオン交換樹脂 (B i o - R a d A G 1 - X 2 r e s i n、m e s h s i z e 200 - 400、H₂O : r e s i n = 2 : 1) を500 μ L添加し、10分間の放置後に遠心分離 (2000 r p m、10分) し、 [^{3} H] - グアノシンの存在する上清をL u m a P l a t e (パーキンエルマー社) に移し、放射活性をT o p C o u n t N X T マイクロプレートシンチレーション・ルミネッセンスカウンター (パーキンエルマー社) で測定した。

[0090] 評価化合物のP D E 9 抑制率は、評価化合物を含まないコントロールの放射活性を (A)、酵素を含まないブランクの放射活性を (B) 及び評価化合物の放射活性を (C) とし、以下の式を用いて算出した。

$$\text{抑制率} = 100 - \{ [(C) - (B)] / [(A) - (B)] \} \times 100 \text{ (\%)}$$

また、評価化合物のP D E 9 に対する I C₅₀ 値は、種々の濃度における抑制率より求めた。各評価化合物における I C₅₀ 値を表1に示す。

[0091] [表1]

実施例No.	PDE9 IC50 μ M
1a	0.0480
1b	0.0136
1c	0.0872
1d	0.0069
2a	0.0116
2b	0.0037
2c	0.0123
2d	0.0013
3a	0.0069
3b	0.0256
4a	0.0058
4b	0.0391
5a	0.0098
5b	0.0127

[0092] 3) げっ歯類脳脊髄液 c G M P に対する作用

I C R 系雄性マウス（日本チャールズリバー社）、S p r a g u e - D a w l e y（S D）系雄性ラット（日本チャールズリバー社）またはL o n g - E v a n s（L E）系雄性ラット（（財）動物繁殖研究所）に評価化合物投与後、ペントバルビタール麻酔下に脳脊髄液を採取し、 -20°C にて保管した。脳脊髄液中のc G M Pの測定はc G M P E I A キット（G E H e a l t h c a r e 社）のA c e t y l a t i o n E I A P r o c e d u r e、あるいはc G M P E I A キット（C a y m a n 社）のN o n - a c e t y l a t i o n P r o c e d u r eに従っておこなった。結果はv e h i c l e投与群のc G M P量（A）に対しての評価化合物投与群のc G M P量（B）の増加量（C）とし、以下の式を用いて算出した。

$$\text{c G M P 増加量 (C)} = [(B) - (A)] / (A) \times 100 (\%)$$

各評価化合物におけるc G M P増加量を表2に示す。

[0093] [表2]

実施例No.	% CSF cGMP increase from vehicle control	species	Dose (mg/kg, p.o.)	Sampling time (hr)
1b	147	rat (LE)	10	2
1d	206	rat (LE)	10	2
2d	183	rat (LE)	10	2
3a	200	rat (LE)	10	2
5b	167	rat (LE)	10	2

[0094] 4) げっ歯類海馬 c G M P に対する作用

S p r a g u e - D a w l e y（S D）系雄性ラット（日本チャールズリバー社）、またはL o n g - E v a n s（L E）系雄性ラット（（財）動物繁殖研究所）に評価化合物投与後、ペントバルビタール麻酔下にマイクロウェーブ処置をおこない海馬を摘出した。湿重量を測定後、液体窒素にて凍結し、 -80°C にて保管した。海馬中c G M Pの測定では、湿重量をもとに5%（w/v）となるように0.5 M 過塩素酸/1 mM E D T A 溶液を添加し破碎した。破碎後、遠心分離（10000 rpm、15分）をおこない、上清を採取した。採取した上清を2 M 炭酸水素カリウム溶液により中和

し、遠心分離（13000rpm、10分）をおこなった。上清中のcGMP濃度をcGMPEIAキット（GE Healthcare社）のNon-acetylation EIA Procedureに従っておこなった。結果はvehicle投与群のcGMP量（A）に対しての評価化合物投与群のcGMP量（B）の増加量（C）とし、以下の式を用いて算出した。

$$\text{cGMP 増加量 (C)} = [(B) - (A)] / (A) \times 100 (\%)$$

各評価化合物におけるcGMP増加量を表3に示す。


[0095] [表3]

実施例No.	% hippocampal cGMP increase from vehicle control	species	Dose (mg/kg, p.o.)	Sampling time (hr)
1b	44	rat (LE)	10	2
1d	61	rat (LE)	10	2
2d	23	rat (LE)	10	2
3a	58	rat (LE)	10	2
5b	41	rat (LE)	10	2

請求の範囲


[請求項1] 式（I）で表わされる化合物またはその薬剤学的に許容される塩。

[化1]




[式中、R¹は式

[化2]




で表わされる基、式

[化3]



で表わされる基または式

[化4]




で表わされる基であり、


R²は3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル基または4-メトキシシクロヘキシル基である。]

[請求項2] 式（II）で表わされる請求項1記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩。

[化5]


[式中、R³は式

[化6]



で表わされる基または式

[化7]




で表わされる基である。]

[請求項3]

式 (I I I) で表わされる請求項 1 記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩。

[化8]




[式中、R²は3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル基または4-メトキシシクロヘキシル基である。]

[請求項4]

(一) - 7 - (6-メトキシ-2, 4-ジメチルピリジン-3-イル) - 1 - ((3 R*, 4 R*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ [4, 3-c] キノリン-4 (5 H) - オン ((一) - c i s) またはその薬剤学的に許容される塩

o


[化9]



[請求項5]

(-) - 7 - (6-メトキシ-2, 4-ジメチルピリジン-3-イル) - 1 - ((3R*, 4S*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4 (5H) - オン ((-) - t r a n s) またはその薬剤学的に許容される塩。


[化10]



[請求項6]


(-) - 7 - (2-メトキシ-4, 6-ジメチルピリジン-3-イル) - 1 - ((3R*, 4S*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4 (5H) - オン ((-) - t r a n s) またはその薬剤学的に許容される塩。

[化11]




[請求項7] (一) - 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - ((3R*, 4R*) - 3-メチルテトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オン((一) - c i s) またはその薬剤学的に許容される塩。

[化12]



[請求項8] 7 - (2-メトキシ-3, 5-ジメチルピリジン-4-イル) - 1 - (トランス-4-メトキシクロヘキシル) - 1H-ピラゾロ[4, 3-c]キノリン-4(5H)-オンまたはその薬剤学的に許容される塩。

[化13]



[請求項9] 請求項1記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩を有効成分として含有する医薬組成物。

[請求項10] PDE9の阻害剤である請求項9記載の医薬組成物。

[請求項11] 脳内cGMP濃度を上昇させるための請求項9記載の医薬組成物。

[請求項12] 請求項1記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩を含有する、アルツハイマー病における認知機能障害改善剤。

[請求項13] 請求項1記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩を患者に投与する、アルツハイマー病における認知機能障害の改善方法。

[請求項14] アルツハイマー病における認知機能障害の改善に使用される、請求項1記載の化合物またはその薬剤学的に許容される塩。