

说明书

发明名称: 促进多特异性抗体的重链和轻链同源配对的突变体

[0001] 本发明涉及一种多特异性抗体，例如双特异性抗体，其包含能够促进多特异性抗体的重链和轻链同源配对的突变氨基酸对。

[0002] 发明背景：

[0003] 在当前的生物治疗市场中，抗体分子占主导地位。双特异性抗体(bsAbs)作为单个分子，同时结合两个不同的抗原或同一抗原上的两个不同的表位；它们不同于天然存在的免疫球蛋白G(IgG)单特异性抗体mAb。由于具有额外的靶向能力，bsAb常常可提供改善的治疗复杂疾病(如癌症和免疫失调)的临床益处，所述疾病涉及多种细胞表面受体或配体。为了将mAb工程化为bsAb，已经做出了许多努力，从而产生了60多种不同的bsAb形式。通过连接抗体片段，例如单链可变片段(scFv)，抗原结合片段(Fab)，重链(VH)和轻链(VL)可变结构域，可以工程化许多bsAb。但是，这些不同于常规IgG结构的新形式通常具有较差的理化特性，例如溶解度低和易聚集，大规模生产困难，热稳定性差、药物动力学差以及潜在的免疫原性。双特异性抗体在数量，质量和稳定性方面的巨大生产挑战已阻碍了其更广泛的临床应用和接受度。

[0004] 已经开发了异二聚Fc技术，来辅助双特异性抗体的生产。例如，Carter等人用“Kih“(knobs-into-holes)模型改造抗体重链的部分氨基酸，比较成功的实现了双特异抗体(Ridgway, Presta et al.1996; Carter 2001)。他们在Fc第一条重链的CH3区域上通过将一个侧链小的氨基酸突变成了一个侧链大的氨基酸从而创造出了一个“knob“(如T366Y),并将第二条重链上的CH3上的某些氨基酸突变成了侧链小的氨基酸创造出了“hole”(Y407T等)，即利用空间构象互补来实现异二聚体的形成(WO9627011)。之后通过随机突变-噬菌体展示等方法进一步提高了异二聚体的比例(WO1998050431)，同时引入了CH3区域内二硫键来提高异二聚体的，但阻碍同二聚体的形成的能力依然不够，整个异二聚体比例约70-80%左右。

- [0005] 或者，链交换改造结构域(SEED)异质化代表另一种基于空间突变的设计策略，运用IgG与IgA的CH3结构域(AG SEED CH3和GA SEED CH3)之间可替换的氨基酸序列形成互补结构。IgG和IgA CH3衍生物产生互补序列，因此两种互补的重链可以装配产生异二聚体，从而避免了缺乏互补作用产生同二聚体的可能(Muda, Met al. Therapeutic assessment of SEED: A new engineered antibody platform designed to generate mono- and bispecific antibodies. Protein Eng. Des. Sel. PEDS 2011, 24, 447 - 454.)。
- [0006] 除了早期提出的空间突变，静电引力相互作用也被广泛的用作促进重链形成异二聚体。该方法是将一条重链CH3结构域上的个别氨基酸突变为带正电荷的Lys, 将另一条重链的CH3中的个别氨基酸替换为带负电荷的Asp或Glu。然后带电的氨基酸通过静电引力容易形成异二聚体。Gunasekaran et al等人第一次引入带电的氨基酸形成Fc异源二聚体的双特异性抗体(Gunasekaran, K. et al. Enhancing antibody Fc heterodimer formation through electrostatic steering effects: applications to bispecific molecules and monovalent IgG. J. Biol. Chem. 2010, 285, 19637 - 19646.)。
- [0007] CN104011221B提供了一种在可变区和恒定区包含二硫键重塑突变的具有修饰的多肽链的双特异性抗体，但是该突变仍不足促使单个细胞系表达的双特异性抗体达到90%以上的完全正确配对。此专利中的二硫键重塑所选的氨基酸对不够优化，存在一部分未能形成二硫键的分子。
- [0008] CN109475627A提供了一种制备抗体混合物的方法，但是其涉及的是2种单特异性抗体混合物的制备，且电荷突变主要在恒定区中引入，这使得需要引入大量突变才能实现配对效果优化。
- [0009] 因此，本领域仍然需要新的双特异性抗体平台，其仅需要引入较少的突变，就能使得基于其获得双特异性抗体在表达时，具有较低的错配，且保持亲和力和表达量不变，同时，因所获得的双特异性抗体具有较少的突变而得以降低免疫原性，并且所述双特异性抗体平台的抗体的表达和重组能够在一个细胞系中进行。
- [0010] 发明简述

- [0011] 本发明提供了一种新的多特异性抗体(例如新的双特异性抗体)平台,其在双特异性抗体的可变区中引入电荷突变,同时在CH1/CL区引入二硫键重塑突变,从而获得的多特异性抗体
- [0012] (1)错配少,正确配对的分子比例更高;
- [0013] (2)具有与天然IgG相当的免疫原性风险;
- [0014] (3)亲和力与引入突变前的抗体相似或保持不变;
- [0015] (4)具有较高的表达量,例如与引入突变前的抗体或与单特异性抗体相当或更高的表达量;
- [0016] (5)能够在细胞系中表达,避免了在不同细胞系中表达和体外重组。
- [0017] 同时,本发明的多特异性抗体平台中引入的突变位置和氨基酸均较为保守,因此适用于多种多特异性抗体(双特异性抗体)。
- [0018] 附图简述:
- [0019] 图1显示了示例性的双特异性抗体结构(单价1+1构型)以及其中可以包含的突变。
- [0020] 图2显示了用LC-MS分析的表7所示的突变组合的正确组装分子比例,其中A: 抗体1重链; a: 抗体1轻链; B: 抗体2重链; b: 抗体2轻链; AaBb: 正确对配的双抗;
- [0021] 图2A: 表7组合1的LC-MS结果;
- [0022] 图2B: 表7组合2的LC-MS结果
- [0023] 图2C: 表7组合3的LC-MS结果。
- [0024] 图3显示了表8所示的不同抗体对引入二硫键重塑结合电荷突变后,用LC-MS分析正确组装分子比例,其中A: 抗体1重链; a: 抗体1轻链; B: 抗体2重链; b: 抗体2轻链; AaBb: 正确对配的双抗。
- [0025] 图3A: 表8Her2/PD-1组合的LC-MS结果。
- [0026] 图3B: 表8Her2/CD47组合的LC-MS结果。
- [0027] 图3C: 表8Her2/cMET组合的LC-MS结果。

- [0028] 图4显示了表9所示的不同抗体对引入不同电荷突变结合相同的二硫键重塑突变后，用 LC-MS分析正确组装分子比例，其中A：抗体1重链；a：抗体1轻链；B：抗体2重链；b：抗体2轻链；AaBb：正确对配的双抗。
- [0029] 图4A：表9组合1的LC-MS结果。
- [0030] 图4B：表9组合2的LC-MS结果。
- [0031] 图4C：表9组合3的LC-MS结果。
- [0032] 图4D：表9组合4的LC-MS结果。
- [0033] 图4E：表9组合5的LC-MS结果。
- [0034] 图5显示了三种双特异性抗体的构型，其中图5A显示了2+1N端构型的双特异性抗体；图5B显示了2+1C端构型的双特异性抗体；图5C显示了2+2C端构型的双特异性抗体。
- [0035] 图6显示了表11所示的应用本发明构建的多价构型分子，用LC-MS分析正确组装分子比例，其中HC1：抗体1重链；LC1：抗体1轻链；HC2：抗体2重链；LC2：抗体2轻链；Intact：正确配对的多价双抗。
- [0036] 图6A：表11 GPRC5D/CD3-1的LC-MS结果。
- [0037] 图6B：表11 GPRC5D/CD3-2的LC-MS结果。
- [0038] 图6C：表11 GPRC5D/CD3-3的LC-MS结果。
- [0039] 图6D：表11 GPRC5D/CD3-4的LC-MS结果。
- [0040] 图6E：表11 GPRC5D/CD3-5的LC-MS结果。
- [0041] 图6F：表11 GPRC5D/CD3-6的LC-MS结果。
- [0042] 图7A和图7B显示了BCMA/GPRC5D/CD3三抗引入电荷和二硫键重塑突变示例。
- [0043] 图8显示了示例抗体介导的PBMC对H929细胞的杀伤作用，其中图8A显示了示例抗体介导的PBMC对BCMA阳性H929细胞的杀伤作用，图8B显示了示例抗体介导的PBMC对GPRC5D阳性H929细胞的杀伤作用。
- [0044] 图9A-C显示了不同突变体单抗纯化后进行非还原聚丙烯酰胺凝胶电泳的结果；图9D-M显示了形成了二硫键的抗体进行变性非还原毛细管电泳(nrCE-SDS)的结果。

[0045] 定义：

[0046] 应理解本发明不限于本文中描述的特定方法学、方案和试剂，因为这些可以变化。还应理解本文中使用的术语仅为了描述具体实施方案，而并不意图限制本发明的范围，其仅会由所附权利要求书限制。除非另外定义，本文中使用的所有技术和科学术语与本发明所属领域中普通技术人员通常的理解具有相同的含义。

[0047] 为了解释本说明书，将使用以下定义，并且只要适当，以单数形式使用的术语也可以包括复数，并且反之亦然。要理解，本文所用的术语仅是为了描述具体的实施方案，并且不意欲是限制性的。

[0048] 术语“约”在与数字数值联合使用时意为涵盖具有比指定数字数值小5%的下限和比指定数字数值大5%的上限的范围内的数字数值。

[0049] 如本文所用，术语“和/或”意指可选项中的任一项或可选项的两项或多项或全部。

[0050] 在本文中当提及“第一”“第二”时，仅为了区分两个结构域或两条链，而不以任何方式表明两个结构域的位置。

[0051] 如本文所用，术语“包含”或“包括”意指包括所述的要素、整数或步骤，但是不排除任意其他要素、整数或步骤。在本文中，当使用术语“包含”或“包括”时，除非另有指明，否则也涵盖由所述及的要素、整数或步骤组成的情形。例如，当提及“包含”某个具体序列的抗体可变区时，也旨在涵盖由该具体序列组成的抗体可变区。

[0052] 如本文所用，重链和轻链的全部可变区的氨基酸位置根据Kabat等人, Sequences of Proteins of Immunological Interest, 第5版. Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD(1991)中描述的Kabat编号系统编号并且在本文中称作“Kabat编号”。

[0053] 如本文所用，用于提及抗体除可变区之外的结构域(例如恒定区，例如Fc区)中的氨基酸位置时，根据Edelman, G.M. et al., Proc. Natl. Acad. USA, 63, 78-85(1969)中描述的EU编号系统编号并且在本文中称作“EU编号”。当将位置编号和/或氨

氨基酸残基赋予特定抗体同种型时，其旨在适用于任何其它抗体同种型的相应的位置和/或氨基酸残基，这是本领域技术人员已知的。

- [0054] 关于人免疫球蛋白轻链和重链的核苷酸序列的一般信息在Kabat,E.A.等人,Sequences of Proteins of Immunological Interest,第5版,Public Health Service,National Institutes of Health,Bethesda,MD(1991)中给出。
- [0055] 术语“氨基酸取代”或“氨基酸突变”指将预先确定的亲本氨基酸序列中的至少一个氨基酸残基替换为不同的“取代”氨基酸残基。该取代残基或多个残基可以是“天然存在的氨基酸残基”(即由遗传密码编码)并且选自：丙氨酸(Ala)；精氨酸(Arg)；天冬酰胺(Asn)；天冬氨酸(Asp)；半胱氨酸(Cys)；谷氨酰胺(Gln)；谷氨酸(Glu)；甘氨酸(Gly)；组氨酸(His)；异亮氨酸(Ile)；亮氨酸(Leu)；赖氨酸(Lys)；甲硫氨酸(Met)；苯丙氨酸(Phe)；脯氨酸(Pro)；丝氨酸(Ser)；苏氨酸(Thr)；色氨酸(Trp)；酪氨酸(Tyr)；和缬氨酸(Val)。本文的氨基酸取代定义中还涵盖用一种或多种非天然存在的氨基酸残基置换。“非天然存在的氨基酸残基”指除上文所列的那些天然存在的氨基酸残基之外，能够共价结合多肽链中相邻氨基酸残基的残基。非天然存在的氨基酸残基的例子包括正亮氨酸、鸟氨酸、正缬氨酸、高丝氨酸、Aib和其他氨基酸残基类似物。
- [0056] 术语“CH1区”指抗体重链多肽的从EU位置118延伸至EU位置220的部分(EU编号体系)。在一个实施方案中，CH1结构域包含ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGT AALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVPS SSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSC(SEQ ID NO:116)的氨基酸序列。在一个实施方案中，通过突变CH1中的半胱氨酸为非半胱氨酸来去除内部二硫键，或者通过将非半胱氨酸突变为半胱氨酸来重塑新的二硫键。
- [0057] 术语“CH2区”指抗体重链多肽的从EU位置231延伸至EU位置340的部分(EU编号体系)。在一个实施方案中，CH2结构域包含APELL GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHN AKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTIS KAK(SEQ ID NO:117)的氨基酸序列。

- [0058] 术语“CH3区”指抗体重链多肽的从EU位置341延伸至EU位置447的部分。在一个实施方案中，CH3结构域包含GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK(SEQ ID NO:118)的氨基酸序列。
- [0059] 术语“铰链区”指抗体重链多肽的部分，所述部分在野生型抗体重链中连接CH1区和CH2区，例如，IgG1铰链区，例如根据EU编号，D221到P230的序列。可以通过与IgG1亚类序列的铰链区半胱氨酸残基对齐，确定其他IgG亚类的铰链区。
- [0060] 铰链区通常情况下是由具有相同氨基酸序列的两条多肽组成的二聚体分子。在一个实施方案中，铰链区具有氨基酸序列DKTHTCPXCP(SEQ ID NO:119)，其中X是S或P。在一个实施方案中，铰链区包含氨基酸序列HTCPXCP(SEQ ID NO:120)，其中X是S或P。在一个实施方案中，铰链区包含氨基酸序列CPXCP(SEQ ID NO:121)，其中X是S或P。在一个实施方案中，通过突变铰链区中的半胱氨酸为非半胱氨酸来去除铰链区的内部二硫键。
- [0061] 本发明的多特异性抗体可以包含接头。如本文所用的术语“接头”是指使得能够直接连接多特异性抗体的不同部分的任何分子。在多特异性抗体不同部分之间建立共价连接的接头的实例包括肽接头和非蛋白质聚合物，包括但不限于聚乙二醇(PEG)、聚丙二醇、聚氧化烯或聚乙二醇、聚丙二醇的共聚物。在一些实施方案中，根据本发明的术语“肽接头”是指氨基酸的序列，其中所述序列将多特异性抗体的各个部分的氨基酸序列连接在一起。优选地，所述肽接头具有这样的长度，其足以连接两个实体，其方式使得它们维持它们相对于彼此的构象，使得不妨碍期望的活性。肽接头可以主要包括或不主要包括以下氨基酸残基：Gly、Ser、Ala或Thr。有用的接头包括甘氨酸-丝氨酸聚合物，包括例如(GS)_n、(GSGGS)_n、(GGGGS)_n、(GGGS)_n和(GGGGS)_nG，其中n是至少1(且优选2、3、4、5、6、7、8、9、10)的整数。有用的接头还包括甘氨酸-丙氨酸聚合物、丙氨酸-丝氨酸聚合物和其他柔性接头。
- [0062] 术语“Fc结构域”或“Fc区”在本文中用来定义免疫球蛋白重链的含有至少一部分恒定区的C端区域。该术语包括天然序列Fc区和变体Fc区。天然的

免疫球蛋白“Fc结构域”包含两个或三个恒定结构域，即CH2结构域、CH3结构域和可选的CH4结构域。例如，在天然抗体中，免疫球蛋白Fc结构域包含源自IgG、IgA和IgD类抗体的两条重链的第二和第三恒定结构域(CH2结构域和CH3结构域)；或者包含源自IgM和IgE类抗体的两条重链的第二、第三和第四恒定结构域(CH2结构域、CH3结构域和CH4结构域)。除非本文中另外说明，否则Fc区或重链恒定区中的氨基酸残基编号根据如Kabat等人, *Sequences of Proteins of Immunological Interest*, 第5版, Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD, 1991中所述的EU编号体系(也称作EU索引)进行编号。然而，Fc区的C端赖氨酸(Lys447)可以存在或可以不存在。两个Fc区可以实现二聚化以构成二聚Fc，两个不同的Fc异二聚化形成异二聚Fc。在本文中，术语“Fc区”、“Fc部分”和“二聚Fc(例如异二聚Fc)”不包括免疫球蛋白的重链可变区VH和轻链可变区VL以及重链恒定区CH1和轻链恒定区CL，但在一些情况下可以包括在重链恒定区N端的铰链区。在一个实施方案中，人IgG重链Fc区从Asp221或从Cys226或从Asp231延伸至重链的羧基端。

[0063] 在一个实施方案中，人IgG1Fc区多肽(包含铰链区)包含以下氨基酸序列：

DKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDG
VEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKG
QPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGS
FFLYSKLTVDKSRWQQGNVVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPGK (SEQ ID NO:122)。

[0064] 人IgG4Fc区多肽(包含铰链区)包含以下氨基酸序列：

PPCPCSPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVH
NAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREP
QVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYS
RLTVDKSRWQQGNVVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPGK (SEQ ID NO:123)。

[0065] 如本文所报道方法中产生的抗体包含Fc区，在一个实施方案中，Fc区衍生自人源的Fc区。在一个实施方案中，该Fc区包含人类恒定区的全部部分。抗体Fc区直接参与补体激活、C1q结合、C3活化和Fc受体结合。在一个实施方案中，Fc区是人Fc区。在一个实施方案中，Fc区属于人IgG4亚类。在一个实施方案中，Fc区属于人IgG1亚类。

[0066] 在本文中，“异二聚体Fc支架”是指包含两个不同的Fc区或由两个不同的Fc区二聚化后形成的支架，其可以在其N末端或C末端连接结合抗原的结构域(例如可以与靶分子结合的抗体的重链和/或轻链可变区或抗体的抗原结合片段，或可以

与靶分子结合的配体或受体的可溶性部分), 用于构成多特异性抗体例如双特异性抗体。

- [0067] 在氨基酸突变用(原始氨基酸,氨基酸位置,突变氨基酸)来表示。例如,当突变位点位于V区时,“A43D”是指,位于Kabat位置43的丙氨酸氨基酸被天冬氨酸(D)取代;当突变位点位于C区时,“Q124C”是指,位于EU位置124的谷氨酰胺被半胱氨酸(C)取代。当谈及突变组合时,组合的突变之间用加号(+)连接。
- “A43D+Q124C”表示同时包含突变A43D和Q124C。当在一个特定位置可以具有多种突变可能性时,在本文中,通过符号“/”来表示。例如,突变“K370T/S”表示370位的残基K可以替代为T或S残基。
- [0068] 在本发明提及氨基酸位置时,如无明确说明,是指根据IgG1重链或kappa轻链编号的氨基酸位置,即其涵盖基于IgG1重链或Kappa轻链编号的氨基酸位置,以及在其他重链或轻链上对应于所述氨基酸位置的氨基酸位置。例如,在提及C220时,其涵盖IgG1重链通过EU编号下的第220位氨基酸,以及在其他重链中对应的氨基酸,例如在IgG2、IgG3或IgG4中的第131位氨基酸。
- [0069] 应当注意,在描述突变时,在一个具体位置上的原始氨基酸可以是描述的氨基酸,或者也可以是在对应位置上的其他氨基酸。例如,当注意,在在描述突变时,包括将可变区第43位的丙氨酸突变为天冬氨酸,也包括在对应于第43位不是丙氨酸时,将对应的43位位置上的氨基酸突变为天冬氨酸,只要该原始氨基酸对应于该可变区的第43位即可。术语“宿主细胞”、“宿主细胞系”和“宿主细胞培养物”互换使用并且指已经向其中引入外源核酸的细胞,包括这类细胞的后代。宿主细胞包括“转化体”和“转化的细胞”,这包括原代转化的细胞和从中衍生的子代,而无论传代次数是多少。后代可以在核酸含量方面不与亲本细胞完全相同,反而可以含有突变。本文中包括这样的突变子代,所述突变子代具有针对最初转化的细胞中所筛选或选择的相同的功能或生物活性。
- [0070] 术语“载体”当在本文中使用时是指能够增殖与其相连的另一个核酸的核酸分子。该术语包括作为自我复制核酸结构的载体以及结合到已经引入其的宿主细胞的基因组中的载体。一些载体能够指导与其可操作相连的核酸的表达。这样的载体在本文中被称为“表达载体”。

- [0071] 术语“结合分子”是指能够与靶标特异性结合的任何分子，例如抗体或其抗原结合片段或融合蛋白。
- [0072] 术语“靶标”是指结合分子所针对的被结合物。靶标可以是抗原，也可以是配体或受体。术语“抗原”是指引发免疫应答的分子。这种免疫应答可能涉及抗体产生或特异性免疫细胞的活化，或两者兼有。技术人员将理解，任何大分子，包括基本上所有的蛋白质或肽，都可以用作抗原。此外，抗原可以衍生自重组或基因组DNA。如本文所用，术语“表位”指抗原中与抗体分子特异性相互作用的部分。在一些实施方案中，抗原为肿瘤相关抗原(即与肿瘤的发生进展有关的抗原)或T细胞衔接器。在本发明的结合分子涉及来源于抗体的靶标结合区时，“靶标”和“抗原”可以互换使用。
- [0073] 如本文所用的术语“靶标结合区”是指结合分子，例如多特异性结合分子或双特异性结合分子的结合特定靶标或抗原的部分。靶标结合区可以是例如抗体或免疫球蛋白本身或抗体片段。这种靶标结合区可以具有或可以不具有独立于结合分子的剩余部分的三级结构，并且可以作为单独实体结合或不结合其靶标。靶标结合区还可以是受体或配体，或受体的能够结合配体的结构域。在多特异性抗体或双特异性抗体时，也将“靶标结合区”称为“抗原结合区”。
- [0074] 如本文所用的术语“抗原结合区”是指抗体或其抗原结合片段，例如多特异性抗体或双特异性抗体的结合特定靶标或抗原的任何部分。抗原结合区可以是例如抗体或免疫球蛋白本身或抗体片段。这种抗原结合区可以具有或可以不具有独立于多特异性抗体或双特异性抗体的剩余部分的三级结构，并且可以作为单独实体结合或不结合其抗原/表位。在本发明的结合分子涉及来源于抗体的靶标结合区时，“靶标结合区”和“抗原结合区”可以互换使用。
- [0075] 术语“多特异性结合分子”是指至少是双特异性的多特异性结合分子，例如双特异性结合分子，即所述分子包含至少第一靶标结合区和第二靶标结合区，其中所述第一靶标结合区结合一种靶标或抗原且所述第二靶标结合区结合另一抗原或靶标。根据本发明的多特异性结合分子也涵盖包含多个靶标结合区/结合位点的多特异性分子，诸如三特异性结合分子。在一些实施方案中，本发明的多特异性结合分子是多特异性抗体。在一些实施方案中，本发明的双特异性结

合分子是双特异性抗体。在一些实施方案中，本发明的多特异性结合分子是融合蛋白，其可以例如包含来自抗体的靶标结合区和来自受体或配体的靶标结合区。

[0076] 如本文所用，术语“单特异性”指，具有一个或多个靶标结合位点的多肽/蛋白质分子，所述位点中的每一个位点与相同靶标的相同位点或结构或相同抗原的相同表位结合。

[0077] 如本文所用，术语“多特异性”结合分子例如抗体指具有至少两个靶标结合位点，所述至少两个靶标结合位点中的每一个靶标结合位点与相同靶标的不同位点/结构或与不同靶标结合。多特异性结合分子是对至少两个不同靶标或位点/结构具有结合特异性的结合分子。在一个实施方案中，本文提供了这样的双特异性结合分子，其具有针对第一靶标和第二靶标的结合特异性。

[0078] 如本文所用，术语“多特异性”抗体指具有至少两个抗原结合位点的抗体，所述至少两个抗原结合位点中的每一个抗原结合位点与相同抗原的不同表位或与不同抗原的不同表位结合。多特异性抗体是对至少两个不同抗原表位具有结合特异性的抗体。在一个实施方案中，本文提供了这样的双特异性抗体，其具有针对第一抗原和第二抗原的结合特异性。

[0079] 当在多特异性抗体或双特异性抗体中提及“第一抗原结合区”时，是指结合第一抗原的结合区，而不意图限制抗体中所含的该抗原结合区的个数，例如多特异性抗体或双特异性抗体中可以包含1个或1个以上的第一抗原结合区。例如，双特异性抗体包含第一抗原结合区和第二抗原结合区，但是可以包含1个或1个以上的第一抗原结合区和1个或1个以上的第二抗原结合区。

[0080] 当在结合分子中提及“第一靶标结合区”时，是指结合第一靶标的结合区，而不意图限制结合分子中所含的该靶标结合区的个数，例如多特异性结合分子或双特异性结合分子中可以包含1个或1个以上的第一靶标结合区。例如，双特异性结合分子包含第一靶标结合区和第二靶标结合区，可以包含1个或1个以上的第一靶标结合区和1个或1个以上的第二靶标结合区。

[0081] 当在抗体中提及“第一抗原结合区”时，是指结合第一抗原的结合区，而不意图限制抗体中所含的该抗原结合区的个数，例如多特异性抗体或双特异性抗体

中可以包含1个或1个以上的第一抗原结合区。例如，双特异性抗体包含第一抗原结合区和第二抗原结合区，但是可以包含1个或1个以上的第一抗原结合区和1个或1个以上的第二抗原结合区。

[0082] 当提及“靶标或抗原结合区来源于抗体”时，是指构成该靶标/抗原结合区的结合结构域为或衍生自该抗体的特异性结合抗原的结合结构域，例如，抗原结合区的特异性结合抗原的片段例如Fab为或衍生自该抗体的相应片段例如Fab，或抗原结合区的重链可变区和/或轻链可变区为或衍生自该抗体的重链可变区和/或轻链可变区，或者该抗原结合区的1个、2个、3个、4个、5个或6个CDR为该抗体的CDR。

[0083] 术语“衍生自”是指在抗原结合区中的片段与其所来源的抗体的片段基本相同，但是在一个或多个位点处具有突变，例如取代、缺失或添加。在一个具体的实施方案中，所述突变不在抗体的CDR中。


[0084] 术语“全抗体”或“全长抗体”在本文中可互换使用，是指具有天然免疫球蛋白分子结构的抗体分子。在常规四链IgG抗体的情况下，全长抗体包含由二硫键相互连接的两条重链(H)和两条轻链(L)。在仅具有重链而缺乏轻链的重链抗体情况下，全长抗体包含由二硫键相互连接的两条重链(H)。对于常规四链IgG抗体，全长抗体重链通常由重链可变区(本文中缩写为VH)和重链恒定区组成，其中重链恒定区至少包含3个结构域CH1、CH2和CH3。全长抗体轻链由轻链可变区(本文中缩写为VL)和轻链恒定区组成，其中轻链恒定区由一个结构域CL组成。每个重链可变区VH和每个轻链可变区都由三个CDR和4个FR组成，从氨基端到羧基端以如下顺序排列：FR1,CDR1,FR2,CDR2,FR3,CDR3,FR4。术语“抗体片段”包括完整抗体的一部分。在优选的实施方案中，抗体片段为抗原结合片段。

[0085] 术语抗体的“抗原结合片段”是与全长抗体不同的分子，其包含全长抗体的一部分，但其能结合全长抗体的抗原或与全长抗体(即与抗原结合片段所来源的全长抗体)竞争结合抗原。可以通过重组DNA技术、或通过酶或化学切割完整的抗体制备抗原结合片段。抗原结合片段包括但不限于Fab、Fab'、F(ab')₂、Fv、单链Fv、双体抗体(diabody)、单域抗体(sdAb)、纳米抗体。例如，通过木瓜蛋白

酶消化全长抗体能够获得Fab片段。此外，通过胃蛋白酶在铰链区的二硫键下面消化完全抗体产生F(ab')₂，其为Fab'的二聚体，是二价的抗体片段。F(ab')₂可以在中性条件下通过破坏铰链区中的二硫键而被还原，由此将F(ab')₂二聚体转化为Fab'单体。Fab'单体基本上是具有铰链区的Fab片段。Fv片段由抗体单臂的VL和VH结构域组成。Fv片段的两个结构域VL和VH可以由独立的基因编码，但是也可以使用重组方法，使用合成性连接肽连接这两个结构域以使其作为单条蛋白链产生，并且在所述单条蛋白链中VL区和VH区配对以形成单链Fv(scFv)。

[0086] “Fab片段”或“Fab”在本文中可互换使用，用于指，由两条多肽链组成的、包含免疫球蛋白重链可变结构域VH、重链恒定结构域CH1、轻链可变结构域VL和轻链恒定结构域CL的免疫球蛋白片段，其中，一条多肽链从N端到C端包含VH和选自CH1和CL的一个恒定区，另一条多肽链从N端到C端包含VL和选自CL和CH1的另一恒定区，其中所述VH结构域和VL结构域配对形成抗原结合位点。在本文中，包含重链恒定区CH1的Fab多肽链也称作“Fab重链”；相应地，包含轻链恒定区CL的Fab多肽链也称作“Fab轻链”。

[0087] “互补决定区”或“CDR区”或“CDR”是抗体可变结构域中在序列上高变并且形成在结构上确定的环(“超变环”)和/或含有抗原接触残基(“抗原接触点”)的区域。CDR主要负责与抗原表位结合。重链和轻链的CDR通常被称作CDR1、CDR2和CDR3，从N-端开始顺序编号。位于抗体重链可变结构域内的CDR被称作HCDR1、HCDR2和HCDR3，而位于抗体轻链可变结构域内的CDR被称作LCDR1、LCDR2和LCDR3。在一个给定的轻链可变区或重链可变区氨基酸序列中，各CDR的精确氨基酸序列边界可以使用许多公知的抗体CDR指派方案的任一种或其组合确定，所述指派方案包括例如：基于抗体的三维结构和CDR环的拓扑学的Chothia(Chothia等人.(1989)Nature 342:877-883, Al-Lazikani等人, “Standard conformations for the canonical structures of immunoglobulins” Journal of Molecular Biology, 273, 927-948(1997)), 基于抗体序列可变性的Kabat(Kabat等人, Sequences of Proteins of Immunological Interest, 第4版, U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health (1987)), AbM(University of Bath), Contact(University College London), 国际

ImMunoGeneTics database(IMGt)(在万维网上)，以及基于利用大量晶体结构的近邻传播聚类(affinity propagation clustering)的North CDR定义。除非另有说明，否则在本发明中，术语“CDR”或“CDR序列”涵盖以上述任一方式确定的CDR序列。CDR也可以基于与参考CDR序列(例如本发明示例性CDR之一)具有相同的Kabat编号位置而确定。

[0088] 如下进行序列之间序列同一性的计算。

[0089] 为确定两个氨基酸序列或两个核酸序列的同一性百分数，将所述序列出于最佳比较目的比对(例如，可以为了最佳比对而在第一和第二氨基酸序列或核酸序列之一或二者中引入空位或可以为比较目的而抛弃非同源序列)。在一个优选实施方案中，为比较目的，所比对的参考序列的长度是至少30%、优选地至少40%、更优选地至少50%、60%和甚至更优选地至少70%、80%、90%、100%的参考序列长度。随后比较在对应氨基酸位置或核苷酸位置处的氨基酸残基或核苷酸。当第一序列中的位置由第二序列中对应位置处的相同氨基酸残基或核苷酸占据时，则所述分子在这个位置处是相同的。

[0090] 发明详述

[0091] I.结合分子

[0092] 本发明涉及一种结合分子，其包含第一靶标结合区和第二靶标结合区，以及任选地一个或多个其他靶标结合区，其中，所述靶标结合区中的一个或两个或多个包含有利于防止错配和/或促进异二聚化的一个或多个突变。在一些实施方案中所述结合分子还包含促进异二聚体纯化的一个或多个突变。在一些实施方案中，本发明的结合分子包含的突变选自二硫键重塑突变、电荷突变和/或其他有利于防止错配和/或促进异二聚化的一个或多个突变。在一些实施方案中，第一靶标结合区和第二靶标结合区结合相同的靶标或靶标上的位点/结构。在一些实施方案中，第一靶标结合区和第二靶标结合区结合不同的靶标或靶标上的位点/结构。

[0093] 在一些实施方案中，所述结合分子是融合蛋白，其可以例如包含来自抗体的靶标结合区和来自受体或配体的靶标结合区。在一些实施方案中，所述配体或受体的示例性实例为颗粒相关细胞因子或其受体，如肿瘤坏死因子(TNF)、血管

内皮生长因子(VEGF)或转化生长因子(TGF, 例如TGF- β)或其受体, 以及其片段。

- [0094] 在一些实施方案中, 所述结合分子是抗体。在一些实施方案中, 本发明涉及一种包含突变的抗体, 例如单特异性抗体或多特异性抗体, 例如双特异性抗体, 其包含第一抗原结合区和第二抗原结合区, 以及任选地一个或多个其他抗原结合区, 其中, 所述抗原结合区中的一个或两个或多个包含有利于防止错配和/或促进异二聚化的一个或多个突变。在一些实施方案中所述抗体还包含促进异二聚体纯化的一个或多个突变。在一些实施方案中, 本发明的抗体包含的突变选自二硫键重塑突变、电荷突变和/或其他有利于防止错配和/或促进异二聚化的一个或多个突变。在一些实施方案中, 第一抗原结合区和第二抗原结合区结合相同的抗原或表位。在一些实施方案中, 第一抗原结合区和第二抗原结合区结合不同的抗原或表位。
- [0095] 在一些实施方案中, 靶标结合区或抗原结合区包含重链可变区和轻链可变区。在一些实施方案中, 靶标结合区或抗原结合区包含轻链恒定区CL。在一些实施方案中, 靶标结合区或抗原结合区包含重链恒定区CH1。
- [0096] 在一些实施方案中, CH1区为人的IgG CH1, 例如, 人IgG1 CH1, 人IgG2 CH1, 人IgG3 CH1或人IgG4 CH1。在一个实施方案中, CH1区包含氨基酸序列SEQ ID NO:116, 或与其具有至少90%同一性, 例如95%, 96%, 97%, 99%或100%的同一性的氨基酸序列或由其组成。
- [0097] 在一些实施方案中, CL区为人的Kappa轻链CL区或人的Lamda轻链CL区。在一些实施方案中, CL区包含氨基酸序列SEQ ID NO:54或SEQ ID NO:55, 或与其具有至少90%同一性, 例如95%, 96%, 97%, 99%或100%的同一性的氨基酸序列或由其组成。
- [0098] 在本公开中, 对抗原结合区的限定同样适用于靶标结合区。
- [0099] I-1二硫键重塑突变
- [0100] 二硫键重塑突变是一个可以有效强制同源轻重链配对从而避免结合分子或多特异性抗体的不同靶标结合区的轻重链之间错配的策略, 对于其中一个或多个靶

标结合区的轻重链连接的二硫键进行重塑，改变二硫键的位置，使得错误配对的轻重链不能有效形成二硫键。

[0101] 因此，在一个实施方案中，本发明的结合分子例如抗体中，至少一个靶标结合区或抗原结合区包含CH1-CL，且所述CH1-CL的界面上的二硫键被重塑，例如在所述CH1-CL界面上具有二硫键重塑突变。在一个实施方案中，本发明的结合分子例如抗体中，2个或更多个靶标结合区包含在所述CH1-CL界面上的二硫键重塑突变。

[0102] 本文所述的“二硫键重塑突变”是指界面上一对氨基酸的位置上的突变，其中所述氨基酸对的位置上的非半胱氨酸被半胱氨酸取代，例如所述氨基酸对位置上的两个非半胱氨酸被半胱氨酸取代后允许链间二硫键的形成。

[0103] 在一些实施方案中，本发明的二硫键重塑突变是在抗原结合区(例如包含Fab的抗原结合区)的CH1-CL界面上的氨基酸对的位置上的突变，其中所述氨基酸对的位置上的非半胱氨酸被半胱氨酸取代。在一些实施方案中，所述氨基酸对位置上的两个非半胱氨酸被半胱氨酸取代后允许链间二硫键的形成。

[0104] 在一些实施方案中，所述突变为在所述CH1-CL界面上 α 碳原子之间的距离小于8Å,更优选的小于6Å的非半胱氨酸的氨基酸对中的氨基酸均被突变为半胱氨酸。在一些实施方案中，所述氨基酸对中的氨基酸侧链指向彼此。在一些实施方案中，所述CH1-CL界面上 α 碳原子之间的距离小于8Å,更优选的小于6Å的非半胱氨酸的氨基酸对中的氨基酸均被突变为半胱氨酸，且所述非半胱氨酸的氨基酸对中的氨基酸侧链指向彼此。

[0105] 在一些实施方案中，所述抗原结合区中的(例如IgG1、IgG2、IgG3或IgG4的)重链CH1在位置126、128、134、136、139、168、170、171或173处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代。在一些实施方案中，所述抗原结合区中的轻链CL在位置114、116、118、124、160、162或164处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代。

[0106] 在一些实施方案中，在所述抗原结合区的CH1-CL中，(例如IgG1、IgG2、IgG3或IgG4)重链CH1在位置126处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至

一个半胱氨酸氨基酸的取代，且轻链CL在位置124处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代。

- [0107] 在一些实施方案中，在所述抗原结合区的CH1-CL中，(例如IgG1、IgG2、IgG3或IgG4)重链CH1在位置168处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代，且轻链CL在位置164处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代。
- [0108] 在一些实施方案中，在所述抗原结合区的CH1-CL中，(例如IgG1、IgG2、IgG3或IgG4)重链CH1在位置170处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代，且轻链CL在位置162或164处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代。
- [0109] 在一些实施方案中，在所述抗原结合区的CH1-CL中，(例如IgG1、IgG2、IgG3或IgG4)重链CH1在位置173处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代，且轻链CL在位置160或162处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代。
- [0110] 在一些实施方案中，在所述抗原结合区的CH1-CL中，(例如IgG1、IgG2、IgG3或IgG4)重链CH1在位置128处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代，且轻链CL在位置118处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代。
- [0111] 在一些实施方案中，在所述抗原结合区的CH1-CL中，(例如IgG1、IgG2、IgG3或IgG4)重链CH1在位置134处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代，且轻链CL在位置116处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代。
- [0112] 在一些实施方案中，在所述抗原结合区的CH1-CL中，(例如IgG1、IgG2、IgG3或IgG4)重链CH1在位置136处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代，且轻链CL在位置114处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代。
- [0113] 在一些实施方案中，在所述抗原结合区的CH1-CL中，(例如IgG1、IgG2、IgG3或IgG4)重链CH1在位置171处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至

一个半胱氨酸氨基酸的取代，且轻链CL在位置162处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代。

- [0114] 在一些实施方案中，在所述抗原结合区的CH1-CL中，(例如IgG1、IgG2、IgG3或IgG4)重链CH1在位置139处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代，且轻链CL在位置116处(EU编号)具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代。
- [0115] 非半胱氨酸氨基酸在一些方面包括天然存在的和/或非经典氨基酸。天然存在的非半胱氨酸氨基酸包括甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、脯氨酸、丝氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸、组氨酸、赖氨酸、精氨酸、谷氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺、天冬酰胺、苯丙氨酸、酪氨酸以及色氨酸。非经典氨基酸有时可以经由细胞表达系统(例如，原核细胞和/或真核细胞表达系统)来并入。非经典氨基酸的实例包括鸟氨酸、二氨基丁酸、正亮氨酸、吡啶丙氨酸(pyrrylalanine)、噻吩丙氨酸、萘基丙氨酸以及苯基甘氨酸。
- [0116] 在一些实施方案中，所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含F126C，且在CL中包含Q124C(EU编号)。
- [0117] 在一些实施方案中，所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含H168C，且在CL中包含T164C(EU编号)。
- [0118] 在一些实施方案中，所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含F170C，且在CL中包含T164C(EU编号)。
- [0119] 在一些实施方案中，所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含F170C，且在CL中包含S162C(EU编号)。
- [0120] 在一些实施方案中，所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含V173C，且在CL中包含S162C(EU编号)。
- [0121] 在一些实施方案中，所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含V173C，且在CL中包含Q160C(EU编号)。
- [0122] 在一些实施方案中，所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含L128C，且在CL中包含F118C(EU编号)。

- [0123] 在一些实施方案中,所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含S134C,且在CL中包含F116C(EU编号)。
- [0124] 在一些实施方案中,所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含S136C,且在CL中包含S114C(EU编号)。
- [0125] 在一些实施方案中,所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含P171C,且在CL中包含S162C(EU编号)。
- [0126] 在一些实施方案中,所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含T139C,且在CL中包含F116C(EU编号)。
- [0127] 因此,在本发明的一个实施方案中,本发明涉及一种结合分子,例如多特异性抗体,其包含第一抗原结合区和第二抗原结合区以及任选的其他抗原结合区,其中,在第一抗原结合区包含第一CH1和第一CL,
- [0128] (i)所述第一CH1包含F126C突变,且所述第一CL中包含Q124C突变(EU编号);
- [0129] (ii)所述第一CH1包含H168C突变,且所述第一CL中包含T164C突变(EU编号);
- [0130] (iii)所述第一CH1包含F170C突变,且所述第一CL中包含T164C突变(EU编号);
- [0131] (iv)所述第一CH1包含F170C突变,且所述第一CL中包含S162C突变(EU编号);
- [0132] (v)所述第一CH1包含V173C突变,且所述第一CL中包含S162C突变(EU编号);
- [0133] (vi)所述第一CH1包含V173C突变,且所述第一CL中包含Q160C突变(EU编号);
- [0134] (vii)所述第一CH1包含L128C突变,且所述第一CL中包含F118C突变(EU编号);
- [0135] (viii)所述第一CH1包含S134C突变,且所述第一CL中包含F116C突变(EU编号);
- [0136] (ix)所述第一CH1包含S136C突变,且所述第一CL中包含S114C突变(EU编号);
- [0137] (x)所述第一CH1包含P171C突变,且所述第一CL中包含S162C突变(EU编号);
- 或
- [0138] (xi)所述第一CH1包含T139C突变,且所述第一CL中包含F116C突变(EU编号)。
- [0139] 在一些实施方案中,所述CH1来自IgG1、IgG2、IgG3或IgG4,优选来自IgG1或IgG4。在一些实施方案中,所述CL来自kappa轻链或λ轻链。

- [0140] 在一些实施方案中,所述二硫键重塑突变还包括将天然半胱氨酸取代为非半胱氨酸。在一些实施方案中,在一个或两个或多个抗原结合区中的重链恒定区-轻链恒定区界面内的链间半胱氨酸被非半胱氨酸取代。在一些实施方案中,所述抗原结合区中的CH1在位置220处(EU编号)具有一个半胱氨酸氨基酸被一个非半胱氨酸氨基酸的取代。在一些实施方案中,所述抗原结合区中的IgG1重链CH1在位置220处(EU编号)具有一个半胱氨酸氨基酸被一个非半胱氨酸氨基酸的取代,或者所述抗原结合区中的IgG2、IgG3或IgG4重链CH1在位置131处(EU编号)具有一个半胱氨酸被一个非半胱氨酸的取代。在一些实施方案中,所述抗原结合区中的轻链CL在位置214处(EU编号)具有一个半胱氨酸氨基酸至一个非半胱氨酸氨基酸的取代。在一些实施方案中,在所述抗原结合区中,IgG1重链CH1在位置220处(EU编号)具有一个半胱氨酸氨基酸至一个非半胱氨酸氨基酸的取代,且轻链CL在位置214处(EU编号)具有一个半胱氨酸氨基酸至一个非半胱氨酸氨基酸的取代,或者IgG2、IgG3或IgG4重链CH1区在位置131处(EU编号)具有一个半胱氨酸氨基酸至一个非半胱氨酸氨基酸的取代,且轻链CL在位置214处(EU编号)具有一个半胱氨酸氨基酸至一个非半胱氨酸氨基酸的取代。示例性的半胱氨酸至非半胱氨酸的突变还描述在例如CN104011221B中。在一些实施方案中,所述半胱氨酸被取代为丝氨酸、丙氨酸或缬氨酸,例如丝氨酸。
- [0141] 在一些实施方案中,所述二硫键重塑突变为在抗原结合区中的CH1中包含C220S/A/V(IgG1亚型,或在IgG2、IgG3或IgG4的对应的位置上包含C131S/A/V),且在CL中包含C214S/A/V(EU编号)。
- [0142] 因此,在本发明的一个实施方案中,本发明涉及一种双特异性抗体,其包含第一抗原结合区和第二抗原结合区,其中,在第一抗原结合区包含CH1和CL,
- [0143] (i)所述第一CH1包含F126C突变,且所述第一CL中包含Q124C突变(EU编号);
- [0144] (ii)所述第一CH1包含H168C突变,且所述第一CL中包含T164C突变(EU编号);
- [0145] (iii)所述第一CH1包含F170C突变,且所述第一CL中包含T164C突变(EU编号);
- [0146] (iv)所述第一CH1包含F170C突变,且所述第一CL中包含S162C突变(EU编号);
- [0147] (v)所述第一CH1包含V173C突变,且所述第一CL中包含S162C突变(EU编号);

- [0148] (vi)所述第一CH1包含V173C突变,且所述第一CL中包含Q160C突变(EU编号);
- [0149] (vii)所述第一CH1包含L128C突变,且所述第一CL中包含F118C突变(EU编号);
- [0150] (viii)所述第一CH1包含S134C突变,且所述第一CL中包含F116C突变(EU编号);
- [0151] (ix)所述第一CH1包含S136C突变,且所述第一CL中包含S114C突变(EU编号);
- [0152] (x)所述第一CH1包含P171C突变,且所述第一CL中包含S162C突变(EU编号);
- 或
- [0153] (xi)所述第一CH1包含T139C突变,且所述第一CL中包含F116C突变(EU编号)
- [0154] 且所述CH1还包含C220S/A/V突变(或对应的C131S/A/V),且所述CL中还包含C214S/A/V突变(EU编号);
- [0155] 优选地,所述CH1还包含C220S(EU编号),且所述CL中还包含C214S(EU编号)。
- [0156] 在一些实施方案中,第一抗原结合区包含CH1和CL,所述CH1包含T139C和C220S突变(或对应的C131S),且所述CL中包含F116C和C214S突变(EU编号)。
- [0157] 在一些实施方案中,第一抗原结合区包含CH1和CL,所述CH1包含F126C和C220S突变(或对应的C131S),且所述CL中包含Q124C和C214S突变(EU编号)。
- [0158] 在一些实施方案中,第一抗原结合区包含CH1和CL,所述CH1包含H168C和C220S突变(或对应的C131S),且所述CL中包含T164C和C214S突变(EU编号)。
- [0159] 在一些实施方案中,第一抗原结合区包含CH1和CL,所述CH1包含F170C和C220S突变(或对应的C131S),且所述CL中包含T164C和C214S突变(EU编号)。
- [0160] 在一些实施方案中,第一抗原结合区包含CH1和CL,所述CH1包含F170C和C220S突变(或对应的C131S),且所述CL中包含S162C和C214S突变(EU编号)。
- [0161] 在一些实施方案中,第一抗原结合区包含CH1和CL,所述CH1包含V173C和C220S突变(或对应的C131S),且所述CL中包含S162C和C214S突变(EU编号)。
- [0162] 在一些实施方案中,第一抗原结合区包含CH1和CL,所述CH1包含V173C和C220S突变(或对应的C131S),且所述CL中包含Q160C和C214S突变(EU编号)。

- [0163] 在一些实施方案中，第一抗原结合区包含CH1和CL，所述CH1包含L128C和C220S突变(或对应的C131S)，且所述CL中包含F118C和C214S突变(EU编号)。
- [0164] 在一些实施方案中，第一抗原结合区包含CH1和CL，所述CH1包含S134C和C220S突变(或对应的C131S)，且所述CL中包含F116C和C214S突变(EU编号)。
- [0165] 在一些实施方案中，第一抗原结合区包含CH1和CL，所述CH1包含S136C和C220S突变(或对应的C131S)，且所述CL中包含S114C和C214S突变(EU编号)。
- [0166] 在一些实施方案中，第一抗原结合区包含CH1和CL，所述CH1包含P171C和C220S突变(或对应的C131S)，且所述CL中包含S162C和C214S突变(EU编号)。
- [0167] 在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:1所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F126C。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:1所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:129所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F126C和C220S。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:129所示的氨基酸序列或由所述序列组成。
- [0168] 在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:132所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含H168C。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:132所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:133所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含H168C和C220S。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:133所示的氨基酸序列或由所述序列组成。
- [0169] 在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:134所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F170C。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:134所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:135所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95

%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F170C和C220S。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:135所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[0170] 在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:136所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含V173C。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:136所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:137所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含V173C和C220S。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:137所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[0171] 在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:138所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含L128C。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:138所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:139所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含L128C和C220S。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:139所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[0172] 在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:140所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S134C。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:140所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:141所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S134C和C220S。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:141所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[0173] 在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:142所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性

的氨基酸序列，且包含S136C。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:142所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:143所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S136C和C220S。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:143所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[0174] 在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:144所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含P171C。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:144所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:145所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含P171C和C220S。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:145所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[0175] 在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:146所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含T139C。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:146所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CH1包含与SEQ ID NO:147所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含T139C和C220S。在一些实施方案中，CH1包含SEQ ID NO:147所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[0176] 在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:2所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含Q124C。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:2所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:128所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、9

7%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含Q124C和C124S。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:128所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

- [0177] 在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:148所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含T164C。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:148所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:149所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含T164C和C124S。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:149所示的氨基酸序列或由所述序列组成。
- [0178] 在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:150所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S162C。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:150所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:151所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S162C和C124S。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:151所示的氨基酸序列或由所述序列组成。
- [0179] 在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:152所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含Q160C。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:152所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:35所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含Q160C和C124S。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:35所示的氨基酸序列或由所述序列组成。
- [0180] 在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:36所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F118C。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:36所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:37所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%

或99%同一性的氨基酸序列，且包含F118C和C124S。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:37所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[0181] 在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:38所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F116C。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:38所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:98所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F116C和C124S。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:98所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[0182] 在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:99所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S114C。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:99所示的氨基酸序列或由所述序列组成。在一些实施方案中，CL包含与SEQ ID NO:100所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S114C和C124S。在一些实施方案中，CL包含SEQ ID NO:100所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[0183] I-2电荷突变

[0184] 电荷突变是可以有效强制同源轻重链配对，避免两个靶标结合区的轻重链之间错配的策略，其中在重链和轻链的接触面上寻找氨基酸对，突变为带相反电荷的氨基酸，利用相反电荷互相吸引的原理促进同源配对。

[0185] 在一个实施方案中，本发明的结合分子例如抗体(例如多特异性抗体，例如双特异性抗体)包含电荷突变。在一些实施方案中，所述电荷突变是在至少一个抗原结合区的重链和轻链的接触面上的氨基酸对的突变，其中所述氨基酸对中的两个氨基酸被突变为相反电荷。在一些实施方案中，所述氨基酸对具有如下一个或多个特征：

[0186] a.所述氨基酸对是位于抗原结合区的重链可变区和轻链可变区交界面上保守的氨基酸对；

[0187] b.所述氨基酸对的 α 碳原子之间距离小于12Å;和/或

- [0188] c.所述氨基酸对的侧链朝向彼此。
- [0189] 在一些实施方案中，所述电荷突变包括在选自以下位置的氨基酸对上将两个氨基酸分别突变为带有相反电荷的氨基酸：重链可变区的位置39和轻链可变区的位置38、重链可变区的位置45和轻链可变区的位置87、重链可变区的位置45和轻链可变区的位置44、重链可变区的位置91和轻链可变区的位置43或重链可变区的位置91和轻链可变区的位置44(kabat编号)。
- [0190] 在一些实施方案中，所述电荷突变包括在选自以下位置的氨基酸对上将两个氨基酸分别突变为带有相反电荷的氨基酸：重链可变区的Q39和轻链可变区的Q38、重链可变区的L45和轻链可变区的Y87、重链可变区的L45和轻链可变区的P44、重链可变区的Y91和轻链可变区的A43或重链可变区的Y91和轻链可变区的P44(kabat编号)。
- [0191] 在一些实施方案中，在结合不同抗原的抗原结合区中的1个或多个氨基酸对的位置上分别包含电荷突变。在一些实施方案中，结合不同抗原的抗原结合区中包含电荷突变的氨基酸位置可以相同或不同。在包含电荷突变的氨基酸位置相同时，在结合不同抗原的抗原结合区中的氨基酸对上的突变后的氨基酸不同。例如，在一些实施方案中，在第一抗原结合区和第二抗原结合区的1个或多个相同的氨基酸对的位置上包含电荷突变，但是在一个抗原结合区中的氨基酸对上的电荷突变与另一个抗原结合区中的氨基酸对上的电荷突变不同，例如在相同位置上，第一抗原结合区中突变的氨基酸所带电荷与第二抗原结合区中突变的氨基酸所带电荷相反。例如，在第一抗原结合区中，在位置X1上的重链氨基酸被突变带正电荷的氨基酸，且在位置X2上的轻链氨基酸被突变为带负电荷的氨基酸，同时在第二抗原结合区中，在位置X1上的重链氨基酸被突变带负电荷的氨基酸，且在位置X2上的轻链氨基酸被突变为带正电荷的氨基酸，其中在第一抗原结合区中的带正电荷的氨基酸与在第二抗原结合区中的带正电荷的氨基酸可以相同或不同，例如相同；且在第一抗原结合区中的带负电荷的氨基酸与在第二抗原结合区中的带负电荷的氨基酸可以相同或不同，例如相同。
- [0192] 在一些实施方案中，所述氨基酸对中的重链可变区的氨基酸由带正电荷的氨基酸取代，并且在轻链可变区的氨基酸由带负电荷的氨基酸取代。在一些实施方

案中，所述氨基酸对中的重链可变区的氨基酸由带负电荷的氨基酸取代，并且在轻链可变区的氨基酸由带正电荷的氨基酸取代。

- [0193] 在一些实施方案中，在第一抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和/或在第二抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸。
- [0194] 在一些实施方案中，在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和/或在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸。
- [0195] 在一些实施方案中，在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和/或在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸。
- [0196] 在一些实施方案中，在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和/或在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸。
- [0197] 在一些实施方案中，在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和/或在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸。

- [0198] 在一些实施方案中，带正电荷的氨基酸选自K、R和H，并且/或者带负电荷的氨基酸选自E或D。在一些实施方案中，带正电荷的氨基酸选自K和R，并且/或者带负电荷的氨基酸选自E或D。在一些实施方案中，带正电荷的氨基酸是K，并且/或者带负电荷的氨基酸是D。
- [0199] 在一些实施方案中，在一个抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为D。在一些实施方案中，在一个抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为K。
- [0200] 在一些实施方案中，在一个抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为D。在一些实施方案中，在一个抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为K。
- [0201] 在一些实施方案中，在一个抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D。在一些实施方案中，在一个抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K。
- [0202] 在一些实施方案中，在一个抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为D。在一些实施方案中，在一个抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为K。
- [0203] 在一些实施方案中，在一个抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D。在一些实施方案中，在一个抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K。
- [0204] 在一些实施方案中，本发明的结合分子，例如抗体，如多特异性抗体，例如双特异性抗体包含第一抗原结合区和第二抗原结合区，其包含选自如下的取代：

- [0205] (i).在第一抗原结合区中,重链可变区位置39处的氨基酸被取代为K,且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为D,同时,在第二抗原结合区中,重链可变区位置39处的氨基酸被取代为D,且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为K;
- [0206] (ii).在第一抗原结合区中,重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K,且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为D,同时,在第二抗原结合区中,重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D,且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为K;
- [0207] (iii).在第一抗原结合区中,重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K,且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D,同时,在第二抗原结合区中,重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D,且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K;
- [0208] (iv).在第一抗原结合区中,重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K,且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为D,同时,在第二抗原结合区中,重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D,且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为K;
- [0209] (v).在第一抗原结合区中,重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K,且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D,同时,在第二抗原结合区中,重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D,且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K。
- [0210] I-3组合突变
- [0211] 在一些实施方案中,本发明的结合分子,例如抗体,例如多特异性抗体,例如双特异性抗体,包含第一靶标结合区(抗原结合区)和第二靶标结合区(抗原结合区),其包含二硫键重塑突变,以及电荷突变。
- [0212] 在一些实施方案中,本发明涉及一种抗体,例如多特异性抗体,例如双特异性抗体,包含第一抗原结合区和第二抗原结合区,其中,第一抗原结合区包含重链可变区、重链恒定区CH1、轻链可变区和轻链恒定区CL,且第二抗原结合区包含重链可变区VH和轻链可变区VL。
- [0213] 在一些实施方案中,第一抗原结合区包含在CH1-CL界面包含二硫键重塑突变,且在VH和VL上包含电荷突变。
- [0214] 在一些实施方案中,第一抗原结合区包含在CH1-CL界面包含二硫键重塑突变,且在VH和VL上包含电荷突变;第二抗原结合区在VH和VL上包含电荷突变。

[0215] 在一些实施方案中，在所述第一抗原结合区中，包含选自如下的突变组合：

	重链 VH 突变	重链 CH1 突变	轻链 VL 突变	轻链 CL 突变
组合 1	Q39K	F126C, C220S	Q38D	Q124C, C214S
	Q39K	H168C, C220S	Q38D	T164C, C214S
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	T164C, C214S
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	S162C, C214S
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	S162C, C214S
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	Q160C, C214S
	Q39K	L128C, C220S	Q38D	F118C, C214S
	Q39K	S134C, C220S	Q38D	F116C, C214S
	Q39K	S136C, C220S	Q38D	S114C, C214S
	Q39K	P171C, C220S	Q38D	S162C, C214S
	Q39K	T139C, C220S	Q38D	F116C, C214S

組合 2	L45K	F126C, C220S	Y87D	Q124C, C214S
	L45K	H168C, C220S	Y87D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	Y87D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	Y87D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	Y87D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	Y87D	Q160C, C214S
	L45K	L128C, C220S	Y87D	F118C, C214S
	L45K	S134C, C220S	Y87D	F116C, C214S
	L45K	S136C, C220S	Y87D	S114C, C214S
	L45K	P171C, C220S	Y87D	S162C, C214S
	L45K	T139C, C220S	Y87D	F116C, C214S
組合 3	L45K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S
	L45K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S
	L45K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S
	L45K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S
	L45K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S
	L45K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S
	L45K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S
組合 4	Y91K	F126C, C220S	A43D	Q124C, C214S
	Y91K	H168C, C220S	A43D	T164C, C214S
	Y91K	F170C, C220S	A43D	T164C, C214S
	Y91K	F170C, C220S	A43D	S162C, C214S
	Y91K	V173C, C220S	A43D	S162C, C214S

	Y91K	V173C, C220S	A43D	Q160C, C214S
	Y91K	L128C, C220S	A43D	F118C, C214S
	Y91K	S134C, C220S	A43D	F116C, C214S
	Y91K	S136C, C220S	A43D	S114C, C214S
	Y91K	P171C, C220S	A43D	S162C, C214S
	Y91K	T139C, C220S	A43D	F116C, C214S
组合 5	Y91K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S
	Y91K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S
	Y91K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S
	Y91K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S
	Y91K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S
	Y91K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S
	Y91K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S
	Y91K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S
	Y91K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S
	Y91K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S
	Y91K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S

[0216] 在一些实施方案中，在所述第二抗原结合区中，包含选自如下的突变组合：

	重链 VH 突变	轻链 VL 突变
组合 1	Q39D	Q38K
组合 2	L45D	Y87K
组合 3	L45D	P44K
组合 4	Y91D	A43K
组合 5	Y91D	P44K

[0217] 在一些实施方案中，本发明涉及一种抗体，例如多特异性抗体，例如双特异性抗体，包含第一抗原结合区和第二抗原结合区，其中，第一抗原结合区包含重链可变区VH、重链恒定区CH1、轻链可变区VL和轻链恒定区CL，且第二抗原结合区包含重链可变区VH和轻链可变区VL，其中所述抗体包含如下的突变组合：

	第一抗原结合区				第二抗原结合区	
	重链 VH 突变	重链 CH1 突变	轻链 VL 突变	轻链 CL 突变	重链 VH 突变	轻链 VL 突变
组合 1	Q39K	F126C, C220S	Q38D	Q124C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	H168C, C220S	Q38D	T164C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	T164C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	Q160C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	L128C, C220S	Q38D	F118C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	S134C, C220S	Q38D	F116C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	S136C, C220S	Q38D	S114C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	P171C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	T139C, C220S	Q38D	F116C, C214S	Q39D	Q38K
组合 2	L45K	F126C, C220S	Y87D	Q124C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	H168C, C220S	Y87D	T164C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	F170C, C220S	Y87D	T164C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	F170C, C220S	Y87D	S162C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	V173C,	Y87D	S162C,	L45D	Y87K

		C220S		C214S		
	L45K	V173C, C220S	Y87D	Q160C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	L128C, C220S	Y87D	F118C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	S134C, C220S	Y87D	F116C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	S136C, C220S	Y87D	S114C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	P171C, C220S	Y87D	S162C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	T139C, C220S	Y87D	F116C, C214S	L45D	Y87K
组 合 3	L45K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S	L45D	P44K
	L45K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S	L45D	P44K
	L45K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S	L45D	P44K
	L45K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S	L45D	P44K
	L45K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S	L45D	P44K
	L45K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S	L45D	P44K
	L45K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S	L45D	P44K
	L45K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S	L45D	P44K
	L45K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S	L45D	P44K
	L45K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S	L45D	P44K
	L45K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S	L45D	P44K

组合 4	Y91K	F126C, C220S	A43D	Q124C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	H168C, C220S	A43D	T164C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	F170C, C220S	A43D	T164C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	F170C, C220S	A43D	S162C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	V173C, C220S	A43D	S162C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	V173C, C220S	A43D	Q160C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	L128C, C220S	A43D	F118C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	S134C, C220S	A43D	F116C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	S136C, C220S	A43D	S114C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	P171C, C220S	A43D	S162C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	T139C, C220S	A43D	F116C, C214S	Y91D	A43K
组合 5	Y91K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S	Y91D	P44K

	Y91K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S	Y91D	P44K

- [0218] 在一些实施方案中，在所述抗体例如多特异性抗体(例如双特异性抗体)中，一个或多个或全部结合相同抗原的抗原结合区包含相同的突变。
- [0219] 在一些实施方案中，在所述抗体例如多特异性抗体(例如双特异性抗体)中，一个或多个或全部结合相同抗原的抗原结合区包含不同的突变。
- [0220] I-4轻链恒定区替换
- [0221] 在一些实施方案中，本发明的结合分子，例如抗体，如多特异性抗体包含第一靶标结合区(抗原结合区)和第二靶标结合区(抗原结合区)，其中一个或多个或全部第一靶标结合区(抗原结合区)所包含的轻链恒定区为Kappa轻链恒定区，且一个或多个或全部第二靶标结合区(抗原结合区)所包含的轻链恒定区为Lambda轻链恒定区，或者其中一个或多个或全部第一靶标结合区(抗原结合区)所包含的轻链恒定区为Lambda轻链恒定区，且一个或多个或全部第二靶标结合区(抗原结合区)所包含的轻链恒定区为Kappa轻链恒定区。
- [0222] I-5 Fc区突变
- [0223] 在一些实施方案中，本发明的结合分子，例如抗体，如多特异性抗体(例如双特异性抗体)的一个或多个靶标结合区(抗原结合区)还包含Fc区，其中所包含的Fc区可以相同或不同。
- [0224] 在一些实施方案中，第一Fc区和第二Fc区不同，其能够二聚化形成异二聚体Fc支架。
- [0225] 在本文中，Fc区是指含有至少一部分的恒定区的免疫球蛋白重链的C-端区域，并且可以包括天然序列Fc区和变体Fc区。天然序列Fc区涵盖天然存在的各种免疫球蛋白Fc序列，例如各种Ig亚型以及其同种异型的Fc区(Gestur Vidarsson

等,IgG subclasses and allotypes:from structure to effector functions, 20 October 2014,doi:10.3389/fimmu.2014.00520)。在一些实施方案中,本发明的Fc区包含抗体CH2和CH3。在一些实施方案中,抗体Fc区还可以在N端带有IgG铰链区或部分IgG铰链区,例如,IgG1铰链区或部分IgG1铰链区,例如根据EU编号,D221到P230的序列。在所述铰链区中可以含有突变。

- [0226] 除非本文中另外指出,Fc区中的氨基酸残基的编号根据EU编号系统,也称为EU索引,如Kabat, E.A.等, Sequences of Proteins of Immunological Interest, 第5版, Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD(1991), NIH Publication 91-3242中所述。
- [0227] 在一些实施方案中,Fc区为人的IgG Fc,例如,人IgG1Fc,人IgG2Fc,人IgG3Fc或人IgG4Fc。在一个实施方案中,Fc区包含氨基酸序列SEQ ID NO:122或123或与其具有至少90%同一性,例如95%,96%,97%,99%或更高的同一性的氨基酸序列或由其组成。
- [0228] 如本领域技术人员理解的,为了促进本发明的多特异性抗体作为异二聚体的形成,本发明多特异性抗体所包含的Fc区可以包含利于第一Fc区与第二Fc区异二聚化的突变。在一个实施方案中,在两个Fc区的CH3区中引入突变。
- [0229] 本领域已知促进Fc区异二聚化的方法。例如,第一Fc区的CH3区和第二Fc区的CH3区以互补方式进行工程化改造使得每个CH3区(或包含它的重链)不再能与其自身同二聚化但被迫与互补工程化改造的其它CH3区异二聚化(使得第一和第二Fc区的CH3区异二聚化且两个第一CH3区或两个第二CH3区之间不形成同二聚体)。
- [0230] 优选地,基于Knob-in-Hole技术,在第一Fc区和第二Fc区中引入相应的Knob突变和Hole突变。此技术参见例如US 5,731,168; US 7,695,936; Ridgway等,Prot Eng9,617-621(1996)和Carter,J Immunol Meth 248,7-15(2001)。
- [0231] 在一个特定的实施方案中,在一个Fc区的CH3区中,第366位的苏氨酸残基用色氨酸残基替换(T366W)(knob突变);而在另一个Fc区的CH3区中,第407位的酪氨酸残基用缬氨酸残基替换(Y407V)(hole突变),任选地366位的苏氨酸残基用丝氨酸

残基替换(T366S)且第407位的酪氨酸残基用缬氨酸残基替换(Y407V)(编号方式依照EU索引)。

- [0232] 在又一个实施方案中,在一个Fc区的CH3区中,第366位的苏氨酸残基用色氨酸残基替换(T366W)且第354位的丝氨酸残基用半胱氨酸残基替换(S354C)或第356位的谷氨酸残基用半胱氨酸残基替换(E356C)(特别是,第354位的丝氨酸残基用半胱氨酸残基替换);而在另一个Fc区的CH3区中,第407位的酪氨酸残基用缬氨酸残基替换(Y407V)(hole突变),任选地366位的苏氨酸残基用丝氨酸残基替换(T366S)且第368位的亮氨酸残基用丙氨酸残基替换(L368A)(编号方式依照EU索引),任选地第349位的酪氨酸残基用半胱氨酸残基替换(Y349C)(编号方式依照EU索引)。
- [0233] 在一个具体的实施方案中,一个Fc区包含氨基酸替代T366W,且另一个Fc区包含氨基酸替代T366S,L368A和Y407V(编号方式依照EU索引)。
- [0234] 在一个具体的实施方案中,一个Fc区包含氨基酸替代S354C和T366W,且另一个Fc区包含氨基酸替代Y349C,T366S,L368A和Y407V(编号方式依照EU索引)。
- [0235] 还可以基于Innobody技术,在第一Fc区和第二Fc区中引入相应的突变。此技术参见例如PCT/CN2021/143141。
- [0236] 在一个特定的实施方案中,
- [0237] 所述第一CH3区包含S364R/K突变(优选地S364R),以及任选的一个或多个其他突变。在一些实施方案中,所述第二CH3区包含K370S/T/A/V突变(优选地K370S),以及任选的一个或多个其他突变。在一些实施方案中,所述第一CH3区包含S364R/K突变,且所述第二CH3区包含K370S/T/A/V突变。在一些实施方案中,所述第一CH3区包含S364R突变,且所述第二CH3区包含K370S突变。
- [0238] 在一些实施方案中,所述第一CH3区包含S364R/K(优选地S364R)和D399K/R(优选地D399K)突变。在一些实施方案中,所述第二CH3区包含K370S/T/A/V(优选地K370S)突变和K409D/E(优选地K409D)突变。在一些实施方案中,所述第一CH3区包含 S364R/K+D399K/R,且所述第二CH3区包含K370S/T/A/V+Y349T/S/A/V。在一些实施方案中,所述第一CH3区包含S364R+D399K,且所述第二CH3区包含K370S+Y349T。在一些实施方案中,所述第一CH3区还包含E375N/Q(优选地E375N)和/或T350V/A(优选地T350V)。在一些实施方案中,

所述第二CH3区还包含K409D/E(优选地K409D)、Q347D/E(优选地Q347D)和/或T350V/A(优选地T350V)。

- [0239] 在一些实施方案中，所述第一CH3区包含S364R+D399K，且所述第二CH3区包含K370S+Y349T+K409D。在一些实施方案中，所述第一CH3区还包含E357N。在一些实施方案中，所述第二CH3区还包含Q347D。在一些实施方案中，所述第一CH3区还包含E357N，且所述第二CH3区还包含Q347D。在一些实施方案中，所述第一CH3区和所述第二CH3区还分别包含T350V，或都包含T350V。
- [0240] 因此，在一些实施方案中，所述第一CH3区包含S364R+D399K，且所述第二CH3区包含K370S+Y349T+K409D+Q347D。在一些实施方案中，所述第一CH3区包含S364R+D399K+E357N，且所述第二CH3区包含K370S+Y349T+K409D+Q347D。在一些实施方案中，所述第一CH3区包含S364R+D399K+E357N+T350V，且所述第二CH3区包含K370S+Y349T+K409D+Q347D+T350V。
- [0241] 在一些实施方案中，所述第一CH3区包含K409E/D(优选地K409E)。在一些实施方案中，所述第二CH3区包含D399K/R(优选地D399K)或K370T/S/A/V(优选地K370T)。在一些实施方案中，所述第一CH3区包含K409E/D(优选地K409E)，且所述第二CH3区包含D399K/R(优选地D399K)。在一些实施方案中，所述第一CH3区还包含T411R/K(优选地T411R)。在一些实施方案中，所述第二CH3区还包含K370T/S/A/V(优选地K370T)。在一些实施方案中，所述CH3区包含K409E/D+T411R/K，且所述第二CH3区包含D399K/R+K370T/S/A/V。在一些实施方案中，所述CH3区包含K409E+T411R，且所述第二CH3区包含D399K+K370T。
- [0242] 在一些具体的实施方案中，所述第一和第二CH3区具有以下突变组合：

第一 CH3 区	第二 CH3 区
S364R, D399K, E357N, T350V	K370S, Y349T, Q347D, K409D, T350V
K409E, T411R	D399K, K370T
S364R, D399K, E357N	K370S, Y349T, Q347D, K409D
S364R, D399K	K370S, Y349T, Q347D, K409D
S364R, D399K	K370S, Y349T, K409D

- [0243] 在一个实施方案中，一个Fc区的CH3包含S364R和D399K突变，且另一个Fc区的CH3突变包含Y349T、K370S和K409D突变。

- [0244] 因此，在一个具体的实施方案中，本发明的结合分子例如抗体如多特异性抗体包含的两个Fc区异二聚化，其中
- [0245] a) 一个Fc区多肽包含突变T366W，而另一个Fc区多肽包含T366S、L368A和Y407V，或
- [0246] b) 一个Fc-区多肽包含突变S354C和T366W，而另一个Fc-区多肽包含突变Y349C、T366S、L368A和Y407V，或
- [0247] c) 一个Fc-区多肽包含突变S364R和D399K，而另一个Fc-区多肽包含突变Y349T、K370S和K409D。
- [0248] 因此，在一个具体的实施方案中，本发明的结合分子例如抗体如多特异性抗体包含的两个Fc区异二聚化，其中
- [0249] a) 一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:20或131所示的氨基酸序列或由其组成，而另一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:101或130所示的氨基酸序列或由其组成
- [0250] b) 一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:125所示的氨基酸序列或由其组成，而另一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:124所示的氨基酸序列或由其组成；或
- [0251] c) 一个Fc区包含SEQ ID NO:126所示的氨基酸序列或由其组成，而另一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:127所示的氨基酸序列或由其组成。
- [0252] 因此，在一个具体的实施方案中，本发明的结合分子例如抗体如多特异性抗体包含的两个Fc区异二聚化，其中
- [0253] a) 一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:20或131所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:101或130所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列；或
- [0254] b) 一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:125所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:124所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列；或
- [0255] c) 一个Fc区包含与SEQ ID NO:126所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，而另一

个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:127所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列。

[0256] 因此，在一个具体的实施方案中，本发明的结合分子例如抗体如多特异性抗体包含的两个Fc区异二聚化，其中

[0257] a)一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:20或131所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变T366W，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:101或130所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列包含突变T366S,L368A和Y407V；或

[0258] b)一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:125所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变S354C和T366W，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:124所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列包含突变Y349C,T366S,L368A和Y407V；或

[0259] c)一个Fc区包含与SEQ ID NO:126所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变S364R和D399K，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:127所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变Y349T、K370S和K409D。

[0260] 在一些实施方案中,Fc区还包含其他利于异二聚体纯化的突变。

[0261] 还可以将本发明的结合分子例如抗体中的Fc区进行突变以获得所需的特性。本领域已知对Fc区的突变。

[0262] 在一个实施方案中，在Fc区的效应子功能(例如Fc区的补体激活功能)的特性上修饰Fc区。在一个实施方案中，所述效应子功能相对于野生同种型Fc区已经被降低或消除。在一个实施方案中，通过选自以下的方法来降低或消除效应子功能：使用天然具有降低或消除的效应子功能的Fc同种型、和Fc区修饰。

- [0263] 在一个优选的实施方案中，Fc区具有减少的由Fc区介导的效应子功能，例如减少的或消除的ADCC或ADCP或CDC效应子功能，例如包含实现上述功能的突变。
- [0264] 如本领域技术人员理解的，根据本发明结合分子例如抗体分子的预期用途，本发明结合分子例如抗体分子也可以在Fc结构域中包含改变对一种或多种Fc受体的结合亲和力的修饰。在一个实施方案中，所述Fc受体是Fc γ 受体，特别是人Fc γ 受体。在一些实施方案中，所述Fc区包含降低与Fc γ 受体结合的突变。例如，在一些实施方案中，用于本发明的Fc区具有降低与Fc γ 受体结合的L234A/L235A突变。在再一优选的实施方案中，Fc片段可以具有导致增加的血清半衰期的突变，例如改善Fc片段与FcRn结合的突变。
- [0265] I-6.双特异性抗体或多特异性抗体
- [0266] 在一些实施方案中，本发明的抗体是双特异性抗体。
- [0267] 术语“双特异性抗体”是指包含第一抗原结合区和第二抗原结合区的抗体，其中所述第一抗原结合区结合一种抗原或表位且所述第二抗原结合区结合另一抗原或另一表位。因此，根据本发明的双特异性抗体包含对于两种不同的抗原，或对一种抗原的两个不同的表位的特异性。双特异性抗体形式包含IgG样抗体(Fan等人(2015)Journal of Hematology&Oncology.8:130)。最常见的IgG样抗体类型包含两个Fab区域和两个Fc区域,每个Fab的重链和轻链可以来自单独的单克隆抗体。
- [0268] 可以使用本领域已知的双特异性抗体形式或技术来制备本发明的双特异性抗体。可以在本发明的背景下使用的具体示例性双特异性形式参见例如，Labrijn, et al. Bispecific antibodies: a mechanistic review of the pipeline. Nature Reviews Drug Discovery, 2019, 18(8):1-24。在一些实施方案中，本发明的双特异性抗体具有以下模式：2+1N端构型的双特异性抗体(图5A)，2+1C端构型的双特异性抗体(图5B)，2+2C端构型的双特异性抗体(图5C)。在一些实施方案中，本发明的双特异性抗体还包含2+2N构型或串联Fab构型。
- [0269] 在一些实施方案中，本发明的双特异性抗体包含特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中第一抗原结合区包含

第一Fab，第二抗原结合区包含第二Fab，其中第一Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，第二Fab在其CH1的C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)。在一个具体的实施方案，所述双特异性抗体是IgG样抗体，其具有如图1所示的构型。在一个具体的实施方案中，第一Fab包含电荷突变和二硫键重塑突变，第二Fab包含电荷突变，以及任选地，第一Fc区和第二Fc区包含Innobody突变或Knob-into-hole突变。优选地，第一Fab上包含的电荷突变与第二Fab上包含的电荷突变位置相同，但是相同位置上突变氨基酸所带电荷相反。在一个实施方案中，所述双特异性抗体包含：

- [0270] 重链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区，其中重链恒定区CH1在其C末端与第一Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接；
- [0271] 轻链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区；
- [0272] 重链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区，其中重链恒定区CH1在其C末端与第二Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接；
- [0273] 轻链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区。
- [0274] 在一些实施方案中，本发明的双特异性抗体包含1个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和2个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中第一抗原结合区包含第一Fab，第二抗原结合区包含第二Fab，其中一个第二Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，一个第一Fab在其CH1的C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，且另一个第二Fab在其CH1的C末端与第一Fab的重链可变区的N末端连接(通过或不通过接头)。在一个具体的实施方案，所述双特异性抗体是2+1N端构型，其具有如图5A所示的构型。在一个具体的实施方案中，1个或2个第二Fab包含本发明所述的电荷突变，且第一Fab包含本发明所述的电荷突变和二硫键重塑突变，以及任选地，第一Fc区和第二Fc区基于Innobody或Knob-into-hole引入突变。优选地，2个第二Fab包含相同的电荷突变。优选地，第二Fab上包含的电荷突变与第一Fab

上包含的电荷突变位置相同，但是相同位置上突变氨基酸所带电荷相反。在一个实施方案中，所述双特异性抗体包含：

- [0275] 重链1：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区，其中第一Fab重链恒定区CH1在其C末端与第二Fc区N末端经由或不經由接头(例如铰链区)连接，且第二Fab在其CH1的C末端与第一Fab的重链可变区的N末端连接(通过或不通过接头)；
- [0276] 轻链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区；
- [0277] 重链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区，其中重链恒定区CH1在其C末端与第一Fc区N末端经由或不經由接头(例如铰链区)连接；
- [0278] 轻链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区，
- [0279] 其中所述双特异性抗体包含2条轻链2。
- [0280] 在一些实施方案中，本发明的双特异性抗体包含1个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和2个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中第一抗原结合区包含第一Fab，第二抗原结合区包含第二Fab，其中2个第二Fab在其CH1的C末端分别与第一Fc区N末端和第二Fc区N末端连接(经由或不經由接头，例如铰链区)，且第一Fab在重链可变区的N末端与第二Fc区的C末端连接(通过或不通过接头)。在一个具体的实施方案，所述双特异性抗体是2+1C端构型，其具有如图5B所示的构型。在一个具体的实施方案中，1个或2个第二Fab包含本发明所述的电荷突变，且第一Fab包含本发明所述电荷突变和二硫键重塑突变，以及任选地，第一Fc区和第二Fc区包含Innobody突变或Knob-into-hole突变。优选地，2个第二Fab包含相同的电荷突变。优选地，第一Fab上包含的电荷突变与第二Fab上包含的电荷突变位置相同，但是相同位置上突变氨基酸所带电荷相反。在一个实施方案中，所述双特异性抗体包含
- [0281] 重链1：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区-第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1，其中第二Fab在其CH1的

C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头,例如铰链区),且第一Fab在重链可变区的N末端与第二Fc区的C末端连接(通过或不通过接头);

[0282] 轻链1:从N端至C端包含或由下述组成:第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区;

[0283] 重链2:从N端至C端包含或由下述组成:第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区,其中重链恒定区CH1在其C末端与第一Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接;

[0284] 轻链2:从N端至C端包含或由下述组成:第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区,

[0285] 其中所述双特异性抗体包含2条轻链2。

[0286] 在一些实施方案中,本发明的双特异性抗体包含2个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和2个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区,其中第一抗原结合区包含第一Fab,第二抗原结合区包含第二Fab,其中2个第二Fab在其CH1的C末端分别与两个Fc区N末端连接(经由或不经由接头,例如铰链区)(所述Fc区可以相同或不同),且2个第一Fab在重链可变区的N末端分别与两个Fc区的C末端连接(通过或不通过接头)。在一个具体的实施方案,所述双特异性抗体是2+2C端构型,其具有如图5C所示的构型。在一个具体的实施方案中,1个或2个第二Fab包含本发明所述的电荷突变,且1个或2个第一Fab包含本发明所述电荷突变和二硫键重塑突变。在一个具体的实施方案中,2个第二Fab包含相同的本发明所述的电荷突变,和/或2个第一Fab包含相同的本发明所述的电荷突变和二硫键重塑突变。优选地,第一Fab上包含的电荷突变与第二Fab上包含的电荷突变位置相同,但是相同位置上突变氨基酸所带电荷相反。在一个实施方案中,所述双特异性抗体包含

[0287] 重链:从N端至C端包含或由下述组成:第二Fab重链可变区-重链恒定区

CH1-Fc区-第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1,其中第二Fab在其CH1的C末端与Fc区N末端连接(经由或不经由接头,例如铰链区),且第一Fab在重链可变区的N末端与Fc区的C末端连接(通过或不通过接头);

[0288] 轻链1:从N端至C端包含或由下述组成:第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区;

[0289] 轻链2:从N端至C端包含或由下述组成:第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区,

[0290] 其中所述双特异性抗体包含2条重链。

- [0291] 在一些实施方案中，本发明的抗体是多特异性抗体。在一些实施方案中，本发明的多特异性抗体是三特异性抗体。
- [0292] 在一些实施方案中，本发明的三特异性抗体包含特异性结合第一抗原的第一抗原结合区、特异性结合第二抗原的第二抗原结合区和特异性结合第三抗原的第三抗原结合区，其中第一抗原结合区包含第一Fab，第二抗原结合区包含第二Fab，其中第一Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，第二Fab在其CH1的C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，第三抗原结合区包含scFv(例如VH-VL，或VL-VH)，其经由或不经由接头在其VH或VL的N末端或C末端(例如scFv是VL-VH，例如VL的N末端)与第二Fc区的C末端连接。在一个具体的实施方案中，三特异性抗体的构型为2+1C端构型的(图7A或B)。在一个具体的实施方案中，第一Fab包含电荷突变和二硫键重塑突变，第二Fab包含电荷突变，以及任选地，第一Fc区和第二Fc区包含Innobody突变或Knob-into-hole突变。优选地，第一Fab上包含的电荷突变与第二Fab上包含的电荷突变位置相同，但是相同位置上突变氨基酸所带电荷相反。在一个实施方案中，所述多特异性抗体包含
- [0293] 重链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区，其中第一Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)；
- [0294] 轻链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区；
- [0295] 重链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区-scFv，其中重链恒定区CH1在其C末端与第二Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接，且scFv经由或不经由接头在其VH或VL的N末端或C末端(例如scFv是VL-VH，例如VL的N末端)与第二Fc区的C末端连接；
- [0296] 轻链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区。
- [0297] I-7.抗原和抗原结合区
- [0298] 本发明的结合分子，如抗体，例如多特异性抗体，例如双特异性抗体，可以结合任何靶标，如适用于抗体的抗原，或配体或受体。

- [0299] 在一些实施方案中，抗原是肿瘤相关抗原(TA)。在一些实施方案中，肿瘤相关抗原是免疫检查点分子。
- [0300] 在一些实施方案中，所述靶标或抗原选自FAP、CEA、p95HER2、BCMA、EpCAM、MSLN、MCSP、HER-1、HER-2、HER-3、CD19、CD20、CD22、CD33、CD38、CD52Flt3、EpCAM、IGF-1R、FOLR1、Trop-2、CA-12-5、HLA-DR、MUC-1(粘蛋白)、GD2、A33-抗原、PSMA、PSCA、转铁蛋白-受体、TNC(肌腱蛋白)、CA-IX、CD3、B7H3、EGFR、Hel、cMET、Axl、GPRC5D、PD-1、PD-L1、CD47、免疫激活分子如4-1BB、CD40、OX40等。
- [0301] 在一些实施方案中，所述靶标或抗原例如选自以下的一个或多个靶标/抗原：CD3、BCMA、CD20、Her2、Her3、B7H3、EGFR、Hel、cMET、Axl、GPRC5D、免疫检查点分子例如PD-1、PD-L1、CD47、4-1BB、CD40、OX40，或同一抗原的不同表位。
- [0302] 在一些实施方案中，本发明的双特异性抗体结合一个抗原的两个不同的表位或结合两个抗原。
- [0303] 在一些具体的实施方案中，本发明的双特异性抗体结合选自如下的两个抗原：
- [0304] CD3/BCMA，CD3/CD20，CD3/Her2，Her2/Her3，B7H3/EGFR，PD-L1/CD47，PD-L1/CD40，PD-L1/4-1BB，EGFR/Her3，Her2/Hel，Her2/PD-1，Her2/PD-L1，Her2/CD47，Her2/cMet，CD3/GPRC5D。
- [0305] 在一些具体的实施方案中，本发明的三特异性抗体结合BCMA、GPRC5D和CD3。
- [0306] 本发明的结合分子例如抗体的靶标结合区或抗原结合区可以是来源于结合上述抗原的抗体。
- [0307] ➤特异性结合Her2的抗原结合区
- [0308] 在一些实施方案中，抗原结合区来源于特异性结合Her2的抗体，例如曲妥珠单抗。
- [0309] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合Her2的抗体如曲妥珠单抗的1、2、3、4、5、或6个CDR。

- [0310] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合Her2的抗体如曲妥珠单抗的1、2和3个重链可变区CDR，即HCDR1、HCDR2和HCDR3。
- [0311] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合Her2的抗体如曲妥珠单抗的1、2和3个轻链可变区CDR，即LCDR1、LCDR2和LCDR3。
- [0312] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合Her2的抗体如曲妥珠单抗的3个重链可变区CDR和3个轻链可变区CDR。
- [0313] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合Her2的抗体如曲妥珠单抗的重链可变区和轻链可变区，以及本发明所述的突变。
- [0314] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合Her2的抗体如曲妥珠单抗的Fab，以及本发明所述的突变。
- [0315] ➤特异性结合PD-1的抗原结合区
- [0316] 在一些实施方案中，抗原结合区来源于特异性结合PD-1的抗体，例如WO 2017025016中公开的PD-1抗体，例如Sintilimab单抗。
- [0317] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合PD-1的抗体例如WO 2017025016中公开的PD-1抗体，如Sintilimab单抗的1、2、3、4、5、或6个CDR。
- [0318] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合PD-1的抗体例如WO 2017025016中公开的PD-1抗体，如Sintilimab单抗的1、2和3个重链可变区CDR，即HCDR1、HCDR2和HCDR3。
- [0319] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合PD-1的抗体例如WO 2017025016中公开的PD-1抗体，如Sintilimab单抗的1、2和3个轻链可变区CDR，即LCDR1、LCDR2和LCDR3。
- [0320] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合PD-1的抗体例如WO 2017025016中公开的PD-1抗体，如Sintilimab单抗的3个重链可变区CDR和3个轻链可变区CDR。
- [0321] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合PD-1的抗体例如WO 2017025016中公开的PD-1抗体，如Sintilimab单抗的重链可变区和轻链可变区，以及本发明所述的突变。

- [0322] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合PD-1的抗体例如WO2017025016中公开的PD-1抗体，如Sintilimab单抗的Fab，以及本发明所述的突变。
- [0323] ➤特异性结合CD47的抗原结合区
- [0324] 在一些实施方案中，抗原结合区来源于特异性结合CD47的抗体，例如WO2019042285A1中公开的特异性结合CD47的抗体，例如其中公开的ADI26630。
- [0325] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合CD47的抗体，例如WO2019042285A1中公开的CD47抗体，例如其中公开的ADI26630的1、2、3、4、5、或6个CDR。
- [0326] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合CD47的抗体，例如WO2019042285A1中公开的CD47抗体，例如其中公开的ADI26630的1、2和3个重链可变区CDR，即HCDR1、HCDR2和HCDR3。
- [0327] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合CD47的抗体，例如WO2019042285A1中公开的CD47抗体，例如其中公开的ADI26630的1、2和3个轻链可变区CDR，即LCDR1、LCDR2和LCDR3。
- [0328] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合CD47的抗体，例如WO2019042285A1中公开的CD47抗体，例如其中公开的ADI26630的3个重链可变区CDR和3个轻链可变区CDR。
- [0329] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合CD47的抗体，例如WO2019042285A1中公开的CD47抗体，例如其中公开的ADI26630的重链可变区和轻链可变区，以及本发明所述的突变。
- [0330] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合CD47的抗体，例如WO2019042285A1中公开的特异性结合CD47的抗体，例如其中公开的ADI26630的Fab，以及本发明所述的突变。
- [0331] ➤特异性结合cMet的抗原结合区
- [0332] 在一些实施方案中，抗原结合区来源于特异性结合cMet的抗体，例如Onartuzumab.

- [0333] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合cMet的抗体，例如Onartuzumab的1、2、3、4、5、或6个CDR。
- [0334] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合cMet的抗体，例如Onartuzumab的1、2和3个重链可变区CDR，即HCDR1、HCDR2和HCDR3。
- [0335] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合cMet的抗体，例如Onartuzumab的1、2和3个轻链可变区CDR，即LCDR1、LCDR2和LCDR3。
- [0336] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合cMet的抗体，例如Onartuzumab的3个重链可变区CDR和3个轻链可变区CDR。
- [0337] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合cMet的抗体，例如Onartuzumab的重链可变区和轻链可变区，以及本发明所述的突变。
- [0338] 在一些抗原结合区包含已知的特异性结合cMet的抗体，例如Onartuzumab的Fab，以及本发明所述的突变。
- [0339] ➤特异性结合GPCR5D的抗原结合区
- [0340] 在一些实施方案中，抗原结合区来源于特异性结合GPCR5D的抗体，例如PCT/CN2022/076832中公开的特异性结合GPCR5D的抗体。
- [0341] 在一些实施方案中，特异性结合GPCR5D抗体包含3个来自重链可变区的互补决定区(HCDR)，HCDR1、HCDR2和HCDR3，其中所述HCDR1、HCDR2和HCDR3为如SEQ ID NO:87所示重链可变区的HCDR1、HCDR2和HCDR3。
- [0342] 在一些实施方案中，特异性结合GPCR5D抗体包含3个来自轻链可变区的互补决定区(LCDR)，LCDR1、LCDR2和LCDR3，其中所述的LCDR1、LCDR2和LCDR3为如SEQ ID NO:83所示轻链可变区的LCDR1、LCDR2和LCDR3。
- [0343] 在一些实施方案中，特异性结合GPCR5D的抗体的HCDR1包含SEQ ID NO:88的氨基酸序列或由其组成；HCDR2包含SEQ ID NO:89的氨基酸序列或由其组成，HCDR3包含SEQ ID NO:90的氨基酸序列或由其组成，LCDR1包含SEQ ID NO:84的氨基酸序列或由其组成，LCDR2包含SEQ ID NO:85的氨基酸序列或由其组成，和/或LCDR3包含SEQ ID NO:86的氨基酸序列或由其组成。
- [0344] 在一些实施方案中，特异性结合GPCR5D的抗体包含3个来自重链可变区的互补决定区(HCDR)，HCDR1、HCDR2和HCDR3和3个来自轻链可变区的互补

决定区(LCDR), LCDR1、LCDR2和LCDR3, 其中HCDR1包含SEQ ID NO:88的氨基酸序列或由其组成; HCDR2包含SEQ ID NO:89的氨基酸序列或由其组成, HCDR3包含SEQ ID NO:90的氨基酸序列或由其组成, LCDR1包含SEQ ID NO:84的氨基酸序列或由其组成, LCDR2包含SEQ ID NO:85的氨基酸序列或由其组成, 和LCDR3包含SEQ ID NO:86的氨基酸序列或由其组成。

- [0345] 在一些方面中, 特异性结合GPC5D的抗体包含重链可变区(VH), 其中所述VH
- [0346] (i)包含与SEQ ID NO:87的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列或由所述氨基酸序列组成; 或者
- [0347] (ii)包含SEQ ID NO:87的氨基酸序列或由所述氨基酸序列组成; 或者
- [0348] (iii)包含与SEQ ID NO:87的氨基酸序列相比具有1个或多个(优选不超过10个, 更优选不超过5、4、3、2、1个)的氨基酸改变(优选氨基酸置换, 更优选氨基酸保守置换)的氨基酸序列或由所述氨基酸序列组成, 优选地, 所述氨基酸改变不发生在CDR区中。
- [0349] 在一些方面中, 特异性结合GPC5D的抗体包含轻链可变区(VL), 其中所述VL
- [0350] (i)包含与SEQ ID NO:83的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列或由所述氨基酸序列组成; 或者
- [0351] (ii)包含SEQ ID NO:83的氨基酸序列或由所述氨基酸序列组成; 或者
- [0352] (iii)包含与SEQ ID NO:83的氨基酸序列相比具有1个或多个(优选不超过10个, 更优选不超过5、4、3、2、1个)的氨基酸改变(优选氨基酸置换, 更优选氨基酸保守置换)的氨基酸序列由所述氨基酸序列组成, 优选地, 所述氨基酸改变不发生在CDR区中。
- [0353] 在一些实施方案中, 特异性结合GPC5D的抗体包含VH和VL, 其中VH包含SEQ ID NO:87所示的序列或由所述序列组成; 和/或VL包含SEQ ID NO:83所示的序列或由所述序列组成。

- [0354] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的或上述特异性结合GPRC5D的抗体的1、2、3、4、5、或6个CDR。
- [0355] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的或上述特异性结合GPRC5D的抗体的1、2和3个重链可变区CDR，即HCDR1、HCDR2和HCDR3。
- [0356] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的或上述特异性结合GPRC5D的抗体的1、2和3个轻链可变区CDR，即LCDR1、LCDR2和LCDR3。
- [0357] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的或上述特异性结合GPRC5D的抗体的3个重链可变区CDR和3个轻链可变区CDR。
- [0358] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的或上述特异性结合GPRC5D的抗体的重链可变区和轻链可变区，以及本发明所述的突变。
- [0359] 在一些抗原结合区包含已知的或上述特异性结合GPRC5D的抗体的Fab，以及本发明所述的突变。
- [0360] ➤特异性结合CD3的抗原结合区
- [0361] 在一些实施方案中，抗原结合区来源于特异性结合CD3的抗体，例如WO2022068809中公开的CD3抗体，例如其中的sp34.24或sp34.87。
- [0362] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合CD3的抗体，例如WO2022068809中公开的CD3抗体，例如其中的sp34.24或sp34.87的1、2、3、4、5、或6个CDR。
- [0363] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合CD3的抗体，例如WO2022068809中公开的CD3抗体，例如其中的sp34.24或sp34.87的1、2和3个重链可变区CDR，即HCDR1、HCDR2和HCDR3。
- [0364] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合CD3的抗体，例如WO2022068809中公开的CD3抗体，例如其中的sp34.24或sp34.87的1、2和3个轻链可变区CDR，即LCDR1、LCDR2和LCDR3。
- [0365] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合CD3的抗体，例如WO2022068809中公开的CD3抗体，例如其中的sp34.24或sp34.87的3个重链可变区CDR和3个轻链可变区CDR。

- [0366] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的特异性结合CD3的抗体，例如WO2022068809中公开的CD3抗体，例如其中的sp34.24或sp34.87的重链可变区和轻链可变区，以及本发明所述的突变。
- [0367] 在一些抗原结合区包含已知的特异性结合CD3的抗体，例如WO2022068809中公开的CD3抗体，例如其中的sp34.24或sp34.87的Fab，以及本发明所述的突变。
- [0368] ➤特异性结合BCMA的抗原结合区
- [0369] 在一些实施方案中，抗原结合区来源于特异性结合BCMA的抗体，例如PCT/CN2022/076832中公开的特异性结合BCMA的抗体。
- [0370] 在一些实施方案中，特异性结合BCMA抗体包含3个来自重链可变区的互补决定区(HCDR)，HCDR1、HCDR2和HCDR3，其中所述HCDR1、HCDR2和HCDR3为如SEQ ID NO:103所示重链可变区的HCDR1、HCDR2和HCDR3。
- [0371] 在一些实施方案中，特异性结合BCMA抗体包含3个来自轻链可变区的互补决定区(LCDR)，LCDR1、LCDR2和LCDR3，其中所述的LCDR1、LCDR2和LCDR3为具有如SEQ ID NO:107所示轻链可变区的LCDR1、LCDR2和LCDR3。
- [0372] 在一些实施方案中，特异性结合BCMA抗体的HCDR1包含SEQ ID NO:104的氨基酸序列或由其组成；HCDR2包含SEQ ID NO:105的氨基酸序列或由其组成，HCDR3包含SEQ ID NO:106的氨基酸序列或由其组成，LCDR1包含SEQ ID NO:108的氨基酸序列或由其组成，LCDR2包含SEQ ID NO:109的氨基酸序列或由其组成，和/或LCDR3包含SEQ ID NO:110的氨基酸序列或由其组成。
- [0373] 在一些实施方案中，特异性结合BCMA抗体包含3个来自重链可变区的互补决定区(HCDR)，HCDR1、HCDR2和HCDR3和3个来自轻链可变区的互补决定区(LCDR)，LCDR1、LCDR2和LCDR3，其中HCDR1包含SEQ ID NO:104的氨基酸序列或由其组成；HCDR2包含SEQ ID NO:105的氨基酸序列或由其组成，HCDR3包含SEQ ID NO:106的氨基酸序列或由其组成，LCDR1包含SEQ ID NO:108的氨基酸序列或由其组成，LCDR2包含SEQ ID NO:109的氨基酸序列或由其组成，和LCDR3包含SEQ ID NO:110的氨基酸序列或由其组成。
- [0374] 在一些方面中，特异性结合BCMA抗体包含重链可变区(VH)，其中所述VH

- [0375] (i)包含与SEQ ID NO:103的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列或由所述氨基酸序列组成；或者
- [0376] (ii)包含SEQ ID NO:103的氨基酸序列或由所述氨基酸序列组成；或者
- [0377] (iii)包含与SEQ ID NO:103的氨基酸序列相比具有1个或多个(优选不超过10个,更优选不超过5、4、3、2、1个)的氨基酸改变(优选氨基酸置换,更优选氨基酸保守置换)的氨基酸序列由所述氨基酸序列组成,优选地,所述氨基酸改变不发生在CDR区中。
- [0378] 在一些方面中,特异性结合BCMA抗体包含轻链可变区(VL),其中所述VL
- [0379] (i)包含与SEQ ID NO: 107的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列或由所述氨基酸序列组成；或者
- [0380] (ii)包含SEQ ID NO:107的氨基酸序列或由所述氨基酸序列组成；或者
- [0381] (iii)包含与SEQ ID NO:107的氨基酸序列相比具有1个或多个(优选不超过10个,更优选不超过5、4、3、2、1个)的氨基酸改变(优选氨基酸置换,更优选氨基酸保守置换)的氨基酸序列由所述氨基酸序列组成,优选地,所述氨基酸改变不发生在CDR区中。
- [0382] 在一些实施方案中,特异性结合BCMA抗体包含VH和VL,其中VH包含SEQ ID NO:103所示的序列或由所述序列组成;和/或VL包含SEQ ID NO:107所示的序列或由所述序列组成。
- [0383] 在一些实施方案中,抗原结合区包含已知的或上述特异性结合BCMA的抗体的1、2、3、4、5、或6个CDR。
- [0384] 在一些实施方案中,抗原结合区包含已知的或上述特异性结合BCMA的抗体的1、2和3个重链可变区CDR,即HCDR1、HCDR2和HCDR3。
- [0385] 在一些实施方案中,抗原结合区包含已知的或上述特异性结合BCMA的抗体的1、2和3个轻链可变区CDR,即LCDR1、LCDR2和LCDR3。
- [0386] 在一些实施方案中,抗原结合区包含已知的或上述特异性结合BCMA的抗体的3个重链可变区CDR和3个轻链可变区CDR。

- [0387] 在一些实施方案中，抗原结合区包含已知的或上述特异性结合BCMA的抗体的重链可变区和轻链可变区，以及本发明所述的突变。
- [0388] 在一些抗原结合区包含已知的或上述特异性结合BCMA的抗体的Fab，以及本发明所述的突变。
- [0389] I.8.结合分子的结合片段
- [0390] 本发明还涉及本文所述的结合分子，例如抗体的片段，特别是特异性结合分子所结合靶标的片段，例如抗原结合片段。
- [0391] 在一些实施方案中，抗原结合片段是Fab。
- [0392] 在一些实施方案中，抗原结合片段包含1个或多个Fab，其中一个或多个Fab包含本公开所述的突变或突变组合。
- [0393] I.9.示例性的实施方案
- [0394] 1、抗体或其抗原结合片段，其包含一个或多个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和一个或多个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中所述的抗原结合区中的至少一个或多个包含重链CH1和轻链CL，并且在所述CH1-CL的界面上包含二硫键重塑突变，和/或所述抗原结合区中的至少一个或多个包含重链可变区和轻链可变区，所述重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对包含电荷突变，所述电荷突变为将所述氨基酸对上的两个氨基酸分别突变为带有相反电荷的氨基酸；
- [0395] 其中所述第一抗原和第二抗原可以相同或不同；
- [0396] 优选地，二硫键重塑突变仅包含在一个抗原结合区的CH1-CL界面上。
- [0397] 2、实施方案1的抗体或其抗原结合片段，其中二硫键重塑突变包括
- [0398] (i)在重链CH1的位置126处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)，且轻链CL的位置124处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)；
- [0399] (ii)在重链CH1的位置168处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)，且轻链CL的位置164处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)；

- [0400] (iii)在重链CH1的位置170处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号), 且轻链CL的位置162或164处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号);
- [0401] (iv)在重链CH1的位置173处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号), 且轻链CL的位置160或162处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号);
- [0402] (v)在重链CH1的位置128处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号), 且轻链CL的位置118处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号);
- [0403] (vi)在重链CH1的位置134处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号), 且轻链CL的位置116处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号);
- [0404] (vii)在重链CH1的位置136处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号), 且轻链CL的位置114处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号);
- [0405] (viii)在重链CH1的位置171处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号), 且轻链CL的位置162处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号);
- [0406] (ix)在重链CH1的位置139处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号), 且轻链CL的位置116处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)。
- [0407] 3、实施方案2的抗体或其抗原结合片段, 其中二硫键重塑突变包括
- [0408] (i)在CH1中包含F126C, 且在CL中包含Q124C(EU编号);
- [0409] (ii)在CH1中包含H168C, 且在CL中包含T164C(EU编号);
- [0410] (iii)在CH1中包含F170C, 且在CL中包含T164C(EU编号);
- [0411] (iv)在CH1中包含F170C, 且在CL中包含S162C(EU编号);
- [0412] (v)在CH1中包含V173C, 且在CL中包含S162C(EU编号);
- [0413] (vi)在CH1中包含V173C, 且在CL中包含Q160C(EU编号);

- [0414] (vii)在CH1中包含L128C, 且在CL中包含F118C(EU编号);
- [0415] (viii)在CH1中包含S134C, 且在CL中包含F116C(EU编号);
- [0416] (ix)在CH1中包含S136C, 且在CL中包含S114C(EU编号);
- [0417] (x)在CH1中包含P171C, 且在CL中包含S162C(EU编号);
- [0418] (xi)在CH1中包含T139C, 且在CL中包含F116C(EU编号)。
- [0419] 4、抗体或其抗原结合片段, 其包含一个或多个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和一个或多个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区, 其中所述的抗原结合区中的至少一个包含重链CH1和轻链CL, 并且在所述CH1-CL的界面上包含二硫键重塑突变, 其中所述二硫键重塑突变为在CH1中包含T139C, 且在CL中包含F116C, 其中所述第一抗原结合区和第二抗原结合区可以相同或不同。
- [0420] 5、实施方案2-4中任一项的抗体或其抗原结合片段, 其中二硫键重塑突变还包含重链恒定区-轻链恒定区界面内的链间半胱氨酸被非半胱氨酸取代。
- [0421] 6、实施方案5的抗体或其抗原结合片段, 其中链间半胱氨酸被非半胱氨酸取代包括在CH1中的第220位的半胱氨酸被非半胱氨酸取代, 且在CL的第214位的半胱氨酸被非半胱氨酸取代。
- [0422] 7、实施方案6的抗体或其抗原结合片段, 其中链间半胱氨酸被非半胱氨酸取代包括在CH1中的C220S/A/V, 且在CL中包含C214S/A/V(EU编号)。
- [0423] 8、实施方案6的抗体或其抗原结合片段, 其中二硫键重塑突变包括
- [0424] (i)在CH1中的F126C和C220S, 以及在CL中的Q124C和C214S(EU编号);
- [0425] (ii)在CH1中包含H168C和C220S, , 且在CL中包含T164C和C214S(EU编号);
- [0426] (iii)在CH1中包含F170C和C220S, , 且在CL中包含T164C和C214S(EU编号);
- [0427] (iv)在CH1中包含F170C和C220S, , 且在CL中包含S162C和C214S(EU编号);
- [0428] (v)在CH1中包含V173C和C220S, , 且在CL中包含S162C和C214S(EU编号);
- [0429] (vi)在CH1中包含V173C和C220S, , 且在CL中包含Q160C和C214S(EU编号);
- [0430] (vii)在CH1中包含L128C和C220S, , 且在CL中包含F118C和C214S(EU编号);
- [0431] (viii)在CH1中包含S134C和C220S, , 且在CL中包含F116C和C214S(EU编号);
- [0432] (ix)在CH1中包含S136C和C220S, , 且在CL中包含S114C和C214S(EU编号);

- [0433] (x)在CH1中包含P171C和C220S, , 且在CL中包含S162C和C214S(EU编号);
- [0434] (xi)在CH1中包含T139C和C220S, , 且在CL中包含F116C和C214S(EU编号)。
- [0435] 9、实施方案1-8中任一项所述的抗体或其抗原结合片段, 其中CH1区为人的IgG CH1, 例如, 人IgG1 CH1, 人IgG2 CH1, 人IgG3 CH1或人IgG4 CH1, 例如CH1区包含SEQ ID NO:116所示的氨基酸序列;
- [0436] 和/或CL区为人的Kappa轻链CL区或人的Lambda轻链CL区, 例如CL区包含SEQ ID NO:54或SEQ ID NO:55的氨基酸序列。
- [0437] 10、实施方案8或9的抗体或其抗原结合片段, 其中CH1
- [0438] (i)包含与SEQ ID NO:129所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列, 且包含F126C和C220S; 或包含SEQ ID NO:129所示的氨基酸序列或由所述序列组成;
- [0439] (ii)包含与SEQ ID NO:133所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列, 且包含H168C和C220S; 或包含SEQ ID NO:133所示的氨基酸序列或由所述序列组成;
- [0440] (iii)包含与SEQ ID NO:135所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列, 且包含F170C和C220S; 或包含SEQ ID NO:135所示的氨基酸序列或由所述序列组成;
- [0441] (iv)包含与SEQ ID NO:137所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列, 且包含V173C和C220S; 或包含SEQ ID NO:137所示的氨基酸序列或由所述序列组成;
- [0442] (v)包含与SEQ ID NO:139所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列, 且包含L128C和C220S; 或包含SEQ ID NO:139所示的氨基酸序列或由所述序列组成;

- [0443] (vi)包含与SEQ ID NO:141所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S134C和C220S；或包含SEQ ID NO:141所示的氨基酸序列或由所述序列组成；
- [0444] (vii)包含与SEQ ID NO:143所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S136C和C220S；或包含SEQ ID NO:143所示的氨基酸序列或由所述序列组成；
- [0445] (viii)包含与SEQ ID NO:145所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含P171C和C220S；或包含SEQ ID NO:145所示的氨基酸序列或由所述序列组成；或
- [0446] (ix)包含与SEQ ID NO:147所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含T139C和C220S；或包含SEQ ID NO:147所示的氨基酸序列或由所述序列组成。
- [0447] 11、实施方案8-10中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中CL
- [0448] (i)包含与SEQ ID NO:128所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含Q124C和C124S；或包含SEQ ID NO:128所示的氨基酸序列或由所述序列组成；
- [0449] (ii)包含与SEQ ID NO:149所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含T164C和C124S；或包含SEQ ID NO:149所示的氨基酸序列或由所述序列组成；
- [0450] (iii)包含与SEQ ID NO:151所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基

酸序列，且包含S162C和C124S；或包含SEQ ID NO:151所示的氨基酸序列或由所述序列组成；

- [0451] (iv)包含与SEQ ID NO:35所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含Q160C和C124S；或包含SEQ ID NO:35所示的氨基酸序列或由所述序列组成；
- [0452] (v)包含与SEQ ID NO:37所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F118C和C124S；或包含SEQ ID NO:37所示的氨基酸序列或由所述序列组成；
- [0453] (vii)包含与SEQ ID NO:98所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F116C和C124S；或包含SEQ ID NO:98所示的氨基酸序列或由所述序列组成；或
- [0454] (viii)包含与SEQ ID NO:100所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S114C和C124S；或包含SEQ ID NO:100所示的氨基酸序列或由所述序列组成。
- [0455] 12、实施方案1-11中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所述重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对的位置选自：重链可变区的位置39和轻链可变区的位置38、重链可变区的位置45和轻链可变区的位置87、重链可变区的位置45和轻链可变区的位置44、重链可变区的位置91和轻链可变区的位置43或重链可变区的位置91和轻链可变区的位置44(kabat编号)。
- [0456] 13、实施方案1-12中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中至少一个第一抗原结合区中的重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对的位置与至少一个第二抗原结合区的位置相同。14、实施方案13中的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原结合区的氨基酸对的位置上的突变后的氨基酸与第二抗原结合区相同位置上的突变后的氨基酸带有相反的电荷。

- [0457] 15、实施方案14的抗体或其抗原结合片段，其中
- [0458] (1)在第一抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；
- [0459] (2)在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；
- [0460] (3)在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；
- [0461] (4)在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；或者
- [0462] (5)在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸。
- [0463] 16、实施方案15的抗体或其抗原结合片段，其中所述带正电荷的氨基酸选自K、R或H，和/或所述带负电荷的氨基酸选自E或D。
- [0464] 17、实施方案16的抗体或其抗原结合片段，其中
- [0465] (i).在第一抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为K；

- [0466] (ii).在第一抗原结合区中,重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K,且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为D,同时,在第二抗原结合区中,重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D,且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为K;
- [0467] (iii).在第一抗原结合区中,重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K,且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D,同时,在第二抗原结合区中,重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D,且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K;
- [0468] (iv).在第一抗原结合区中,重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K,且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为D,同时,在第二抗原结合区中,重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D,且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为K;
- [0469] (v).在第一抗原结合区中,重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K,且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D,同时,在第二抗原结合区中,重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D,且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K。
- [0470] 18、实施方案1-17中任一项的抗体或其抗原结合片段,其中所述多特异性抗体包含电荷突变和二硫键重塑突变。
- [0471] 19、实施方案1-18中任一项的抗体或其抗原结合片段,其中一个或多个或全部结合相同抗原的抗原结合区包含相同的突变。
- [0472] 20、实施方案1-19中任一项的抗体或其抗原结合片段,其中,第一抗原结合区包含重链可变区、重链恒定区CH1、轻链可变区和轻链恒定区CL,且第二抗原结合区包含重链可变区VH和轻链可变区VL。
- [0473] 21、实施方案20的抗体或其抗原结合片段,其中
- [0474] 1)第一抗原结合区包含实施方案1-17中任一项所定义的二硫键重塑突变;或者
- [0475] 2)第一抗原结合区包含实施方案1-17中任一项所定义的电荷突变;
- [0476] 3)第一抗原结合区包含实施方案1-17中任一项所定义的二硫键重塑突变和电荷突变;或者
- [0477] 4)第一抗原结合区包含实施方案1-17中任一项所定义的二硫键重塑突变和电荷突变;且第二抗原结合区包含实施方案1-17中任一项所述的电荷突变。
- [0478] 22、实施方案21的抗体或其抗原结合片段,其中
- [0479] 1)第一抗原结合区包含实施方案2-8中任一项所定义的二硫键重塑突变;

- [0480] 2)第一抗原结合区包含如实施方案12-17中任一项所定义的电荷突变；
- [0481] 3)第一抗原结合区包含实施方案2-8中任一项所定义的二硫键重塑突变且包含如实施方案12-17中任一项所定义的电荷突变；或者
- [0482] 4)第一抗原结合区和第二抗原结合区包含如实施方案12-17中任一项所定义的电荷突变，并且第一抗原结合区还包含实施方案2-8中任一项所定义的二硫键重塑突变。
- [0483] 23、实施方案22的抗体或其抗原结合片段，其中所述多特异性抗体的第一抗原结合区包含选自如下的突变组合：

	重链 VH 突变	重链 CH1 突变	轻链 VL 突变	轻链 CL 突变
组合 1	Q39K	F126C, C220S	Q38D	Q124C, C214S
	Q39K	H168C, C220S	Q38D	T164C, C214S
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	T164C, C214S
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	S162C, C214S
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	S162C, C214S
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	Q160C, C214S
	Q39K	L128C, C220S	Q38D	F118C, C214S
	Q39K	S134C, C220S	Q38D	F116C, C214S

	Q39K	S136C, C220S	Q38D	S114C, C214S
	Q39K	P171C, C220S	Q38D	S162C, C214S
	Q39K	T139C, C220S	Q38D	F116C, C214S
组合 2	L45K	F126C, C220S	Y87D	Q124C, C214S
	L45K	H168C, C220S	Y87D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	Y87D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	Y87D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	Y87D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	Y87D	Q160C, C214S
	L45K	L128C, C220S	Y87D	F118C, C214S
	L45K	S134C, C220S	Y87D	F116C, C214S
	L45K	S136C, C220S	Y87D	S114C, C214S
	L45K	P171C, C220S	Y87D	S162C, C214S
	L45K	T139C, C220S	Y87D	F116C, C214S
组合 3	L45K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S
	L45K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S
	L45K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S
	L45K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S
	L45K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S
	L45K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S
	L45K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S
组合 4	Y91K	F126C, C220S	A43D	Q124C, C214S
	Y91K	H168C, C220S	A43D	T164C, C214S

	Y91K	F170C, C220S	A43D	T164C, C214S
	Y91K	F170C, C220S	A43D	S162C, C214S
	Y91K	V173C, C220S	A43D	S162C, C214S
	Y91K	V173C, C220S	A43D	Q160C, C214S
	Y91K	L128C, C220S	A43D	F118C, C214S
	Y91K	S134C, C220S	A43D	F116C, C214S
	Y91K	S136C, C220S	A43D	S114C, C214S
	Y91K	P171C, C220S	A43D	S162C, C214S
	Y91K	T139C, C220S	A43D	F116C, C214S
组合 5	Y91K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S
	Y91K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S
	Y91K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S
	Y91K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S
	Y91K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S
	Y91K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S
	Y91K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S
	Y91K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S
	Y91K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S
	Y91K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S
	Y91K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S

[0484] 任选地，所述第二抗原结合区还包含选自如下的突变组合：

	重链 VH 突变	轻链 VL 突变
组合 1	Q39D	Q38K
组合 2	L45D	Y87K
组合 3	L45D	P44K
组合 4	Y91D	A43K
组合 5	Y91D	P44K

。

[0485] 24、实施方案23的抗体或其抗原结合片段，其中所述多特异性抗体的所述第一抗原结合区和第二抗原结合区分别包含如下的突变组合：

	第一抗原结合区				第二抗原结合区	
	重链 VH 突变	重链 CH1 突变	轻链 VL 突变	轻链 CL 突变	重链 VH 突变	轻链 VL 突变
组合 1	Q39K	F126C, C220S	Q38D	Q124C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	H168C, C220S	Q38D	T164C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	T164C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	Q160C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	L128C, C220S	Q38D	F118C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	S134C, C220S	Q38D	F116C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	S136C, C220S	Q38D	S114C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	P171C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	T139C, C220S	Q38D	F116C, C214S	Q39D	Q38K
组合 2	L45K	F126C, C220S	Y87D	Q124C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	H168C, C220S	Y87D	T164C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	F170C, C220S	Y87D	T164C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	F170C, C220S	Y87D	S162C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	V173C,	Y87D	S162C,	L45D	Y87K

		C220S		C214S		
	L45K	V173C, C220S	Y87D	Q160C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	L128C, C220S	Y87D	F118C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	S134C, C220S	Y87D	F116C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	S136C, C220S	Y87D	S114C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	P171C, C220S	Y87D	S162C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	T139C, C220S	Y87D	F116C, C214S	L45D	Y87K
组 合 3	L45K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S	L45D	P44K
	L45K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S	L45D	P44K
	L45K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S	L45D	P44K
	L45K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S	L45D	P44K
	L45K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S	L45D	P44K
	L45K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S	L45D	P44K
	L45K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S	L45D	P44K
	L45K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S	L45D	P44K
	L45K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S	L45D	P44K
	L45K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S	L45D	P44K
	L45K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S	L45D	P44K

组 合 4	Y91K	F126C, C220S	A43D	Q124C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	H168C, C220S	A43D	T164C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	F170C, C220S	A43D	T164C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	F170C, C220S	A43D	S162C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	V173C, C220S	A43D	S162C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	V173C, C220S	A43D	Q160C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	L128C, C220S	A43D	F118C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	S134C, C220S	A43D	F116C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	S136C, C220S	A43D	S114C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	P171C, C220S	A43D	S162C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	T139C, C220S	A43D	F116C, C214S	Y91D	A43K
组 合 5	Y91K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S	Y91D	P44K

	Y91K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S	Y91D	P44K

- [0486] 25、抗体或其抗原结合片段，其包含一个或多个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和一个或多个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中所述抗原结合区中的至少一个包含重链可变区和轻链可变区，所述重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对包含电荷突变，所述电荷突变为将所述氨基酸对上的两个氨基酸分别突变为带有相反电荷的氨基酸，其中所述重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对的位置选自：重链可变区的位置45和轻链可变区的位置87、重链可变区的位置45和轻链可变区的位置44、重链可变区的位置91和轻链可变区的位置43或重链可变区的位置91和轻链可变区的位置44(kabat编号)。
- [0487] 26、实施方案25的抗体或其抗原结合片段，其中至少一个第一抗原结合区中的重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对的位置与至少一个第二抗原结合区的位置相同，其中第一抗原和第二抗原相同或不同。
- [0488] 27、实施方案26中的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原结合区的氨基酸对的位置上的突变后的氨基酸与第二抗原结合区相同位置上的突变后的氨基酸带有相反的电荷。
- [0489] 28、实施方案27的抗体或其抗原结合片段，其中
- [0490] (1)在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；
- [0491] (2)在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二

抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；

- [0492] (3)在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；或者
- [0493] (4)在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸。
- [0494] 29、实施方案28的抗体或其抗原结合片段，其中所述带正电荷的氨基酸选自K、R或H，和/或所述带负电荷的氨基酸选自E或D。
- [0495] 30、实施方案29的抗体或其抗原结合片段，其中
- [0496] (i).在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为K；
- [0497] (ii).在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K；
- [0498] (iii).在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为K；或
- [0499] (iv).在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K。
- [0500] 31、实施方案1-30中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所有第一抗原结合区包含相同的突变，且所有第二抗原结合区包含相同的突变。

- [0501] 32、实施方案1-31中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原结合区为抗体的Fab片段，和/或第二抗原结合区为抗体的Fab片段。
- [0502] 33、实施方案1-32中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体一个或多个或全部第一抗原结合区所包含的轻链恒定区为Kappa轻链恒定区，且一个或多个或全部第二抗原结合区所包含的轻链恒定区为Lambda轻链恒定区，或者其中一个或多个或全部第一抗原结合区所包含的轻链恒定区为Lambda轻链恒定区，且一个或多个或全部第二抗原结合区所包含的轻链恒定区为Kappa轻链恒定区。
- [0503] 34、实施方案1-33中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体还包含第一Fc区和第二Fc区，其中第一Fc区和第二Fc区相同或不同。
- [0504] 35、实施方案34的抗体或其抗原结合片段，其中第一Fc区和第二Fc区分别为人的IgG Fc，例如，人IgG1Fc,人IgG2Fc,人IgG3Fc，或人IgG4Fc，例如包含氨基酸序列SEQ ID NO:122或123或与其具有至少90%同一性，例如95%，96%，97%，99%或更高的同一性的氨基酸序列或由其组成。
- [0505] 36、实施方案34或35的多特异性抗体，其中基于Knob-in-Hole技术，在第一Fc区和第二Fc区中引入相应的Knob突变和Hole突变。
- [0506] 37、实施方案36的抗体或其抗原结合片段，其中
- [0507] a)一个Fc区多肽包含突变T366W，而另一个Fc区多肽包含T366S,L368A和Y407V(编号方式依照EU索引)，或
- [0508] b)一个Fc区包含氨基酸替代S354C和T366W,且另一个Fc区包含氨基酸替代Y349C,T366S,L368A和Y407V(编号方式依照EU索引)。
- [0509] 38、实施方案36的多特异性抗体，其中
- [0510] a)一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:125所示的氨基酸序列或由其组成，而另一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:124所示的氨基酸序列或由其组成；
- [0511] b)一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:125所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:124所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列；

- [0512] c) 一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:125所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变S354C和T366W，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:124所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列包含突变Y349C, T366S, L368A和Y407V；
- [0513] d) 一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:20或131所示的氨基酸序列或由其组成，而另一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:101或130所示的氨基酸序列或由其组成；
- [0514] e) 一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:20或131所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:101或130所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列；或
- [0515] f) 一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:20或131所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变T366W，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:101或130所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列包含突变T366S, L368A和Y407V。
- [0516] 39、实施方案34或35的抗体或其抗原结合片段，其中基于Innobody技术，在第一Fc区和第二Fc区中引入突变，促进第一Fc区和第二Fc区的异二聚化。
- [0517] 40、实施方案39的抗体或其抗原结合片段，其中一个Fc区的CH3包含S364R和D399K突变，且另一个Fc区的CH3突变包含Y349T、K370S和K409D突变。
- [0518] 41、实施方案40的抗体或其抗原结合片段，其中
- [0519] a) 一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:126所示的氨基酸序列或由其组成，而另一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:127所示的氨基酸序列或由其组成；
- [0520] b) 一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:126所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:127所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列；或

- [0521] c)一个Fc区包含与SEQ ID NO:126所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变S364R和D399K,而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:127所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变Y349T、K370S和K409D。
- [0522] 42、实施方案34-41中任一项的抗体或其抗原结合片段,其中所述第一和/或第二Fc区包含L234A/L235A突变。
- [0523] 43、实施方案1-42中任一项的抗体或其抗原结合片段,其中所述抗体或其抗原结合片段所结合的抗原选自以下的一个或多个:CD3、BCMA、CD20、Her2、Her3、B7H3、EGFR、Hel、cMET、Axl、GPCR5D、免疫检查点分子例如PD-1、PD-L1、CD47、免疫激活分子如4-1BB、CD40、OX40。
- [0524] 44、实施方案1-43中任一项的抗体或其抗原结合片段,其中第一抗原和第二抗原不同且所述抗体是双特异性抗体。
- [0525] 45、实施方案44的抗体或其抗原结合片段,其中所述双特异性抗体结合选自如下的两个抗原:CD3/BCMA,CD3/CD20,CD3/Her2,Her2/Her3,B7H3/EGFR,PD-L1/CD47,PD-L1/CD40,PD-L1/4-1BB,EGFR/Her3,Her2/Hel,Her2/PD-1,Her2/PD-L1,Her2/CD47,Her2/cMet,或CD3/GPCR5D。
- [0526] 46、实施方案44或45的抗体或其抗原结合片段,其中所述双特异性抗体包含特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和特异性结合第二抗原的第二抗原结合区,其中第一抗原结合区包含第一Fab,第二抗原结合区包含第二Fab,其中第一Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经过接头,例如铰链区),第二Fab在其CH1的C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经过接头,例如铰链区)。
- [0527] 47、实施方案46的抗体或其抗原结合片段,其中所述双特异性抗体是IgG样抗体,其具有如图1所示的构型。
- [0528] 48、实施方案46或47所述的抗体或其抗原结合片段,其包含

- [0529] 重链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区，其中重链恒定区CH1在其C末端与第一Fc区N末端经由或不经过接头(例如铰链区)连接；
- [0530] 轻链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区；
- [0531] 重链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区，其中重链恒定区CH1在其C末端与第二Fc区N末端经由或不经过接头(例如铰链区)连接；
- [0532] 轻链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区。
- [0533] 49、实施方案48的抗体或其抗原结合片段；其中
- [0534] (1)第一抗原结合区特异性结合Her2，其中重链1和轻链1分别包含如下的SEQ ID NO:所示的氨基酸序列，或包含与所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由如下SEQ ID NO所示的序列组成：
- [0535] i)SEQ ID NO:43和SEQ ID NO:45；
- [0536] ii)SEQ ID NO:48和SEQ ID NO:49；
- [0537] iii)SEQ ID NO:21和SEQ ID NO:22；
- [0538] iv)SEQ ID NO:25和SEQ ID NO:26；
- [0539] v)SEQ ID NO:25和SEQ ID NO:29；
- [0540] vi)SEQ ID NO:31和SEQ ID NO:32；或
- [0541] vii)SEQ ID NO:31和SEQ ID NO:29；
- [0542] 和/或
- [0543] (2)第二抗原结合区特异性结合Hel，重链2和轻链2分别包含如下的SEQ ID NO:所示的氨基酸序列，或包含与所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由如下SEQ ID NO所示的序列组成：
- [0544] i)SEQ ID NO:41和SEQ ID NO:42；
- [0545] ii)SEQ ID NO:23和SEQ ID NO:24；
- [0546] iii)SEQ ID NO:27和SEQ ID NO:28；

- [0547] iv)SEQ ID NO:27和SEQ ID NO:30;
- [0548] v)SEQ ID NO:33和SEQ ID NO:34; 或
- [0549] vi)SEQ ID NO:33和SEQ ID NO:30;
- [0550] (2)-1第二抗原结合区特异性结合PD-1, 重链2和轻链2分别包含如下的SEQ ID NO:所示的氨基酸序列, 或包含与所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由如下SEQ ID NO所示的序列组成: SEQ ID NO:46和SEQ ID NO:47;
- [0551] (2)-2第二抗原结合区特异性结合CD47, 重链2和轻链2分别包含如下的SEQ ID NO:所示的氨基酸序列, 或包含与所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由如下SEQ ID NO所示的序列组成: SEQ ID NO:50和SEQ ID NO:51;
- [0552] (3)-2第二抗原结合区特异性结合c-Met, 重链2和轻链2分别包含如下的SEQ ID NO: 所示的氨基酸序列, 或包含与所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由如下SEQ ID NO所示的序列组成: SEQ ID NO:52和SEQ ID NO:53。
- [0553] 50、实施方案44或45的多特异性抗体, 其中所述双特异性抗体包含1个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和2个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区, 其中第一抗原结合区包含第一Fab, 第二抗原结合区包含第二Fab, 其中一个第二Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经由接头, 例如铰链区), 一个第一Fab在其CH1的C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头, 例如铰链区), 且另一个第二Fab在其CH1的C末端与第一Fab的重链可变区的N末端连接(通过或不通过接头)。
- [0554] 51、实施方案50的抗体或其抗原结合片段, 其中所述双特异性抗体是2+1N端构型, 其具有如图5A所示的构型。
- [0555] 52、实施方案51的抗体或其抗原结合片段, 其中所述双特异性抗体包含
- [0556] 重链1: 从N端至C端包含或由下述组成: 第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区, 其中第一Fab重链恒定区CH1在其C末端与第二Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接, 且第

二Fab在其CH1的C末端与第一Fab的重链可变区的N末端连接(通过或不通过接头);

[0557] 轻链1: 从N端至C端包含或由下述组成: 第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区;

[0558] 重链2: 从N端至C端包含或由下述组成: 第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区, 其中重链恒定区CH1在其C末端与第一Fc区N末端经由或不经过接头(例如铰链区)连接;

[0559] 轻链2: 从N端至C端包含或由下述组成: 第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区,

[0560] 其中所述双特异性抗体包含2条轻链2。

[0561] 53、实施方案52的抗体或其抗原结合片段, 其中第一抗原结合区结合CD3, 且第二抗原结合区结合GPCR5D, 例如其中,

[0562] 1)重链1包含SEQ ID NO:58所示的氨基酸序列, 或包含与SEQ ID NO:58所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由所述氨基酸序列组成;

[0563] 轻链1包含SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列, 或包含与SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由所述氨基酸序列组成;

[0564] 重链2包含SEQ ID NO:57所示的氨基酸序列, 或包含与SEQ ID NO:57所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由所述氨基酸序列组成; 和/或

[0565] 轻链2包含SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列, 或包含与SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由所述氨基酸序列组成; 或者

[0566] 2)重链1包含SEQ ID NO:62所示的氨基酸序列, 或包含与SEQ ID NO:62所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由所述氨基酸序列组成;

[0567] 轻链1包含SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列, 或包含与SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由所述氨基酸序列组成;

- [0568] 重链2包含SEQ ID NO:61所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:61所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；和/或
- [0569] 轻链2包含SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成。
- [0570] 54、实施方案44或45的多抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体包含1个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和2个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中第一抗原结合区包含第一Fab，第二抗原结合区包含第二Fab，其中2个第二Fab在其CH1的C末端分别与第一Fc区N末端和第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，且第一Fab在重链可变区的N末端与第二Fc区的C末端连接(通过或不通过接头)。
- [0571] 55、实施方案54的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体是2+1C端构型，其具有如图5B所示的构型。
- [0572] 56、实施方案55的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体包含
- [0573] 重链1：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区-第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1，其中第二Fab在其CH1的C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，且第一Fab在重链可变区的N末端与第二Fc区的C末端连接(通过或不通过接头)；
- [0574] 轻链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区；
- [0575] 重链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区，其中重链恒定区CH1在其C末端与第一Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接；
- [0576] 轻链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区，
- [0577] 其中所述双特异性抗体包含2条轻链2。
- [0578] 57、实施方案56的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原结合区结合CD3，且第二抗原结合区结合GPRC5D，例如其中，

- [0579] 1)重链1包含SEQ ID NO:64所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:64所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;
- [0580] 轻链1包含SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;
- [0581] 重链2包含SEQ ID NO:57所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:57所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;和/或
- [0582] 轻链2包含SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;或者
- [0583] 2)重链1包含SEQ ID NO:65所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:65所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;
- [0584] 轻链1包含SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;
- [0585] 重链2包含SEQ ID NO:61所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:61所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;和/或
- [0586] 轻链2包含SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成。
- [0587] 58、实施方案44或45的抗体或其抗原结合片段,其中所述双特异性抗体包含2个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和2个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区,其中第一抗原结合区包含第一Fab,第二抗原结合区包含第二Fab,其中2个第二Fab在其CH1的C末端分别与两个Fc区N末端连接(经由或不经由接头,例

如铰链区)(所述Fc区可以相同或不同),且2个第一Fab在重链可变区的N末端分别与2个Fc区的C末端连接(通过或不通过接头)

- [0588] 59、实施方案58的抗体或其抗原结合片段,其中所述双特异性抗体是2+2C端构型,其具有如图5C所示的构型。
- [0589] 60、实施方案59的抗体或其抗原结合片段,其中所述双特异性抗体包含
- [0590] 重链:从N端至C端包含或由下述组成:第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-Fc区-第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1,其中第二Fab在其CH1的C末端与Fc区N末端连接(经由或不经由接头,例如铰链区),且第一Fab在重链可变区的N末端与Fc区的C末端连接(通过或不通过接头);
- [0591] 轻链1:从N端至C端包含或由下述组成:第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区;
- [0592] 轻链2:从N端至C端包含或由下述组成:第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区,
- [0593] 其中所述双特异性抗体包含2条重链。
- [0594] 61、实施方案60的抗体或其抗原结合片段,其中第一抗原结合区结合CD3,且第二抗原结合区结合GPRC5D,例如其中,
- [0595] 1)重链包含SEQ ID NO:66所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:66所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;
- [0596] 轻链1包含SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;和/或
- [0597] 轻链2包含SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;或者
- [0598] 2)重链包含SEQ ID NO:67所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:67所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;

- [0599] 轻链1包含SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；和/或
- [0600] 轻链2包含SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成。
- [0601] 62、实施方案1-43中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所述第一抗原和第二抗原不同，且所述抗体还包含特异性结合一个或多个其他抗原的抗原结合区。
- [0602] 63、实施方案62的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体是三特异性抗体。
- [0603] 64、实施方案63的抗体或其抗原结合片段，其中所述三特异性抗体包含特异性结合第一抗原的第一抗原结合区、特异性结合第二抗原的第二抗原结合区和特异性结合第三抗原的第三抗原结合区，其中第一抗原结合区包含第一Fab，第二抗原结合区包含第二Fab，其中第一Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，第二Fab在其CH1的C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，第三抗原结合区包含scFv(例如VH-VL或VL-VH)，其经由或不经由接头在其VH或VL的N末端或C末端(例如scFv是VL-VH，例如VL的N末端)与第二Fc区的C末端连接。
- [0604] 65、实施方案64的抗体或其抗原结合片段，其中所述三特异性抗体的构型为2+1C端构型，如图7A或B所示。
- [0605] 66、实施方案65的抗体或其抗原结合片段，其中所述多特异性抗体包含
- [0606] 重链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区，其中第一Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)；
- [0607] 轻链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区；
- [0608] 重链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区-scFv，其中重链恒定区CH1在其C末端与第二Fc区N末端经由或

不经由接头(例如铰链区)连接,且scFv经由或不经由接头在其VH或VL的N末端或C末端(例如scFv是VL-VH,例如VL的N末端)与第二Fc区的C末端连接;

- [0609] 轻链2:从N端至C端包含或由下述组成:第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区。
- [0610] 67、实施方案66的抗体或其抗原结合片段,其中第一抗原结合区特异性结合GPCR5D,第二抗原结合区特异性结合CD3,和/或第三抗原结合区特异性结合BCMA,例如其中
- [0611] 重链1包含SEQ ID NO:71所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:71所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;
- [0612] 轻链1包含SEQ ID NO:72所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:72所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;
- [0613] 重链2包含SEQ ID NO:73所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:73所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;和/或
- [0614] 轻链2包含SEQ ID NO:74所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:74所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成。
- [0615] 68、核酸,其编码实施方案1-67中任一项的抗体或其抗原结合片段,或其任一条或多条链。
- [0616] 69、表达载体,其包含实施方案68的核酸。
- [0617] 70、宿主细胞,其包含实施方案68的核酸或实施方案69的表达载体。
- [0618] 71、制备实施方案1-67中任一项的抗体或其抗原结合片段的方法,其包括
- [0619] a)将编码抗体或其抗原结合片段的各条链的核酸引入宿主细胞中;
- [0620] b)在宿主细胞体内表达并组装所述抗体或其抗原结合片段;
- [0621] 任选地,所述抗体或其抗原结合片段被纯化,例如被Protein A纯化。
- [0622] 72、免疫缀合物,其包含实施方案1-67中任一项的抗体或其抗原结合片段。
- [0623] 73、融合蛋白,其包含实施方案1-67中任一项的抗体或其抗原结合片段。

- [0624] 74、T细胞受体，其包含实施方案1-67中任一项的抗体或其抗原结合片段。
- [0625] II.结合分子的制备
- [0626] 本发明还提供了产生结合分子例如抗体的体外方法，在一些实施方案中，所述结合分子为抗体或融合蛋白。在一些实施方案中，所述抗体为多特异性抗体，例如双特异性抗体。
- [0627] 在一个方面，本发明的结合分子例如抗体的制备方法包括：
- [0628] a)将编码结合分子例如抗体的各条链的核酸引入宿主细胞中；
- [0629] b)在宿主细胞体内表达并组装结合分子例如抗体；
- [0630] 任选地，所述结合分子例如抗体被纯化，例如被Protein A纯化。
- [0631] 在又一个实施方案中，在结合分子例如抗体产生期间向培养基中加入化合物，例如L-精氨酸。在一个实施方案中，所述精氨酸用于稳定蛋白。
- [0632] 在一些实施方案中，本发明的产物具有与维持突变前的结合分子例如抗体的表达量和亲和力。
- [0633] 在一些实施方案中，本发明的方法以高收率获得稳定的结合分子例如抗体如多特异性抗体(例如双特异性抗体)。
- [0634] 在一些实施方案中，本发明的方法能够实现在一个细胞系中表达结合分子例如抗体如多特异性抗体(例如双特异性抗体)的各条链并组装，优选地避免了两个细胞系表达和体外重组。
- [0635] III核酸和宿主细胞
- [0636] 本发明提供编码本发明的结合分子例如抗体如多特异性抗体例如双特异性抗体的任一条链或任何单体或结构域的核酸。可以采用本领域熟知的方法，产生编码各条链的多核苷酸序列。此外，本发明的多核苷酸和核酸可以包含编码分泌信号肽的区段，并与编码本发明结合分子例如抗体如多特异性抗体例如双特异性抗体中的抗体或蛋白可操作连接，从而可以指导本发明结合分子例如抗体如多特异性抗体例如双特异性抗体以及其各条链的分泌性表达。
- [0637] 本发明也提供包含本发明核酸的载体。在一个实施方案中，载体是表达载体，例如真核表达载体。载体包括但不限于病毒、质粒、粘粒、λ噬菌体或酵母人

工染色体(YAC)。在优选的实施方案中,本发明的表达载体是pCNDA载体,例如pCNDA3.1表达载体。

[0638] 本发明也提供包含所述核酸或所述载体的宿主细胞。适用于复制并支持本发明结合分子例如抗体如多特异性抗体例如双特异性抗体表达的宿主细胞是本领域中公知的。可以用特定的表达载体转染或转导这类细胞,并且可以生长大量的含载体细胞以用于接种大规模发酵罐,从而获得充足量的多特异性抗体例如双特异性抗体用于临床应用。

[0639] 在一个实施方案中,宿主细胞是真核的。在另一个实施方案中,宿主细胞选自酵母细胞、哺乳动物细胞(例如CHO细胞或293细胞,例如Expi293细胞)。可用的哺乳动物宿主细胞系的例子是由SV40转化的猴肾CV1系(COS-7);人胚胎肾系(293或293T细胞,如例如记载于Graham等JGenVirol36,59(1977))、幼仓鼠肾细胞(BHK)、小鼠塞托利(sertoli)细胞(TM4细胞,如例如记载于Mather,BiolReprod23,243-251(1980))、猴肾细胞(CV1)、非洲绿猴肾细胞(VERO-76)、人宫颈癌细胞(HELA)、犬肾细胞(MDCK),buffalo大鼠肝细胞(BRL3A)、人肺细胞(W138)、人肝细胞(HepG2)、小鼠乳房肿瘤细胞(MMT060562)、TRI细胞(如例如记载于Mather等,AnnalsN.Y.AcadSci383,44-68(1982))、MRC5细胞和FS4细胞。其它可用的哺乳动物宿主细胞系包括中国仓鼠卵巢(CHO)细胞,包括dhfr-CHO细胞(Urlaub等,ProcNatlAcadSciUSA77,4216(1980));和骨髓瘤细胞系如YO、NS0、P3X63和Sp2/0。在一个实施方案中,宿主细胞是真核生物细胞,优选为哺乳动物细胞如中国仓鼠卵巢(CHO)细胞、人胚胎肾(HEK)细胞或淋巴细胞(例如Y0、NS0、Sp20细胞)。

[0640] IV.包含本发明结合分子或其片段的其他分子

[0641] 在一些实施方案中,本发明的结合分子中的第一和/或第二靶标结合区可以与药物、前药或毒素缀合或者含有药物、前药或毒素的受体基团。此类受体基团可以是例如非天然氨基酸。

[0642] 因此,本发明还涉及包含本发明的结合分子例如抗体如多特异性抗体(例如双特异性抗体)的免疫缀合物(ADC)。

- [0643] 在一些实施方案中，本发明的结合分子或其片段还可以被构建到T细胞受体(TCR)中。在一些实施方案中，TCR的可变区包含本公开所述的突变或突变组合，例如二硫键重塑突变，和/或电荷突变。
- [0644] 在一些实施方案中，本发明的结合分子或其片段可以与其他蛋白质融合构成融合蛋白。在一些实施方案中，其他蛋白的实例包括例如配体或受体，例如颗粒相关细胞因子或其受体，如肿瘤坏死因子(TNF)、血管内皮生长因子(VEGF)或转化生长因子(TGF，例如TGF- β)或其受体，以及其片段。
- [0645] V.产品和用途
- [0646] 在一些实施方案中，本发明还涉及包含所述结合分子例如抗体如多特异性抗体例如双特异性抗体的组合物(例如药物组合物)。
- [0647] 在一个实施方案中，所述组合物还包含药用辅料。在一个实施方案中，组合物，例如，药物组合物，包含本发明的结合分子，以及一种或多种其它治疗剂的组合。
- [0648] 本发明的组合物还可以包含合适的药用辅料，如本领域中已知的药用载体、药用赋形剂，包括缓冲剂。如本文所用，“药用载体”包括生理上相容的任何和全部溶剂、分散介质、等渗剂或吸收延迟剂等。对于药用辅料的使用及其用途，亦参见“Handbook of Pharmaceutical Excipients”，第八版，R.C.Rowe,P.J.Seskey和S.C.Owen,Pharmaceutical Press,London,Chicago。本发明的组合物可以处于多种形式。这些形式例如包括液体、半固体和固体剂型，如液态溶液剂(例如，可注射用溶液剂和可输注溶液剂)、散剂或混悬剂、脂质体剂和栓剂。优选的形式取决于预期的施用模式和治疗用途。可以通过将具有所需纯度的本发明的结合分子与一种或多种任选的药用辅料混合来制备包含本文所述的结合分子的药物，例如以冻干制剂或水溶液的形式。
- [0649] 在一些实施方案中，本发明涉及利用所述的结合分子例如抗体如多特异性抗体例如双特异性抗体治疗疾病，例如肿瘤例如癌症的方法，或用于所述治疗的用途，或用于制备用于所述治疗的药物的用途。
- [0650] 取决于其治疗用途，本发明的结合分子例如抗体如多特异性抗体例如双特异性抗体还可以与其他治疗剂组合。例如，当所述结合分子用于治疗肿瘤时，所述

治疗剂例如用于治疗肿瘤的各种治疗剂，例如化疗剂、血管生成抑制剂、细胞因子、细胞毒性剂、其它抗体、小分子药物或免疫调节剂(例如免疫检查点抑制剂或激动剂)。

[0651] 在一些实施方案中，本发明还提供了药物组合或药物组合产品，其包含本发明的结合分子，以及一种或多种其它治疗剂等。

[0652] 本发明的另一个目的是提供一种成套药盒，其包含本发明的药物组合，优选地所述药盒为药物剂量单元形式。由此可以依据给药方案或药物施用间隔提供剂量单元。

[0653] 在一个实施方案中，本发明的成套药盒在同一包装内包含：

[0654] -含有包含本发明的结合分子的药物组合物的第一容器；

[0655] -含有包含其它治疗剂的药物组合物的第二容器。

实施例

[0656] 实施例1.突变体抗体的设计

[0657] 二硫键重塑

[0658] 一个可以有效强制同源轻重链配对，避免两个抗体的轻重链之间错配的策略是，对于其中一个抗体的轻重链连接的二硫键进行重塑，改变二硫键的位置，使得错误配对的轻重链不能有效形成二硫键。我们对于重链和轻链接触面的氨基酸对进行筛选，选择两个 α 碳原子之间距离小于8Å,更优的小于6Å的氨基酸对，并且氨基酸的侧链指向彼此。被选中的氨基酸对如表1所示(EU编号):

[0659] 表1：二硫键重塑的位置选择

重链位置	示例 CH1	轻链位置	示例 CL
F126C	SEQ ID NO:1	Q124C	SEQ ID NO:2
H168C	SEQ ID NO:132	T164C	SEQ ID NO:148
F170C	SEQ ID NO:134	T164C	SEQ ID NO:148
F170C	SEQ ID NO:134	S162C	SEQ ID NO:150
V173C	SEQ ID NO:136	S162C	SEQ ID NO:150
V173C	SEQ ID NO:136	Q160C	SEQ ID NO:152
L128C	SEQ ID NO:138	F118C	SEQ ID NO:36
S134C	SEQ ID NO:140	F116C	SEQ ID NO:38
S136C	SEQ ID NO:142	S114C	SEQ ID NO:99
P171C	SEQ ID NO:144	S162C	SEQ ID NO:150
T139C	SEQ ID NO:146	F116C	SEQ ID NO:38

[0660] 电荷突变

[0661] 另一个可以有效强制同源轻重链配对，避免两个抗体的轻重链之间错配的策略是，在重链和轻链的接触面上寻找氨基酸对，突变为带相反电荷的氨基酸，利用相反电荷互相吸引的原理促进同源配对。选择标准为，重链可变区和轻链可变区交界面上保守的氨基酸对，氨基酸对的 α 碳原子之间距离小于 12Å,侧链朝向彼此。被选中的氨基酸对如表2所示(Kabat编码)：

[0662] 表2：电荷突变组合

	抗体 1 重链突变	示例 VH	抗体 1 轻链突变	示例 VL	抗体 2 重链突变	示例 VH	抗体 2 轻链突变	示例 VL
组合 1	Q39K	SEQ ID NO:3	Q38D	SEQ ID NO:4	Q39D	SEQ ID NO:5	Q38K	SEQ ID NO:6
组合 2	L45K	SEQ ID NO:7	Y87D	SEQ ID NO:8	L45D	SEQ ID NO:9	Y87K	SEQ ID NO:10
组合 3	L45K	SEQ ID	P44D	SEQ ID	L45D	SEQ ID	P44K	SEQ ID

		NO:7		NO:11		NO:9		NO:12
组合 4	Y91K	SEQ ID NO:13	A43D	SEQ ID NO:14	Y91D	SEQ ID NO:15	A43K	SEQ ID NO:16
组合 5	Y91K	SEQ ID NO:13	P44D	SEQ ID NO:11	Y91D	SEQ ID NO:15	P44K	SEQ ID NO:12

[0663] 在一个细胞系中表达双特异性抗体所采用的最终突变为二硫键重塑与电荷突变的组合，如表3所示：

[0664] 表3：V区电荷突变与二硫键重塑突变组合

	抗体 1				抗体 2	
	重链 VH 突变	重链 CH1 突变	轻链 VL 突变	轻链 CL 突变	重链 VH 突变	轻链 VL 突变
组合 1	Q39K	F126C, C220S	Q38D	Q124C, C214S	Q39D	Q38K
组合 2	L45K	F126C, C220S	Y87D	Q124C, C214S	L45D	Y87K
组合 3	L45K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S	L45D	P44K
组合 4	Y91K	F126C, C220S	A43D	Q124C, C214S	Y91D	A43K
组合 5	Y91K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S	Y91D	P44K
组合 6	Q39K	I1168C, C220S	Q38D	T164C, C214S	Q39D	Q38K
组合 7	Q39K	F170C, C220S	Q38D	T164C, C214S	Q39D	Q38K
组合 8	Q39K	F170C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
组合 9	Q39K	V173C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
组合 10	Q39K	V173C, C220S	Q38D	Q160C, C214S	Q39D	Q38K
组合 11	Q39K	S134C, C220S	Q38D	F116C, C214S	Q39D	Q38K
组合	Q39K	S136C, C220S	Q38D	S114C,	Q39D	Q38K

12				C214S		
组合13	Q39K	P171C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
组合14	Q39K	T139C, C220S	Q38D	F116C, C214S	Q39D	Q38K

- [0665] 当抗体1是抗Her2单抗，抗体2是抗Hel单抗时，示例性的双特异性抗体全长链的序列见序列表中的表3组合1–组合5，即表9中的组合1–组合5的抗体。
- [0666] 轻链恒定区的替换
- [0667] 为了进一步方便下游纯化，除去微量错配抗体，可选择对于其中一个抗体的轻链恒定区进行替换，从C Kappa替换为C Lambda(若其中一个抗体本身为Lambda轻链则不用替换)。使两个抗体Fab为一个Kappa型，一个Lambda型，用对Kappa和Lambda型轻链有选择性的亲和介质进行下游纯化。
- [0668] 实施例2.HEK293细胞表达突变体以及突变体的纯化
- [0669] 将本发明的各个抗体的各条链均送金唯智基因合成，并分别构建到pCDNA3.1模板质粒上，并制备一定量的质粒。实施例中用到的各个抗体的链的序列总结见表4。

表 4 构建的二硫键重塑的双特异性抗体

抗体名称	Her2/Herl_WT	Her2/Herl_126C_121C	Her2/Herl_126C_124C	Her2/PD-1_WT	Her2/PD-1_126C_121C	Her2/PD-1_126C_124C
重链位置突变	WT	F126C	F126C	WT	F126C	F126C
轻链位置突变	WT	S121C	Q124C	WT	S121C	Q124C
第一抗体重链	SEQ ID NO:39 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链, 其包含 knob 突变	SEQ ID NO:43 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链, 其包含 F126C 和 knob 突变斜体为包含 F126C 的 CH1 (SEQ ID NO:1)	SEQ ID NO:43	SEQ ID NO:39	SEQ ID NO:43	SEQ ID NO:43
第一抗体重链 VH	SEQ ID NO:75 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链 VH, 无突变					
第一抗体轻链	SEQ ID NO:40 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链	SEQ ID NO:44 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链, 其包含 S121C	SEQ ID NO:45 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链, 其包含 Q124C	SEQ ID NO:40	SEQ ID NO:44	SEQ ID NO:45
第一抗体轻链 VL	SEQ ID NO:76 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链 VL, 无突变					
第二抗体重链	SEQ ID NO:41 抗 Herl 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)重链, 其包含 hole 突变	SEQ ID NO:46 Similimab (抗 PD-1) 重链, 其包含 AA 突变 和 hole 突变				

第二抗体重链 VH	SEQ ID NO:77 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)重链 VH		SEQ ID NO:79 Sintilimab (抗 PD-1) 重链 VH	
第二抗体轻链 VL	SEQ ID NO:42 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)轻链		SEQ ID NO:47 Sintilimab (抗 PD-1) 轻链, 其包含 kappa 轻链恒定区?	
第二抗体轻链 VL	SEQ ID NO:78 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL		SEQ ID NO:80 Sintilimab (抗 PD-1) 轻链 VL	

	表 7 组合 1 即 Her2_126C_124C/Hel	表 7 组合 2	表 7 组合 3	
第一抗体重链	SEQ ID NO:43	SEQ ID NO:48 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链, 其包含 F126C 和 C220S	SEQ ID NO:21 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链, 其包含 Q39K、F126C 和 C220S, 以及 Knob 突变	
第一抗体重链 VH	SEQ ID NO:75	SEQ ID NO:75 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链 VH, 无突变	SEQ ID NO:3 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-VH, 其包含 Q39K	
第一抗体轻链	SEQ ID NO:45	SEQ ID NO:49 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链, 其包含 Q124C 和 C214S	SEQ ID NO:22 曲妥珠单抗 TZB-轻链, 其包含 Q38D、Q124C 和 Q214S 突变	
第一抗体轻链 VL	SEQ ID NO:76	SEQ ID NO:76 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链 VL, 无突变	SEQ ID NO:4 曲妥珠单抗 TZB-VL, 其包含 Q38D	

第二抗体重链	SEQ ID NO:41	SEQ ID NO:41	SEQ ID NO:41	SEQ ID NO:41
第二抗体重链 VH	SEQ ID NO:77		SEQ ID NO:77	SEQ ID NO:77
第二抗体轻链	SEQ ID NO:42		SEQ ID NO:42	SEQ ID NO:42
第二抗体轻链 VL	SEQ ID NO:78		SEQ ID NO:78	SEQ ID NO:78

	表 8Her2/PD-1	表 8Her2/CD47	表 8Her2/cMET	
第一抗体重链	SEQ ID NO:21	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链, 其包含 Q39K、F126C 和 C220S, 以及 Knob 突变		
第一抗体重链 VH	SEQ ID NO:3	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-VH, 其包含 Q39K		
第一抗体轻链	SEQ ID NO:22	曲妥珠单抗 TZB-轻链, 其包含 Q38D、Q124C 和 Q214S 突变		
第一抗体轻链 VL	SEQ ID NO:4	曲妥珠单抗 TZB-VL, 其包含 Q38D		
第二抗体重链	SEQ ID NO:46	SEQ ID NO:50 AD126630 重链	SEQ ID NO:52 Onartuzumab 重链	
第二抗体重链 VH	SEQ ID NO:79	SEQ ID NO:81 AD126630 重链 VH	SEQ ID NO:18 Onartuzumab 重链 VH	
第二抗体轻链	SEQ ID NO:47	SEQ ID NO:51 AD126630 轻链	SEQ ID NO:53 Onartuzumab 轻链	

第二抗体轻链 VL	SEQ ID NO:80 Sintilimab (抗 PD-1) 轻链 VL, 无突变	SEQ ID NO:82 ADI26630 轻链 VL	SEQ ID NO:17 Onartuzumab 轻链 VL	
第一抗体重链	表 9 或表 10 组合 1 SEQ ID NO:21 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链 包含 Q39K、F126C 和 C220S, 以及 Knob 突变	表 9 或表 10 组合 2 SEQ ID NO:25 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链, 其包含 L45K、F126C、C220S 突变和 knob 突变	表 9 或表 10 组合 3 SEQ ID NO:25	表 9 或表 10 组合 4 SEQ ID NO:31 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链, 其包含 Y91K_F126C_C220S 和 knob 突变
第一抗体重链 VH	SEQ ID NO:3 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-VH, 其包含 Q39K	SEQ ID NO:7 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-VH, 其包含 L45K	SEQ ID NO:7	SEQ ID NO:13 曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-VH, 其包含 Y91K
第一抗体轻链	SEQ ID NO:22 曲妥珠单抗 TZB-轻链, 其包含 Q38D、Q124C 和 Q214S 突变	SEQ ID NO:26 曲妥珠单抗 TZB-轻链, 其包含 Q38D、Y87D_Q124C_C214S	SEQ ID NO:29 曲妥珠单抗 TZB-轻链, 其包含 P44D、Q124C、C214S	SEQ ID NO:29 曲妥珠单抗 TZB-轻链, 其包含 A43D_Q124C_C214S
第一抗体轻链 VL	SEQ ID NO:4 曲妥珠单抗 TZB-VL, 其包含	SEQ ID NO:8 曲妥珠单抗 TZB-VL, 其包含	SEQ ID NO:11 曲妥珠单抗 TZB-VL, 其包含	SEQ ID NO:11 曲妥珠单抗 TZB-VL, 其包含

	Q38D	Y87D	P44D	A43D	
第二抗体重链	SEQ ID NO:23 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-重链, 其包含 Q39D 和 Hole 突变	SEQ ID NO:27 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-重链, 其包含 L45D 和 hole 突变	SEQ ID NO:27	SEQ ID NO:33 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-重链, 其包含 Y91D 和 hole 突变	SEQ ID NO:33
第二抗体重链 VH	SEQ ID NO:5 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VH, 其包含 Q39D	SEQ ID NO:9 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VH, 其包含 L45D	SEQ ID NO:9	SEQ ID NO:15 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VH, 其包含 Y91D	SEQ ID NO:15
第二抗体轻链	SEQ ID NO:24 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-轻链, 其包含 Q38K 突变	SEQ ID NO:28 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-轻链, 其包含 Y87K 突变	SEQ ID NO:30 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-轻链, 其包含 P44K 突变	SEQ ID NO:34 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-轻链, 其包含 A43K 突变	SEQ ID NO:30
第二抗体轻链 VL	SEQ ID NO:6 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL, 其包含 Q38K	SEQ ID NO:10 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL, 其包含 Y87K	SEQ ID NO:12 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL, 其包含 P44K	SEQ ID NO:16 抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL, 其包含 A43K	SEQ ID NO:12

	表 11	表 11	表 11	表 11	表 11
	GPRC5D/CD3-1	11-GPRC5D/CD3-2	GPRC5D/CD3-3	11-GPRC5D/CD3-4	GPRC5D/CD3-5
轻链 2	SEQ ID NO: 56	SEQ ID NO: 60	SEQ ID NO: 56	SEQ ID NO: 60	SEQ ID NO: 56
轻链 2 可变区	SEQ ID NO: 83	SEQ ID NO: 93	SEQ ID NO: 83	SEQ ID NO: 93	SEQ ID NO: 83
重链 2	SEQ ID NO: 57	SEQ ID NO: 61	SEQ ID NO: 57	SEQ ID NO: 61	NA
重链 2	SEQ ID NO: 87	SEQ ID NO: 94	SEQ ID NO: 87	SEQ ID NO: 94	NA

可变区	SEQ ID NO: 59	SEQ ID NO: 63	SEQ ID NO: 59	SEQ ID NO: 63	SEQ ID NO: 59	SEQ ID NO: 63
轻链 1	SEQ ID NO: 92	SEQ ID NO: 97	SEQ ID NO: 92	SEQ ID NO: 97	SEQ ID NO: 92	SEQ ID NO: 97
轻链 1 可变区						
重链 1	SEQ ID NO: 58	SEQ ID NO: 62	SEQ ID NO: 64	SEQ ID NO: 65	SEQ ID NO: 66	SEQ ID NO: 67
重链 1 可变区 1	SEQ ID NO: 87	SEQ ID NO: 95	SEQ ID NO: 87	SEQ ID NO: 95	SEQ ID NO: 87	SEQ ID NO: 95
重链 1 可变区 2	SEQ ID NO: 91	SEQ ID NO: 96	SEQ ID NO: 91	SEQ ID NO: 96	SEQ ID NO: 91	SEQ ID NO: 96

[0670] 用0.22 μm的滤头过滤，用于细胞的瞬转表达。根据所需转染体积传代Expi293细胞(Invitrogen)，转染前一天将细胞密度调整至3 × 10⁶个细胞/ml。转染当天细

胞密度再次调整为 3×10^6 个细胞/ml。取终体积1/10(v/v)的Opti-MEM培养基(Gibco货号: 31985-070)作为转染缓冲液,按照抗体A重链:抗体A轻链:抗体B重链:抗体B轻链=1:1:1:1或其它更适合的比例,加入表达质粒,混匀。加合适的聚乙烯亚胺(PEI)(Polysciences, 23966)到上一步的质粒中(质粒与PEI的质量比例为1:3),混匀后室温孵育10min,获得DNA/PEI混合物。将DNA/PEI混合物轻柔倒入HEK293细胞并混匀,在37℃,8%CO₂的条件下培养24h后,补加VPA(Sigma, 货号: P4543-100G)使终浓度至2mM及2%(v/v)Feed(1g/L Phytone Peptone+1g/L Difco Select Phytone),继续培养6天。收集培养物,以4000转/分钟离心30分钟,取细胞上清用0.45 μm滤膜过滤,通过ProteinA亲和层析进行纯化,特殊需求的样品进一步通过离子交换层析、KappaSelect亲和层析和LambdaFabSelect亲和层析进行纯化。

- [0671] 具体的ProteinA亲和层析纯化操作步骤为:用预装柱Hitrap Mabselect Sure(GE,11-0034-95)纯化上清液。操作如下:纯化前用5倍柱体积的平衡液(20mM Tris,150mM NaCl,pH7.2)平衡填料柱;将收集的上清通过柱子,再用10倍柱体积的平衡液清洗填料柱,去除非特异性结合蛋白;用5倍柱体积的洗脱缓冲液(100mM sodium citrate, pH 3.5)冲洗填料,收集洗脱液。加入2M Tris中和pH到6.5。用液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)对纯化后的双特异性抗体进行正确配对比例定量测定。
- [0672] 具体的离子交换层析纯化操作步骤为:使用超滤浓缩管(MILLIPORE, 货号: UFC901096)交换到pH6.0低盐PB缓冲液(10mM磷酸盐, pH6.0)中,并用Capto HiRes S 10/100(GE, 货号29275879)进行精细纯化。纯化前用5倍柱体积的pH6.0低盐PB缓冲液平衡填料柱;将换液后的样品通过柱子,再用10倍柱体积的pH6.0低盐PB缓冲液清洗填料柱,去除非特异性结合蛋白;洗脱时,线性增加pH6.0高盐PB缓冲液(10mM磷酸盐, pH 6.0, 1M NaCl)的浓度(线性梯度:30个柱体积分内将pH6.0高盐PB缓冲液比例从30%增加到100%),收集洗脱主峰。使用超滤浓缩管(MILLIPORE, 货号: UFC901096)交换到PBS缓冲液(Gibco, 货号: 70011-044)中。用液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)对纯化后的双特异性抗体进行正确配对比例定量测定。

- [0673] 具体的KappaSelect亲和层析纯化操作步骤为：用预装柱HiTrap KappaSelect(GE,17-5458-11)纯化上清液。操作如下：纯化前用5倍柱体积的平衡液(PBS,pH7.4)平衡填料柱；将收集的上清通过柱子，再用10倍柱体积的平衡液清洗填料柱，去除非特异性结合蛋白；用5倍柱体积的洗脱缓冲液(0.1M甘氨酸缓冲液,pH 2.5)冲洗填料，收集洗脱液。加入2M Tris中和pH到6.5。用液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)对纯化后的双特异性抗体进行正确配对比例定量测定。
- [0674] 具体的LambdaFabSelect亲和层析纯化操作步骤为：用预装柱HiTrap LambdaFabSelect(GE,17-5482-11)纯化上清液。操作如下：纯化前用5倍柱体积的平衡液(PBS,pH7.4)平衡填料柱；将收集的上清通过柱子，再用10倍柱体积的平衡液清洗填料柱，去除非特异性结合蛋白；用5倍柱体积的洗脱缓冲液(0.1M醋酸盐缓冲液,pH 3.5)冲洗填料，收集洗脱液。加入2M Tris中和pH到6.5。用液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)对纯化后的双特异性抗体进行正确 配对比例定量测定。
- [0675] 实施例3本发明中突变氨基酸的筛选
- [0676] 筛选能正确形成二硫键的突变位点
- [0677] 以曲妥珠单抗为模型抗体，突变去除天然重链和轻链之间的二硫键(重链C220S，轻链C214S)，然后按照表1所选的氨基酸对，突变为半胱氨酸。将突变体单抗在HEK293系统中进行表达，用protein A纯化后进行非还原聚丙烯酰胺凝胶电泳，如图9A-图9C。可以看到，这些突变体单抗在非还原聚丙烯酰胺凝胶电泳中能够维持完整分子，只有很少的轻链掉落成分，所选二硫键突变位点基本都正常形成了二硫键。
- [0678] 进一步的，将这些形成了二硫键的抗体进行变性非还原毛细管电泳(nrCE-SDS)(图9D-图9M)，对于二硫键形成的完整性进行量化测量。可以看到，二硫键重塑抗体的完整分子均在98%以上，进一步证明了重塑的二硫键都能正确形成。
- [0679] 二硫键重塑突变对正确配对比例的影响
- [0680] 按照表1中的F126C/Q124C二硫键重塑突变为例测试二硫键重塑突变对正确配对比例的影响，应用本发明的突变的抗体和作为对照的野生型抗体序列。在HEK293细胞中表达后，只用protein A亲和层析纯化，避免其它纯化方式对于错

配分子的去除作用。用LC-MS测试anti-Her2/anti-Hel抗体对和anti-Her2/anti-PD-1抗体对组成双特异性抗体时的正确配对比例。重链之间通过Knob into hole促进异源配对。

[0681] 表5二硫键重塑的双特异性抗体以及正确配对比例

抗体名称	正确配对分子比例
Her2/Hel_WT	30.27%
Her2/Hel_126C_121C	58.18%
Her2/Hel_126C_124C	65.10%
Her2/PD-1_WT	55.60%
Her2/PD-1_126C_121C	70.78%
Her2/PD-1_126C_124C	76.93%

[0682] 由上表可以看出，F126C/Q124C突变能够显著提高双特异性抗体的正确配对比例，例如Her2/PD-1抗体对的野生型抗体对的正确配对比例已达55.60%。加上F126C/Q124C突变后，正确配对比例可进一步达到76.93%。

[0683] 可见，F126C/Q124C突变形成的正确配对分子比例最高，明显高于野生型 抗体序列，也一定程度高于CN104011221B中公布的突变F126C/S121C。

[0684] 此外，如果突变的半胱氨酸对之间没有正确形成二硫键，具有完整巯基的半胱氨酸往往会和细胞或者溶液中的游离半胱氨酸反应形成二硫键，导致蛋白分子被半胱氨酸化修饰。此修饰可以被LC-MS检测到。

[0685] 表6二硫键重塑的双特异性抗体的半胱氨酸修饰测试

抗体名称	半胱氨酸修饰比例
Her2/Hel_WT	N/A
Her2/Hel_126C_121C	N/A
Her2/Hel_126C_124C	N/A
Her2/PD-1_WT	N/A
Her2/PD-1_126C_121C	10%
Her2/PD-1_126C_124C	N/A

[0686] 无论是在Her2/Her1双抗中，还是在Her2/PD-1双抗中，F126C/Q124C突变几乎检测不到游离半胱氨酸被修饰的成分，进一步说明二硫键正确形成的比例很高。相对的，引入了CN104011221B中公布的突变F126C/S121C的Her2/PD-1双特异性抗体还是存在约10%游离半胱氨酸被修饰的成分，意味着部分F126C/S121C二硫键未能完全正确形成。

[0687] 二硫键重塑突变结合V区电荷突变

[0688] 在二硫键重塑突变(F126C/Q124C)的基础上结合电荷突变(Q39K/Q38D)突变，在HEK293细胞中表达后，只用protein A亲和层析纯化，避免其它纯化方式对于错配分子的去除作用。用LC-MS测试anti-Her2/anti-Her1抗体对组成双特异性抗体时的正确配对比例(图2)。重链之间通过Knob into hole促进异源配对。

[0689] 表7二硫键重塑结合电荷突变的双特异性抗体正确配对比例

	重链 VH 突变	重链 CH1 突变	轻链 VL 突变	轻链 CL 突变	正确配对分子比例
组合 1	N/A	F126C	N/A	Q124C	47.4%
组合 2	N/A	F126C, C220S	N/A	Q124C, C214S	65.6%
组合 3	Q39K	F126C, C220S	Q38D	Q124C, C214S	96.3%

[0690] 可以看到，二硫键重塑后，双特异性抗体正确配对率显著提高。在移除抗体天然的二硫键之后(表7组合2，图2B)，比仅仅添加二硫键(表7组合1，图2A)的正确配对率进一步提高。进一步的，在V区加入电荷突变后(表7组合3，图2C)，正确配对率还会进一步提高。

[0691] 用4对不同的抗体对组合双抗，在HEK293细胞中表达后，只用protein A亲和层析纯化，避免其它纯化方式对于错配分子的去除作用。用LC-MS测试组成双特异性抗体时的正确配对比例(图3)。验证二硫键重塑结合电荷突变对于不同的抗体具备通用性。同时，观察抗体表达量水平。

[0692] 表8-1不同抗体对引入二硫键重塑结合电荷突变后的抗体序列以及正确配对比例

抗体对	突变	正确配对分子比例	表达量 (mg/L)
Her2/PD-1	Q39K,F126C,C220S/ Q38D,Q124C,C214S	86.1%	199.6
Her2/CD47		89.1%	234.8
Her2/cMET		94.6%	222.9

[0693] 4组不同的抗体组合都维持了90%左右的正确配对比例，说明二硫键重塑结合电荷突变对于不同的抗体具备通用性。从表达量看，4组不同的抗体组合都可以达到200mg/L左右的水平，达到了较高的表达量，水平与单抗相当。

[0694] 二硫键重塑突变结合不同位置电荷突变对正确配对比例的影响

[0695] IgG在细胞中组装分泌的天然过程是：重链在细胞内表达后，CH1与分子伴侣BiP结合，在遇到轻链之前都保持不完全折叠状态。遇到轻链后，轻链首先通过VL与VH结合，然后CL替换掉BiP并与CH1结合，在CL的帮助下，CH1完全折叠，轻重链装配完成。(Matthias J.Feige,An Unfolded CH1 Domain Controls the Assembly and Secretion of IgG Antibodies,Molecular Cell.2009 Jun 12; 34(5):569-79)。由此生物学过程可知，VH和VL的相互识别是驱动轻重链装配的第一过程，所以，本发明的电荷突变主要设计在VH和VL的区域。为了进一步证明我们的设计优效性，我们也同时在CH1和CL之间引入电荷，来对比电荷突变位于V区和C区对于正确配对比例的影响。包含表8-2中任一项突变的Her2/Her1双特异性抗体与包含表7组合3的抗体在序列上的区别仅在于所列出的突变组合的区别，其他序列不变。

[0696] 表8-2二硫键重塑突变结合不同位置电荷突变对于轻重链正确配对比例的影响

电荷突变	二硫键重塑突变	正确配对分子比例
Q39K/Q38D (V区)	F126/Q124	96.34%

H171K+T190K/N137D (C区)	F126/Q124	77.89%
K216E/E123R (C区)	F126/Q124	55.87%

[0697] 可以看到，在相同的二硫键重塑突变基础上，组合位于V区的Q39K/Q38D电荷突变和位于C区的H171K+T190K/N137D和K216E/E123R电荷突变，位于V区的电荷突变会带来高的正确配对分子比例。证明电荷位于V区的设计优效性。

[0698] 其它的V区电荷突变与二硫键重塑的组合

[0699] 除了Q39K和Q38D之外，将其它发现的V区电荷突变与二硫键重塑突变F126C/Q124C进行组合，形成表3中的组合1-组合5。在HEK293细胞中表达后，只用protein A亲和层析纯化，避免其它纯化方式对于错配分子的去除作用。用LC-MS测试组成双特异性抗体时的正确配对比例(图4)。重链之间通过Knob into hole促进异源配对。同时，观察抗体表达量水平。

[0700] 表9-1 V区突变结合二硫键重塑后正确配对的分子比例

抗体对	突变	正确配对的分子比例	表达量 (mg/L)
Her2/Her	组合 1	92.17%	305.6
	组合 2	98.88%	221.0
	组合 3	99.11%	183.5
	组合 4	98.47%	83.8
	组合 5	99.47%	104.6

[0701] 组合1到组合5的突变方式均能达到超过90%的正确配对率。组合1到组合3可以达到与单抗相近的表达量(200-300mg/L)。组合4与组合5的表达量略低，但也可以达到100mg/L左右。因此，包含本发明的突变组合的双特异性抗体能达到较好的表达水平。

[0702] V区电荷突变与其它二硫键重塑突变的组合

[0703] 除了F126C/Q124C之外，将其它发现的二硫键重塑突变与V区电荷突变Q39K和Q38D进行组合，形成表3中的组合6-组合14。包含表3中组合6-组合14中任一项突变的Her2/Her双特异性抗体与包含表3中组合1-5中任一项在序列上的区别仅在于所列出的突变组合的区别，其他序列不变。

[0704] 在HEK293细胞中表达后，只用protein A亲和层析纯化，避免其它纯化方式对于错配分子的去除作用。用LC-MS测试组成双特异性抗体时的正确配对比例。重链之间通过Knob into hole促进异源配对。同时，观察抗体表达量水平。

[0705] 表9-2 V区电荷突变结合二硫键重塑突变后正确配对的分子比例

抗体对	突变	正确配对的分子比例	表达量 (mg/L)
Her2/Her1	组合 6	83.90%	199.6
	组合 7	97.50%	229.5
	组合 8	98.90%	243.2
	组合 9	91.90%	252.9
	组合 10	80.52%	253.2
	组合 11	79.46%	264.1
	组合 12	86.86%	262.2
	组合 13	93.16%	224.0
	组合 14	83.82%	246.1

[0706] 组合6到组合14的突变方式能使得双抗达到79.46%~98.90%的正确配对率，表达量均能达到与单抗相似的水平(200-300mg/L)。因此，包含本发明的突变组合的双特异性抗体均能达到较好的正确配对比例和表达水平。

[0707] 实施例4.本发明中抗体的亲和力测定实验

[0708] 采用生物膜薄层干涉(Biolayer Interferometry, BLI)技术测定本发明中的双特异性抗体结合各自抗原的平衡解离常数(KD)。BLI法亲和力测定按照现有的方法(Estep,P等人, High throughput solution Based measurement of antibody-antigen affinity and epitope binning.MAbs,2013.5(2):第270-8页)进行。

[0709] 实验开始前半个小时，根据样品数量，取合适数量的ProA(ForteBio, 18-5010)传感器浸泡于SD buffer(PBS 1×, BSA 0.1%, Tween-20 0.05%)中。取100 μl的SD缓冲液、抗原融合蛋白分别加入到96孔黑色聚苯乙烯半微量孔板(Greiner, 675076)中。根据样品位置布板，选择传感器位置。仪器设置参数如下：运行步骤：Baseline、Loading~1nm、Baseline、Association和Dissociation；各个

步骤运行时间取决于样品结合和解离速度，转速为400rpm，温度为30度。使用 ForteBio 分析软件分析KD值。

[0710] 以抗-Her2抗体作为模板，引入表3中的组合1-组合5突变后，与其抗原Her2的亲和力数据见下表。

[0711] 表10.示例抗体与人Her2的亲和力检测

Name	Antigen	kon(1/Ms)	kdis(1/s)	KD (M)
WT	人 Her2	2.68E+05	2.00E-04	7.46E-10
组合 1		2.49E+05	2.00E-04	8.05E-10
组合 2		2.68E+05	2.00E-04	7.48E-10
组合 3		2.64E+05	2.00E-04	7.58E-10

组合 4		2.62E+05	2.00E-04	7.64E-10
组合 5		2.78E+05	2.00E-04	7.20E-10

[0712] 由以上图表结果可见，各突变体与野生型抗体在亲和力上没有明显差异。本发明所述在V区的轻重链结合面上引入的突变和二硫键的改变不会影响抗体亲和力。

[0713] 实施例5.多价构型拓展

[0714] 应用本发明的双特异性抗体除了单价1+1构型(图1)外，还可以拓展出多价的2+1N端构型(图5A)，2+1C端构型(图5B)，2+2C端构型(图5C)，等多种模式。除串联Fab构型无需重链异源配对外，重链之间通过本公司的Innobody突变促进异源配对。

[0715] 按照实施例2的方法表达和纯化多价的2+1N端构型，2+1C端构型，2+2C端构型并用质谱检测正确配对比例(图6)，结果总结参见表11。

[0716] 表11多价构型分子的正确配对比例

抗体编号	抗体对	构型	突变	正确配对的分子比例
GPRC5D/CD3-1	GPRC5D/CD3	2+1N 端构型	仅二硫键重塑	37.80%
GPRC5D/CD3-2	GPRC5D/CD3	2+1N 端构型	二硫键重塑结合电荷突变	99.32%
GPRC5D/CD3-3	GPRC5D/CD3	2+1C 端构型	仅二硫键重塑	59.10%
GPRC5D/CD3-4	GPRC5D/CD3	2+1C 端构型	二硫键重塑结合电荷突变	98.58%
GPRC5D/CD3-5	GPRC5D/CD3	2+2C 端构型	仅二硫键重塑	42.60%
GPRC5D/CD3-6	GPRC5D/CD3	2+2C 端构型	二硫键重塑结合电荷突变	98.89%

[0717] 由上表中结果所示，本专利所声明的突变应用于多价构型的分子时，仍能保持很高的正确配对比例。且在应用于多价构型分子时，同样可以看到，二硫键重塑结合电荷突变，比仅二硫键重塑突变，正确配对比例提高的更高。

[0718] 实施例6.细胞杀伤实验

[0719] BCMA/GPRC5D/CD3三抗(野生型和引入本专利所声明的突变，构型见图7，序列参见序列表)同时与H929细胞表面的BCMA或GPRC5D和原代PBMC中的T细胞表面的CD3结合，激活T细胞，介导T细胞对BCMA或GPRC5D阳性肿瘤细胞的杀伤。本研究利用乳酸脱氢酶(LDH)法检测PBMC与BCMA阳性的H929细胞以及GPRC5D阳性的H929细胞共培养条件下，加入示例抗体24小时后收集的上清中死细胞释放的LDH的水平，从而评估抗体介导的T细胞对BCMA肿瘤细胞以及GPRC5D肿瘤细胞的杀伤能力。通过未引入本发明电荷突变和二硫键重塑突变的BCMA/GPRC5D/CD3三抗(图7A)和引入本专利所声明的突变的BCMA/GPRC5D/CD3三抗(图7B)，评估本专利声明的突变对于该三抗分子的影响。

[0720] 从液氮罐中取出PBMC(赛笠生物，SLB-HP100A)于37℃快速融化，滴加入预热的1640培养基(Gibco，22400-071)(含0.1% DNA酶)中，得混合液10ml。400g离

心5分钟，用10ml的1640培养基重悬，并加入10 μ l DNA酶，37℃、5% CO₂、贴壁培养过夜。吸取悬浮细胞400g离心5分钟，用1640培养基重悬，计数，并将细胞密度调整为4 $\times$ 10⁶ cell/ml，作为效应细胞。BCMA或GPC5D阳性H929细胞(ATCC,CRL-9068)作为靶细胞，400g离心5分钟，用1640培养基重悬，计数，并将细胞密度调整为2 $\times$ 10⁵ cell/ml。将调整好细胞密度的靶细胞加到96孔板中，每孔100 μ l；将梯度稀释好的抗体加到96孔板中，每孔50 μ l；再将效应细胞PBMC加到96孔板中，每孔50 μ l。最终效靶比为10:1。将上述96孔板置于37℃、5% CO₂培养箱中培养24小时后取上清，按照LDH检测试剂盒(CytoTox96non-radioactive cytotoxicity kit, Promega)说明书检测死细胞释放到上清中的LDH的含量，然后计算示例抗体对MM细胞的杀伤比例。

[0721] 在如以上测定法所述进行的实验中，示例抗体能够剂量依赖性地诱导人PBMC对H929细胞的杀伤作用(见图8)。

[0722] 在如以上测定法所述进行的实验中，比较了示例抗体在诱导同一供者来源的PBMC对BCMA或GPC5D阳性的H929细胞系的杀伤作用，是否引入本专利所声明的突变，对于示例抗体的杀伤能力没有影响。但引入本专利所声明的突变后，示例抗体可以在一个细胞系中表达制备，节省了在两个细胞系中表达制备和体外重组的麻烦。

说明书中	SEQ ID NO	注释	序列（突变位点下划线标记）	描述
表 1	1	F126C	ASTKGPSV C PLAPSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTISGVHTFP PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSC	CHI(IgG1 的 CHI), 含有 126C 突变
	2	Q124C	RIVAAPSVFHEPPSD E CLKSGTASVVCLLNNEYPREAKVQWKVDNALQSGNSQ ESVTEQDSKDSITYSLSSITLTL S KADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRG E C	CL (Kappa), 含有 124C 突变
表 2: 组合 1	3	抗体 1, 重链, 突变 Q39K	EVQLVESGGGLVQPQGGSLRLS C AAASGFNIKDTYIHWVR K APGKGLEWVARIY PINGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMN S LRAEDTAVYYC S RWGGDGF YAMDYWGQGTTLVTVSS	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-VH, 其包含 Q39K
	4	抗体 1, 轻链, 突变 Q38D	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQ D KPGKAPKLLIYSASF LYSGVPSRFSRSGSGTIDFTLTIS S LQPEDFATYYC Q QHYYTTPTEFGQGTKVEIK	曲妥珠单抗 TZB-VL, 其包含 Q38D
	5	抗体 2, 重链, 突变 Q39D	EVRLLESGGGLVQPQGGSLRLS C AAASGFTEFSNYAMGWVR D APGKGLEWVSAIS GSGGSTYYADSVKGRFTTSRD D SKNALYLQMN S LRAEDTAVYYCARGGGPGW YAADYWGQGTTLVTVSS	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VH, 其包含 Q39D
	6	抗体 2 轻链突变 Q38K	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQISSYLNWY Q KKPGKAPKLLIYAASSL QSGVPSRFSRSGSGTIDFTLTIS S LQPEDFATYYC Q QADLPAAFAFGGGTKVEIK	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL, 其包含 Q38K
	7	抗体 1, 重链, 突变 L45K	EVQLVESGGGLVQPQGGSLRLS C AAASGFNIKDTYIHWVRQAPGKGKEWVARIY PINGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMN S LRAEDTAVYYC S RWGGDGF YAMDYWGQGTTLVTVSS	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-VH, 其包含 L45K
	8	抗体 1, 轻链, 突变 Y87D	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQ Q KPGKAPKLLIYSASF LYSGVPSRFSRSGSGTIDFTLTIS S LQPEDFATYY D CQQHYYTTPTEFGQGTKVEIK	曲妥珠单抗 TZB-VL, 其包含 Y87D
	9	抗体 2, 重链, 突变 L45D	EVRLLESGGGLVQPQGGSLRLS C AAASGFTEFSNYAMGWVRQAPGKG D EWVSAIS GSGGSTYYADSVKGRFTTSRD D SKNALYLQMN S LRAEDTAVYYCARGGGPGW YAADYWGQGTTLVTVSS	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VH, 其包含 L45D
	10	抗体 2, 轻链, 突变 Y87K	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQISSYLNWY Q KQPGKAPKLLIYAASSL QSGVPSRFSRSGSGTIDFTLTIS S LQPEDFATY K CQQADLPAAFAFGGGTKVEIK	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL, 其包含 Y87K
表 2: 组合 3	7	抗体 1, 重链,	SEQ ID NO:7	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-VH

表 2: 组合 4	11	突变 L45K 抗体 1, 轻链, 突变 P44D	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGK A DKLLIYSASF LYSGVPSRISGSRSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQIYITPPTFGGQTKVEIK	曲妥珠单抗 T1ZB-VL, 其包含 P44D
	9	抗体 2, 重链, 突变 L45D	SEQ ID NO:9	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌 酶)-VH, 其包含 L45D
	12	抗体 2, 轻链, 突变 P44K	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISSYLNWYQQKPGK A KKLLIYAASLL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQADLPAPAFEGGGTKVEIK	抗 Ilc1 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL, 其包含 P44K
	13	抗体 1, 重链, 突变 Y91K	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFNKIDTYIHVVVRQAPGKGLEWVARINYP INGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVY K CSRWGGDGF YAMDYWGQGLVTVSS	曲妥珠单抗 T1ZB(抗-Her2)-VH
	14	抗体 1, 轻链, 突变 A43D	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGK D PKLLIYSASF LYSGVPSRISGSRSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQHYITPPTFGGQTKVEIK	曲妥珠单抗 T1ZB-VL, 其包含 A43D
	15	抗体 2, 重链, 突变 Y91D	EVRLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSNYAMGWVRQAPGKGLEWVSAIS GSGGTYYADSVKGRFTTSRDSDSKNALYQMNSLRAEDTAVY D CARGGPGW YAADVWGQGTITVSS	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌 酶)-VH, 其包含 Y91D
表 2: 组合 5	16	抗体 2, 轻链, 突变 A43K	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISSYLNWYQQKPGK K PKLLIYAASLL QSGVPSRISGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQADLPAPAFEGGGTKVEIK	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL, 其包含 A43K
	13	抗体 1, 重链, 突变 Y91K	SEQ ID NO:13	曲妥珠单抗 T1ZB(抗-Her2)-VH, 其包含 Y91K
	11	抗体 1, 轻链, 突变 P44D	SEQ ID NO:11	曲妥珠单抗 T1ZB-VL
	15	抗体 2, 重链, 突变 Y91D	SEQ ID NO:15	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VH
	12	抗体 2, 轻链, 突变 Y91D	SEQ ID NO:12	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL

表 3: 组合 1		轻链, 突变 P44K			
	21	抗体 1, 重链, Q39K_F126C_C2 20S_knob	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFNIKDTYIHWVRKAPGKGLEWVARIYPTNGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLR AE DTAVVYCSRWGGDGEYAMDYWGQGTLLTVSSASTKGPSVCP L APSSKTSGGTAALGCLVKDYPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSDKTHITCPCPAPEAAAGGPSVFLPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTIVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTKISKAKGQPREPQVYITLPPCRDELTKNQVSLWCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK SEQ ID NO:3	曲妥珠单抗 T2B(抗-Her2)-重链, 包含 Q39K、F126C 和 C220S, 以及 Knob 突变	
	3	抗体 1, 重链 VH			
	22	抗体 1, 轻链, Q38D_Q124C_C 214S	DIQMTQSPSSLSASVGDRTVTITCRASQDVNTAVAWYQDKPKGKAPKLLIYSAFLYSGVPSRFSGRSGTDFTLTISSLPEDFAITYYCOQHYYTTPTEGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCCLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSITYSLSSITLILSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRG E S SEQ ID NO:4	曲妥珠单抗 T2B-轻链, 其包含 Q38D、Q124C 和 Q214S 突变	
	4	抗体 1, 轻链 VL,其包含 Q38D			
	23	抗体 2, 重链, Q39D_hole	EVRLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTISNYAMGWVVRDAPGKGLEWVSAISGSGSTYYADSVKGRFTTSRDDSKNALYLQMNSLR AE DTAVVYCARGGPGWYAADVWGQGTITVTSASTKGPSVFPLAPSSKTSGGTAALGCLVKDYFPEPTVTSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTITCPCPAPEAAAGGPSVFLPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTIVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTKISKAKGQPREPQVCTLPPSRDELTKNQVSLSCAVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK SEQ ID NO:5	抗 Hlel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-重链, 其包含 Q39D 和 Hlel 突变	
	5	抗体 2, 重链, Q39D_hole VII			抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VII, 其包含 Q39D
	24	抗体 2, 轻链, Q38K	DIQMTQSPSSLSASVGDRTVTITCRASQSISSVLYNWYQKPKGKAPKLLIYAASSLQSGVPSRFSGSGGTDFTLTISSLPEDFAITYYCOQADLPAAFAFGGQTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCCLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQES	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-轻链, 其包含 Q38K 突变	

	6	抗体 2, 轻链, Q38K VL	SVTEQDSKDSYSLSSITLTL SKADYE HKHVVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC SEQ ID NO:6	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL, 其包含 Q38K
表 3: 组合 2	25	抗体 1, 重链, L45K_F126C_C2 20S_knob	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFRNIKDTYHWVRQAPGKGKEWVARIY PTNGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYYCSRWGGDGF YAMDYYWGQGTILVTVSSASTIKGPSVCPPLAPSSKSTISGGTAAAGCLVKDYHPEP VTVSWNSGALTSVGHITPAVLQSSGLYSLSSVTVPPSSSLGTQTYICNVNHHKPS NTKVDKKVEPKSSDKTHITCPCPAPEAAGGPSVFLFPKPKDITLMISRTPEVTC VVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD WLNKEYCKKVSNAKALPAIEKTSKAKQPREPQVYTLPPCRDELTKNQVSL WCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRW QQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK SEQ ID NO:7	曲妥珠单抗 T2B(抗-Her2)-重 链,其包含 L45K、F126C、C220S 突变和 knob 突变
	7	抗体 1, 重链 VH	SEQ ID NO:7	
	26	抗体 1, 轻链, Y87D_Q124C_C 214S	DIQMTQSPFSLASVGDRTVITTCRASQDVNTAVAWYQQKPGKAPKLLIYSASF LYSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYDCQQHYITTPITGGGTKEIKR TVAAPSVFHEPPSDIECLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQE SVTEQDSKDSYSLSSITLTL SKADYE HKHVVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEG SEQ ID NO:8	曲妥珠单抗 T2B-轻链, 其包含 Y87D_Q124C_C214S
	8	抗体 1, 轻链 VL	SEQ ID NO:8	
	27	抗体 2, 重链, L45D_hole	EVRLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSNYAMGWVRQAPGKGDEWVSAIS GSGGSTYYADSVKGRFTTSRDDSKNALYQMNSLRAEDTAVYYCARGGPGW YAADVWGQGTITVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAAGCLVKDYFPEPV TVSWNSGALTSVGHITPAVLQSSGLYSLSSVTVPPSSSLGTQTYICNVNHHKPSN TKVDKKVEPKSCDKTHITCPCPAPEAAGGPSVFLFPKPKDITLMISRTPEVTCV VVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD WLNKEYCKKVSNAKALPAIEKTSKAKQPREPQVCTLPPSRDELTKNQVSL SCAVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK SEQ ID NO:9	抗 Ilc1 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-重 链, 其包含 L45D 和 hole 突 变
	9		SEQ ID NO:9	
	28	抗体 2, 轻链, Y87K	DIQMTQSPFSLASVGDRTVITTCRASQSISSVNLWYQQKPGKAPKLLIYAASL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYKCCQADLPAPAFGGGTKEIKR TVAAPSVFHEPPSDIEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQE SVTEQDSKDSYSLSSITLTL SKADYE HKHVVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-轻 链, 其包含 Y87K 突变

	10	抗体 2, 轻链 VL Y87K	SEQ ID NO:10		
表 3: 组合 3	25	抗体 1, 重链, L45K_F126C_C2 20S_knob	SEQ ID NO:25		曲妥珠单抗 TZB(抗-HER2)-重 链,其包含 L45K、F126C、C220S 突变和 knob 突变
	29	抗体 1, 轻链, P44D_Q124C_C2 14S	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDYNVAVYQQKPGKADKLLIYSASF LYSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCOQHYYTPTFGGQTKVEIKR TVAAPSVFIFPPSDVECLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQEQ SVTEQDSKDSITYSLSSITLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGGE		曲妥珠单抗 TZB-轻链, 其包含 P44D、Q124C、C214S
	11		SEQ ID NO:11		曲妥珠单抗 TZB-VL, 包含 P44D
	27	抗体 2, 重链, L45D_hole	SEQ ID NO:27		抗 HER 抗体(抗鸡溶菌酶)-重 链
	9		SEQ ID NO:9		抗 HER 抗体(抗鸡溶菌 酶)-VH, 其包含 L45D
	30	抗体 2, 轻链, P44K	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSSSYLNWYQQKPGKAKKLLIYAASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQADLPAAFGGGTKVEIKR TVAAPSVFIFPPSDVEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQEQ SVTEQDSKDSITYSLSSITLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC		抗 HER 抗体(抗鸡溶菌酶)-轻 链, 其包含 P44K 突变
	12		SEQ ID NO:12		抗 HER 抗体(抗鸡溶菌酶)-VL, 其包含 P44K
表 3: 组合 4	31	抗体 1, 重链, Y91K_F126C_C2 20S_knob	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGPNIKDTYIHVVYRQAPGKGLEWVARIYP TNGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYKCSRWGGDGF YAMDYWGQGLTVTVSSASTKGPSVCLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEP VTVSWNSGALTSGVHPHFPVAVLQSSGLYSLSVYTVPSSSLGTQIYICNVNIKPS NTKVDKKVEPKSDDKITITCPCPAPEAAGGPSVFLFPPKPKDITLMISRITPEVTC VVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVSVLTIVLHQD WLVNGKEYCKVKSNKALPAPIEKTIKAKGQPREPQVYTLPPCGRDELTKNQVSL WYCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRW QQGNVECSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK		曲妥珠单抗 TZB(抗-HER2)-重 链,其包含 Y91K、F126C、C220S 和 knob 突变
		13	SEQ ID NO:13		曲妥珠单抗 TZB(抗-HER2)-VL,

表 3: 组合 5	32	抗体 1, 轻链, A43D_Q124C_C 214S	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGK DP KLLIYSAF LYSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQHHYTPPTFGQGKVEIKR TVAAPSVFIFPPSDE CL KSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQE SVTEQDSKDSITYSLSSITLTLISKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSHNRG S SEQ ID NO:14	其包含 Y91K 曲妥珠单抗 T7B-轻链, 其包含 A43D_Q124C_C214S
	14			曲妥珠单抗 T7B-VL, 其包含 A43D
	33	抗体 2, 重链, Y91D_hole	EVRLLESGGGLVQPGSLRLSCAASGFTTFSNYAMGVWRQAPGKGLEWVSAIS GSGSTYYADSVKGRFTTSRDDSKNALYLQMNSLRAEIDTAVYDCARGGPGW YAADVWGQGTITVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPV TVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVIVPSSSLGTQTYICNVNHKPSN TKVDKKVEPKSCDKTHTIICPCPCPAPEAAAGGPSVFLFPPKPKDILMISRTPEVTCV VVDVSIEDPEVKFNWYVDGVEVFNIAKTRPREQYNSTIRRVSVLTVLIQD WLNQKEYKCKVSNKALPAPIEKITISKAKGQPREPQV C TLPPSRDELTKNQVSL SCA VKGFPYSDIAVEVESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLY S SKLTVDKSRWQ QGNVPSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK SEQ ID NO:15	抗 Hcl 抗体(抗鸡蛋溶酶)-重 链, 其包含 Y91D 和 hole 突变
	34	抗体 2, 轻链, A43K	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSSSYLNWYQQKPGK K KPLLIAASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQADLPAPAFGGGKVEIKR TVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQE SVTEQDSKDSITYSLSSITLTLISKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSHNRGEC SEQ ID NO:16	抗 Hcl 抗体(抗鸡蛋溶酶)-轻 链, 其包含 A43K 突变
	31	抗体 1, 重链, Y91K_F126C_C2 20S_knob	SEQ ID NO:31	曲妥珠单抗 T7B(抗-Her2)-重 链,其包含 Y91K_F126C_C220S 和 knob 突变
	13		SEQ ID NO:13	
	29	抗体 1, 轻链, P44D_Q124C_C2 14S	SEQ ID NO:29	曲妥珠单抗 T7B-轻链, 其包含 P44D, Q124C 和 C214S
	33	抗体 2, 重链, Y91D_hole	SEQ ID NO:33	抗 Hcl 抗体(抗鸡蛋溶酶)-重 链, 其包含 Y91D 和 hole 突变

30	抗体 2, 轻链, P44K	SEQ ID NO:30	抗 Hel 抗体(抗鸡溶菌酶)-轻链, 其包含 P44K 突变
39	TZB_HC_WT_knob	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFRNIKTDTIHWVRQAPGKGLIEWVARIYPTNGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYYCSRWGGDGFYAMDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVPPSSSLGTQIYICNVNHIKPSN TKVDKKVEPKSCDKTHCTCPAPEAAGGSPVFLPPKPKDITLMISRTPEVTCV VVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD WLNKEYCKCKVSNKALPAPIEKTIISKAKGQPREPQVYTLPPCQDELTKNQVSL WCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFFLYSKLTVDKSRWQQGNVPSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链, 其包含 knob 突变
75	TZB_IIC_WT_knob 的 VH	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFRNIKTDTIHWVRQAPGKGLIEWVARIYPTNGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYYCSRWGGDGFYAMDYWGQGTLVTVSS	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链 VH
40	TZB_LC_WT	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGKAPKLLIYSASF LYSGVPSRFSGSRSGTDFTLTISSLQPEDFAITYCQQHYTTPPTFGQGTIKVEIKR TVAAPSVHLEPPSQDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQE SVTEQDSKDSITYSLSSITLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSPVTKSFNRGEC	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链
76	可变区 VL	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGKAPKLLIYSASF LYSGVPSRFSGSRSGTDFTLTISSLQPEDFAITYCQQHYTTPPTFGQGTIKVEIK	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链 VL
41	Hel_HC_hole	EVRLLSEGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSNYAMGWVRQAPGKGLIEWVSAIS GSGGSTYYADSVKGRFTISRDDSKNALYLQMNSLRAEDTAVYYCARGGPGW YAADVWGQGTITVTVSSASTKGPSVFLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPV TVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVPPSSSLGTQIYICNVNHIKPSN TKVDKKVEPKSCDKTHCTCPAPEAAGGSPVFLPPKPKDITLMISRTPEVTCV VVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD WLNKEYCKCKVSNKALPAPIEKTIISKAKGQPREPQVCTLPPSRDELTKNQVSL SCAVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFFLYSKLTVDKSRWQQGNVPSCSVMIEALINIITYQKSLSLSPGK	抗 Hel 抗体(抗鸡溶菌酶)重链, 其包含 hole 突变
77	Hel_HC_hole VH	EVRLLSEGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSNYAMGWVRQAPGKGLIEWVSAIS GSGGSTYYADSVKGRFTISRDDSKNALYLQMNSLRAEDTAVYYCARGGPGW YAADVWGQGTITVTVSS	抗 Hel 抗体(抗鸡溶菌酶)重链 VH
42	Hel_LC	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISSVLYNWYQQKPGKAPKLLIYAASLL QSGVPSRFSGSGTDFTLTISSLQPEDFAITYCQQADLPFAFAEGGTTKVEIKR	抗 Hel 抗体(抗鸡溶菌酶)轻链

	78	Uel_LC_VL	TVAAPSVFIHPPSDQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSSTYSLSSTLTLSKADYEHKHYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)-VL
表 4: Her2/H el_126 C_121 C	43	TZB_HC_F126C_knob	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFRNIKDTYIHVVRAQPGKGLEWVARYP TNGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYCYCSRWGGDGF YAMDYWGQGTLLVTVSSASTKGPSTCPLAPSSKSTSGGT4ALGCLVKDYFPEPTV SWASGALISGHFHP4/LQSSGLYSSTVTVPSSTLGTQTYICNVNHPSPNKKVDDK VEPKSCDKTHTCTCPAPEAAGGPSVFLPPKPKDITLMISRTPEVTCVVVDVSH EDPEKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLIHQDWLNGKEY KCKVSNKALPAPIEKTTISKAKGQPREPQVYTLPTCRDELTKNQVSLWCLVKGF YPSDIAVEWESNGQPENNYKTPPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFC SVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链, 其包含 F126C 和 knob 突变斜体为包含 F126C 的 CH1 (SEQ ID NO:1)
	75	TZB_IIC_WT_knob 的 VH	SEQ ID NO:75	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链 VH
	44	TZB_LC_S121C	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGKAPKLLIYSASF LYSGVPSRFSGSRSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQHYTTPPTFGQGTKVEIKR TVAAPSVFIHPPSDQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQES SVTEQDSKDSSTYSLSSTLTLSKADYEHKHYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链, 其包含 S121C
	76	可变区 VL	SEQ ID NO:76	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链 VL
表 4: Her2/H el_126 C_124 C	41	Hel_HC_hole	SEQ ID NO:41	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)重链, 其包含 hole 突变
	42	Hel_LC	SEQ ID NO:42	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)轻链
	43	TZB_HC_F126C_knob	SEQ ID NO:43	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链, 其包含 F126C 和 knob 突变
	45	TZB_LC_Q124C	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGKAPKLLIYSASF LYSGVPSRFSGSRSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQHYTTPPTFGQGTKVEIKR TV44PSVFIHPPSDQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTE QDSKDSSTYSLSSTLTLSKADYEHKHYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链, 其包含 Q124C 斜体为包含 Q124C 的 CL (SEQ ID NO:2)
	76	可变区 VL	SEQ ID NO:76	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链 VL
	41	Uel_IIC_hole	SEQ ID NO:41	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)重链, 其包含 hole 突变

表 4: Her2/P D-1_12 W T	42	Hel_LC	SEQ ID NO:42	抗 Hel 抗体(抗鸡溶菌酶)轻链
	39	TZB_HC_WT_kn ob	SEQ ID NO:39	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重 链, 其包含 knob 突变
	40	TZB_LC_WT	SEQ ID NO:40	曲妥珠单抗 TZB-轻链
	46	Sintilimab -VH-in IgG1AA-hole	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTIFSSYAISWVRQAPGQGLEWMGLIIP MFDLAGYAQKFGQGRVAITVDESTIS'LAYMELSSLRSEDTAVYYCARAEHSST'G TFDYWGQGLTVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVIT VSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNT KVDKKVEPKSCDKTHCTPCPAPEAAAGPSVFLPPKPKDTLMISRTPEVTCVV VDVSHEDPEVKENWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVSVSLTVLHQDWL NGKEYCKVSNKALPAPIEKTIISKAKGQPREPQVCTLP'PSRDELTKNQVSLSCA VKGFYSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSPFLYSKLTIVDKSRWQQG NVFCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK	Sintilimab (抗 PD-1) 重链, 其 包含 AA 突变和 hole 突变
表 4: Her2/P D-1_12 6C_12 1C	79	Sintilimab -VH	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSKASGGTIFSSYAISWVRQAPGQGLEWMGLIIP MFDLAGYAQKFGQGRVAITVDESTIS'LAYMELSSLRSEDTAVYYCARAEHSSTG TFDYWGQGLTVTVSS	Sintilimab (抗 PD-1) 重链 VH
	47	Sintilimab -VL in pcDNA3.1-SP-Ig KCL	DIQMTQSPSSVSASVGDRTVITTCRASQGISSWLAWYQQKPGKAPKLLISAASSL QSGVPSRFSGSGGTDFLTITSSLPQEDFAATYYCQQAHLPTFTGGGKVEIKRT VAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVC'LLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQLES VTEQDSKDSITYSLSSITLTLSKADYEKIIKVVYACEVTIIQGLSSPVTKSFNRGEC	Sintilimab (抗 PD-1) 轻链, 其 包含 kappa 轻链恒定区
	80	Sintilimab -VL	DIQMTQSPSSVSASVGDRTVITTCRASQGISSWLAWYQQKPGKAPKLLISAASSL QSGVPSRFSGSGGTDFLTITSSLPQEDFAATYYCQQAHLPTFTGGGKVEIK	Sintilimab (抗 PD-1) 轻链 VL
	43	TZB_HC_F126C _knob	SEQ ID NO:43	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重 链, 其包含 F126C 和 knob 突变
表 4: Her2/P D-1_12 6C_12 1C	44	TZB_LC_S121C	SEQ ID NO:44	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻 链, 其包含 S121C
	46	Sintilimab -VH-in IgG1AA-hole	SEQ ID NO:46	Sintilimab (抗 PD-1) 重链, 其 包含 AA 突变和 hole 突变
	47	Sintilimab -VL in pcDNA3.1-SP-Ig KCL	SEQ ID NO:47	Sintilimab (抗 PD-1) 轻链, 其 包含 kappa 轻链恒定区
	43	TZB_HC_F126C _knob	SEQ ID NO:43	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重 链, 其包含 F126C 和 knob 突变
45	TZB_LC_Q124C	SEQ ID NO:45	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻	

6C ₁₂ 4C	46	Sinilimab - VH-in IgG1AA-hole	SEQ ID NO:46		链, 其包含 Q124C	
	47	Sinilimab - VL in pcDNA3.1-SP-Ig KCL	SEQ ID NO:47		Sinilimab (抗 PD-1) 重链, 其 包含 AA 突变和 hole 突变	
	表 7: 组合 1	43	抗体 1, 重链, F126C ₁ knob	SEQ ID NO:43		Sinilimab (抗 PD-1) 轻链, 其 包含 kappa 轻链恒定区
		45	抗体 1, 轻链, Q124C	SEQ ID NO:45		
		41	抗体 2, 重链, hole	SEQ ID NO:41		
表 7: 组合 2	42	抗体 2, 轻链	SEQ ID NO:42			
	48	抗体 1, 重链, F126C ₁ C220S ₁ knob	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFNIKDTYIHWVRQAPGKGLGLEWVARIYPTNGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLR AEDTAVYYCSRWGGDGFYAMDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVCPAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVTHHPAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQYICNVNIKPSNTKVDKKVEPKSSDKTHTCPPCPAPEAAGGPSVFLFPKPKDITLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYCKVSNKALPAPIEKTIISKAKGQPREPQVYVTLPPCRDELTKNQVSLWCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSGDSGFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPGK	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链, 其包含 F126C 和 C220S		
	75	TZB ₁ IIC ₁ WT ₁ knob 的 VH	SEQ ID NO:75		曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链 VH	
	49	抗体 1, 轻链, Q124C ₁ C214S	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGKAPKLLIYSASF LYSGVPSRFSGSRSGTDFLTITSLIQPEDFATYYCQQHYTTPPTFGQGTKEIKR TVAAPSVFIFPPSDVECLKSGTASVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSITYSLSSITLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGDS	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链, 其包含 Q124C 和 C214S		
	76	可变区 VL	SEQ ID NO:76		曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-轻链 VH	

表 7: 组合 3	41	抗体 2 重链 hole	SEQ ID NO:41	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)重链, 其包含 hole 突变
	42	抗体 2 轻链	SEQ ID NO:42	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)轻链
	21	抗体 1, 重链, Q39K_F126C_C220S_knob	SEQ ID NO:21	曲妥珠单抗 TZB(抗-HER2)-重链, 包含 Q39K、F126C 和 C220S, 以及 Knob 突变
	22	抗体 1 轻链, Q38D_Q124C_C214S	SEQ ID NO:22	曲妥珠单抗 TZB-轻链, 其包含 Q38D、Q124C 和 Q214S 突变
	41	抗体 2 重链 hole	SEQ ID NO:41	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)重链, 其包含 hole 突变
表 8: Her2/PD-1	42	抗体 2 轻链	SEQ ID NO:42	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)轻链
	21	TZB_HC_Q39K_F126C_C220S_knob	SEQ ID NO:21	曲妥珠单抗 TZB(抗-HER2)-重链, 包含 Q39K、F126C 和 C220S, 以及 Knob 突变
	22	TZB_LC_Q38D_Q124C_C214S	SEQ ID NO:22	曲妥珠单抗 TZB-轻链, 其包含 Q38D、Q124C 和 Q214S 突变
	46	Similimab VH in IgG1AA-hole	SEQ ID NO:46	Similimab 重链
	47	Similimab VL in peDNA3.1-SP-Ig KCL	SEQ ID NO:47	Similimab 轻链
表 8: Her2/C D47	21	TZB_HC_Q39K_F126C_C220S_knob	SEQ ID NO:21	曲妥珠单抗 TZB(抗-HER2)-重链, 包含 Q39K、F126C 和 C220S, 以及 Knob 突变
	22	TZB_LC_Q38D_Q124C_C214S	SEQ ID NO:22	曲妥珠单抗 TZB-轻链, 其包含 Q38D、Q124C 和 Q214S 突变
	50	CD47_HC_hole	QVQLQESGPGLVKPSSETLSLTCTVSGGSISSYYVSWIRQPPGKGLVWIGYIYYSGSTINYNPSLKSRLTISVDTSKNQFSLKLSSTAAADTAVYYCARGKTCSAAWGQGTLLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAIGCLVKDYFPEPTVTSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVPSPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVPEPKSCDKTHTCPPCPAPEAAGGSFVFLPPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHIE	AD126630 重链

			DPEVKFNWYVDGVEVIUNAKTKPREHQYNSITVRVSVLTVLIQDWLNGKEY KCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVCTLPSPSRDELTKNQVSLSCAVKGFY PSDIAVEWESNGQPNENYKTTTPVLDSDGSFELYSKLTVDKSRWQQGNVFPSCS VMHEALHNHYTQKSLSLSPGK	ADI26630 重链 VH
81			QVQLQESGPGLVKPSETLSLTCTVSGGSISSYYWSWIRQPPGKGLEWIGYIYY GSTINYPNLSKSRVTISVDTSKNQSLKLSSTAAATAVYYCARGKTGSAAWG QGTLTVYSS	ADI26630 轻链
51	CD47_LC		DIQMTQSPSSVSASVGDRTVTITCRASQGISRWLAWYQQKPKGAPKLLIYAASS LQSGVPSRFSGSGGIDFTLTISLQPEDFATYYCQQTIVSFPIFGGGTKVEIKRT VAAPSVEIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWVKVDNALQSGNSQES VTEQDSKDSITYSLSSIIITLSKADYEKIIKVVYACEVTIIGLSSTPVTKSHRGEC	ADI26630 轻链 VL
82			DIQMTQSPSSVSASVGDRTVTITCRASQGISRWLAWYQQKPKGAPKLLIYAASS LQSGVPSRFSGSGGIDFTLTISLQPEDFATYYCQQTIVSFPIFGGGTKVEIK SEQ ID NO:21	曲妥珠单抗 TZB(抗-Her2)-重链 包含 Q39K、F126C 和 C220S, 以及 Knob 突变
21	TZB_HC_Q39K_ F126C_C220S_knob		SEQ ID NO:22	曲妥珠单抗 TZB 轻链, 其包含 Q38D、Q124C 和 Q214S 突变
22	TZB_LC_Q38D_Q124C_C214S		EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGYTFTSYWLIWVVRQAPGKGLEWVGMI DPSNSDITRENPNFKDRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYYCATYRSYVT PLDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPV VSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVPPSSSLGTQTYICNVNHRKPSNT KVDKKVEPKSCDKITLTICPPCAPPAEAGGPSVFLFPPKPKDITLMISRTPDEVTCVV VDVSHIEDPEVKENWYVDGVEVIUNAKTKPREHQYNSITVRVSVLTVLIQDWL NGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVCTLPSPSRDELTKNQVSLSCA VKGFYPSDIAVEWESNGQPNENYKTTTPVLDSDGSFELYSKLTVDKSRWQQG NVFCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK	Onartuzumab 重链
52	cMet_IIC_hole		EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGYTFTSYWLIWVVRQAPGKGLEWVGMI DPSNSDITRENPNFKDRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYYCATYRSYVT PLDYWGQGTLVTVSS	Onartuzumab 重链 VH
18			DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCKSSQSLLYTSSQKNYLAWYQQKPKGAPKLLI YWASTRESGVPSRFSGSGGIDFTLTISLQPEDFATYYCQQTIVSFPIFGG TKVEIKRTVAAPSVEIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWVKVDNAL QSGNSQESVTEQDSKDSITYSLSSIIITLSKADYEKIIKVVYACEVTHQGLSSPVTK SFNRGEC	Onartuzumab 轻链
53	cMet_LC			

表 8:
Her2/c
MET

	17			DIQMTQSPSSLSASVGDRTITCKSSQSLTYTSSQKNYLAWYQQKPKAPKLLI YWASTRESGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFAITYCQQYVAYPWTFGQG TKVEIK	Onartuzumab 轻链 VL
表 10: WT	39	TZB_HC_WT_kn ob		SEQ ID NO:39	曲妥珠单抗 TZB-重链
	40	TZB_LC_WT		SEQ ID NO:40	曲妥珠单抗 TZB-轻链
	41	Hel_HC_hole		SEQ ID NO:41	鸡溶菌酶抗体 Hel 重链
	42	Hel_LC		SEQ ID NO:42	抗 Hel 抗体(抗鸡蛋溶菌酶)轻链
表 10: 组合 1- 组合 5 与表 3 完全一 致					
表 11: 2+IN 端构 型; 仅 二硫键 重塑	56	5E_LC		DIVMTQSPDLSAVSLGERATINCRASESDSYGITFMNWWYQQKPGQPPKLLIYA ASNQSGVPPDRISGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVYYCQQSKEVPWTFQGQTK LEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQS GNSQESVTEQDSKDSITYLSSTLTLSKADYEKIKVYACEVTIQGLSSPVTKSF NRGEC	GPRC5D 抗体轻链
	83			DIVMTQSPDLSAVSLGERATINCRASESDSYGITFMNWWYQQKPGQPPKLLIYA ASNQSGVPPDRISGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVYYCQQSKEVPWTFQGQTK LEIK	GPRC5D 抗体轻链 VL, 无突变
	84			RASESDSYGITFMN	GPRC5D 抗体轻链 VL-CDR1
	85			AASNQGS	GPRC5D 抗体轻链 VL-CDR2
	86			QQSKEVPWT	GPRC5D 抗体轻链 VL-CDR3
	57	5E_IIC_InnoA Innobody 突变 (S364R+D399K)		QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFIGYVMIHWVRQAPGQGLEWMGYI NPYNDVYSHQGHFKGRVTMTISDTSTSTVYVMEISLRSEDTAVYYCAREGRLG LRVLAYWGQGTITLVTSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGTAAALGCLVKDYFPEP VTVSWNSGALTSGVHTPEPAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHEKPS NTKVDKKVEPKSCDKTHICPPCPAPELLGGPSVFLPPKPKDTILMISRTPETVC VVVDVSHEDPLEVKFNWYVDGVEVFINAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLIQD WLNKGKEYCKVSNKALPAPIEKTIISKAKGQPREPQVYTLTPSREIMTKNQVRL	GPRC5D 抗体重链

		TCLVKGYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVVLKSDGSFELYSKLLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPGK			GPRC5D 抗体重链 VH, 无突变
87		QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFIGYVMMHWVRQAPGQGLEWMGYI NPYNDVSIQIGKFKGRVTMTSDTSTSTVYVMESSLRSEDIAVYVCAREGRLG LRVLAYWGQGLTVTVSS			GPRC5D 抗体重链 VH-CDRI
88		GYVMH			GPRC5D 抗体重链 VH-CDR2
89		YINPYNDVSIHQGKFKG			GPRC5D 抗体重链 VH-CDR3
90		EGRLGLRVLAY			GPRC5D VH+sp34.24 VH+Fc
58	5E_sp34.24_CS_ HC_ImoB(F126C +C220S+Y349T+ K370S+K409D)	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFIGYVMMHWVRQAPGQGLEWMGYI NPYNDVSIHQGKFKGRVTMTSDTSTSTVYVMESSLRSEDIAVYVCAREGRLG LRVLAYWGQGLTVTVSSASTKGPSVFLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYHPEP VTVSWNSGALTSGVITTPAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNIKPS NTKVDKKVEPKSCGGGGGGGSEVQLVESGGGLVQPGGSLKLSCAASGFTF NTYAMNWVRQASGKGLWVGRIRSKYNNYATYYADSVKDRFTISRDDSKST LYLQMNSLKTEDTAVYVCARHGNFGQSVWFAYWGQGLTVTVSSASTKGP SVCPAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYHPEPVTVSWNSGALTSGVITTPAVLQS SGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSSDKTHTCPPCP APELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVE VHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYCKCKVSNKALPAPIEKT ISKAKGQPREPQVTLTPPSREEMTKNQVSLTCLVSGFYPSDIAVEWESNGQPEN NYKTTTPVLDSDGSFELYSDLTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPGK			
87		SEQ ID NO:87			GPRC5D VH 无突变
91		EVQLVESGGGLVQPGGSLKLSCAASGFTFTYAMNWVRQASGKGLWVGRIR RSKYNNTATYYADSVKDRFTISRDDSKSTLYLQMNSLKTEDTAVYVCARHGN FGQSVSWFAYWGQGLTVTVSS			sp34.24 VH, 无突变
59	SP34vk_CS_LC (Q124C+C214S)	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRSSITGAVTITSNYANWVQKPKGKAPKGLIGG TNKRAPGVPSRFSGSLIGDKATLTISSLQPELDFATYYCALWYSNLWVFGQGT VEIKRTVAAPSVFIFPPSDEFLKSGTASVVCVLLNNFYPREAKVQWVKVDNALQS GNSQESVTEQDSKDSITYSLSSITLTSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSF NRGESS			sp34.24 轻链
92		DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRSSITGAVTITSNYANWVQKPKGKAPKGLIGG TNKRAPGVPSRFSGSLIGDKATLTISSLQPELDFATYYCALWYSNLWVFGQGT VEIK			sp34.24VL, 无突变
60	5E_K_LC(Q38K)	DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCRASEVDSYGTIFEMNWWYQKPKGQPPKLLIY			GPRC5D 抗体轻链, 其包含
表 11:					

2+1N 端构型：二 硫键重 塑结合 电荷突 变			AASNQSGVPDRFSGSGGTDFLTISSLQAEDVAVYYCQSQSKEVPWITGQGT KLEIKRTVAAPSVEIFPPSDEQLKSGTASVCLLNNFYPRKAVQWVKVDNALQ SGNSQESVTEQDSKDSITYSLSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKS FNRGEC	Q38K 突变
	93		DIVMTQSPDLSAIVSLGERATINCRASEISVDSYGITFMNWO K KPGQPPKLLIY AASNQSGVPDRFSGSGGTDFLTISSLQAEDVAVYYCQSQSKEVPWITGQGT KLEIK	GPRC5D 抗体轻链-VL,其包含 Q38K 突变
	61	5E_D_HC_InnoA Innobody 突变 (S364R+D399K)	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFIGYVMHWVRRDAPGQGGLFWMGYI NPYNDV S QHOGKFKGRVTMTSDTSTVYME L SSLRSEDIAVYYCAREGRLG LRVLAYWGQGTILVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYRPEP VTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTV P SSSLGTQTYICNVNHKPS NTKVDKKVEPKSCDKTHITCPGPCAPPELLGGPSVFLPPKPKDTLMISRTPEVTC VVVDVSHEDPEVKENWYVDGVEVHNAIKTPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD WLNKGEYCKVSNKALPAPIEKTI S SKAGQPREPQVY T LPSPREEMTKNQVRL TCLVKGFPYPSDIAVEWESNGQPENNYK T TPPV L K SDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMIIEALINIY T QKSLSPGK	GPRC5D 抗体重链, 其包含 Q39D 突变
	94		QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFIGYVMHWVRRDAPGQGGLFWMGYI NPYNDV S QHOGKFKGRVTMTSDTSTVYME L SSLRSEDIAVYYCAREGRLG LRVLAYWGQGTILVTVSS	GPRC5D 抗体 VH, 其包含 Q39D 突变
	62	5E_D_SP34.24_K CS_HC_InnoB Inno 突变 (GPRC5D:Q39D) (sp34.24: Q39K+F126C+C2 20S+Y349I+K37 0S+K409D)	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFIGYVMHWVRRDAPGQGGLFWMGYI NPYNDV S QHOGKFKGRVTMTSDTSTVYME L SSLRSEDIAVYYCAREGRLG LRVLAYWGQGTILVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYRPEP VTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTV P SSSLGTQTYICNVNHKPS NTKVDKKVEPKSCGGGGGGSEVQLVESGGGLVQPGGSLKLSCAASGFTF NITYAMNHWVR K ASGKGLWVGRI S KYNNYATYADSVKDRFTISRDDSKST LYLQMNSLKTEDTAVYYCARHGNFGQSYVSWEAYWGQGTITVTVSSASTKGP SV C PLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYRPEPVTISWNSGALTSGVHTFPAVLQ SGLYSLSSVTV P SSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPK S DKTHITCPPCP APELLGGPSVFLPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVE VIINAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLIQD W LNGKEYCKVSNKALPAPIEKT ISKAKGQPREPOV T LPSPREEMTKNQVSLTCLV S SGFYPSDIAVEWESNGQPEN NYK T TPPVLDSDGSFFLY S D LTVDKSRWQQGNVFSCSVMIIEALINIY T QKSL SLSPGK	GPRC5D VII+sp34.24 VII+Fc, GPRC5D VII 包含 Q39D 突变, sp34.24 VH 包含 Q39K 突变
	95		QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFIGYVMHWVRRDAPGQGGLFWMGYI NPYNDV S QHOGKFKGRVTMTSDTSTVYME L SSLRSEDIAVYYCAREGRLG LRVLAYWGQGTILVTVSS	GPRC5D 抗体-VH, 其包含 Q39D 突变

96			EVQLVESGGGLVQPGGSLKLSCAASGFTFTNTYAMNWVHKAASGKGLEWVVGRI RSKYNNYATYYADSVKDRFTISRDDSKSTLYLQMNSLKTEDTAVYYCARHGN FGQSYVSWFAYWGQGTITVTVSS	sp34.24 VH, 其包含 Q39K 突变
63	SP34Vh_DCS_L C (Q38D+Q124C+214S)		DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITICRSTGAVTTISNYANWVQDKPKGAPKGLIGG TNKRAPGVPSRFSGLIGDKATLTISLQPEDFATYYCALWYSNLWVFGQGTK VEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQS GNSQESVTEQDSKDSITYSLSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSF NRGESS	sp34.24 轻链, 其中 sp34.24 VL 包含 Q38D 突变
97			DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITICRSTGAVTTISNYANWVQDKPKGAPKGLIGG TNKRAPGVPSRFSGLIGDKATLTISLQPEDFATYYCALWYSNLWVFGQGTK VEIK	sp34.24 VL, 其包含 Q38D 突变
56	5E_LC		SEQ ID NO:56	GPRC5D 抗体轻链
57	5E_HC_InnoA Innobody 突变 (S364R+D399K)		SEQ ID NO:57	GPRC5D 抗体重链
64	5E_HC_InnoB_sp 34.24_CS (Y349T+K370S+ K409D+I26C+22 0S)		QVQLVQSGAEVVKPGASVKVSCKASGYTFIGYVMHWVVRQAPGQGLEWMGYI NPYNDVSHQHGKFKGRVTMTSDTSTSTVYMESSLRSEDTAVYYCAREGRIG LRVLA YWGQGLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEP VTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPS NTKVDKKVEPKSCDKTHTCTCPAPELGGPSVFLPPKPKD TLMISRTPETVC VVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEFVINA KTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD WLNKGEYKCKVSNKALPAPIEKTIKAKGQPREPQVITLPPSRHEMTKNQVSL TCLVSGFYPSDIAVEWESNGQPENNYK TTPVLDSDGSFFLYSDLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGKGGGGGGGGSEVQLVESGGGLVQ PGSLKLSCAASGFTFTNTYAMNWVVRQASGKGLFWVGRIRSKYNNYATYYAD SVKDRFTISRDDSKSTLYLQMNSLKTEDTAVYYCARHGNFGQSYVSWFAYWG QGTITVTVSSASTKGPSVCP LAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTWNSG	GPRC5D VH+Fc+sp34.24 VH, 两个 VH 都没有突变

表 11:
2+1C
结构
型: 仅
二硫键
重链

表 11: 2+1C 端结构 型: 二 硫键重 塑结合 电荷突 变	87		ALTSGVHTFPVAVLQSSGLYSLSSVVTVTPSSSLGTQTYICNVNIHKPSNTKVDKKV EPKSS	SEQ ID NO:87	GPRC5D VH, 无突变
	91			SEQ ID NO:91	sp34.24 VH, 无突变
	59	SP34Vr_CS_LC(Q124C+C214S)		SEQ ID NO:59	sp34.24 的改造过的轻链
	60	5E_K_LC(Q38K)		SEQ ID NO:60	GPRC5D 抗体轻链
	61	5E_D_HC_ImoA Imobody 突变 (Q39D+S364R+ D399K)		SEQ ID NO:61	GPRC5D 抗体重链
	65	5E_D_HC_ImoB _sp34.24_KCS Imobody 突变 (Q39D+Y349T+K 370S+K409D)+(Q39K+F126C+C2 20S)	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFIGYVMHVVRRDAPGQGLEWVMGYI NPYNDVSQIQGKFKGRVTMTSDTSTSTVYMELSSLRSEDTAVYYCAREGRLG LRVLAYWGQGTILVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEP VTVSWNSGALTSGVHTFPVAVLQSSGLYSLSSVVTVTPSSSLGTQTYICNVNIHKPS NTKVDKKVEPKSCDKTHTCPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTILMISRTPEVTC VVVDVSIIDPEVKFNWYVDGVEVIINAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLIQD WLNQKEYCKVSNKALPAPIEKTIISKAKGQPREPQVYITLPPSREEMTKNQVSL TCLVSGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTIPVLDSDGSFFLYSDLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMIIEALINITYTQKLSLSPKGGGGGGGGSEVQLVESGGGLVQ PGSGSLKSCAASGFTNTYAMNWRVKASGKGLFWVGRIRSKYNNTYATYYAD SVKDRFTISRDDSKSTLYLQMNSLKTEDTAVYYCARIGNFGQSYVSWEAYWG QGTTVTVSSASTKGPSVPLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPVTWNSG ALTSGVHTFPVAVLQSSGLYSLSSVVTVTPSSSLGTQTYICNVNIHKPSNTKVDKKV EPKSS	GPRC5D VH+Fc+sp34.24 VH, GPRC5D VH 包含 Q39D 突变, sp34.24 VH 包含 Q39K 突变	
	95			SEQ ID NO:95	GPRC5D 抗体-VII, 其包含 Q39D 突变
	96			SEQ ID NO:96	sp34.24 VH, 其包含 Q39K 突变
	63	SP34Vr_DCS_L C(Q38D+Q124C+ C214S)		SEQ ID NO:63	sp34.24 的改造过的轻链
	56	5E_LC		SEQ ID NO:56	
表 11: 2+2C 端结构	66	5E_HC_sp34.24_ CS	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFIGYVMHVVRRQAPGQGLEWVMGYI NPYNDVSQIQGKFKGRVTMTSDTSTSTVYMELSSLRSEDTAVYYCAREGRLG		GPRC5D 抗体轻链 GPRC5D VH+Fc+sp34.24 VH,

表 11: 2+2C 端构 型: 二 硫键重 塑结合 电荷突 变		(F126C+C220S)	LRVLA YWGGTILVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGLCLVKDYPEP VTVSWNSGALTSGVHTFPFPAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHHKPS NTKVDDKKVEPKSCDKTHITCPCPAPPELLGGPSVFLFPPKPKDITLMISRTPEVTC VVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD WLNKGEYKCKVSNKALPAPIEKTIISKAKGQPREPQVYITLPPSRREEMTKNQVSL TCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSEFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCVMHEALHNHYTQKSLSLSPGKGGGGGGSEVQLVESGGGLVQ PGSLKLSCAASGFTNTYAMNWRQASGKGLWVGRIRSKYNNYATYYAD SVKDRFTISRDDSKSTLYLQMNSLKTEDTAVYCARHGNFGQSYVSWFAYWG QGTTVTVSSASTKGPSVCPPLAPSSKSTSGGTAALGLCLVKDYPEPPTVSWNSG ALTSGVHTFPFPAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHHKPSNTKVDDKKV EPKSS	GPRC5D VH 和 sp34.24 VH 无 突变
	87		SEQ ID NO:87	GPRC5D VH, 无突变
	91		SEQ ID NO:91	sp34.24 VH, 无突变
	59	SP34Vh_CS_LC	SEQ ID NO:59	sp34.24 的改造过的轻链
	60	5E_K_LC	SEQ ID NO:60	GPRC5D 抗体 LC, 其中 VL 含 有 Q38K 突变
	67	5E_D_HC_sp34.2 4_KCS (Q39D)+(Q39K+ F126C+C220S)	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFIGYVMHWVRDAPGQGLEWMGYI NPYNDVSHQHKFKGRVTMTSDTSTVYMESSLRSEDTAVYYCAREGRLG LRVLA YWGGTILVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGLCLVKDYPEP VTVSWNSGALTSGVHTFPFPAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHHKPS NTKVDDKKVEPKSCDKTHITCPCPAPPELLGGPSVFLFPPKPKDITLMISRTPEVTC VVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD WLNKGEYKCKVSNKALPAPIEKTIISKAKGQPREPQVYITLPPSRREEMTKNQVSL TCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSEFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCVMHEALHNHYTQKSLSLSPGKGGGGGGSEVQLVESGGGLVQ PGSLKLSCAASGFTNTYAMNWRQASGKGLWVGRIRSKYNNYATYYAD SVKDRFTISRDDSKSTLYLQMNSLKTEDTAVYCARHGNFGQSYVSWFAYWG QGTTVTVSSASTKGPSVCPPLAPSSKSTSGGTAALGLCLVKDYPEPPTVSWNSG ALTSGVHTFPFPAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHHKPSNTKVDDKKV EPKSS	GPRC5D VH+Fc+sp34.24 VH, GPRC5D VH 包含 Q39D 突变, sp34.24 VH 包含 Q39K 突变
	95		SEQ ID NO:95	GPRC5D 抗体重链-VH, 其包含 Q39D 突变
	96		SEQ ID NO:96	sp34.24VH,其包含 Q39K 突变

Figure 7A: BCMA /GPC 5D/CD 3	63	SP34V _k _DCS_L C	SEQ ID NO:63	sp34.24 的改造过的轻链
	68	GPC5D_IIC_kn ob (T366W)	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSKASGYTFIGYVMIIWVRQAPGQGLEWVMGYI NPYNDVSQHOGKFKGRVTMTSDTSTSTVYMELSSLRSEDTAVYYCAREGRLG LRVLAYWGQGITLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEP VTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPS NTKVDKKVEPKSCDKTIIICPPCPAPEAAGGPSVFLFPPKPKDILMISRTPEVTC VVVDYSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD WLNKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSL WCLVKGYFSPIDIAVEESNGQPENNYKTTIPVLDSDGSHFLYSKLTVDKSRW OQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPGK	GPC5D 抗体重链
	87		SEQ ID NO:87	GPC5D VH, 无突变
	56	GPC5D_LC	SEQ ID NO:56	GPC5D 抗体轻链
	69	CD3_HC_hole_B CM _{AseFv} (T366S+L368A+ Y407V)+(G100C +G44C)	EVQLVESGGGLVQPGGSLKLSCAASGFTENTYAMNWVRQASGKGLEWVGRI RSKYNNTATYYADSVKDRFTISRDDSKSTLYLQMNSLKTEDTAVYYCARHYN FGQSYVSWFAYWGQGITVTIVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKD YFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVPSSSLGTQTYICNV NHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPEAAGGPSVFLFPPKPKDILMISRT PEVTCVVVDYSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLT VLHODWLNKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTK NQVSLSCAVKGFYPSDIAVEESNGQPENNYKTTIPVLDSDGSHFLYSKLTVD KSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPGAGGGGGGGSDIQMTQSP SSLASVGDRTVITICRASQISIRYLNWYQQKPKAPKLLIYAASLQSGVPSRF SGSGSGTDFTLTISLTQPEDFAIYYCQQKYFDITFCGKTKVEIKGGGGGGGS GGGGLQLQESGPGLVKPSSETLSLTCTVSGGSIVSSSYWTVIRQPPGKCLE WIGSISIAGSTYYNP _{SLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSTVTAADTAVYYCARDRG} DQILDVWWSQGTMTVTVSS	sp34.87 VH + Fc + 38497 scFv
	102		EVQLVESGGGLVQPGGSLKLSCAASGFTENTYAMNWVRQASGKGLEWVGRI SKYNNTATYYADSVKDRFTISRDDSKSTLYLQMNSLKTEDTAVYYCARHYNFG QSYVSWFAYWGQGITVTIVSS	sp34.87VH
	103	G44C	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSKASGYTFIGYVMIIWVRQAPGQGLEWVMGYI NPYNDVSQHOGKFKGRVTMTSDTSTSTVYMELSSLRSEDTAVYYCAREGRLG LRVLAYWGQGITLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEP VTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPS NTKVDKKVEPKSCDKTIIICPPCPAPEAAGGPSVFLFPPKPKDILMISRTPEVTC VVVDYSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD WLNKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSL WCLVKGYFSPIDIAVEESNGQPENNYKTTIPVLDSDGSHFLYSKLTVDKSRW OQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPGK	BCMA-38497 VH, 无突变
	104		WSQGTMTVTVSS	BCMA-38497 VH-CDRI
	105		SSSYWWT	BCMA-38497 VH-CDR2
			SISIAGSTYYNP _{SLKS}	

106		DRGQILDV	BCMA-38497 VH-CDR3
107	G100C	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQISIRYLNWYQOKPGKAPKLLIYAASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFAITYCQOKYFDITFGCGTKVEIK	BCMA-38497 VL
108		RASQISIRYLN	BCMA-38497 VL-CDR1
109		AASSLQS	BCMA-38497 VL-CDR2
110		QOKYFDIT	BCMA-38497 VL-CDR3
111	(G100C+G44C)	DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQISIRYLNWYQOKPGKAPKLLIYAASSL QSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISLQPEDFAITYCQOKYFDITFGCGTKVEIKGGG GSGGGSGGGGSQLQLESGLVKPSETSLTCTVSGGSIVSSYYWTVIRQP PGKCLEWIGISIAGSTYYNPSLKSRTVISVDTSKNQFSLKSSVTAADTAAYYC ARDGQILDVWSQGITMTVSS QAVVTOEPSLTVSPGGTIVTLTCSRSTGAVTTSNYANWVQOKPGQAPRGLIGGT NKRAPGVPARFSGSLLGDKAALTLTLLGAQPEDEAEYYCALWYSNLWVFGQGT KLTVLGGPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSP VKAGVETTTTPSKQSNKYYAASSYLSLTPEQWKSRSYSCQVTHEGSTVEKTV APTECS	BCMA-38497VL-VH scFv
70	CD3_LC	QAVVTOEPSLTVSPGGTIVTLTCSRSTGAVTTSNYANWVQOKPGQAPRGLIGGT NKRAPGVPARFSGSLLGDKAALTLTLLGAQPEDEAEYYCALWYSNLWVFGQGT KLTVL	sp34.87 轻链
112		QAVVTOEPSLTVSPGGTIVTLTCSRSTGAVTTSNYANWVQOKPGQAPRGLIGGT NKRAPGVPARFSGSLLGDKAALTLTLLGAQPEDEAEYYCALWYSNLWVFGQGT KLTVL	sp34.87 轻链可变区，无突变
图 7B: BCMA /GPRC 5D/CD 3 with Charge and cystein e mutatio n	71	QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFEIGYVMHWVVRKAPGQGLEWMGY INPYNDVSHQHGKFKGRVTMTISDTSITSTVYMESSLRSEDTAVYYCAREGRL GLRVLAYWGQGTLLVTVSSASTKGPSVCPAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPE PVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKP SNTKVDKKVEPKSDKTHITCPCPAPEAAGGPSVFLFPKPKDITLMISRIPVET CVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVTHQ DWLNGKEYCKVSNKALPAPIEKTKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVS LWCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFELYSKLTVDKSR WQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPCK QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFEIGYVMHWVVRKAPGQGLEWMGY INPYNDVSHQHGKFKGRVTMTISDTSITSTVYMESSLRSEDTAVYYCAREGRL GLRVLAYWGQGTLLVTVSS	GPRC5D 抗体重链，其包含突 变 Q39K、F126C 和 C220S，以 及 Knob 突变
	113	Q39K	GPRC5D 抗体重链 VH，其包含 突变 Q39K
	72	GPRC5D_DCS_L C Q39K+F126C+C2 20S	GPRC5D 抗体轻链，其包含突 变 Q38D、Q124C 和 C214S

19	Q38D	NRGES DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCRASESVDYSYGITFMNWWYQDKPGQPPKLLIYA ASNQGGVDPDRFSGSGSGTDFTLTISLSQAEDVAVYYCQSKSEVPWITEGQGITK LEIK	GPRC5D 抗体轻链 VL, 其包含 突变 Q38D
73	CD3 D HC hole BCMAscFv (Q39D+T366S+L 368A+Y407V)+(G100C+G44C)	EVQLVESGGGLVQPGGSLKLSCAASGFTNTYAMNWWVRDASGKGLEWVGRI RSKYNNAITYYADSVKDRFTISRDDSKSTLYLQMNSLKTEDTAVYYCARHYN FGQSYVSWFAYWGQGTIVTVSSASTKGPSVPLAPSSKSTSGGTAAAGCLVKD YFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSVAVTVPSSSLGTDITICNV NHPKSTKVDDKKVEPKSCDKTHITCPCPAPEAAGGPSVFLFPKPKDTLMISRT PEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLT VLHQDWLNGKEYCKVSNKALPAPIEKTIKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTK NQVSLSCAVKGFPYSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVD KSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGAGGGGGGSDIQMTQSP SSLSASVGDRTITICRAQSISRNLNWWYQKPGKAPKLLIYAASLSQSGVPSRF SGSGSGTDFTLTISLQPEDFATYYCQOKYFDITFGCGTKVEIKGGGGSGGGGS GGGGSQLQLQESGPGLVKPSFETLSLTCTVSGGSIVSSSYWWIRQPPGKCLE WIGSISIAGSTYYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSVTAADTAVYYCARDRG DQILDVWSQGTMTVTVSS	sp34.87 VH + Fc + 38497 scFv 38497 是 BCMA 抗体
103		SEQ ID NO:103	BCMA-38497 VH, 无突变
107		SEQ ID NO:107	BCMA-38497 VL
111	G100C+G44C	SEQ ID NO:111	BCMA-38497VL-VH scFv
114	Q39D	EVQLVESGGGLVQPGGSLKLSCAASGFTNTYAMNWWVRDASGKGLEWVGRI RSKYNNAITYYADSVKDRFTISRDDSKSTLYLQMNSLKTEDTAVYYCARHYN FGQSYVSWFAYWGQGTIVTVSS	sp34.87VH, 其包含突变 Q39D
74	CD3 K LC Q39K	QAVVTQEPSLTVSPGGITVTLTCRSSTGAVTTSNYANWVQKPKQAPRGLIGG TNKRAPGVPAFSGSLLGDKAALILGAGQPEDEAEYYCALWYNLWVFGQG TKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSP VKAGVETTTPSKQSNKKAASSYLSLTPEQWKSRSYSCQVTHEGSTVEKTV APTECS	sp34.87 轻链, 其包含突变 Q38K
115	Q39K	QAVVTQEPSLTVSPGGITVTLTCRSSTGAVTTSNYANWVQKPKQAPRGLIGG TNKRAPGVPAFSGSLLGDKAALILGAGQPEDEAEYYCALWYNLWVFGQG TKLTVL	sp34.87 轻链 VL, 其包含突变 Q38K
116	野生型 IgG1 CIII 结构域	ASTKGPSVFPLAPSSKSTISGGLTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFP AVLQSSGLYSLSVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKV EPKSC	
117	野生型 IgG1 CH2	APELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVE	

		结构域	VHNAKTKPREEQNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKITI SKAK	
118		野生型 IgG1 CH3 结构域	GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTT PPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCSCVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK	
119			DKTHTCPXCP, 其中 X 是 S 或 P.	
120			HITCPXCP, 其中 X 是 S 或 P	
121			CPXCP, 其中 X 是 S 或 P	
122		人 IgG1 Fc 区多 肽	DKTHTCPCPAPELGGPSVFLPPKPKDITLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVK FNWYVDGVEVHNAKTKPREEQNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSN KALPAPIEKTISKAKGQPREPOVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVE WESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCSCVMHEAL HNHYTQKSLSLSPGK	
123		人 IgG4 Fc 区多 肽	PPCPCPAPEFLGGPSVFLPPKPKDITLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNW YVDGVEVHNAKTKPREEQNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGL PSSIEKTIKAKGQPREPOVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWES NGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCSCVMHEALHNH YTQKSLSLSPGK	
124		人 IgG1 Fc 区, 包 含 Y349C、T366S、L 368A 和 Y407V	DKTHTCPCPAPEAAGGPSVFLPPKPKDITLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVK FNWYVDGVEVHNAKTKPREEQNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVS NKALPAPIEKTISKAKGQPREPOVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIA VEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCSCVMHE ALHNHYTQKSLSLSPGK	
125		人 IgG1 Fc 区, 包 含 S354C 和 T366W	DKTHTCPCPAPEAAGGPSVFLPPKPKDITLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVK FNWYVDGVEVHNAKTKPREEQNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVS NKALPAPIEKTISKAKGQPREPOVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIA VEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCSCVMHE ALHNHYTQKSLSLSPGK	
126		人 IgG1 Fc 区, 包 含突变 S364R 和 D399K	DKTHTCPCPAPELGGPSVFLPPKPKDITLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVK FNWYVDGVEVHNAKTKPREEQNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVS NKALPAPIEKTISKAKGQPREPOVYTLPPSRDEMTKNQVRLTCLVKGFYPSDIA VEWESNGQPENNYKTTTPVLKSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCSCVMHE ALHNHYTQKSLSLSPGK	
127		人 IgG1 Fc 区, 包 含突变 Y349T、 K370S 和 K409D	DKTHTCPCPAPELGGPSVFLPPKPKDITLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVK FNWYVDGVEVHNAKTKPREEQNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVS NKALPAPIEKTISKAKGQPREPOVYTLPPSRDEMTKNQVSLTCLVSGFYPSDIAV	

			EWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSLTVDKSRWQQGNVFCSCVMIEA LHNHYTQKSLSLSPGK
128	人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 Q124C 和 C214S)		RTVAAPSVEFPPSDECLKSGTASVCLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQ ESVTEQDSKDSITYSLSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEG S
54	人 Kappa 轻链 CL 区		RTVAAPSVEFPPSDEQLKSGTASVCLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQ ESVTEQDSKDSITYSLSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
55	人 Lambda 轻链 CL 区		GQPKAAPSVLTLPSPSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGV EITTPSKQSNKYAAASSYLSTLPEQWKSHRYSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS
129	人 IgG1 CH1 (包含 F126C 和 C220S)		ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTF PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHHKPSNTKVDKKVEPKSS
130	人 IgG1 Fc 区, 包含 T366S, L368A 和 Y407V 和 LALA 突变		DKTHITCPCPAPEAAAGGPSVFLFPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVK ENWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKV SKALPAPEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLVCLVKGFYPSDIA VEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCSCVMIE ALENHYTQKSLSLSPGK
131	人 IgG1 Fc 区, 包含 T366W 和 LALA 突变		DKTHITCPCPAPEAAAGGPSVFLFPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVK ENWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKV SKALPAPEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLVCLVKGFYPSDIA VEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCSCVMIE ALENHYTQKSLSLSPGK
132	人 IgG1 CH1 (包含 H168C)		ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTF PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHHKPSNTKVDKKVEPKSC
133	人 IgG1 CH1 (包含 H168C+C220S)		ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTF PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHHKPSNTKVDKKVEPKSS
134	人 IgG1 CH1 (包含 F170C)		ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTC PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHHKPSNTKVDKKVEPKSC
135	人 IgG1 CH1 (包含 F170C+C220S)		ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTC PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHHKPSNTKVDKKVEPKSS
136	人 IgG1 CH1		ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTF PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHHKPSNTKVDKKVEPKSC

		(包含 V173C)	ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP ACLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSS	
137		人 IgG1 CIII (包含 V173C+C220S)	ASTKGPSVFPCAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP AVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSC	
138		人 IgG1 CH1 (包含 L128C)	ASTKGPSVFPCAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP AVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSS	
139		人 IgG1 CIII (包含 L128C+C220S)	ASTKGPSVFPLAPSSKCTSGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSC	
140		人 IgG1 CH1 (包含 S134C)	ASTKGPSVFPLAPSSKCTSGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSC	
141		人 IgG1 CH1 (包含 S134C+C220S)	ASTKGPSVFPLAPSSKCTSGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSS	
142		人 IgG1 CIII (包含 S136C)	ASTKGPSVFPLAPSSKSTCGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSC	
143		人 IgG1 CH1 (包含 S136C+C220S)	ASTKGPSVFPLAPSSKSTCGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP PAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSS	
144		人 IgG1 CIII (包含 P171C)	ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP CAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSC	
145		人 IgG1 CH1 (包含 P171C+C220S)	ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP CAVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSS	
146		人 IgG1 CH1 (包含 T139C)	ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP AVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSC	
147		人 IgG1 CH1 (包含 T139C+C220S)	ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPTVSWNSGALTSGVHTFP AVLQSSGLYSLSSVTVTPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSS	
148		人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 T164C)	RTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQ ESVCEQSDKSDTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGE C	
149		人 Kappa 轻链 CL	RTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQ	

		区 (包含 T164C 和 C214S)	ESVCEQDSKSDSTYSLSSLTLTLKADYEKKHVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRRGE S	
150		人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 S162C)	RTVAAPSVFI PP SD EQ LKSGTASVVC LL NNFY P REAKVQWKVDNALQSGNSQ ECVTEQDSKSDSTYSLSSLTLTLKADYEKKHVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRRGE C	
151		人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 S162C 和 C214S)	RTVAAPSVFI PP SD EQ LKSGTASVVC LL NNFY P REAKVQWKVDNALQSGNSQ ECVTEQDSKSDSTYSLSSLTLTLKADYEKKHVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRRGE S	
152		人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 Q160C)	RTVAAPSVFI PP SD EQ LKSGTASVVC LL NNFY P REAKVQWKVDNALQSGNSC ESVTEQDSKSDSTYSLSSLTLTLKADYEKKHVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRRGE C	
35		人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 Q160C 和 C214S)	RTVAAPSVFI PP SD EQ LKSGTASVVC LL NNFY P REAKVQWKVDNALQSGNSC ESVTEQDSKSDSTYSLSSLTLTLKADYEKKHVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRRGE S	
36		人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 F118C)	RTVAAPSVFI CP PSD EQ LKSGTASVVC LL NNFY P REAKVQWKVDNALQSGNSQ ESVTEQDSKSDSTYSLSSLTLTLKADYEKKHVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRRGE C	
37		人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 F118C 和 C214S)	RTVAAPSVFI CP PSD EQ LKSGTASVVC LL NNFY P REAKVQWKVDNALQSGNSQ ESVTEQDSKSDSTYSLSSLTLTLKADYEKKHVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRRGE S	
38		人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 F116C)	RTVAAPSVCI PP SD EQ LKSGTASVVC LL NNFY P REAKVQWKVDNALQSGNSQ ESVTEQDSKSDSTYSLSSLTLTLKADYEKKHVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRRGE C	
98		人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 F116C 和 C214S)	RTVAAPSVCI PP SD EQ LKSGTASVVC LL NNFY P REAKVQWKVDNALQSGNSQ ESVTEQDSKSDSTYSLSSLTLTLKADYEKKHVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRRGE S	
99		人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 S114C)	RTVAAPCVFI PP SD EQ LKSGTASVVC LL NNFY P REAKVQWKVDNALQSGNSQ ESVTEQDSKSDSTYSLSSLTLTLKADYEKKHVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRRGE C	
100		人 Kappa 轻链 CL 区 (包含 S114C 和 C214S)	RTVAAPCVFI PP SD EQ LKSGTASVVC LL NNFY P REAKVQWKVDNALQSGNSQ ESVTEQDSKSDSTYSLSSLTLTLKADYEKKHVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRRGE S	
101		人 IgG1 Fc 区, 包 含 I366S, L368A	DKTHTCPPCAP ELL GGPSVFLPPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVK FNWYVDGVEVHNAKIKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYCKVVS	

		和 Y407V	NKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLSCAVKGFYPSDIA VEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHE ALINITYTQKSLSPGK	
	20	人 IgG1 Fc 区, 色 含 T366W	DKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDITLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVK FNWYVDGVEVIINAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLIQDWLNGKEYKCKVYS NKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLWCLVKGFYPSDIA VEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHE ALHNHYTQKSLSPGK	

权利要求书

- [权利要求 1] 抗体或其抗原结合片段，其包含一个或多个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和一个或多个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中所述的抗原结合区中的至少一个或多个包含重链CH1和轻链CL，并且在所述CH1-CL的界面上包含二硫键重塑突变，和/或所述抗原结合区中的至少一个或多个包含重链可变区和轻链可变区，所述重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对包含电荷突变，所述电荷突变为将所述氨基酸对上的两个氨基酸分别突变为带有相反电荷的氨基酸；
- 其中所述第一抗原和第二抗原可以相同或不同；
- 优选地，二硫键重塑突变仅包含在一个抗原结合区的CH1-CL界面上。
- [权利要求 2] 权利要求1的抗体或其抗原结合片段，其中二硫键重塑突变包括
- (x)在重链CH1的位置126处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)，且轻链CL的位置124处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)；
 - (xi)在重链CH1的位置168处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)，且轻链CL的位置164处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)；
 - (xii)在重链CH1的位置170处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)，且轻链CL的位置162或164处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)；
 - (xiii)在重链CH1的位置173处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)，且轻链CL的位置160或162处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)；
 - (xiv)在重链CH1的位置128处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)，且轻链CL的位置118处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)；

(xv)在重链CH1的位置134处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)，且轻链CL的位置116处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)；

(xvi)在重链CH1的位置136处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)，且轻链CL的位置114处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)；

(xvii)在重链CH1的位置171处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)，且轻链CL的位置162处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)；

(xviii)在重链CH1的位置139处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)，且轻链CL的位置116处具有一个非半胱氨酸氨基酸至一个半胱氨酸氨基酸的取代(EU编号)。

[权利要求 3]

权利要求2的抗体或其抗原结合片段，其中二硫键重塑突变包括

(xii)在CH1中包含F126C，且在CL中包含Q124C(EU编号)；

(xiii)在CH1中包含H168C，且在CL中包含T164C(EU编号)；

(xiv)在CH1中包含F170C，且在CL中包含T164C(EU编号)；

(xv)在CH1中包含F170C，且在CL中包含S162C(EU编号)；

(xvi)在CH1中包含V173C，且在CL中包含S162C(EU编号)；

(xvii)在CH1中包含V173C，且在CL中包含Q160C(EU编号)；

(xviii)在CH1中包含L128C，且在CL中包含F118C(EU编号)；

(xix)在CH1中包含S134C，且在CL中包含F116C(EU编号)；

(xx)在CH1中包含S136C，且在CL中包含S114C(EU编号)；

(xxi)在CH1中包含P171C，且在CL中包含S162C(EU编号)；

(xxii)在CH1中包含T139C，且在CL中包含F116C(EU编号)。

[权利要求 4]

抗体或其抗原结合片段，其包含一个或多个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和一个或多个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中所述的抗原结合区中的至少一个包含重链CH1和轻链CL，并且在所述CH1-CL的界面上包含二硫键重塑突变，其中所

- 述二硫键重塑突变为在CH1中包含T139C，且在CL中包含F116C，其中所述第一抗原结合区和第二抗原结合区可以相同或不同。
- [权利要求 5] 权利要求2-4中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中二硫键重塑突变还包含重链恒定区-轻链恒定区界面内的链间半胱氨酸被非半胱氨酸取代。
- [权利要求 6] 权利要求5的抗体或其抗原结合片段，其中链间半胱氨酸被非半胱氨酸取代包括在CH1中的第220位的半胱氨酸被非半胱氨酸取代，且在CL的第214位的半胱氨酸被非半胱氨酸取代。
- [权利要求 7] 权利要求6的抗体或其抗原结合片段，其中链间半胱氨酸被非半胱氨酸取代包括在CH1中的C220S/A/V，且在CL中包含C214S/A/V(EU编号)。
- [权利要求 8] 权利要求6的抗体或其抗原结合片段，其中二硫键重塑突变包括
- (xii)在CH1中的F126C和C220S，以及在CL中的Q124C和C214S(EU编号)；
 - (xiii)在CH1中包含H168C和C220S，，且在CL中包含T164C和C214S(EU编号)；
 - (xiv)在CH1中包含F170C和C220S，，且在CL中包含T164C和C214S(EU编号)；
 - (xv)在CH1中包含F170C和C220S，，且在CL中包含S162C和C214S(EU编号)；
 - (xvi)在CH1中包含V173C和C220S，，且在CL中包含S162C和C214S(EU编号)；
 - (xvii)在CH1中包含V173C和C220S，，且在CL中包含Q160C和C214S(EU编号)；
 - (xviii)在CH1中包含L128C和C220S，，且在CL中包含F118C和C214S(EU编号)；
 - (xix)在CH1中包含S134C和C220S，，且在CL中包含F116C和C214S(EU编号)；

(xx)在CH1中包含S136C和C220S，，且在CL中包含S114C和C214S(EU编号)；

(xxi)在CH1中包含P171C和C220S，，且在CL中包含S162C和C214S(EU编号)；

(xxii)在CH1中包含T139C和C220S，，且在CL中包含F116C和C214S(EU编号)。

[权利要求 9]

权利要求1-8中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中CH1区为人的IgG CH1，例如，人IgG1 CH1,人IgG2 CH1,人IgG3 CH1或人IgG4 CH1，例如CH1区包含SEQ ID NO:116所示的氨基酸序列；

和/或CL区为人的Kappa轻链CL区或人的Lambda轻链CL区，例如CL区包含SEQ ID NO:54或SEQ ID NO:55的氨基酸序列。

[权利要求 10]

权利要求8或9的抗体或其抗原结合片段，其中CH1

(i)包含与SEQ ID NO:129所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F126C和C220S；或包含SEQ ID NO:129所示的氨基酸序列或由所述序列组成；

(ii)包含与SEQ ID NO:133所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含H168C和C220S；或包含SEQ ID NO:133所示的氨基酸序列或由所述序列组成；

(iii)包含与SEQ ID NO:135所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F170C和C220S；或包含SEQ ID NO:135所示的氨基酸序列或由所述序列组成；

(iv)包含与SEQ ID NO:137所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%

同一性的氨基酸序列，且包含V173C和C220S；或包含SEQ ID NO:137所示的氨基酸序列或由所述序列组成；

(v)包含与SEQ ID NO:139所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含L128C和C220S；或包含SEQ ID NO:139所示的氨基酸序列或由所述序列组成；

(vi)包含与SEQ ID NO:141所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S134C和C220S；或包含SEQ ID NO:141所示的氨基酸序列或由所述序列组成；

(vii)包含与SEQ ID NO:143所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S136C和C220S；或包含SEQ ID NO:143所示的氨基酸序列或由所述序列组成；

(viii)包含与SEQ ID NO:145所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含P171C和C220S；或包含SEQ ID NO:145所示的氨基酸序列或由所述序列组成；或

(ix)包含与SEQ ID NO:147所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含T139C和C220S；或包含SEQ ID NO:147所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[权利要求 11]

权利要求8-10中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中CL

(i)包含与SEQ ID NO:128所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含Q124C和C124S；或包含SEQ ID NO:128所示的氨基酸序列或由所述序列组成；

- (ii)包含与SEQ ID NO:149所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含T164C和C124S；或包含SEQ ID NO:149所示的氨基酸序列或由所述序列组成；
- (iii)包含与SEQ ID NO:151所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S162C和C124S；或包含SEQ ID NO:151所示的氨基酸序列或由所述序列组成；
- (iv)包含与SEQ ID NO:35所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含Q160C和C124S；或包含SEQ ID NO:35所示的氨基酸序列或由所述序列组成；
- (v)包含与SEQ ID NO:37所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F118C和C124S；或包含SEQ ID NO:37所示的氨基酸序列或由所述序列组成；
- (vii)包含与SEQ ID NO:98所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含F116C和C124S；或包含SEQ ID NO:98所示的氨基酸序列或由所述序列组成；或
- (viii)包含与SEQ ID NO:100所示的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的氨基酸序列，且包含S114C和C124S；或包含SEQ ID NO:100所示的氨基酸序列或由所述序列组成。

[权利要求 12]

权利要求1-11中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所述重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对的位置选自：重链可变区的位置39和轻链可变区的位置38、重链可变区的位置45和轻链可变区的位置87、重链可变区的位置45和轻链可变区的位置44、重链可

变区的位置91和轻链可变区的位置43或重链可变区的位置91和轻链可变区的位置44(kabat编号)。

[权利要求 13] 权利要求1-12中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中至少一个第一抗原结合区中的重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对的位置与至少一个第二抗原结合区的位置相同。

[权利要求 14] 权利要求13中的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原结合区的氨基酸对的位置上的突变后的氨基酸与第二抗原结合区相同位置上的突变后的氨基酸带有相反的电荷。

[权利要求 15] 权利要求14的抗体或其抗原结合片段，其中

(1)在第一抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；

(2)在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；

(3)在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；

(4)在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨

基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；或者

(5)在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸。

[权利要求 16] 权利要求15的抗体或其抗原结合片段，其中所述带正电荷的氨基酸选自K、R或H，和/或所述带负电荷的氨基酸选自E或D。

[权利要求 17] 权利要求16的抗体或其抗原结合片段，其中

(vi).在第一抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置39处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置38处的氨基酸被取代为K；

(vii).在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为K；

(viii).在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K；

(ix).在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为K；

(x).在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗

原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K。

- [权利要求 18] 权利要求1-17中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所述多特异性抗体包含电荷突变和二硫键重塑突变。
- [权利要求 19] 权利要求1-18中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中一个或多个或全部结合相同抗原的抗原结合区包含相同的突变。
- [权利要求 20] 权利要求1-19中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中，第一抗原结合区包含重链可变区、重链恒定区CH1、轻链可变区和轻链恒定区CL，且第二抗原结合区包含重链可变区VH和轻链可变区VL。
- [权利要求 21] 权利要求20的抗体或其抗原结合片段，其中
- 1) 第一抗原结合区包含权利要求1-17中任一项所定义的二硫键重塑突变；或者
 - 2) 第一抗原结合区包含权利要求1-17中任一项所定义的电荷突变；
 - 3) 第一抗原结合区包含权利要求1-17中任一项所定义的二硫键重塑突变和电荷突变；或者
 - 4) 第一抗原结合区包含权利要求1-17中任一项所定义的二硫键重塑突变和电荷突变；且第二抗原结合区包含权利要求1-17中任一项所述的电荷突变。
- [权利要求 22] 权利要求21的抗体或其抗原结合片段，其中
- 1) 第一抗原结合区包含权利要求2-8中任一项所定义的二硫键重塑突变；
 - 2) 第一抗原结合区包含如权利要求12-17中任一项所定义的电荷突变；
 - 3) 第一抗原结合区包含权利要求2-8中任一项所定义的二硫键重塑突变且包含如权利要求12-17中任一项所定义的电荷突变；或者
 - 4) 第一抗原结合区和第二抗原结合区包含如权利要求12-17中任一项所定义的电荷突变，并且第一抗原结合区还包含权利要求2-8中任一项所定义的二硫键重塑突变。

[权利要求 23]

权利要求22的抗体或其抗原结合片段，其中所述多特异性抗体的第一抗原结合区包含选自如下的突变组合：

	重链 VH 突变	重链 CH1 突变	轻链 VL 突变	轻链 CL 突变
组合 1	Q39K	F126C, C220S	Q38D	Q124C, C214S
	Q39K	H168C, C220S	Q38D	T164C, C214S
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	T164C, C214S
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	S162C, C214S
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	S162C, C214S
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	Q160C, C214S
	Q39K	L128C, C220S	Q38D	F118C, C214S
	Q39K	S134C, C220S	Q38D	F116C, C214S
	Q39K	S136C, C220S	Q38D	S114C, C214S
	Q39K	P171C, C220S	Q38D	S162C, C214S
	Q39K	T139C, C220S	Q38D	F116C, C214S
组合 2	L45K	F126C, C220S	Y87D	Q124C, C214S
	L45K	H168C, C220S	Y87D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	Y87D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	Y87D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	Y87D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	Y87D	Q160C, C214S
	L45K	L128C, C220S	Y87D	F118C, C214S
	L45K	S134C, C220S	Y87D	F116C, C214S
	L45K	S136C, C220S	Y87D	S114C, C214S
	L45K	P171C, C220S	Y87D	S162C, C214S
	L45K	T139C, C220S	Y87D	F116C, C214S
组合 3	L45K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S

	L45K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S
	L45K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S
	L45K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S
	L45K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S
	L45K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S
	L45K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S
	L45K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S
	L45K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S
组合 4	Y91K	F126C, C220S	A43D	Q124C, C214S
	Y91K	H168C, C220S	A43D	T164C, C214S
	Y91K	F170C, C220S	A43D	T164C, C214S
	Y91K	F170C, C220S	A43D	S162C, C214S
	Y91K	V173C, C220S	A43D	S162C, C214S
	Y91K	V173C, C220S	A43D	Q160C, C214S
	Y91K	L128C, C220S	A43D	F118C, C214S
	Y91K	S134C, C220S	A43D	F116C, C214S
	Y91K	S136C, C220S	A43D	S114C, C214S
	Y91K	P171C, C220S	A43D	S162C, C214S
	Y91K	T139C, C220S	A43D	F116C, C214S
组合 5	Y91K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S
	Y91K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S
	Y91K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S
	Y91K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S
	Y91K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S
	Y91K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S

	Y91K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S
	Y91K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S
	Y91K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S
	Y91K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S
	Y91K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S

任选地，所述第二抗原结合区还包含选自如下的突变组合：

	重链 VH 突变	轻链 VL 突变
组合 1	Q39D	Q38K
组合 2	L45D	Y87K
组合 3	L45D	P44K
组合 4	Y91D	A43K
组合 5	Y91D	P44K

[权利要求 24] 权利要求23的抗体或其抗原结合片段，其中所述多特异性抗体的所述第一抗原结合区和第二抗原结合区分别包含如下的突变组合：

	第一抗原结合区				第二抗原结合区	
	重链 VH 突变	重链 CH1 突变	轻链 VL 突变	轻链 CL 突变	重链 VH 突变	轻链 VL 突变
组合 1	Q39K	F126C, C220S	Q38D	Q124C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	H168C, C220S	Q38D	T164C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	T164C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	F170C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	V173C, C220S	Q38D	Q160C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	L128C, C220S	Q38D	F118C, C214S	Q39D	Q38K

	Q39K	S134C, C220S	Q38D	F116C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	S136C, C220S	Q38D	S114C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	P171C, C220S	Q38D	S162C, C214S	Q39D	Q38K
	Q39K	T139C, C220S	Q38D	F116C, C214S	Q39D	Q38K
组合 2	L45K	F126C, C220S	Y87D	Q124C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	H168C, C220S	Y87D	T164C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	F170C, C220S	Y87D	T164C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	F170C, C220S	Y87D	S162C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	V173C, C220S	Y87D	S162C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	V173C, C220S	Y87D	Q160C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	L128C, C220S	Y87D	F118C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	S134C, C220S	Y87D	F116C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	S136C, C220S	Y87D	S114C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	P171C, C220S	Y87D	S162C, C214S	L45D	Y87K
	L45K	T139C, C220S	Y87D	F116C, C214S	L45D	Y87K
组合 3	L45K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S	L45D	P44K

	L45K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S	L45D	P44K
	L45K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S	L45D	P44K
	L45K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S	L45D	P44K
	L45K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S	L45D	P44K
	L45K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S	L45D	P44K
	L45K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S	L45D	P44K
	L45K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S	L45D	P44K
	L45K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S	L45D	P44K
	L45K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S	L45D	P44K
	L45K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S	L45D	P44K
组合 4	Y91K	F126C, C220S	A43D	Q124C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	H168C, C220S	A43D	T164C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	F170C, C220S	A43D	T164C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	F170C, C220S	A43D	S162C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	V173C, C220S	A43D	S162C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	V173C, C220S	A43D	Q160C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	L128C, C220S	A43D	F118C, C214S	Y91D	A43K

	Y91K	S134C, C220S	A43D	F116C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	S136C, C220S	A43D	S114C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	P171C, C220S	A43D	S162C, C214S	Y91D	A43K
	Y91K	T139C, C220S	A43D	F116C, C214S	Y91D	A43K
组合 5	Y91K	F126C, C220S	P44D	Q124C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	H168C, C220S	P44D	T164C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	F170C, C220S	P44D	T164C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	F170C, C220S	P44D	S162C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	V173C, C220S	P44D	S162C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	V173C, C220S	P44D	Q160C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	L128C, C220S	P44D	F118C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	S134C, C220S	P44D	F116C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	S136C, C220S	P44D	S114C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	P171C, C220S	P44D	S162C, C214S	Y91D	P44K
	Y91K	T139C, C220S	P44D	F116C, C214S	Y91D	P44K

[权利要求 25]

抗体或其抗原结合片段，其包含一个或多个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和一个或多个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中所述抗原结合区中的至少一个包含重链可变区和轻链可变区，所述重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对包含电荷突变，所述电荷突变为将所述氨基酸对上的两个氨基酸分别突变为带有相反电荷的氨基酸，其中所述重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对的位置选自：重链可变区的位置45和轻链可变区的位置87、重链可变区的位置45和轻链可变区的位置44、重链可变区的位置91和轻链可变区的位置43或重链可变区的位置91和轻链可变区的位置44(kabat编号)。

- [权利要求 26] 权利要求25的抗体或其抗原结合片段，其中至少一个第一抗原结合区中的重链可变区和轻链可变区交界面上的氨基酸对的位置与至少一个第二抗原结合区的位置相同，其中第一抗原和第二抗原相同或不同。
- [权利要求 27] 权利要求26中的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原结合区的氨基酸对的位置上的突变后的氨基酸与第二抗原结合区相同位置上的突变后的氨基酸带有相反的电荷。
- [权利要求 28] 权利要求27的抗体或其抗原结合片段，其中
- (1)在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；
 - (2)在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；
 - (3)在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸；或者
 - (4)在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸；和在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为带负电荷的氨基酸，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为带正电荷的氨基酸。

- [权利要求 29] 权利要求28的抗体或其抗原结合片段，其中所述带正电荷的氨基酸选自K、R或H，和/或所述带负电荷的氨基酸选自E或D。
- [权利要求 30] 权利要求29的抗体或其抗原结合片段，其中
- (v).在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置87处的氨基酸被取代为K；
- (vi).在第一抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置45处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K；
- (vii).在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置43处的氨基酸被取代为K；或
- (viii).在第一抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为K，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为D，同时，在第二抗原结合区中，重链可变区位置91处的氨基酸被取代为D，且轻链可变区位置44处的氨基酸被取代为K。
- [权利要求 31] 权利要求1-30中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所有第一抗原结合区包含相同的突变，且所有第二抗原结合区包含相同的突变。
- [权利要求 32] 权利要求1-31中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原结合区为抗体的Fab片段，和/或第二抗原结合区为抗体的Fab片段。
- [权利要求 33] 权利要求1-32中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体一个或多个或全部第一抗原结合区所包含的轻链恒定区为Kappa轻链恒定区，且一个或多个或全部第二抗原结合区所包含的轻链恒定

区为Lambda轻链恒定区，或者其中一个或多个或全部第一抗原结合区所包含的轻链恒定区为Lambda轻链恒定区，且一个或多个或全部第二抗原结合区所包含的轻链恒定区为Kappa轻链恒定区。

- [权利要求 34] 权利要求1-33中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体还包含第一Fc区和第二Fc区，其中第一Fc区和第二Fc区相同或不同。
- [权利要求 35] 权利要求34的抗体或其抗原结合片段，其中第一Fc区和第二Fc区分别为人的IgG Fc，例如，人IgG1 Fc,人IgG2 Fc,人IgG3 Fc，或人IgG4 Fc，例如包含氨基酸序列SEQ ID NO:122或123或与其具有至少90%同一性，例如95%，96%，97%，99%或更高的同一性的氨基酸序列或由其组成。
- [权利要求 36] 权利要求34或35的多特异性抗体，其中基于Knob-in-Hole技术，在第一Fc区和第二Fc区中引入相应的Knob突变和Hole突变。
- [权利要求 37] 权利要求36的抗体或其抗原结合片段，其中
- a)一个Fc区多肽包含突变T366W，而另一个Fc区多肽包含T366S,L368A和Y407V(编号方式依照EU索引)，或
 - b)一个Fc区包含氨基酸替代S354C和T366W,且另一个Fc区包含氨基酸替代Y349C,T366S,L368A和Y407V(编号方式依照EU索引)。
- [权利要求 38] 权利要求36的多特异性抗体，其中
- a)一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:125所示的氨基酸序列或由其组成，而另一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:124所示的氨基酸序列或由其组成；
 - b)一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:125所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:124所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列；

- c)一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:125所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变S354C和T366W，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:124所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列包含突变Y349C,T366S,L368A和Y407V；
- d)一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:20或131所示的氨基酸序列或由其组成，而另一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:101或130所示的氨基酸序列或由其组成；
- e)一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:20或131所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:101或130所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列；或
- f)一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:20或131所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变T366W，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:101或130所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列包含突变T366S,L368A和Y407V。

- [权利要求 39] 权利要求34或35的抗体或其抗原结合片段，其中基于Innobody技术，在第一Fc区和第二Fc区中引入突变，促进第一Fc区和第二Fc区的异二聚化。
- [权利要求 40] 权利要求39的抗体或其抗原结合片段，其中一个Fc区的CH3包含S364R和D399K突变，且另一个Fc区的CH3突变包含Y349T、K370S和K409D突变。
- [权利要求 41] 权利要求40的抗体或其抗原结合片段，其中

a)一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:126所示的氨基酸序列或由其组成，而另一个Fc区多肽包含SEQ ID NO:127所示的氨基酸序列或由其组成；

b)一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:126所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:127所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列；或

c)一个Fc区包含与SEQ ID NO:126所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变S364R和D399K，而另一个Fc区多肽包含与SEQ ID NO:127所示的氨基酸序列所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列且包含突变Y349T、K370S和K409D。

[权利要求 42] 权利要求34-41中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所述第一和/或第二Fc区包含L234A/L235A突变。

[权利要求 43] 权利要求1-42中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段所结合的抗原选自以下的一个或多个：CD3、BCMA、CD20、Her2、Her3，B7H3、EGFR、Hel、cMET、Axl、GPRC5D、免疫检查点分子例如PD-1、PD-L1、CD47、免疫激活分子如4-1BB、CD40、OX40。

[权利要求 44] 权利要求1-43中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原和第二抗原不同且所述抗体是双特异性抗体。

[权利要求 45] 权利要求44的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体结合选自如下的两个抗原：CD3/BCMA，CD3/CD20，CD3/Her2，Her2/Her3，B7H3/EGFR，PD-L1/CD47，PD-L1/CD40，PD-L1/4-1BB，EGFR/Her3，Her2/Hel，Her2/PD-1，Her2/PD-L1，Her2/CD47，Her2/cMet，或CD3/GPRC5D。

- [权利要求 46] 权利要求44或45的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体包含特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中第一抗原结合区包含第一Fab，第二抗原结合区包含第二Fab，其中第一Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，第二Fab在其CH1的C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)。
- [权利要求 47] 权利要求46的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体是IgG样抗体，其具有如图1所示的构型。
- [权利要求 48] 权利要求46或47所述的抗体或其抗原结合片段，其包含
重链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区，其中重链恒定区CH1在其C末端与第一Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接；
轻链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区；
重链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区，其中重链恒定区CH1在其C末端与第二Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接；
轻链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区。
- [权利要求 49] 权利要求48的抗体或其抗原结合片段；其中
(1)第一抗原结合区特异性结合Her2，其中重链1和轻链1分别包含如下的SEQ ID NO:所示的氨基酸序列，或包含与所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由如下SEQ ID NO所示的序列组成：
i)SEQ ID NO:43和SEQ ID NO:45；
ii)SEQ ID NO:48和SEQ ID NO:49；
iii)SEQ ID NO:21和SEQ ID NO:22；
iv)SEQ ID NO:25和SEQ ID NO:26；

v)SEQ ID NO:25和SEQ ID NO:29;
vi)SEQ ID NO:31和SEQ ID NO:32; 或
vii)SEQ ID NO:31和SEQ ID NO:29;
和/或

(2)第二抗原结合区特异性结合Hel, 重链2和轻链2分别包含如下的SEQ ID NO:所示的氨基酸序列, 或包含与所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由如下SEQ ID NO所示的序列组成:

i)SEQ ID NO:41和SEQ ID NO:42;
ii)SEQ ID NO:23和SEQ ID NO:24;
iii)SEQ ID NO:27和SEQ ID NO:28;
iv)SEQ ID NO:27和SEQ ID NO:30;
v)SEQ ID NO:33和SEQ ID NO:34; 或
vi)SEQ ID NO:33和SEQ ID NO:30;

(2)-1第二抗原结合区特异性结合PD-1, 重链2和轻链2分别包含如下的SEQ ID NO:所示的氨基酸序列, 或包含与所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由如下SEQ ID NO所示的序列组成: SEQ ID NO:46和SEQ ID NO:47;

(2)-2第二抗原结合区特异性结合CD47, 重链2和轻链2分别包含如下的SEQ ID NO:所示的氨基酸序列, 或包含与所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列, 或由如下SEQ ID NO 所示的序列组成: SEQ ID NO:50和SEQ ID NO:51;

(3)-2第二抗原结合区特异性结合c-Met, 重链2和轻链2分别包含如下的SEQ ID NO:所示的氨基酸序列, 或包含与所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一

性的氨基酸序列，或由如下SEQ ID NO所示的序列组成：SEQ ID NO:52和SEQ ID NO:53。

- [权利要求 50] 权利要求44或45的多特异性抗体，其中所述双特异性抗体包含1个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和2个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中第一抗原结合区包含第一Fab，第二抗原结合区包含第二Fab，其中一个第二Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，一个第一Fab在其CH1的C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，且另一个第二Fab在其CH1的C末端与第一Fab的重链可变区的N末端连接(通过或不通过接头)。
- [权利要求 51] 权利要求50的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体是2+1N端构型，其具有如图5A所示的构型。
- [权利要求 52] 权利要求51的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体包含重链1：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区，其中第一Fab重链恒定区CH1在其C末端与第二Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接，且第二Fab在其CH1的C末端与第一Fab的重链可变区的N末端连接(通过或不通过接头)；
轻链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区；
重链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区，其中重链恒定区CH1在其C末端与第一Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接；
轻链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区，
其中所述双特异性抗体包含2条轻链2。
- [权利要求 53] 权利要求52的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原结合区结合CD3，且第二抗原结合区结合GPC5D，例如其中，

1)重链1包含SEQ ID NO:58所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:58所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;

轻链1包含SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;

重链2包含SEQ ID NO:57所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:57所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;和/或

轻链2包含SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;或者

2)重链1包含SEQ ID NO:62所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:62所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;

轻链1包含SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;

重链2包含SEQ ID NO:61所示的氨基酸序列,或包含与SEQ ID NO:61所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列,或由所述氨基酸序列组成;和/或

轻链2包含SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成。

[权利要求 54] 权利要求44或45的多抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体包含1个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和2个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中第一抗原结合区包含第一Fab，第二抗原结合区包含第二Fab，其中2个第二Fab在其CH1的C末端分别与第一Fc区N末端和第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，且第一Fab在重链可变区的N末端与第二Fc区的C末端连接(通过或不通过接头)。

[权利要求 55] 权利要求54的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体是2+1C端构型，其具有如图5B所示的构型。

[权利要求 56] 权利要求55的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体包含
重链1：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区-第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1，其中第二Fab在其CH1的C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，且第一Fab在重链可变区的N末端与第二Fc区的C末端连接(通过或不通过接头)；
轻链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区；
重链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区，其中重链恒定区CH1在其C末端与第一Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接；
轻链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区，
其中所述双特异性抗体包含2条轻链2。

[权利要求 57]

权利要求56的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原结合区结合CD3，且第二抗原结合区结合GPRC5D，例如其中，

1)重链1包含SEQ ID NO:64所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:64所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；

轻链1包含SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；

重链2包含SEQ ID NO:57所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:57所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；和/或

轻链2包含SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；或者

2)重链1包含SEQ ID NO:65所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:65所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；

轻链1包含SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；

重链2包含SEQ ID NO:61所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:61所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96

%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；和/或

轻链2包含SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成。

[权利要求 58] 权利要求44或45的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体包含2个特异性结合第一抗原的第一抗原结合区和2个特异性结合第二抗原的第二抗原结合区，其中第一抗原结合区包含第一Fab，第二抗原结合区包含第二Fab，其中2个第二Fab在其CH1的C末端分别与两个Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)(所述Fc区可以相同或不同)，且2个第一Fab在重链可变区的N末端分别与2个Fc区的C末端连接(通过或不通过接头)

[权利要求 59] 权利要求58的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体是2+2C端构型，其具有如图5C所示的构型。

[权利要求 60] 权利要求59的抗体或其抗原结合片段，其中所述双特异性抗体包含重链：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-Fc区-第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1，其中第二Fab在其CH1的C末端与Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，且第一Fab在重链可变区的N末端与Fc区的C末端连接(通过或不通过接头)；

轻链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区；

轻链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区，

其中所述双特异性抗体包含2条重链。

[权利要求 61] 权利要求60的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原结合区结合CD3，且第二抗原结合区结合GPCR5D，例如其中，

1)重链包含SEQ ID NO:66所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:66所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；

轻链1包含SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:59所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；和/或

轻链2包含SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:56所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；或者

2)重链包含SEQ ID NO:67所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:67所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；

轻链1包含SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:63所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；和/或

轻链2包含SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:60所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成。

[权利要求 62]

权利要求1-43中任一项的抗体或其抗原结合片段，其中所述第一抗原和第二抗原不同，且所述抗体还包含特异性结合一个或多个其他抗原的抗原结合区。

- [权利要求 63] 权利要求62的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体是三特异性抗体。
- [权利要求 64] 权利要求63的抗体或其抗原结合片段，其中所述三特异性抗体包含特异性结合第一抗原的第一抗原结合区、特异性结合第二抗原的第二抗原结合区和特异性结合第三抗原的第三抗原结合区，其中第一抗原结合区包含第一Fab，第二抗原结合区包含第二Fab，其中第一Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，第二Fab在其CH1的C末端与第二Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)，第三抗原结合区包含scFv(例如VH-VL或VL-VH)，其经由或不经由接头在其VH或VL的N末端或C末端(例如scFv是VL-VH，例如VL的N末端)与第二Fc区的C末端连接。
- [权利要求 65] 权利要求64的抗体或其抗原结合片段，其中所述三特异性抗体的构型为2+1C端构型，如图7A或B所示。
- [权利要求 66] 权利要求65的抗体或其抗原结合片段，其中所述多特异性抗体包含
重链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第一Fc区，其中第一Fab在其CH1的C末端与第一Fc区N末端连接(经由或不经由接头，例如铰链区)；
轻链1：从N端至C端包含或由下述组成：第一Fab的轻链可变区-轻链恒定区；
重链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab重链可变区-重链恒定区CH1-第二Fc区-scFv，其中重链恒定区CH1在其C末端与第二Fc区N末端经由或不经由接头(例如铰链区)连接，且scFv经由或不经由接头在其VH或VL的N末端或C末端(例如scFv是VL-VH，例如VL的N末端)与第二Fc区的C末端连接；
轻链2：从N端至C端包含或由下述组成：第二Fab的轻链可变区-轻链恒定区。

- [权利要求 67] 权利要求66的抗体或其抗原结合片段，其中第一抗原结合区特异性结合GPRC5D，第二抗原结合区特异性结合CD3，和/或第三抗原结合区特异性结合BCMA，例如其中
重链1包含SEQ ID NO:71所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:71所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；
轻链1包含SEQ ID NO:72所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:72所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；
重链2包含SEQ ID NO:73所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:73所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成；和/或
轻链2包含SEQ ID NO:74所示的氨基酸序列，或包含与SEQ ID NO:74所示的氨基酸序列具有至少85%、90%、95%、96%、97%、98%、99%的同一性的氨基酸序列，或由所述氨基酸序列组成。
- [权利要求 68] 核酸，其编码权利要求1-67中任一项的抗体或其抗原结合片段，或其任一条或多条链。
- [权利要求 69] 表达载体，其包含权利要求68的核酸。
- [权利要求 70] 宿主细胞，其包含权利要求68的核酸或权利要求69的表达载体。
- [权利要求 71] 制备权利要求1-67中任一项的抗体或其抗原结合片段的方法，其包括
a)将编码抗体或其抗原结合片段的各条链的核酸引入宿主细胞中；
b)在宿主细胞体内表达并组装所述抗体或其抗原结合片段；

任选地，所述抗体或其抗原结合片段被纯化，例如被Protein A纯化。

[权利要求 72] 免疫缀合物，其包含权利要求1-67中任一项的抗体或其抗原结合片段。

[权利要求 73] 融合蛋白，其包含权利要求1-67中任一项的抗体或其抗原结合片段。

[权利要求 74] T细胞受体，其包含权利要求1-67中任一项的抗体或其抗原结合片段。